

109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 大承氣湯與大陷胸湯比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩方皆屬瀉下劑，且兩方皆只能用於實證
(B)大承氣湯之功用為峻下熱結；大陷胸湯之功用為瀉熱逐水
(C)兩方組成中皆有大黃、芒硝、枳實
(D)大承氣湯煮法上，先煮枳實、厚朴，而後納大黃；大陷胸湯先煮大黃而後納諸藥
- 關於《傷寒論》麻子仁丸之敘述，下列何者錯誤？
(A)又名脾約丸
(B)其功用為潤腸瀉熱、行氣通便
(C)其組成為火麻仁、芍藥、枳實、大黃、厚朴、杏仁、蜂蜜
(D)適用於氣虛便秘
- 患者 1 週未解大便，今證見下利清水，味道極臭，脘腹脹滿，腹痛拒按，身熱譫語，口乾舌燥，舌苔焦黑，神疲少氣。治宜以下列何者？
(A)葛根、黃芩、黃連
(B)桔梗、生薑、大棗、甘草、芒硝、枳實、厚朴、人參、當歸、大黃
(C)大黃、附子、乾薑、人參、甘草、當歸、芒硝
(D)玄參、大黃、麥冬、芒硝、生地
- 下列何方由麻黃湯重用麻黃，再加石膏、生薑、大棗而組成？
(A)桂枝二越婢一湯 (B)大青龍湯 (C)小青龍加石膏湯 (D)越婢湯
- 58 歲男性患者於去年 10 月 5 日來院門診，主訴咳喘已 10 餘年，2 天前因受涼而引發咳喘且不能平臥，惡寒，發熱，無汗，咳吐稀痰且量多，經醫生診察舌苔白滑，脈浮。治以下列何方最適宜？
(A)大青龍湯 (B)小青龍湯 (C)麻黃湯 (D)麻黃加朮湯
- 張先生來院門診主訴身發熱，惡寒甚，雖厚衣重被，其寒不減，精神疲倦，經醫師診察舌淡，脈沉弱。治以下列何方最適宜？
(A)麻黃附子細辛湯 (B)敗毒散 (C)參蘇飲 (D)麻黃湯
- 組成中含有大黃的方劑，下列方劑正確者共幾項？①黃龍湯 ②八正散 ③復元活血湯 ④當歸龍薈丸 ⑤枳實導滯丸
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 50 歲林先生，從事貨運工作多年，須輪值日夜三班，飲食不定時，近 2 個月來，肢體酸重疼痛，倦怠無力，飲食無味，不思飲食，大便不調，小便頻數，口苦口乾來院求診，理學檢查發現患者面色不華，舌苔厚膩，脈濡數，下列何方治療最適宜？
(A)《和劑局方》參苓白朮散 (B)《脾胃論》補中益氣湯
(C)《小兒藥證直訣》七味白朮散 (D)《脾胃論》升陽益胃湯
- 有關《醫宗金鑑》五味消毒飲，下列敘述正確者共幾項？①本方以金銀花劑量最大 ②方中加少量酒，且煎藥後熱服，可利於消散癰疽疔瘡 ③陰疽亦可適用本方 ④服用本方需蓋被出汗為度
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 下列方劑中不含《和劑局方》四君子湯之完整組成藥物者有幾項？①《和劑局方》參苓白朮散 ②《脾胃論》補中益氣湯 ③《脾胃論》升陽益胃湯 ④《衛生寶鑑》人參蛤蚧散
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- 11 有關《外臺秘要》黃連解毒湯的敘述，下列何者正確？
(A)方中黃連瀉心火及上中焦火、黃芩清上焦火、梔子瀉下焦火
(B)本方加金銀花，即為梔子金花湯
(C)《金匱要略》三黃瀉心湯，即為本方去黃柏、梔子加大黃，可治濕熱黃疸
(D)本方、《傷寒論》白虎湯與《醫方集解》龍膽瀉肝湯三方組合，即為《疫疹一得》清瘟敗毒飲
- 12 下列藥物有幾項是青蒿鱉甲湯、秦艽鱉甲湯、清骨散的共同組成藥物？①青蒿 ②知母 ③鱉甲 ④地骨皮 ⑤秦艽
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 13 下列何者是左歸丸與六味地黃丸共同藥物？
(A)山藥、茯苓 (B)熟地黃、牛膝 (C)山茱萸、熟地黃 (D)澤瀉、丹皮
- 14 下列何者為當歸補血湯的主治？①產後血虛發熱頭痛 ②瘡瘍潰後久不癒合者 ③勞倦內傷，氣弱血虛，陽浮外越
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 15 有關《傷寒論》白頭翁湯的組方與證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治熱痢，下利膿血，赤多白少，裏急後重，肛門灼熱
(B)方中主藥是白頭翁，味苦性寒，入血分，入大腸與肝經
(C)以黃連、黃芩清熱解毒，燥濕厚腸
(D)以秦皮，苦寒而澀，能涼肝益腎固下焦
- 16 完帶湯是治療婦女白帶的主要方劑，有關其組方原理，下列敘述何者錯誤？
(A)以白朮與山藥，健脾益氣止帶為主藥
(B)以人參與蒼朮，健脾燥濕為次藥
(C)以香附理氣，車前子滲濕，荊芥穗升陽止帶，柴胡疏肝，白芍柔肝為佐藥
(D)以甘草調和諸藥為使藥
- 17 下列何種方劑源自《丹溪心法》，功能滋陰清熱，固經止血，方中有香附，作為反佐藥？
(A)固經丸 (B)大補陰丸 (C)清經湯 (D)當歸六黃湯
- 18 62 歲邱先生罹患右側肺癌第三期，已經手術與放射治療後，最近開始接受標靶治療，來診時主訴標靶治療後開始出現手足末端麻木的現象，理學檢查覺肌力正常，但前臂與小腿皮膚有麻木感覺遲緩的現象。問之平時就容易疲倦，稍步行則氣喘促，手術後症狀加劇。且體重下降，食慾稍減退，三餐規則，睡眠平穩，苔薄白潤舌質淡紅，脈微澀兼緊，若依中醫辨證論治原則，下列治療處方何者最適當？
(A)當歸四逆湯 (B)附子理中湯 (C)補陽還五湯 (D)黃耆桂枝五物湯
- 19 小兒夜間遺尿或頻尿，舌淡脈沉弱，最宜選用下列何者？
(A)牡蠣、黃耆、浮小麥、麻黃根 (B)沙苑蒺藜、芡實、蓮鬚、蓮子、龍骨、牡蠣
(C)山藥、益智仁、烏藥 (D)黃柏、山藥、白果、車前子、芡實
- 20 當歸四逆湯的組成，是當歸、桂枝、白芍、大棗、炙甘草，再加下列那一組藥物？
(A)附子、乾薑 (B)細辛、通草 (C)乾薑、細辛 (D)吳茱萸、細辛
- 21 下列敘述，正確者有幾項？①清熱解毒，消散疔瘡是五味消毒飲的功効 ②龍膽瀉肝湯主治熱毒壅盛三焦之證 ③天花粉、沒藥、白芷是仙方活命飲的組成 ④五味消毒飲與龍膽瀉肝湯沒有共同的藥物組成
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 22 《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯與《攝生眾妙方》定喘湯皆為治療痰多喘嗽之妙方，下列何者不是方劑組成中相同的藥物？
(A)蘇子 (B)杏仁 (C)半夏 (D)甘草（炙甘草）

- 23 有關《金匱要略》溫經湯能溫經散寒、祛瘀養血，為治療經行腹痛常用的方劑，下列敘述何者正確？
(A)山藥、阿膠：甘平，能養肝血、滋腎陰
(B)乾薑辛溫，能夠溫裏散寒；與半夏配伍，則溫中和胃，以助氣血生化
(C)山茱萸通行血脈，為方中次藥
(D)川芎、當歸養血調經，能入肝經活血祛瘀
- 24 《景岳全書》柴胡疏肝散與《太平惠民和劑局方》逍遙散皆為《傷寒論》四逆散加減變化而來，下列敘述何者正確？
(A)《景岳全書》柴胡疏肝散用木香、川芎，枳實換枳殼，增加其行氣止痛之效用
(B)《太平惠民和劑局方》逍遙散用當歸養血，加白朮、陳皮治療肝鬱引起的脾虛及血虛兼證
(C)3 個方劑使用柴胡皆為中劑量（5 分～1 錢），著重其疏肝效力
(D)3 個方劑共同使用的藥物有 3 個
- 25 下列那個方劑其製服法中未特別建議使用酒？
(A)《素問·病機氣宜保命集》金鈴子散
(B)《醫學發明》天台烏藥散
(C)《丹溪心法》越鞠丸
(D)《濟生方》橘核丸
- 26 下列何方具有行氣止痛，軟堅散結之功？
(A)暖肝煎
(B)柴胡疏肝散
(C)橘核丸
(D)天台烏藥散
- 27 有關方劑組成，下列選項何者正確？①越鞠丸含木香 ②柴胡疏肝散含香附 ③天台烏藥散含小茴香 ④厚朴溫中湯含沉香
(A)①②
(B)①④
(C)②③
(D)②④
- 28 安神方劑主治的證型，下列正確者有幾項？①天王補心丹主治心腎兩虛的不眠 ②甘麥大棗湯主治肝鬱心虛的不眠 ③溫膽湯主治痰熱內擾的虛煩不眠 ④逍遙散主治心脾兩虛的不眠
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4
- 29 有關《雜病證治新義》天麻鉤藤飲的敘述，下列何者錯誤？
(A)方中鉤藤宜後下，石決明宜先煎
(B)原書選用天麻為君藥，主要是考量其具有補益的效果
(C)方中組成有益母草，取其活血利水之藥效
(D)透過梔子和黃芩清肝熱，有助於平肝
- 30 有關《溫病條辨》桑杏湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治溫燥襲肺之輕證，津液受灼，乾咳少痰
(B)桑葉、麥冬是與《醫門法律》清燥救肺湯所共有的藥物
(C)豆豉是與《溫病條辨》銀翹散所共有的藥物
(D)原書方後注云：「輕藥不得重用，重用必過病所」，提示邪氣輕淺，用藥亦宜輕清
- 31 有關《重訂嚴氏濟生方》實脾散的敘述，下列何者錯誤？
(A)和《傷寒論》真武湯相比，本方較偏於暖脾
(B)治療證候特點為脾腎陽虛，水邪阻滯氣機，可見到胸腹脹滿症狀
(C)本方包含《三因極一病證方論》附子理中湯去掉人參後的組成藥物
(D)本方同《傷寒論》真武湯，也用芍藥取其利小便作用，又可制約附子溫燥之性
- 32 「下元虛衰，筋骨痿軟無力，故足廢不能用；虛陽浮越，痰濁隨之上逆，堵塞竅道，故舌強不能語」，「治宜溫補下元，攝納浮陽，開竅化痰，宣通心氣」，依上述說明，下列何方較適宜？
(A)河間地黃飲子
(B)羚角鉤藤湯
(C)鎮肝熄風湯
(D)阿膠雞子黃湯

- 33 《外科正宗》消風散的組成中，那些藥最能闡釋「治風先治血，血行風自滅」之意？
(A)石膏、知母 (B)荊芥、防風、牛蒡子、蟬蛻
(C)當歸、生地、胡麻仁 (D)蒼朮、苦參、木通
- 34 下列何者最能反映出《金匱要略》所說「病痰飲者，當以溫藥和之」的方劑？
(A)小建中湯 (B)防己黃耆湯 (C)小青龍湯 (D)苓桂朮甘湯
- 35 有關《韓氏醫通》三子養親湯之敘述，下列何者正確？
(A)紫蘇子降氣，白芥子消食兼降氣，萊菔子除痰
(B)老年人氣虛而喘為其主要適應症
(C)三藥皆為行氣豁痰之品，用之太過則恐傷正氣，不宜久服
(D)萊菔子、紫蘇子氣味芳香，不宜久煎
- 36 有關《傷寒論》小陷胸湯所治證的病機，下列何者正確？
(A)火熱犯肺，灼津為痰 (B)邪熱內陷，痰熱結胸
(C)膽胃不和，痰濁上擾 (D)肺胃痰火，肺氣上逆
- 37 有關李東垣之生脈散與清暑益氣湯的比較敘述，下列何者正確？
(A)生脈散主治夏月感暑、濕困脾傷之證 (B)清暑益氣湯主治暑熱傷氣、耗氣傷陰之證
(C)生脈散主治偏於上下二焦 (D)清暑益氣湯主治偏於中上二焦
- 38 有關《溫病條辨》新加香薷飲敘述，下列何者正確？
(A)本方與《太平惠民和劑局方》香薷散之不同，乃另加有益氣之藥物
(B)其組成為《太平惠民和劑局方》香薷散，另加銀花即成
(C)主治暑溫兼濕證
(D)多汗熱盛者，亦宜本方
- 39 若患者證見上腹悶脹按之不輒，吃得少又覺難以消化，大便稀，苔膩微黃，脈弱，則以下列何方治之最適宜？
(A)《內外傷辨惑論》枳實導滯丸 (B)《證治準繩》健脾丸
(C)《丹溪心法》保和丸 (D)《和劑局方》四君子湯
- 40 10歲小男生，平素健康，因飲食過量，出現胃腸悶脹，隱隱作痛，食慾下降，二便尚可，舌苔厚膩，脈滑。最宜下列何方治療？
(A)半夏、黃芩、黃連、乾薑、甘草、大棗、人參
(B)山楂、神麴、半夏、茯苓、陳皮、連翹、萊菔子
(C)大黃、枳實、神麴、茯苓、黃芩、黃連、白朮、澤瀉
(D)木香、砂仁、陳皮、半夏、人參、茯苓、白朮、甘草
- 41 有關桂枝用法，下列何者最不宜？
(A)心脾陽虛，陽氣不行，水濕內停 (B)感冒頭痛，惡寒發熱，陽盛陰虛
(C)外感風寒，表虛自汗，裏虛腹痛 (D)胸痹、胸痛，心動悸、脈結代
- 42 有關羌活主治，下列敘述何者最不宜？
(A)風濕相搏，本經頭痛，肢體沉重 (B)剛瘕柔瘕，中風不語，頭旋目赤
(C)督脈為病，脊強而厥，血虛痺痛 (D)脾虛濕盛，食少便溏，四肢困弱
- 43 有關木瓜主治，下列敘述何者最不宜？
(A)飲食不慎，嘔吐腹瀉，消化不良 (B)濕熱積滯，腰膝無力，關節疼痛
(C)風濕痺痛，筋脈拘攣，腳氣水腫 (D)暑濕傷中，嘔吐洩瀉，霍亂轉筋

- 44 有關細辛主治，下列敘述何者最宜？
(A)口瘡喉痹，風眼淚下 (B)肺熱咳喘，氣虛汗多
(C)血虛頭痛，腰膝冷痛 (D)陰虛乾咳，痰少稠黏
- 45 荊芥用於祛風解表，下列何者最宜？
(A)全荊芥 (B)炒荊芥 (C)荊芥穗 (D)荊芥炭
- 46 下列何藥用於肝熱犯胃之嘔吐吞酸、口苦、脇痛，作為苦辛通降之「反佐」使用？
(A)山茱萸 (B)五味子 (C)吳茱萸 (D)五倍子
- 47 下列何者為枳殼最適當的功效？
(A)行氣止痛，溫腎納氣 (B)行氣寬中，化痰消積
(C)行氣止痛，溫中和胃 (D)降氣止呃，兼有溫腎助陽
- 48 下列何藥最適合利水滲濕、清腎火？
(A)澤瀉 (B)豬苓 (C)牽牛子 (D)小蘗
- 49 下列何者為陳皮最適當的功效？
(A)理氣調中，燥濕化痰 (B)疏肝破氣，散結消滯
(C)行氣止痛，溫中和胃 (D)降氣止呃，兼有溫腎助陽
- 50 下列何藥具有行氣止痛，溫腎助陽之功？
(A)丁香 (B)沉香 (C)山茱萸 (D)九香蟲
- 51 下列何藥，藥性溫而不燥，化濁又能發表、止嘔，常用於夏令，治療暑濕？
(A)砂仁 (B)藿香 (C)厚朴 (D)草果
- 52 下列何者常用於利水通淋之藥對？
(A)芡實、金櫻子 (B)篇蓄、瞿麥 (C)仙靈脾、仙茅 (D)續斷、牛膝
- 53 下列何藥為制相火，退虛熱之用？
(A)黃柏 (B)黃連 (C)黃芩 (D)龍膽
- 54 下列何藥具清肺熱，祛痰排膿，清胃熱，利尿？
(A)瓜蒌 (B)貝母 (C)桔梗 (D)蘆根
- 55 有關夏枯草藥物之敘述，下列何者錯誤？
(A)清肝火 (B)治眼珠疼痛 (C)治癭瘤、瘰癧 (D)治小兒雀盲
- 56 下列何種藥物歸肺胃經，能解肌除煩，止渴？
(A)石膏 (B)葛根 (C)淡豆豉 (D)知母
- 57 下列何者除潤腸通便外，亦可用於水腫腹滿、腳氣等症？
(A)火麻仁 (B)柏子仁 (C)瓜蒌仁 (D)郁李仁
- 58 下列何藥能理氣血，逐寒濕，暖子宮，調經安胎，止諸血？
(A)當歸 (B)澤蘭 (C)續斷 (D)艾葉
- 59 下列何藥生用性滑，行血消瘀，可療撲打損傷；炒黑性澀，止一切血，可治崩帶泄精？
(A)梔子 (B)蒲黃 (C)仙鶴草 (D)卷柏
- 60 下列何藥有通經下乳，除風去痹，消癰腫之效？
(A)浮小麥 (B)菝葜 (C)王不留行 (D)赤小豆
- 61 下列何藥能破血逐瘀，續筋接骨，可用於經閉、骨折損傷？
(A)澤蘭 (B)凌霄花 (C)蟪蟲 (D)水蛭
- 62 下列何藥用於氣血凝滯所致的心腹及肢體疼痛等證，治氣凝血結上下內外諸痛？
(A)丁香 (B)菝葜 (C)丹參 (D)延胡索

- 63 有關山藥的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)補脾養胃 (B)生津益肺 (C)補腎澀精 (D)托毒生肌
- 64 有關鹿茸的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)壯腎陽 (B)調衝任 (C)托瘡毒 (D)溫肺定喘
- 65 下列何種補陰藥具有益胃生津，滋陰清熱、明目、強腰膝之功效？
(A)石斛 (B)沙參 (C)天冬 (D)黃精
- 66 有關黃耆的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)表實邪盛、氣滯濕阻 (B)食積內停、陰虛陽亢
(C)皮水浮腫，小便不力 (D)癰疽初起或潰後熱毒尚盛
- 67 白及味苦而辛，性瀋而收，可治下列何者？
(A)肺癰，乾欬 (B)吐血 (C)喘渴，喉痹 (D)肝痿，肝虛
- 68 下列何種補陽藥具有補肝腎、行血脈、續筋骨、止漏安胎之功效？
(A)補骨脂 (B)續斷 (C)骨碎補 (D)狗脊
- 69 下列何種補陽藥具有補腎益精、溫肺定喘、潤腸通便之功效？
(A)益智仁 (B)蛤蚧 (C)補骨脂 (D)胡桃肉
- 70 林小姐平素有胃潰瘍，近日常感心神不安，失眠，驚悸。下列藥物配伍何者最不適當？
(A)柏子仁、遠志 (B)酸棗仁、牡蠣 (C)龍骨、牡蠣 (D)龍骨、茯苓
- 71 下列何藥有納氣平喘之功？
(A)石決明 (B)白殭蠶 (C)赤石脂 (D)磁石
- 72 下列何藥較無應用於中風、破傷風等證之治療？
(A)蜈蚣 (B)石決明 (C)天麻 (D)全蠍
- 73 下列何藥不用於肝陽上亢所致的頭痛眩暈？
(A)石決明 (B)刺蒺藜 (C)鉤藤 (D)天麻
- 74 下列何藥用於痰壅氣逆、咳嗽氣喘，亦有潤腸通便的功效？
(A)百部 (B)蘇子 (C)貝母 (D)白前
- 75 關於虛煩失眠兼有腸燥便秘的患者，最適合選用下列何藥？
(A)核桃仁 (B)酸棗仁 (C)火麻仁 (D)郁李仁
- 76 有關蓮子和芡實的敘述，何者錯誤？
(A)均可用於脾虛久瀉久痢 (B)均可用於腎虛遺精滑精
(C)均可用於婦女白帶過多 (D)均可用於虛煩驚悸失眠
- 77 下列何藥味鹹，功能消血塊，散痰積？
(A)桃仁 (B)丹參 (C)代赭石 (D)瓦楞子
- 78 檳榔治濕熱痢疾，裏急後重，與下列何藥同用？
(A)蘇子 (B)大黃 (C)木香 (D)牽牛
- 79 有關牡蠣的敘述，下列何者錯誤？
(A)煨後有制酸、止痛之功效
(B)生用重鎮安神、清肝明目
(C)能軟堅散結，適用於痰火鬱結之瘰癧、痰核等證
(D)煨用，長於收斂固澀，有止汗、澀精、止帶之功效
- 80 有關冰片敘述，下列何者錯誤？
(A)外用可以防腐止癢 (B)外用可以清熱止痛
(C)入丸散不宜入湯劑 (D)入丸散需經火研細粉