

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、  
社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、  
牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、  
中醫診斷學）

考試時間：1小時30分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

（二）本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 依《傷寒論》所述，發汗後或下法後，不可更行桂枝湯，汗出而喘，無大熱者，下列診斷何者最適宜？  
(A)風寒束表，營衛不和 (B)營衛不足，肺氣鬱閉  
(C)外感寒邪，陽明熱盛 (D)外感風寒，邪熱壅肺
- 仲景指出「霍亂，自吐下，又利止，復更發熱」依《醫宗金鑑》，如果自嘔吐及瀉利皆停止，但病人仍有頭痛身疼惡寒，更復發熱，下列那一個方劑可治療此病症？  
(A)香薷飲 (B)五苓散 (C)白虎加人參湯 (D)辰砂六一散
- 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》所述，太陽蓄血證的治療，下列何者最不適宜？  
(A)太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，外不解者，宜桃核承氣湯  
(B)太陽病身黃，脈沉結，少腹鞭，小便自利，其人如狂，抵當湯主之  
(C)傷寒有熱，少腹滿，小便利者，宜抵當丸  
(D)太陽病，六七日表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人發狂，小便利，抵當湯主之
- 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》所述，關於痞證的治療，下列何者錯誤？  
(A)傷寒大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也，宜桂枝湯  
(B)心下痞，按之濡，其脈關上浮者，大黃黃連瀉心湯主之  
(C)傷寒發汗，若吐，若下，解後，心下痞鞭，噫氣不除者，旋覆代赭石湯主之  
(D)傷寒五六日，嘔而發熱者，柴胡湯證具，而以他藥下之，心下滿而鞭痛者，半夏瀉心湯主之
- 依近代普遍觀點，《傷寒論》中有關六經病證治則，下列敘述何者正確？  
(A)太陽病在表，一般使用解表法  
(B)陽明病是裡熱實證，均使用下法  
(C)邪入少陽，樞機不利，為半表半裡證，其治法以疏通行氣為主  
(D)太陰病屬脾虛寒濕證，治法以運脾利水為主
- 依《傷寒論》：「吐利，汗出，發熱，惡寒，四肢拘急，手足厥冷者」，下列何方治療最適宜？  
(A)人參、白朮、生薑、附子 (B)乾薑、白朮、附子、甘草  
(C)桂枝、乾薑、人參、附子、甘草 (D)乾薑、生附子、炙甘草
- 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》，傷寒發汗，若吐若下，解後，心下痞硬，噫氣不除者，下列何方治療最適宜？  
(A)半夏瀉心湯 (B)生薑瀉心湯 (C)附子瀉心湯 (D)旋覆代赭石湯
- 依《傷寒論》，「淋家，不可發汗」，發汗後會出現下列何症？  
(A)嘔吐 (B)心悸 (C)便血 (D)身痛
- 依《傷寒論》所述：「陽明病，外證云何？」，患者外感熱證太陽病，觀察到那一個症狀是傳變為陽明病的症候，下列何者最不適宜？  
(A)惡寒 (B)汗自出 (C)身熱 (D)惡熱
- 依《醫宗金鑑》：「傷寒若吐、若下後，不解，不大便五六日，上至十餘日，日晡所發潮熱，不惡寒，獨語如見鬼狀。若劇者，循衣摸床，惕而不安，微喘直視」，治以下列何方最適宜？  
(A)大承氣湯 (B)桃核承氣湯 (C)小承氣湯 (D)調胃承氣湯

- 11 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》所述，關於少陽病兼變證的治療，下列何者錯誤？  
(A)傷寒六七日，發熱，微惡寒，支節煩疼，微嘔，心下支結，外證未去者，柴胡桂枝湯主之  
(B)傷寒發熱，汗出不解，心中痞鞭，嘔吐而下利者，大柴胡湯主之  
(C)傷寒五六日，已發汗而復下之，胸脅滿微結，小便不利，渴而不嘔，但頭汗出，往來寒熱，心煩者，柴胡桂枝乾薑湯主之  
(D)傷寒八九日，下之，胸滿煩驚，小便不利，譫語，一身盡重，不可轉側者，小柴胡湯主之
- 12 依《傷寒論》「陽明病，不能食，小便不利，手足濇然汗出，此欲作固瘕。」，其病因病機及症狀，下列何者最不適宜？  
(A)眩暈 (B)水穀不別 (C)胃中冷 (D)大便初硬後溏
- 13 依《傷寒論》少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者，治以下列何方最適宜？  
(A)茯苓、芍藥、生薑、白朮、附子 (B)附子、茯苓、人參、白朮、芍藥  
(C)蔥、乾薑、附子 (D)炙甘草、乾薑、附子
- 14 依《傷寒論》少陰病，得之二三日以上，心中煩，不得臥者，下列何藥物非處方組成之一？  
(A)黃連 (B)梔子 (C)芍藥 (D)阿膠
- 15 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註》，有關少陰病真武湯證，二三日不已，至四五日腹痛下利，設小便利則應屬下列何者最適宜？  
(A)純寒而無水 (B)陰寒兼有水氣之證  
(C)水寒之氣外攻於表 (D)水氣停於上焦胸肺
- 16 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書傷寒論註·厥陰全篇》，虻厥主以烏梅丸，又主久痢者，取其下列何藥性味最適宜？  
(A)酸收苦降 (B)苦溫燥濕 (C)辛熱動虻 (D)酸苦辛溫，寒熱併用
- 17 孫小姐，40歲，身高158公分，體重75公斤，B型肝炎帶原。近日外感出現發熱，口渴不多飲，脘痞腹脹，噁心欲吐等現象，望診呈現舌胖大苔黃膩，切診呈現弦滑數脈。依據上述狀況，下列關於患者病機與治療的敘述，何者最正確？  
(A)其證為邪鬱少陽、胃失和降所致，當以蒿芩清膽湯清泄少陽治之  
(B)孫小姐二日後呈現意識昏迷，此為病機傳變導致耗傷真陰、虛風內動，當以大定風珠治之  
(C)治療後患者意識恢復，此時若餵食過多，會出現兼挾痰飲，需加入溫膽湯治之  
(D)治癒出院後，仍有飲食不消、大便溏薄等症，可以參苓白朮散進行瘥後調理
- 18 溫病學自宋元至明清時代發展，下列敘述何者正確？①後世推崇劉河間為溫病學說的創始人，而有「傷寒宗仲景，熱病崇河間」之說 ②清代溫病學家吳鞠通稱王安道「始能脫卻傷寒，辨證溫病。」 ③溫病學形成完整體系，是在清代以衛氣營血和三焦為核心的理論體系創立 ④葉天士撰述《溫熱論》闡明溫病的發生發展規律，制定了溫病各階段的治療大法  
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 19 溫病在病程中容易出現斑疹、動風、動血和閉竅等險惡證候，下列敘述何者錯誤？  
(A)斑疹常出現於多種溫病，這些溫病可以稱為發疹性溫病，如疫疹  
(B)溫邪內陷心營（血），可閉塞機竅，或引動肝風而癎厥，甚至內脫外閉  
(C)熱盛迫血，可出現急性的多部位、多竅道出血，如咳血、嘔血、便血、尿血和陰道出血  
(D)大量出血可導致氣隨血脫
- 20 根據《溫熱論》論證濕邪為病及其治療的原則，下列敘述何者錯誤？  
(A)「濕熱一去，陽亦衰微」 (B)「在陽旺之軀，胃濕恆多」  
(C)「在陰盛之體，脾濕亦不少」 (D)「然其化熱則不同」
- 21 溫病之浮、洪、數、滑等脈象，常見於熱盛邪實的階段，下列敘述何者錯誤？  
(A)脈浮大而芤，為陽明熱盛而津氣已虛  
(B)洪大之脈僅見於寸部，則為熱傷肺氣  
(C)脈數而細，多為熱邪深入營血或熱犯下焦，真陰受損  
(D)脈濡滑而數，多屬熱壅於內而有外達之機

- 22 下列何時期溫病仍隸屬於傷寒？  
(A)戰國到晉唐 (B)宋到元代 (C)明到清代 (D)民國時代
- 23 蕭先生寒假出遊返家後出現身熱，汗出，面赤，鼻鼾，多睡眠，語言難出，身重難以轉側，舌紅苔黃燥，脈數，治療以下列何方藥最為合適？  
(A)連翹，銀花，桔梗，薄荷，竹葉，甘草，荊芥穗，牛蒡子，淡豆豉，玄參  
(B)麻黃，杏仁，石膏，甘草  
(C)葛根，黃芩，黃連，甘草  
(D)竹葉，石膏，半夏，人參，甘草，粳米
- 24 30 歲男性，素無他病，於春季期間外感，出現身熱面赤，渴欲涼飲，飲不解渴，得水則嘔，按之胸下痛，便秘，苔黃，脈洪滑，最宜下列何方治之？  
(A)銀翹散 (B)小陷胸加枳實湯 (C)葛根黃芩黃連湯 (D)白虎湯
- 25 春溫見少腹堅滿疼痛，小便自利，神志如狂或清或亂，脈沉實，用下列那一組藥物治療最適宜？  
(A)桃仁、大黃、芒硝、桂枝、甘草 (B)大黃、芒硝、玄參、麥冬、生地  
(C)桃仁、大黃、芒硝、當歸、芍藥、丹皮 (D)大黃、芒硝、赤芍、生地、黃連、黃柏
- 26 暑傷心腎，其臨床表現和處方用藥，下列敘述何者錯誤？  
(A)其臨床表現為心熱煩躁，消渴不已，舌絳，苔黃厚膩  
(B)本證可用連梅湯。一以清心熱之亢盛，一以滋腎液之不足  
(C)連梅湯組成為雲連、烏梅、麥冬、生地、阿膠  
(D)連梅湯由《傷寒論》黃連阿膠湯加減而來
- 27 門診患者，25 歲女性，四診如下：身熱，腹滿，便秘，口乾唇裂，苔焦燥，脈象沉細。其診斷病機為下列何者？  
(A)熱熾陽明，熱熾傷津 (B)熱熾陽明，熱結腸腑  
(C)陽明熱結，氣血兩虛 (D)陽明熱結，熱盛動風
- 28 關於吳又可《溫疫論》對於溫疫邪離膜原證治，下列敘述何者錯誤？  
(A)感邪輕者，證見發熱不甚，苔白較薄，其脈數  
(B)感邪重者，舌苔滿布如積粉  
(C)邪離膜原的遲速與正氣盛衰有關  
(D)若疫邪隱匿膜原，而無出路，則易誤認為虛勞
- 29 濕溫病，症狀出現寒熱往來如瘧狀，寒甚熱微，身痛有汗，手足沉重，嘔逆脹滿，舌苔白厚膩濁，或如積粉，下列何方劑最適宜？  
(A)雷氏宣透膜原法 (B)雷氏芳香化濁法 (C)黃連溫膽湯 (D)小柴胡湯
- 30 關於暑燥疫「熱毒充斥表裏證」，因淫熱之氣竄於何經，故骨節煩疼，腰如被杖？  
(A)胃經 (B)脾經 (C)膀胱經 (D)腎經
- 31 依吳鞠通《溫病條辨》指出，三種病證在病機與證治有類似之處，「證本同源，前後互參，不可偏執」。下列何者非此三者之一？  
(A)暑溫 (B)風溫 (C)伏暑 (D)濕溫
- 32 秋燥患者，燥熱內結陽明，津傷氣滯，出現便秘、腹脹，神昏譫語，苔黑乾燥等症，最適宜以下列何者治療？  
(A)五仁橘皮湯 (B)小承氣湯加百合、桃仁、杏仁  
(C)調胃承氣湯加鮮首烏、鮮生地、鮮石斛 (D)桃核承氣湯
- 33 依《金匱要略·胸痹心痛短氣病脈證并治第九》，胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，枳實薤白桂枝湯主之或下列何方？  
(A)括蕪薤白半夏湯 (B)人參湯  
(C)桂枝生薑枳實湯 (D)茯苓杏仁甘草湯

- 34 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》，關於痰飲方證之敘述，下列何者最不適當？  
(A)心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，苓桂朮甘湯主之  
(B)夫短氣有微飲，當从小便去之，苓桂朮甘湯主之  
(C)病懸飲者，十棗湯主之  
(D)心下有支飲，其人苦冒眩，茯苓湯主之
- 35 依《金匱要略·奔豚氣病脈證并治第八》，關於奔豚病的病因與證治，下列何者錯誤？  
(A)奔豚病，從驚恐得之  
(B)奔豚氣，從少腹起，上衝咽喉，發作欲死，復還止  
(C)發汗後引發奔豚，氣從少腹上至心，外用灸法，與桂枝加桂湯主之  
(D)發汗後，臍下悸，欲作奔豚，苓桂朮甘湯主之
- 36 依《金匱要略》有關肺痿肺癰之敘述，下列何者錯誤？①寸口脈數，其人咳，口中反有濁唾涎沫者，為肺癰之病 ②若口中辟辟燥，咳即胸中隱隱痛，脈反滑數，此為肺痿，咳唾膿血 ③脈數虛者為肺痿 ④數實者為肺癰  
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 37 依《金匱要略》所述：「諸肢節疼痛，身體尪羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐」，下列何方治療最適當？  
(A)真武湯 (B)防己黃耆湯 (C)桂枝芍藥知母湯 (D)烏藥湯
- 38 《金匱要略·血痹虛勞病脈證并治第六》，有關「勞之為病」有「春夏劇，秋冬瘥」的特徵，下列敘述何者最適當？  
(A)此乃陽虛之證 (B)此乃陰虛之證 (C)此乃血瘀之證 (D)此乃痰濕之證
- 39 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》條文與註解，關於諸黃家病的治法何者錯誤？  
(A)疸而渴者，其疸難治；疸而不渴者，其疸可治  
(B)若脈浮，發於陽部，常有振寒而發熱，當以汗解，宜桂枝加黃耆湯  
(C)若腹滿，身痿黃，煩躁不得睡，小便不利而赤，自汗出，當利小便，宜茵陳五苓散  
(D)黃疸發熱、煩喘、胸滿、口燥，若火劫其汗，導致身盡熱而黃，壯熱，當下之
- 40 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》條文與註解，關於「嘔吐」病的敘述下列何者錯誤？  
(A)乾嘔噦者，若手足厥，是胃陽虛，宜橘皮湯  
(B)乾嘔吐逆，吐涎沫，是胃中寒，宜半夏乾薑散  
(C)嘔而腸鳴，心下痞者，是下寒上熱，腸虛胃實，半夏瀉心湯主之  
(D)食已即吐者，是胃熱上逆，大黃甘草湯主之
- 41 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》條文與註解，關於「下利」病「大承氣湯」證的敘述下列何者錯誤？  
(A)三部脈皆平，按之心下堅者，裏氣不虛  
(B)脈遲而滑者、利未欲止者，內實也  
(C)脈反滑者，有當去之積  
(D)脈反弦、發熱汗出者，滯下之證
- 42 依《金匱要略》所述，關於水氣病的治療，下列何者錯誤？  
(A)風水，脈浮緊身重，不汗出而惡寒者，防己黃耆湯主之  
(B)風水惡風，一身悉腫，脈浮不渴，續自汗出，無大熱，越婢湯主之  
(C)水之為病，其脈沉小，屬少陰，宜麻黃附子湯  
(D)裏水者，越婢加朮湯主之
- 43 依《醫宗金鑑·訂正仲景全書金匱要略註》：病人胸滿、唇痿、舌青、口燥，但欲漱水，不欲嚥，無寒熱，脈微大來遲，腹不滿，其人言我滿，下列原因何者最適宜？  
(A)此因極飲過度所致也 (B)心氣不足 (C)亡血家 (D)為有瘀血

- 44 林先生，32 歲，電腦工程師，勞累過度及壓力大，近半年眠差，偶終夜不寐，頭暈，耳鳴，精神恍惚，心悸健忘，脈弦細無力，舌淡苔白，治以下列何方最適宜？  
(A)酸棗仁湯 (B)柴胡龍骨牡蠣湯 (C)黃連溫膽湯 (D)炙甘草湯
- 45 有關中風的辨證，下列何者錯誤？  
(A)陽閉，是兼有熱象，症見面赤身熱，躁擾不寧，舌質偏紅  
(B)陰閉，是兼有寒象，症見四肢不溫，心中煩悶，舌苔白膩  
(C)閉證是邪閉於內，口禁不開，兩手握固  
(D)脫證是陽脫於外，目合口張，手撒遺尿
- 46 急黃的症狀，身日均黃，高熱煩渴，神昏譫語外，其舌象應如何？  
(A)舌苔白厚且膩 (B)舌質紅絳，苔黃燥 (C)舌紅少苔 (D)舌質淡，苔白膩
- 47 有關熱重於濕之陽黃，下列選項何者較不適當？①症狀是身目俱黃，黃色鮮明，發熱口渴 ②症狀是身目俱黃，頭重身困，胸脘痞滿 ③病機是濕熱薰蒸，膽汁外溢 ④治法宜茵陳五苓散  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 48 有關脅痛的辨證，下列何者正確？  
(A)脅痛如刺，痛處不移，每因情志變化而增減，多為肝氣鬱結  
(B)脅肋隱痛，悠悠不休，遇勞加重，咽乾口燥，多為瘀血停著  
(C)脅肋脹痛，走竄不定，胸悶不舒，目澀不舒，多為肝陰不足  
(D)脅痛重著，觸痛明顯，噁心納呆，多為肝膽濕熱
- 49 「不寐」的治療上，服藥方法很重要，下列那一位醫家在服藥方法上首先提出「日午夜臥服」的觀點？  
(A)隋·巢元方 (B)唐·孫思邈 (C)宋·許叔微 (D)明·張介賓
- 50 有關「心痛」的敘述，下列何者錯誤？  
(A)氣滯胸痛：悶重而痛輕，無定處，兼見脅脹痛，善太息者多  
(B)痰濁胸痛：見多唾痰涎，陰天易作，苔膩者多  
(C)血瘀胸痛：心胸隱痛而悶，固定不移，由動引發，伴氣短心慌者  
(D)真心痛：痛引肩背、右臂、咽喉，腕腹等處，胸悶如窒，喘息，心悸，脈沉細
- 51 有關心悸的敘述，下列何者錯誤？  
(A)驚悸因外界刺激而發病，發時心悸陣作，甚至有欲厥之狀，病情比怔忡重  
(B)心悸為以虛為主，兼挾實邪；所以治療不只補虛為主，化痰滌飲、活血化瘀也為常用之治則  
(C)怔忡為無驚自悸，悸動不安，稍勞尤甚，多有五臟氣血陰陽虧虛之象  
(D)因實邪而致心悸者，多指痰飲、火邪、血瘀之挾雜
- 52 痢下赤白黏凍，白多赤少或純為白凍，伴有腹痛，裡急後重，飲食乏味，胃脘飽悶，頭身重困，舌質淡，苔白膩，脈濡緩。治以下列何方最適宜？  
(A)胃苓湯 (B)真人養臟湯 (C)駐車丸 (D)連理湯
- 53 清代醫家林珮琴在《類證治裁·痞滿》指出：傷寒（熱病）之痞，從外之內，故宜苦泄；雜病之痞，從內之外，故宜下列何者？  
(A)清降 (B)升提 (C)辛散 (D)和解
- 54 有關「腹痛」辨證要點中，下列敘述何者錯誤？  
(A)少腹痛偏於右側，按之更劇，常欲蜷足而臥，發熱、噁心、大便欲解不利，為「腸癰」  
(B)腹中拘攣，繞臍疼痛，冷汗出，怯寒肢冷，脈沉緊者，名為「寒疝」  
(C)少腹近臍左右痛，按之有長形結塊（按之大者如臂、如黃瓜，小者如指），勁如弓弦，往往牽及脅下，名為「瘕癖」  
(D)小腹痛偏在臍下，痛時拘急結聚硬滿，小便自利，甚至發狂，為「淋證」

- 55 下列何者非《景岳全書》對「嘈雜」之論述？  
(A)食已即飢，或雖食不飽者，火嘈也，宜兼清火  
(B)痰多氣滯，似飢非飢，不喜食者，痰嘈也，宜兼化痰  
(C)肺受火傷，不能平木，木挾相火乘肺而嘈也，則宜兼潤肺  
(D)酸水浸心而嘈者，戚戚膨膨，食少無味，此以脾氣虛寒，水穀不化者，宜溫胃健脾
- 56 有關痰濕蘊肺之咳嗽，下列選項何者正確？①咳聲重濁 ②治宜溫肺湯 ③咯痰黏膩或稠厚成塊，痰多易出 ④順氣降火，化痰止咳  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 57 有關咳血的辨證要點，下列選項何者正確？①外感咳血初起無惡寒，但有發熱的表證 ②內傷咳血，病程長，起病較急 ③內傷咳血是臟腑、陰陽，氣血虛衰或偏盛的表現 ④氣虛咳血，是因不能攝血而導致咳血  
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 58 住院患者有咳喘、胸部脹悶等症狀，初步懷疑是喘證，下列辨證何者最正確？  
(A)若伴隨痰量多、稀薄起沫則為風寒上受、肺氣不宣  
(B)若伴隨胸中悶熱、痰量多黏稠色黃，則為肺氣鬱閉  
(C)若咳聲低弱，氣怯聲低，則為表寒鬱熱  
(D)突然呼吸短促，胸悶氣憋，咽中如窒，則為肺虛證
- 59 鼻淵辨證首重虛實，下列何者錯誤？  
(A)初起屬實，久病正虛以氣虛為多 (B)祛邪以清熱一法應用尤廣  
(C)疏風法以風熱相兼為多 (D)病久傷氣，多與肝相關
- 60 有關尿濁的敘述，下列選項何者正確？①尿濁是指小便混濁，白如泔漿，伴見溲時尿道疼痛為特徵的疾患 ②40 歲男性，主訴尿濁多年，白如米泔，日久不癒，勞倦或食油膩厚味更易發作，伴見小腹下墜，神疲乏力，面色不華，舌淡，脈虛軟，治以溫腎固澀，處方為《雜病源流犀燭》鹿茸補澀丸 ③50 歲女性，主訴小便混濁 1 年，或白或赤，伴見胸悶口渴，舌苔黃膩，脈濡數，治以清熱化濕，處方為《醫學心悟》程氏萆薢分清飲 ④尿濁初起以濕熱為多，治以清熱利濕。病久則脾腎虛弱，治以補益脾腎，固澀下元。但補益之劑中，可佐以清利，清利之劑中，又可兼以補益，必須做到清利而不傷陰，補益而不澀滯  
(A)①③ (B)①④ (C)②④ (D)③④
- 61 因風濕外襲，邪客玄府，肺失開合，通調失司，水溢肌膚，而成水腫，下列何者最適當？  
(A)陽水 (B)石水 (C)陰水 (D)腎水
- 62 有關腰痛的敘述，下列選項何者正確？①30 歲男性，因天冷淋雨騎單車環島後出現腰背疼痛 1 日，腰痛如冰，上連背脊，惡寒拘急，喜得熱按，脈緊，治以溫散寒濕，主方為五苓散 ②40 歲男性，從事家俱搬運 10 多年，主訴勞累時腰痠發作，休息減緩，伴見身倦，面色不華，虛羸少氣，脈弱，治以益氣補血，處方為黃耆桂枝五物湯 ③50 歲女性，停經二年，主訴腰膝痠軟無力，腰脊不舉，口乾舌燥，手足心熱，面紅潮熱，心煩少寐，小便黃赤，舌紅苔薄，脈細數，治以滋水制火，處方為六味地黃丸 ④60 歲男性，主訴腰膝痠軟多年，手足不溫，怕冷，面色皸白，小溲清長，舌淡，脈沉細無力，治以溫補腎陽，處方為金匱腎氣丸  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 63 52 歲女性，患有糖尿病，易有飢餓感、雖能進食，但食後全身無力，口渴但飲水不多、時腹瀉，偶水腫，舌淡，脈弱，下列敘述何者正確？  
(A)上消（燥熱傷肺），宜清熱潤燥，生津止渴 (B)中消（脾胃氣虛），宜益氣攝精  
(C)下消（腎虛火亢），宜滋陰固腎 (D)兼消（腫脹），宜實脾利水
- 64 痹證的疼痛共同治療原則，下列何者正確？  
(A)宣通止痛 (B)緩急止痛 (C)散寒止痛 (D)化瘀止痛
- 65 關於「望口唇」之形態變化中，提到「口瘡」是口內唇邊生白色小泡，潰爛後紅腫疼痛，其病機多是由下列何者積熱上熏所致？  
(A)心腎 (B)肝腎 (C)肝脾 (D)心脾
- 66 王小明音啞發聲不出，一位名老中醫對此他下了「金破不鳴」的診斷，下列何者是最可能的證型？  
(A)痰濁壅滯 (B)風熱束肺 (C)虛火灼金 (D)風寒束肺
- 67 關於「小兒食指絡脈三關」如圖，下列敘述何者最適宜？



- (A)甲：「風關」，乙：「命關」；醫師診察時以右手大拇指用力適中由「甲」向「乙」直推  
(B)甲：「風關」，乙：「命關」；醫師診察時以右手大拇指用力適中由「乙」向「甲」直推  
(C)甲：「命關」，乙：「風關」；醫師診察時以右手大拇指用力適中由「甲」向「乙」直推  
(D)甲：「命關」，乙：「風關」；醫師診察時以右手大拇指用力適中由「乙」向「甲」直推
- 68 關於鼻病型態變化與證候，下列敘述何者最不適宜？  
(A)鼻翼煽動，初病多是熱邪風火壅塞肺臟  
(B)鼻腫起者，是邪氣盛。鼻紅腫生瘡，此為血熱。鼻中腫脹窒塞為「鼻塞」，由熱客陽明所致  
(C)鼻內瘻肉，結如榴子，漸大下垂，閉塞孔竅，稱為「鼻痔」。由肺氣熱極，或風濕鬱滯，日久凝濁，結成瘻肉，甚者又名「鼻鼈」  
(D)鼻頭色紅生粉刺者，是酒齧鼻，多因風熱入肺所致
- 69 關於「裂紋舌」主病之相關敘述，下列何者最不適宜？  
(A)血虛不潤 (B)脾虛濕侵 (C)氣滯血瘀 (D)熱盛傷陰
- 70 有關舌與經脈關係之敘述，下列何者最不適宜？  
(A)手少陰之脈連舌本 (B)足少陰之脈挾舌本  
(C)足厥陰之脈系舌本 (D)足太陰之脈連舌本、散舌本
- 71 有位 41 歲的男性上班族，主要工作為業務及處理文書，來門診的主訴為「最近半年來常常在身旁無人時不知不覺地自言自語，若有旁人出現可以立刻回神過來」，此患者最可能的證型為何？  
(A)心氣不足 (B)肝血不足 (C)肺陰不足 (D)腎氣不足

- 72 有關口渴的問診，要注意飲水量的多寡。若口渴飲水量多，則下列何者最不適宜？  
(A)陽明經證 (B)溫病熱入營血 (C)上消證 (D)暑熱證
- 73 以五臟平脈來說，下列敘述何者最適宜？  
(A)肝脈，沉滑而長 (B)心脈，浮濇而短 (C)肺脈，沉小而濡 (D)腎脈，浮大而弦
- 74 有關脈象的敘述，下列何者最適宜？  
(A)肺痿常出現實脈  
(B)散脈是指下感覺不流利的脈象  
(C)虛脈為浮大無根，應指散漫  
(D)痰食內滯，邪氣盛實，多見滑脈
- 75 關於血瘀證的臨床表現，下列何者最不適宜？  
(A)皮膚乾糙無光澤 (B)皮膚絲狀紅縷  
(C)腹壁青筋暴露 (D)疼痛表現為攻痛
- 76 關於濕熱留戀氣分的臨床敘述，下列何者最不適宜？  
(A)胸悶、納呆 (B)發熱、口渴欲飲  
(C)全身困倦 (D)小便短赤、舌苔黃膩
- 77 在三焦辨證中，出現在下焦病證的症狀，下列何者最適宜？①手足蠕動 ②手心熱甚於手背 ③舌絳少苔 ④脈濡滑  
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①③④
- 78 某 83 歲男性患者，主訴胃口不好，白天嗜睡，晚上卻睡不著，口乾，顏面顴骨部位紅得像化妝一般，手足冷冰冰，大便溏，脈細微，其辨證以下列何者最適宜？  
(A)太陰病證 (B)少陽病證  
(C)厥陰病證 (D)少陰寒化證
- 79 患者主訴胸脅脹悶，納呆腹脹，胸悶，抑鬱，腸鳴，大便滑瀉，舌苔白，脈弦，下列診斷何者最適宜？  
(A)肝胃不和 (B)肝脾不調  
(C)寒邪內犯肝胃 (D)寒濕困脾
- 80 關於肝風內動的證型敘述，下列何者最不適宜？  
(A)熱極生風往往因熱邪亢盛所引起  
(B)肝陽化風最易卒然發生  
(C)脈弦有力可以是風陽擾動的病理反應  
(D)陰虛動風往往伴隨頸項強直，角弓反張