

111年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、111年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、心理師考試

代 號：3310

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關顱內壓升高的護理措施，下列何者正確？

- A.採取集中式護理以免干擾病人休息
- B.鼓勵肌肉等長收縮以預防深部靜脈血栓
- C.鼓勵大量喝水以預防便秘
- D.抬高床頭以促進腦部靜脈回流

2.有關大腸直腸癌的敘述，下列何者錯誤？

- A.多數的大腸直腸癌屬於腺癌
- B.常見的症狀為腹痛或排便型態改變
- C.當糞便潛血檢查為陽性即代表罹癌
- D.目前為國人癌症十大死因的前五名

3.有關膽囊切除術後放置T型管病人之護理措施，下列何者正確？

- A.下床或移動床頭高度時要夾住引流管
- B.引流液會越來越多，顏色會略呈淡紅色
- C.進餐前一小時需先夾住引流管
- D.若解灰色便或有脂痢乃正常現象

4.趙奶奶因跌倒導致右腕部骨折，接受後側切開右腕關節置換手術，其術後護理措施，下列何者錯誤？

- A.右腿應避免內旋的擺位姿勢
- B.平躺時雙腿需勤做雙膝觸胸運動
- C.採坐姿時要避免雙腿交叉及久坐
- D.翻身時雙腿需夾著外展枕且翻向左側

5.有關心音的聽診，下列敘述何者正確？

- A.主動脈瓣關閉產生第一心音
- B.肺動脈瓣開啟產生第二心音

- C.僧帽瓣關閉產生第一心音
- D.三尖瓣開啟產生第二心音
- 6.下列何者為冠狀動脈疾病的危險因子？①心搏過慢 ②A型血型 ③男性 ④抽菸 ⑤懷孕婦女
- A.①③
- B.②④
- C.②⑤
- D.③④
- 7.病人接受化學治療時造成尿酸增加的原因，下列何者正確？
- A.大量細胞被破壞
- B.肝功能受損
- C.腎功能變差
- D.嚴重嘔吐
- 8.下列何者屬於免疫複合體性過敏反應？
- A.枯草熱
- B.類風濕性關節炎
- C.輸血反應
- D.移植排斥
- 9.與後天免疫不全症候群（AIDS）有關的續發性惡性腫瘤，包括下列那幾項？①卡波西氏肉瘤 ②神經母細胞瘤 ③口腔或陰道鱗狀表皮腫瘤 ④非何杰金氏淋巴瘤 ⑤多發性骨髓瘤
- A.①②⑤
- B.①③④
- C.②③④
- D.②④⑤
- 10.有關避免氣管內管氣囊壓迫氣管內微血管之護理措施，下列何者適當？
- A.充氣壓力應小於20 mmHg或25 cmH₂O
- B.應注入10~12 c.c.的空氣
- C.充氣至充氣指示球飽滿緊實為止
- D.充氣至吸、吐氣量相差120 c.c.為止
- 11.有關血液透析病人左下臂動靜脈瘻管之護理措施，下列何者正確？
- A.術後於動靜脈瘻管手臂處密切測量血壓，以評估血循狀況
- B.動靜脈瘻管處，若摸到或聽到血流雜聲，表此處凝血，應速處理

C.不可在動靜脈瘻管處穿刺抽血

D.術後需用繃帶綁住左下臂以保護瘻管

12.下列何種危險因素與膀胱癌較無密切關係？

A.尿液逆流

B.慢性膀胱炎

C.膀胱結石

D.吸菸或吸二手菸

13.下列何者為糖尿病相關慢性合併症的小血管病變？

A.冠狀動脈疾病

B.腦血管疾病

C.手腳麻木感覺異常

D.視網膜病變

14.格雷氏病（Grave's disease）是因下列何種激素異常所致？

A.抗利尿激素

B.甲狀腺素

C.腎上腺素

D.副甲狀腺素

15.有關抗利尿激素分泌不當症候群（SIADH）病人的處置，下列何者正確？

A.攝取低纖食物

B.限鈉飲食

C.禁用利尿劑

D.禁止灌腸

16.低血容性休克病人的尿液排出降低，屬於下列何種代償機轉？

A.交感神經活化，導致腎動脈血管擴張

B.心臟腎上腺素的接受器被刺激，導致心輸出量增加

C.醛固酮與抗利尿荷爾蒙的釋放增加，導致鈉與水的滯留

D.組織間的液體流入血管內，導致腎血流增加

17.氣喘病人長期使用類固醇治療時，應注意下列何項副作用的產生？

A.低血鈉

B.病理性骨折

C.體重下降

D.血氧下降

18.有關體液容積不足的臨床表徵，下列何者錯誤？

A.黏膜乾

B.脈搏快

C.尿量增加

D.血比容升高

19.陳太太詢問護理師：「為什麼出生2天的陳小弟乳房脹大，並分泌白色乳汁？」。下列何項說明較適當？

A.可能是生產過程中受到感染，須立即送檢

B.可能是惡性腫瘤的先兆，須告訴醫師

C.可能是女性荷爾蒙過度分泌，需持續評估其性器官發育

D.這是受母親荷爾蒙的影響，出生1~2週後會自然消失

20.執行兒童心肺復甦術過程中，需評估兒童的脈搏，較適合的檢查部位為何？

A.頸動脈

B.肱動脈

C.橈動脈

D.尺動脈

21.小明注射麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗後，有發燒及出疹現象，母親以電話詢問護理師處置方法，護理師的回應，下列何者較適當？

A.請母親帶小明去看醫生，因為這是嚴重的合併症

B.詢問母親相關問題，並寫下疫苗不良事件報告

C.告知母親這是注射疫苗的症狀，若症狀未改善建議就醫

D.告知母親需將小明與其他孩子隔離，且屋內光線宜保持微暗

22.媽媽帶咳嗽的小美來看門診，小美出生時體重是3.5公斤，現在6個月大，則小美的體重至少要達到多少公斤？

A.4.5

B.7.0

C.9.0

D.10.5

23.王小弟，足月，出生3週，因罹患細支氣管性肺炎，入住新生兒加護病房，有關執行抽痰護理技術的注意事項，下列何者正確？

- A.鼻腔內交感神經分布多，抽吸時易心跳變快，應將鼻腔列為最後抽吸之部位
- B.抽痰時應先抽吸鼻腔，每次抽吸後需休息1~2分鐘，避免反覆抽痰
- C.為能將氣管內管的痰液抽吸乾淨，每次抽吸時間至少持續15秒
- D.抽吸時為避免呼吸道的黏膜受損、出血，因此抽吸壓力不可超過80 mmHg
- 24.醫師執行高膽紅素血症的新生兒換血處置前，護理師依醫囑準備新鮮的或存放在血庫不超過72小時的血液，其主要原因為血液庫存超過3天，血中那一種離子會增高？
- A.鈣
- B.鉀
- C.鐵
- D.鈉
- 25.下列那一項護理措施有助於早產兒的發展？
- A.執行治療時，雙手握住早產兒的雙臂及腿，使其恢復子宮內的姿勢
- B.提供早產兒充足的活動空間，使其伸展肢體，促進動作的穩定發展
- C.病房環境提供明亮的光線，並注意光線變化，以促進視力的發展
- D.經常提供觸摸與探視，並測試各項神經反射，以增加早產兒刺激的機會
- 26.有關新生兒動脈血氧數值，下列何者不在正常範圍內？
- A.氧飽和度95%
- B.PaCO₂：35 mmHg
- C.PaO₂：70 mmHg
- D.pH：7.25
- 27.關於嬰兒鵝口瘡的敘述，下列何者錯誤？
- A.是因白色念珠菌感染引起的
- B.較常見的感染部位是口腔粘膜
- C.可於局部塗抹抗黴菌藥物治療，如滅菌靈（mycostatin）
- D.藥物給與直到白色斑塊消失即可停止
- 28.評估新生兒先天性髖脫位（congenital dislocation of the hip）時，有關歐氏徵象（Ortolani's sign）的敘述，下列何者正確？
- A.兩側髖關節屈曲成90°時，患肢外展受到限制
- B.略施壓力於髖部，並做大腿上下運動，可感覺到股骨頭在關節囊內滑動
- C.下肢屈曲做外展運動時，可聽到卡嗒聲（click）
- D.新生兒仰臥，將髖部屈曲成90°時，患肢之膝部較低

- 29.黃小妹為一名足月新生兒，母親主訴黃小妹突然臉色蒼白、出汗，且有顫抖及躁動現象，其可能正處於下列何種情況？
- A.低血鈉
 - B.低血鉀
 - C.低血鈣
 - D.低血糖
- 30.有關兒童罹患麻疹的護理處置，下列何者正確？
- A.發燒時給與阿斯匹靈（aspirin）製劑之退燒藥
 - B.使用冰的生理食鹽水冰敷，以清除眼睛分泌物
 - C.急性期時，給與流質或軟質飲食
 - D.自發燒起至紅疹開始出現為止，採呼吸道隔離
- 31.有關兒童癲癇藥物的副作用，下列何者錯誤？
- A.Diazepam（Valium）易引起運動失調及呼吸抑制
 - B.Phenytoin（Dilantin）易引起牙齦增生及顆粒性白血球減少症
 - C.Phenobarbital（Luminal）易引起昏睡、肌肉及關節疼痛
 - D.Lorazepam（Ativan）易引起皮疹及黃疸等毒性反應
- 32.君君，2歲，誤食家中裝在寶特瓶的清潔劑，下列護理師的緊急處置較適宜？
- A.給與立即性催吐並補充體液
 - B.給與口腔清潔以利儘早進食
 - C.初步處理時可讓病童喝水
 - D.口鼻抽吸以預防吸入性肺炎
- 33.孔小弟，妊娠週數30週出生，護理師評估他的身體外觀特徵，可發現有下列何種情形？
- A.皮膚較薄且透明，胎毛較少
 - B.耳廓形狀固定，容易摺疊
 - C.陰囊皺褶少，睪丸未降至陰囊
 - D.四肢屈曲，肌肉張力弱
- 34.一位新生兒出生後，護理師將進行Apgar Score的初期評估，其評估指標不包括下列何者項目？
- A.心跳
 - B.血氧
 - C.膚色
 - D.肌肉張力

- 35.小唐出生時，其前臂內側皮膚有一小紅點，現在5個多月了，媽媽主訴那紅點已急速變大到約2公分，經評估檢查後是草莓狀血管瘤（Strawberry hemangioma），有關草莓狀血管瘤的護理指導下列何者正確？
- A.表面凸起皺如草莓，界線不明顯，約在9個月大會自行消失
 - B.表面凸起皺如草莓，界線明顯，約在9歲大時會自行消失
 - C.表面平坦如草莓色，界線不明顯，不會自行消失
 - D.表面平坦如草莓色，界線明顯，不會自行消失
- 36.陳小姐目前在院內待產中，對於將開始的產程變化感到焦慮與不安，有關護理師的處置下列何者最適宜？①傾聽與同理其感受 ②適當運用治療性沉默陪伴陳小姐 ③立即轉介心理師 ④勸告陳小姐不要緊張
- A.①②
 - B.②③
 - C.①④
 - D.③④
- 37.廖太太正處於第一產程的過渡期，頻頻對先生怒罵，且隨著宮縮而大聲喊叫。面對廖太太，下列何種溝通技巧最為適宜？
- A.「請妳多忍耐一點！很快就要結束了！」
 - B.「我知道妳現在很不舒服！我們一起來度過這段辛苦的過程。」
 - C.「生孩子都要經歷這一段，請妳勇敢一點！」
 - D.「醫院為公共場所，妳應該控制一下，不該叫那麼大聲！」
- 38.劉同學18歲，有憂鬱傾向，放學後跑來跟導師道歉，表示班級排名退步都是他的錯，請問劉同學使用的防衛機轉是：
- A.補償（compensation）
 - B.內射（introjection）
 - C.壓抑（suppression）
 - D.昇華（sublimation）
- 39.下列何種抗精神病藥物較不易引起高泌乳血症？
- A.sulpiride
 - B.haloperidol
 - C.clozapine
 - D.chlopromazine
- 40.某國中三年級女生，發現自己懷孕後，上課出現注意力不集中、恍神、感覺不安、混亂、肌肉緊繃等情況，老師發現異狀，詢問時並出現快喘不過氣的症狀。護理人員評估此少女可能有下列那一個疾病？

A.躁鬱症發作

B.精神分裂症

C.焦慮症

D.創傷後壓力症候群

41.家庭訪視是公共衛生護士用來接觸社區家庭的主要方式，有關家庭訪視的敘述，下列何者錯誤？

A.是接觸社區民眾最符合經濟效益的方法

B.與個案互動時間比較充足

C.能配合家庭情況實地指導民眾

D.早期發現及解決家庭的健康問題

42.有關全民健保之特色，下列敘述何者錯誤？

A.獨立自主的財務責任制度

B.強制性、限制性、團體性投保

C.整合勞、農、公保降低行政成本

D.以疾病給付為主不含預防性保健服務

43.下列何者最適合用來評估醫療照顧需求及各種行政需求之考量？

A.致病率

B.死亡率

C.盛行率

D.發生率

44.下列何種菌最容易造成蛋類及牛奶的食物中毒？

A.沙門桿菌

B.金黃葡萄球菌

C.腸炎弧菌

D.肉毒桿菌

45.民國100年1月1日調查結果發現懷孕婦女中，1.29%有妊娠糖尿病，此數據是屬於：

A.期盛行率

B.點盛行率

C.發生率

D.危險率

46.某地共有200,000人，其中0~14歲人口有36,000人，15~22歲人口有10,000人，65歲及以上人口有24,000人，該地依賴人口指數為：

A.6.0

B.24.1

C.42.9

D.53.8

47.有關測量工具的效度，下列敘述何者正確？

A.指此工具可以隨時間的不同而有差異

B.指此工具可以因測量同一母群體之不同樣本而有不同

C.指此工具能夠測量到計劃者想測量的內容

D.指此工具可以用在不同的地區和年齡層

48.擬訂社區衛生護理計畫前，需先完成的步驟，下列何者正確？

A.排定優先順序

B.設定目標

C.尋求可用資源

D.爭取預算

49.以參與式觀察收集社區資料之目的，下列敘述何者錯誤？

A.認識社區中具影響力的活躍人士

B.了解社區中的資源

C.收集社區生命統計資料

D.了解社區民眾活動參與度

50.張太太35歲，現已懷孕17週，第一胎為法洛式四重畸形男嬰，你會建議她做下列何項產前檢查：

A.絨毛採樣術

B.羊膜穿刺

C.平均血球體積檢查

D.臍血採樣術