

112年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

- 1.有關中醫外科學的發展歷史，下列那位醫家有著作《外科樞要》並且認為外科疾病不能只靠以毒攻毒，治其外而不治其內，必須使用內外相輔之綜合療法才是正確？
 - A.孫思邈
 - B.劉涓子
 - C.朱丹溪
 - D.陳藏器
- 2.根據《中醫外科講義》，腫瘍的開刀法主要目的在於切開膿腫，使膿液排出，消腫止痛使之癒合，下列敘述何者正確？
 - A.開刀的切口應在膿腫中央，切開後可因勢利導
 - B.腫瘍膿熟不宜開刀，否則腐爛加深，瘡口難癒
 - C.腫瘍生成中央有透膿之點是最好的開刀時機
 - D.乳房瘡瘍宜側面切開以免傷害乳囊
- 3.下列何者為發生於脛骨及曲凹之處的癢搔皮損，津黃汁極其黏稠，甚則身體煩熱昏冒，而肌肉透紅，更增腫疼？
 - A.風疽
 - B.足發背
 - C.緩疽
 - D.附陰疽
- 4.癰生於篡間，係前陰之後，後陰之前屏翳穴，即會陰穴，稱之為何？
 - A.騎馬癰
 - B.跨馬癰
 - C.腎囊癰
 - D.騙馬墜
- 5.肛門癰，初起紅腫焮痛者，最宜服下列何方？
 - A.神授衛生湯

- B.托裏排膿湯
- C.托裏透膿湯
- D.透膿散
- 6.幽癰，生臍上七寸，初起腫痛，皮色未紅時，若心煩嘔噦，脈沉實者，最宜服下列何方？
- A.托裏透膿湯
- B.內疏黃連湯
- C.六君子湯
- D.白芷升麻湯
- 7.牙疔如延久則牙骨腐蝕，又名下列何者？
- A.螻蛄
- B.穿牙毒
- C.水蛇頭
- D.反唇疔
- 8.面遊風類似脂漏性皮膚炎，多因平素血燥，過食辛辣厚味，以致陽明胃經濕熱受風而起，癢甚者，最宜服用下列何方？
- A.消風散
- B.黃連消毒飲
- C.祛風換肌丸
- D.浮萍丸
- 9.陰囊濕疹為下列何種疾病？
- A.繡毯風
- B.癩風
- C.漏底風
- D.油風
- 10.一名中年男性，近年來頭髮漸漸變少，額角處髮線往後移，日久頭皮部皮紅光亮，毛髮成片脫落，宜內服下列何方加以治療最適宜？
- A.防風通聖散
- B.神應養真丹
- C.蟾酥丸
- D.仙方活命飲
- 11.蕁麻疹發病後四肢皮膚產生風團，顏色鮮紅大小型態不一，可用外治法輔助治療，下列何者最合適？

- A.金黃膏外敷
- B.早晚使用顛倒散外洗
- C.紅油膏外敷
- D.爐甘石洗劑外擦

12.50歲男性，前陰毛際內搔癢難忍，抓破色紅，中含紫點。最可能的診斷為何？

- A.疔瘡
- B.陰虱瘡
- C.淋病
- D.便毒

13.某幼稚園大班學童，罹患慢性鼻竇炎反覆不癒，最近卻在鼻唇與臉頰附近長出許多紅疹與膿胞，還會流出黃稠的分泌物，甚至結成厚痂（如圖所示），下列相關敘述何者錯誤？



- A.宜服「升麻消毒飲」等祛風涼血清熱藥
 - B.痂厚者，用豬油潤之，頻以水洗為宜
 - C.熱甚者，外用「青蛤散」敷之
 - D.濕盛者，可外用「碧玉散」敷之
- 14.有關奶癬的治療，下列何者不適宜？
- A.乳母應忌魚腥動風之物
 - B.皮膚熱極火熱，紅暈成片，治宜收斂
 - C.誤用燙洗，搔癢無度，黃水浸淫，宜服消風導赤湯
 - D.癢起白屑，形如癬疥，可抹潤肌膏
- 15.關於蜘蛛瘡的敘述，下列何者錯誤？
- A.常見於口腔黏膜等處
 - B.初起形如水窠天泡，淡紅微癢且痛
 - C.可內服清熱解毒利濕等藥
 - D.重則亦能使人惡寒發熱，或流水作爛
- 16.纏腰火丹症見皮疹如纍纍珠形，色紅赤，形如雲片，上起風粟，以下列何方劑治療最適宜？

- A.除濕胃苓湯
- B.當歸飲子
- C.神應養真丹
- D.龍膽瀉肝湯

17.瘰癧初起均可服消瘰丸，下列何者不是《醫學心悟》消瘰丸之組成？

- A.昆布
- B.玄參
- C.貝母
- D.牡蠣

18.下列何者不屬於便毒之別名？

- A.血疔
- B.橫痃
- C.便癰
- D.熱癰

19.一位男性患者，因塗抹房術熱藥引起生殖器癢痛堅硬，漸生疙瘩，色紫腐爛，血水淋漓，不時興舉者，治以
下列何法？

- A.養血清熱
- B.疏肝利膽
- C.滲濁固精
- D.洩火解毒

20.淋症，出現胞中脹滿，少腹滿痛，溺有餘瀝，治以沉香散，下列診斷何者最適宜？

- A.石淋
- B.氣淋
- C.血淋
- D.膏淋

21.腓腸肌損傷的相關敘述，下列何者正確？

- A.若產生病變，承山穴為其可使用穴
- B.腓腸肌的附著點足外踝是最容易拉傷處
- C.腓腸肌上的穴位為足三里
- D.損傷時可見垂足症

22.有關骨質疏鬆（Osteoporosis），下列敘述何者正確？


A.身體質量指數（BMI）介於22~24 公斤／平方公尺是危險因子

B.患者往往是老年男人

C.DEXA一般安置於醫院中，常測量腰椎和股骨頸

D.骨密度小於-1

23.針對肱骨外上髁炎的檢查，檢查者將受測者前臂旋前（pronation），手腕完全屈曲，手肘伸直，若在肱骨的外上髁產生疼痛感則為陽性反應（如附圖所示），該測試為下列何者？



A.Mill's test

B.Cozen's test

C.Phalen's test

D.Tinel's sign

24.檢查肩痛的患者時，發現壓痛在肩前外側，屈肘抗阻力痛呈現陽性，下列何種診斷比較符合？

A.肩峰下滑囊炎

B.肩關節周圍炎

C.棘上肌肌腱炎

D.肱二頭肌長頭肌腱炎

25.當拇指伸展時，解剖學的鼻煙盒邊界之肌腱會較為明顯，其中不包含下列那條肌腱？

A.屈拇長肌

B.伸拇長肌

C.伸拇短肌

D.外展拇長肌

26.某搬家工人其左肩肘腕等處痠痛多年，近日因麻木感加重而來門診求治，患者左手掌大魚際肌已呈現萎縮情形，下列何者損傷比較可能？

A.橈神經

B.尺神經

C.前側骨間神經

D.正中神經

27.足背皮膚的感覺跟下列那個皮節（dermatome）無關？

A.L3

B.L4

C.L5

D.S1

28.關於頸部軟組織急性損傷的描述，下列何者錯誤？

A.右側胸鎖乳突肌損傷，會導致頸部向左轉功能障礙

B.落枕為頸部自限性疾患，通常二到三天緩解，一週左右可痊癒

C.拍攝X光片可用以排除骨折或脊椎脫位等情況

D.過度損傷造成C6神經根壓迫，見上臂外側肩章部位感覺異常

29.有關腰肌勞損的敘述，下列何者正確？

A.主要病變在腰背肌纖維、筋膜等軟組織，多合併脊椎關節面狹窄病變

B.年紀大的長者或長期久站的櫃姐彎腰搬重物後出現急性腰痛不得轉側時，可診斷為腰肌勞損

C.某患者若描述其腰痛的發病過程是緩慢的，而且集中在其單側位置的後天脊椎側彎，可診斷為腰肌勞損

D.參加登山團爬玉山攻頂，在山屋過夜時突然出現的腰部劇烈疼痛，可診斷為風寒濕邪引起的腰肌勞損

30.有關肋骨骨折，下列何者錯誤？

A.若發生多處肋骨骨折時可能出現「反常呼吸」的表現

B.肋骨與軟骨交接處骨折，容易從X光片看出

C.當出現嚴重呼吸困難、紫紺甚至休克時應考慮到急診求診

D.X光片的正面照較側面照更容易看出氣胸或血胸的程度

31.關於肩部扭挫傷之併發症，下列何者最不適宜？

A.上臂無力外展，直至60度可自動抬舉，可能是併發肩鎖關節分離

B.肩前有骨性隆突，可能併發肱骨外科頸嵌入性骨折

C.患者用健手托扶患肢前臂，可能是併發肩關節脫位

D.缺乏鍛鍊可能併發肩關節周圍炎

32.35歲男性因手肘疼痛求診，局部腫脹疼痛，刺激尺神經時出現無力感，並見小指間歇性麻感，關於此患者之診治，下列敘述何者最不適宜？

A.俗稱為網球肘

B.患者進行抗阻力屈腕時可能有明顯疼痛

C.腫痛和壓痛點主要在肘內側

D.針灸可選少海和小海進行強刺激

33.關於上肢傷筋的鑑別，下列疾病主要病變及疼痛所在，何者最不適宜？

A.肱骨外上髁炎：手厥陰經

B.鷹嘴滑囊炎：手少陽經

C.肩峰下滑囊炎：手少陽經

D.橈骨莖突韌鞘炎：手陽明經

34.關於de Quervain氏狹窄性韌鞘炎之敘述，下列何者最為適宜？

A.好發於尺骨莖突

B.檢查時將腕關節向橈側傾，產生劇痛，為其特徵

C.外展拇長肌腱為發炎病灶之一

D.此病多數與腕部挫傷有關

35.下列理學檢查特徵與腕橈側疼痛所需鑑別之疾病何者最不適宜？

A.橈骨莖突韌鞘炎：患手拇指在四指內握拳，并向橈側彎曲，可能疼痛加劇

B.腕舟狀骨骨折：第一、二掌骨遠端叩擊腕部痛陽性

C.前臂伸肌周圍炎：抗阻力伸腕痛陽性

D.下尺橈關節扭傷：轉腕可出現聲響，前臂旋前尺骨小頭向背側突出

36.有關下列神經與肌肉之支配，何者正確？

A.喙肱肌：肌皮神經

B.鎖骨下肌：肋間神經

C.肩胛下肌：胸背神經

D.斜方肌：迷走神經

37.增生性腰椎脊椎炎與僵直性脊椎炎之鑑別，下列何者屬於增生性脊椎炎？①多發生在40歲以上男性 ②脊柱

活動一般不受限 ③X光檢查，椎體輪廓模糊 ④小面關節增生清晰 ⑤前縱韌帶多鈣化

⑥ESR (Erythrocyte sedimentation rate) 增高

A.①③④

B.①②④

C.②⑤⑥

D.③⑤⑥

38.檢查腕關節屈曲攣縮的鑑別診斷，下列何種測驗最適當？

A.Ober測驗

B.Telescoping測驗

C.Trendelenburg測驗

D.Thomas測驗

39.有關足跟趾外翻的敘述，下列何者錯誤？

- A.足跟趾外翻是一種常見的跟趾外傾，第一蹠骨內收的前足畸形
- B.極大多數的足跟趾外翻是扁平足的併發症，單純跟趾外翻較少見
- C.由於第一楔狀骨、第一蹠骨與其他楔骨、蹠骨連結較鬆，在不當的負重下，向內移位，引起縱弓和橫弓的塌陷。足跟趾因受內收跟肌和伸跟長肌的牽拉向內移位
- D.足跟趾的蹠趾關節呈半脫位，內側關節囊附著處因受牽拉，可有骨贅增生，蹠趾關節突出部因受鞋幫的磨擦而產生滑囊炎

40.有關膝關節側副韌帶（collateral ligament）損傷的敘述，下列何者正確？

- A.懷疑有斷裂且合併神經損傷時，應直接在門診進行手法治療
- B.功能鍛鍊以內收肌群（adductors）為主
- C.臨床上內側副韌帶損傷機會較外側副韌帶高
- D.初期的中藥治療以壯筋活絡、補養肝腎為主

41.40歲男性，因車禍合併內出血住院，出院後身體仍感不適故前來就診。患者表示自己雖容易口渴，但卻不想喝很多水；診察後發現患者肌膚甲錯，脈細弱，舌質淡且乾。治以下列何方最適當？

- A.白虎湯合五味消毒飲
- B.生脈散加減
- C.聖愈湯加減
- D.六味地黃丸加減

42.患者因傷後出血過多住院，後雖痊癒出院，但仍常感呼吸不暢。觀其面色晄白、氣息短促、唇口紫紺、舌質淡。診其脈則細弱無力。下列處方何者最合適？

- A.人參、蘇木、黃耆、白朮、淮山藥、當歸、白芍、何首烏
- B.紫蘇子、法半夏、前胡、厚朴、當歸、甘草、沉香
- C.三稜、莪朮、青皮、陳皮、白朮、枳殼、當歸、白芍、黨參、乳香、沒藥、甘草
- D.栝蒌仁、陳皮、黃芩、杏仁、枳殼、茯苓、膽南星、半夏

43.65歲女性，腰腿痠痛已10多年，最近覺下肢麻木加重，且走路較無力。患者說話語音低微，且平常稍微活動就感疲倦且汗出多。其面色蒼白、舌質淡嫩、脈細弱。治以下列何方最適當？

- A.活絡效靈丹
- B.芍藥甘草湯
- C.六味地黃丸

D.人參養榮湯

44.依《傷科大成·跌打壓仆損傷者須用引經藥》，下列何藥物可用於接骨？

A.五加皮

B.獨活

C.熟地黃

D.丹參

45.依據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》損傷後喘咳，下列敘述何者正確？

A.傷後喘咳若因出血過多，面黑胸脹，胸膈痛而發喘，宜用二味參蘇飲

B.傷後喘咳若因咳血而喘，使用二味參蘇飲

C.若氣虛血乘於肺，宜十味參蘇飲

D.若氣逆血蘊於肺，宜二味參蘇飲

46.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，下列何種情況不會用到獨參湯？

A.傷損昏憤者

B.傷損煩躁、自汗、頭暈者

C.傷損發熱、汗出不止者

D.咳血衄血而喘者

47.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，登高墜下，撞打損傷，心腹胸中，停積瘀血不散者，以三焦分別部位，以施藥餌。遇虛人不可下者，宜用下列何方進行化裁？

A.當歸補血湯

B.桃仁承氣湯

C.四物湯

D.血府逐瘀湯

48.橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，多發於經常用腕部操作的勞動者，肌腱在腱鞘隧道中活動頻繁，長期磨損，日久腱壁肥厚，管腔狹窄，肌腱腫脹變粗所致，女性多於男性，此病症為下列何肌腱損傷？

A.外展拇長肌、伸拇短肌

B.外展拇長肌、伸拇長肌

C.外展拇短肌、伸拇短肌

D.外展拇短肌、伸拇長肌

49.關於髌骨橫斷骨折的敘述，下列何者正確？

A.常見於膝關節半屈位受傷

B.直接暴力較間接暴力多見

C.主要是股二頭肌拉扯

D.對伸膝功能影響較小

50.常見下肢骨折中，下列何者臨床癒合時間最長？

A.踝部骨折

B.臍骨骨折

C.股骨轉子間骨折

D.股骨幹骨折

51.踝內翻扭傷伴隨腓骨撕脫性骨折後，為了增進腓骨肌修復，建議患者自行穴位按摩，下列穴位何者最適宜？

A.外丘

B.筋縮

C.陽綱

D.曲垣

52.關於股骨頸骨折敘述，下列何者正確？

A.股骨頸內脂肪豐富，骨折後易發生脂肪栓塞併發症

B.股骨頸循環豐富，骨折時出血可達1500至2000毫升

C.股骨頸骨折線越低，骨折不癒合機率越大

D.依X光表現可以分為外展型及內收型，外展型因血循破壞少，癒合機率較高

53.68歲女性2日前跌倒左手撐地，因左手腕腫脹瘀青無法用力而就診，X光如附圖所示，下列敘述何者正確？



A.跌倒時左手掌撐地造成

B.該骨折又稱為反柯力氏骨折（Reverse Colles' fracture）

C.患者手腕外觀可見「餐叉樣」畸形

D.此為伸直型骨折

54.關於肱骨內上髁骨折，下列敘述何項正確？①通常好發於青少年 ②復位後固定約6週 ③肱骨內上髁為前臂屈肌群附著處 ④嚴重時可能合併橈神經損傷

A.①②

B.②④

C.①③

D.③④

55.關於「失欠頰車」前脫位診斷要點，下列何者正確？

A.單側脫位時，下頷骨向患側傾斜

B.單側脫位時，健側顴弓下方觸及髁狀突

C.雙側脫位時，咬肌處呈凹陷

D.雙側脫位時，耳前呈明顯凹陷

56.關於關節脫位後，下列何種狀況發生時較宜先行牽引一週左右？①新鮮關節脫位 ②陳舊關節脫位 ③關節活動度較大 ④關節活動度較小 ⑤軟組織豐厚 ⑥軟組織攣縮

A.①③⑥

B.②③⑤

C.①③④

D.②④⑤⑥

57.55歲貨運工人，工作受傷，右踝疼痛腫脹，下圖為踝部的X光片，其可能之病因、骨折機轉為何？



- A.外翻型骨折
- B.垂直壓縮型骨折
- C.內翻型骨折
- D.外旋型骨折

58.有關肘關節附近骨折，下列敘述何者錯誤？

- A.橈骨頭骨折症狀為肘關節屈伸旋轉活動受限制，尤以旋轉前臂時，橈骨頭處疼痛加重
- B.肱骨髁間骨折為關節內骨折，血循良好，一般癒合良好
- C.尺骨鷹嘴骨折常因肱三頭肌強力收縮所致，多呈橫斷性骨折
- D.橈骨頭骨折整復固定後，初期禁止作前臂旋轉活動

59.關於踝部損傷骨折的生物力學機轉，下列敘述何者正確？

- A.當踝關節蹠屈時，距骨體微向內側傾斜，背屈時，則微向外側傾斜
- B.踝關節背屈時，距骨在踝內可輕微地向兩側活動，蹠屈時則較無側向活動
- C.外側副韌帶結構較堅強，故受內翻暴力時不易斷裂，而往往造成外踝撕脫骨折
- D.三角韌帶較薄弱，且不完整，易受外翻暴力所損傷

60.有關肱骨幹骨折之敘述，下列何者錯誤？

- A.如姿勢不正確的猛力投擲運動等，常使肱骨中、下段發生斜形或螺旋形骨折
- B.骨折在三角肌止點以下時，骨折近端因受三角肌及喙肱肌的牽拉而向前、向外移位
- C.無移位之裂紋骨折，外觀無明顯畸形，在患肢遠端縱軸叩擊，可發生明顯疼痛
- D.復位手法不慎，容易造成神經壓迫，導致爪狀手變形

61.黑睛生翳，下列何者為其較合理的病因病機？

- A.肝陰不足，營血虧虛
- B.腎陰不足，目失所養
- C.肝火素盛，復感風、濕等邪
- D.肺火壅盛，氣滯血瘀

62.眼珠變硬，瞳神散大，瞳色淡綠，嚴重視力減退，《太平聖惠方》稱之為綠風內障，下列何者非其病因病機？

- A.肝膽火邪亢盛，風火攻目
- B.肝胃虛寒，飲邪上逆
- C.肝氣鬱滯，化火上逆
- D.肝腎虧損，精血不足

63.金枝阿嬤因心血管疾病長期服用抗凝血劑，某日清晨梳洗時發現左眼眼白一片紅通通的，但眼睛沒有任何不

適，視力未減退，亦無畏光，家人為防萬一還是趕緊帶金枝阿嬤至眼科門診就診，醫師檢查發現雙眼視力均0.9，眼壓也正常。關於金枝阿嬤的狀況，下列敘述何者錯誤？

- A.此症可因血熱妄行所致
- B.由肺熱引起者，治宜清肺散血，方用退赤散加減
- C.本病初起宜冷敷，3日後可酌情熱敷
- D.此症預後不佳，若未即時治療，病變可能侵蝕黑睛導致黑睛潰爛

64.30歲的王小姐從高中開始便時常配戴隱形眼鏡，近3個月來眼睛常有異物感、發癢、眼屎變多，近日至眼科就診，眼科醫師檢查發現王小姐結膜有一顆顆黃白色、半透明的小濾泡，無角膜血管翳。關於王小姐的狀況，下列敘述何者正確？

- A.中醫病名為椒瘡
- B.病灶多見於下瞼及下穹窿部
- C.痊癒後眼瞼內會結成白色癍痕
- D.本病常伴有黑睛赤膜或生星翳等後遺症

65.下列何者之病位不在白睛？

- A.暴風客熱
- B.白澀症
- C.天行赤眼
- D.風赤瘡癢

66.患者翳上凝脂，漸見減薄，但日久不斂，白睛紅赤不顯，眼痛羞明較輕，舌淡脈弱。選用下列何方加減治療最適宜？

- A.四順清涼飲子
- B.十全大補湯
- C.托裏消毒散
- D.菊花決明散

67.關於真睛破損，一眼受傷後，健眼出現畏光流淚、輕度視力障礙，下列敘述何者錯誤？

- A.若穿破創口在白睛、黑睛交界處，較易影響健眼
- B.健眼受累時可出現神水混濁、抱輪紅赤、畏光、視乳頭水腫等症狀
- C.眼底鏡檢查無明顯異常者，稱交感性眼炎
- D.多數預後不良

68.36歲男性長期入暮或黑暗處視物不清，行動困難，至天明或光亮處視力復常，面白神疲，脈弱，舌淡苔白。有關患者的診斷，下列何者正確？

- A.高風內障
- B.圓翳內障
- C.青風內障
- D.如銀內障

69.中醫古代文獻中的痰包，類似舌下囊腫，屬於良性腫瘤，下列關於痰包的敘述何者錯誤？

- A.又名重舌
- B.外表粗糙
- C.按之柔軟
- D.一般不痛

70.關於早期鼻咽癌病患就醫時較少見的症狀，下列何者正確？

- A.鼻衄
- B.鼻塞
- C.耳鳴
- D.噴嚏

71.關於耳鳴與耳聾的敘述，下列何者正確？

- A.《雜病源流犀燭》卷二十三曰：「耳聾者，鳴之漸也」
- B.《雜病源流犀燭》卷二十三曰：「惟氣虛而聾者，則不鳴」
- C.《靈樞·決氣篇》曰：「精脫者耳鳴」
- D.《靈樞·口問篇》曰：「耳者，宗脈之所聚也，故胃中空則宗脈虛」

72.患者耳內蟬鳴，兼見頭暈目暗，腰膝痠軟，舌質紅少苔，脈細弱，治以下列何方最適合？

- A.益氣聰明湯
- B.耳聾左慈丸
- C.蔓荊子散
- D.二陳湯

73.下列何者不是鼻淵實證之病因病理？

- A.肺經風熱
- B.脾胃濕熱
- C.膽腑鬱熱
- D.心火熾熱

74.鼻塞因肺脾氣虛，邪滯鼻竅所致，若見肺氣虛者，宜用溫肺止流丹治療，處方中何藥物能斂氣？

- A.細辛

B.桔梗

C.訶子

D.荊芥

75.關於梅核氣的敘述，下列何者正確？①最早記載於《金匱要略·婦人雜病脈證并治》 ②病因多為肝氣鬱結，循經上逆，結於咽喉 ③檢查多見咽喉充血，顆粒增生 ④多會影響吞嚥功能

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

76.發病在咽喉兩側的喉核處，證見喉核紅腫疼痛，表面或有黃白色膿樣分泌物，發於春秋二季者尤多。上述最可能為何種咽喉病？

A.虛火乳蛾

B.風熱乳蛾

C.虛火喉痹

D.風熱喉痹

77.有關「急喉風」之敘述，下列何者錯誤？

A.出現牙關拘急，口噤如鎖等危急症狀，名為緊喉風

B.以痰涎壅盛，語言難出，湯水難下為主要症狀

C.以咽喉紅腫疼痛，呼吸困難為主要症狀

D.因其發病急速，病情急重而定名

78.口齒唇舌是人體重要組成部分之一，通過經絡的運行，與臟腑密切地聯繫起來。在五臟六腑中，與下列何者聯繫最不密切？

A.脾

B.肝

C.心

D.肺

79.在歷代醫書中有齒牙根搖、齒間出血、齒挺、食床等病名者，屬口齒科何種疾病？

A.牙痛

B.牙癰

C.牙齦癰

D.牙宣

80.發病突然，常在進食中或嗆咳後，口腔內懸壅垂處突然發生血泡，名懸旗風。依《圖注喉科指掌》卷三記載此症因多食厚味燥酒，下列病因何者最符合？

- A.胃火鬱盛
- B.肝火鬱盛
- C.心火鬱盛
- D.陰火鬱盛