

類 科：職能治療師

科 目：生理疾病職能治療學

考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(1)本試題禁止使用電子計算器。

(2)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出最正確的答案。

(3)每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡1~80題劃記，於本試題上作答者不予計分。

- 下列對建構失用症(constructional apraxia)的敘述，何者錯誤？
(A)只發生於左腦傷患者 (B)常伴隨穿衣失用(dressing apraxia)的問題
(C)常伴隨日常生活功能缺損 (D)在積木堆排(block design)及/或畫圖測驗中表現混亂
- 下列何者與現代動作控制的觀念不吻合？
(A)動作的產生是由許多次系統互動的結果
(B)動作的完成不只取決於執行者本身的特質，也須考慮執行時所處的情境(context)
(C)由該觀念所衍生的治療方法，重視以功能性活動來提昇動作表現
(D)由該觀念所衍生的評估方法，特別重視肌肉張力與不正常反射的問題
- 下列何者不是從事感覺再教育(sensory reeducation)的原則？
(A)每一活動必須包含有及無視覺回饋的情況，以利學習 (B)環境必須吵雜，以加速感覺訓練效果
(C)每一次練習時間不可過長，約10至15分即可 (D)每天可做2至4次的練習
- 在手部屈指肌腱長出小結(nodule)，在肌腱滑動時，小結為屈指肌腱的鞘(sheath)所卡住，而引起疼痛或關節活動度受限的情形稱為：
(A)扳機指(trigger finger) (B)鵝頸畸形(swan neck deformity)
(C)巴特奈爾氏畸形(boutonniere deformity) (D)鳥爪手畸形(claw hand deformity)
- 就一般的治療流程而言，下列關於手部屈指肌腱術後職能治療的敘述，何者不正確？
(A)手術後0~3週為保護期，應穿戴保護副木(如dorsal splint)
(B)術後8~12週，治療師方可開始作矯正性的拉扯(stretch)運動
(C)術後第一週即應開始作手指自主收縮伸直(active flexion/extension)的控制運動
(D)術後保護副木應將腕關節固定於20~40°屈曲，掌指關節保持35~40°屈曲
- 以一般慣用右手者而言，右側大腦半球的腦傷，較之於左大腦半球的損傷，更易造成何種功能障礙？
(A)語言方面表達及理解語義的困難 (B)肢體性運用不能(limb apraxia)
(C)右側肢體感覺與動作的嚴重喪失 (D)非口語之情緒接收困難
- 下列那一評估量表，是由病人自身之觀點來評估其各種職能活動的表現、重要性與對自己表現的滿意程度？
(A)職能表現歷史會談評估(Occupational Performance History Interview)
(B)加拿大職能表現量表(Canadian Occupational Performance Measure)
(C)科曼氏生活技巧評估(Kohlman Evaluation of Living Skills)
(D)功能獨立量表(Functional Independence Measure)
- 若無其他狀況或醫師的特別指示，因肌腱沾黏而接受肌腱鬆解術(tenolysis)的病人，術後運動應如何進行？
(A)手術3週後，即應開始高阻力型的自主運動 (B)手術1週後，方可開始無阻力的自主運動
(C)手術後當天，即可開始無阻力的自主運動 (D)手術1週後，便應開始做高阻力型的自主運動
- 下列那一種疾病為會侵犯人體多種器官與系統的系統性疾病(systemic disease)？
(A)類風濕性關節炎 (B)杜鰲型肌肉萎縮症 (C)多發性硬化症 (D)骨性關節炎
- 接受手部肌腱接合或轉移的病人，約幾週後才能再開始用那隻手從事日常生活中費力(有較大阻力)的活動？
(A)4週 (B)8週 (C)12週 (D)16週
- 下列關於槌狀指(mallet finger)的敘述何者錯誤？
(A)槌狀指是因伸指肌腱最末端的部分斷裂而引起
(B)槌狀指需使用一個副木，將近端與遠端指間關節分別固定在30°屈曲的位置，6週後方可癒合
(C)槌狀指外觀為末端指間關節屈曲且無法伸直 (D)槌狀指若不治療可能會變成鵝頸畸形(swan neck deformity)
- 治療師在治療有心肺疾病的病人時，應先教育病人若有不適的生理反應時，應放慢活動速度，並告知治療師。請問下列那一反應，不屬於不適之心肺負擔的生理反應？(A)出冷汗 (B)呼吸急迫 (C)噁心想吐 (D)打呵欠
- 反射交感性失養症(reflex sympathetic dystrophy)的最主要病徵為：
(A)疼痛 (B)耐力降低 (C)感覺缺失 (D)肌肉萎縮
- 根據史賓瑟(Spencer)對環境(environmental contexts)的分類，檢測居家環境建築障礙的檢核表，是屬於那一層級的實體環境(physical environment)評估？
(A)社區層級(community scale) (B)社會層級(societal scale)
(C)立即層級(immediate scale) (D)近端層級(proximal scale)
- 金(King)與尼克森(Nixon)提出所謂的SABRES計劃，指引如何藉著維持良好的生活型態從事心臟血管疾病復健，下列關於SABRES的敘述何者不正確？
(A)第一個S指要有好的社會支持 (B)A指不要時時處於緊張的警醒狀態
(C)B指學習正確的呼吸方法 (D)R&E指要在休息與勞力間得到一個平衡
- 若測量一病人的肩關節內旋(shoulder internal rotation)角度為30~60°，則下列那一敘述最能描述病人的情形？
(A)肩關節有內旋的限制(limitation in internal rotation)
(B)肩關節有內、外旋的限制(limitation in internal/external rotation)
(C)肩關節有外旋的限制(limitation in external rotation) (D)病人之關節活動度在正常範圍內
- 下列何者不是頭部外傷昏迷患者感覺刺激治療(sensory stimulation program)的原則？
(A)給予的感覺刺激最好是對病人有意義的 (B)每一次治療的時間不要太長，要給予病人休息的機會
(C)最好能施予不同種類的感覺刺激 (D)對於病人接受刺激後的反應，應給予較複雜的口語回饋，以增進警醒程度
- 下列關於格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale)與格拉斯哥結果量表(Glasgow Outcome Scale)的敘述，何者不正確？
(A)前者乃由觀察病人對外界刺激的反應而評分，分數範圍由0到8分
(B)後者共分5級，第5級為良好恢復，病人可回歸工作
(C)前者共觀察肢體動作、眼睛反應與語言反應三方面評分 (D)後者的第1級(最低級)為死亡

- 19 有一血管阻塞型之中風病患。其雖未有明顯的動作與感覺缺失，但卻抱怨有眩暈的困擾，由臨床症狀推斷，該病人可能是何血管被堵塞？
 (A)頸內動脈 (B)基底動脈 (C)小腦動脈 (D)大腦後動脈
- 20 若無其他併發狀況，對一T₁₂層級的完全性脊髓損傷者，下列敘述何者錯誤？
 (A)可訓練其使用雙拐與長腿支架獨立行走，但相當費力 (B)因肋間肌與腹肌仍未能動作，心肺耐力較差
 (C)在日常生活自理方面，加上簡單的環境改造應可達到獨立自主 (D)病人坐姿時的平衡維持能力應可訓練到「良好」
- 21 今若測出一病人的踝關節活動度為0~25°，下週再測為0~29°，這在臨床上的解讀為何？
 (A)該病人的關節活動度未必有真實的改變 (B)該病人的關節活動度可能退步了
 (C)該病人的關節活動度進步了4° (D)該病人的關節活動度可能進步3~10°
- 22 若有一頸椎脊髓受傷的病人，其上肢肌力遠比下肢肌力差，此情形為下列何種症狀？
 (A)Conus Medullaris syndrome (B)anterior cord syndrome
 (C)Brown-Sequard syndrome (D)central cord syndrome
- 23 今若有一燒傷病患，其手掌掌面及掌指關節處有一大片2度燒傷，若在其接受植皮手術2週後，為其製作一副木，以達保護、支持與預防畸形發展的目的，該副木的角度應要：
 (A)維持指間關節內縮(adduction)的位置 (B)維持掌指關節在90°屈曲的位置
 (C)維持掌指關節在0°屈曲的位置 (D)維持指間關節在30°屈曲的位置
- 24 姿勢性低血壓為高層級脊髓受傷之病人常見的併發症，下列何者不是適當的處理或預防措施？
 (A)讓病人在下半身穿上緊身襪 (B)扶病人坐起時可分數階段慢慢扶起
 (C)使用可平躺下的輪椅 (D)病人臥床時，要每20分鐘翻身一次
- 25 要訓練一名30歲病患的心肺耐力，設定70%最大攝氧量層級的活動是危險閥值，則在活動時，只要病人心跳一到達下列那一數值時，便需警戒停止？ (A)133下/分鐘 (B)119下/分鐘 (C)153下/分鐘 (D)126下/分鐘
- 26 下列關於類風濕性關節炎的處理原則何者不正確？
 (A)要做關節運動前可先對關節施予熱敷 (B)治療師應利用強力被動拉扯的技巧，積極矯正病人手部的關節形變
 (C)每天應做3~4次以上的和緩性自主關節運動 (D)可於休息時穿戴副木給予關節適當的休息與支持
- 27 下列關於脊髓節數與其支配之動作的配對，何者錯誤？
 (A)C₄-可不藉呼吸器之助，自行呼吸 (B)C₇-腕關節屈曲 (C)C₅-肘關節屈曲 (D)C₆-肘關節伸直
- 28 柏金森氏症的病人，動作有僵直與起始困難的問題，下列那種治療技術不適用於此等病人？
 (A)使用高阻力的活動來加強動作穩定性 (B)利用音樂來建立及維持動作節奏
 (C)利用觸覺或言語的提示，來促使病人起始一個動作
 (D)利用本體神經肌肉刺激法的技巧來幫助病人起始一個動作
- 29 若類風濕性關節炎病人的掌指關節與腕關節皆已有些許向尺骨側偏斜的畸形產生時，下列那一項日常生活的技巧是比較合適的建議？
 (A)用水果刀切水果時，應以手掌握住刀柄，刀刃處由虎口處突出切物
 (B)擰毛巾時，應以雙手各握住毛巾一端，分向兩不同方向扭轉
 (C)儘量用肩背式的背包，而不要用手提包 (D)拿重物時儘量用雙手來提，而不要用手捧的
- 30 下列那一脊髓層級派出之神經負責了作手指（不包含大拇指）內縮、外展及在掌指關節屈曲90°的姿勢下伸直四指關節的動作？ (A)C₈-T₁ (B)C₅-C₆ (C)C₇ (D)C₄
- 31 下列那一種疾病是因中樞神經系統神經纖維外之髓鞘遭到破壞，而產生的神經傳導病變？
 (A)多發性硬化症(multiple sclerosis) (B)柏金森氏症(Parkinson's disease)
 (C)重症肌無力(myasthenia gravis) (D)肌萎縮性脊髓側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis)
- 32 以人體力學的角度而言，將一箱重物由地上搬到桌上時，下述之做法何者錯誤？
 (A)臉要正對著欲搬運的東西，不要扭腰 (B)利用腹肌與背肌收縮的力量彎腰抬物再起身
 (C)若東西太重時，可先由箱中拿出一些重量，分成2~3次搬 (D)兩足需分開站穩約與肩同寬
- 33 下列那一種退化性疾病通常不會影響到智能與感覺功能？
 (A)柏金森氏症 (B)多發性硬化症
 (C)愛滋病 (D)肌萎縮性脊髓側索硬化症
- 34 有一病人主訴持續性的肩膀與手臂的酸麻疼痛，而醫師懷疑此為工作所引起的累積性傷害，因此請您前去為該病人的工作作人因工程分析。在評估過程中拍攝病人於工作中操作機器的錄影帶，然後計算她每分鐘需抬手多少次，請問這種技術是一種：
 (A)工作方法分析 (B)工作站分析 (C)工作器具分析 (D)工作體能分析
- 35 對一病人作工作性的體能評估時，發現病人最多可舉起9公斤重的物品，且可持續行走或站立1小時以上方需休息。應建議此病人從事何種等級（含該等級）以下體能需求的工作？
 (A)慣坐級 (B)輕量級 (C)中量級 (D)重量級
- 36 在施測徒手肌力測驗時，區辨肌力2分(poor)與3分(fair)的主要因素為：
 (A)病人所能對抗治療師徒手施予阻力的大小 (B)病人是否可維持該動作10秒鐘
 (C)病人作出該動作的姿勢是否需對抗地心引力的影響 (D)以上皆是
- 37 即使是健康的老年人亦會有許多生理功能的退化，下列關於常見的老人生理機能退化的敘述，何者正確？
 (A)老年人除了視力減退外，亦會有淚液分泌減少，夜間視物不良的問題
 (B)老年人常會有聽力減退的困擾，尤其是對低頻率的聲音
 (C)老年人的嗅覺及味覺敏感度之退化不明顯，因此不會產生營養失調的問題
 (D)老年人雖有認知能力的退化，但無損於其資訊處理與問題解決的能力
- 38 若將工作體適能訓練(work conditioning)與工作強化(work hardening)相較，前者通常不會包括：
 (A)肌力及柔軟度訓練 (B)模擬特定工作的工作模擬訓練 (C)體適能訓練 (D)耐力訓練
- 39 下列那一項評估工具同時評量了一個人的工作、娛樂休閒與日常生活自我照顧三方面的職能表現？
 (A)功能獨立量表(Functional Independence Measure)
 (B)動作與處理技巧評量(Assessment of Motor and Process Skills) (C)美蘭切氏活動量表(Frenchay Activity Index)
 (D)加拿大職能表現量表(Canadian Occupational Performance Measure)
- 40 下列關於針對老年人治療活動的選擇、調適與替代時的考慮因素，何者正確？
 (A)該活動最好能激使老人省思其價值觀 (B)應儘量避免懷舊與回憶的活動，以免老人脫離現實
 (C)治療活動的重覆性要高，以利老人打發時間
 (D)因老人注意力差，有目的性與較無目的性活動的持續時間無差別，故兩類活動皆適合

(請接背面)

類 科：職能治療師
科 目：生理疾病職能治療學

- 41 下列那一量表，最能偵測出病患日常生活功能表現之微小變化？
(A)職業適應評量表(Vocational Adaptive Rating Scales) (B)肯尼氏自我照顧評估(Kenny Self-Care Evaluation)
(C)克蘭貝爾日常生活活動量表(Klein-Bell ADL Scale) (D)克茲氏指數(Katz Index)
- 42 美國勞工部所發行的職業典(Dictionary of Occupational Titles)中以20餘項的體能需求(physical demands)來分析工作，這些體能需求不包括下列那個項目？
(A)工作中需抬舉推拉物品的重量或阻力 (B)工作中需應用的視覺能力
(C)工作中需應用的語言能力及聽力 (D)工作中需應用的判斷思考能力
- 43 依蘇俄心理學家洛利亞(Luria)所提的三個功能性腦區塊(3 functional brain units)理論，負責接收、分析、儲存資訊的腦區塊是：
(A)視丘與網狀系統 (B)顳葉、頂葉與枕葉 (C)額葉與枕葉 (D)額葉與海馬迴
- 44 卡爾(Carr)與雪伯(Shepherd)提出的動作再學習計劃(motor relearning program)中，治療師可用5項策略來提高療效，請問這不包括下列何者？
(A)要求病人完全主動作出動作，治療師切忌帶著病人肢體幫助他完成該動作
(B)治療師示範該如何正確作出該動作給病人看 (C)給予病人即時且正確的回饋 (D)給予口語的說明
- 45 下列關於定向感(orientation)的敘述何者正確？
(A)地方定向感(orientation to place)與路徑定向感(topographical orientation)二者實指同一種能力
(B)判定屋內不同房間的相對空間關係涉及地方定向感
(C)測時定向感時，通常只會問病人今天的年、月、日等資訊，至於時間的相對長度(例如住院多久了?)則不屬此範疇
(D)定向感與一個人的記憶力息息相關
- 46 下列何者不是神經發展治療法中抑制痙攣狀態(spasticity inhibition)的方法？
(A)放置及離心式降低(eccentric lowering) (B)被動拉長(passive elongation)痙攣的肌肉
(C)反射抑制姿態(RIP) (D)穿戴反痙攣姿勢的副木/裝具
- 47 在製作手部副木以防止病人的手因長期固定而產生畸形僵硬時，常會依手的安全位置(safe position)而製作，下列關於安全位置的敘述何者正確？
(A)將手部2~5指的掌指關節擺在45°屈曲(MP 45° flexion)的位置 (B)可較有效的預防指間側副韌帶的縮短變形
(C)指間關節應保持約20~30°的屈曲 (D)大拇指的掌指關節應擺在60°屈曲的位置
- 48 在評估一名中風病人時，發現其患側動作達布朗斯壯的第五~六級(Brunnstrom stage V~VI)評分，亦無重大之感覺、智能缺失，但病人動作顯得笨拙，拿工具時手臂的位置、角度都不太對，執行多重步驟的動作倍感困難，亦很難應治療師指示語做出手勢，請問該病人最有可能是下列那種障礙？
(A)身體部位知覺(body schema)異常 (B)動作計劃(motor planning)障礙
(C)單側忽略(unilateral neglect) (D)物體辨識(object gnosis)異常
- 49 根據英國珀巴斯(Bobath)所提出的神經發展治療法(NDT)，下述那一原則不符合其對急性期中風病人的治療主張？
(A)預防患側肢體發展出不正常的肌肉張力 (B)訓練或誘出病人坐(站)姿時的平衡反應
(C)教導病人僅以健側上肢完成日常生活活動的方法 (D)於行走站立練習時，注意患側上肢與健側上肢的對稱使用
- 50 職能治療師欲應用一活動來激發或挑戰病人的平衡反應，活動中需包含下列那一要素，方較有可能達成治療目標？
(A)病人需伸手取物 (B)需對病人四肢近端側施予阻力
(C)需對病人四肢給予促進性的感覺刺激 (D)需對病人腳掌施予粗糙性質的觸覺刺激
- 51 當閉眼時，無法在雙腳併攏的情況下，維持站姿平衡的情形稱為：
(A)繪替運動錯亂(dyssynergia) (B)共濟失調(dyssynergia)
(C)彈回現象(rebound phenomenon) (D)藍柏氏徵候(Romberg's sign)
- 52 下列何者為中風病人「推者症候群(pusher syndrome)」的特徵？
(A)病人在坐著時會向健側傾斜 (B)站立時健側下肢抗拒或不願承重
(C)通常病人很少有感覺與知覺的功能障礙 (D)在移位時，病人之患側會表現出傾推向健側的不自主行為
- 53 依據克洛森(Crosson)等人對病識感(awareness)的分類，若一病人會明白的向治療師表示自己記憶力的缺失，但當治療師要求病人記住一些重要的注意事項時，病人卻不會主動的採用一些策略(例如拿出紙筆記下)，而仍產生記憶力缺失的問題，則病人所表現出的是何種病識感？
(A)理智病識感(intellectual awareness) (B)危機病識感(emergent awareness)
(C)預測病識感(anticipatory awareness) (D)盲目病識感(implicit knowledge of impairments)
- 54 在評估病人的肌肉張力時，治療師先將病人之手肘彎曲，然後快速的把病人的手肘拉直，但在將病人手臂拉到約一半位置(elbow flexion 60°)時，便感到病人手臂的肌肉張力頓時增加，有如彈簧力一般。這種情形並不會發生在將病人手肘壓彎的時候。該如何描述這種情形？
(A)手肘伸肌強度痙攣(elbow extensor severe spasticity)
(B)手肘屈肌/伸肌僵直(elbow flexor/extensor rigidity)
(C)手肘屈肌中度痙攣(moderate elbow flexor spasticity)
(D)手肘伸肌中度痙攣(moderate elbow extensor spasticity)
- 55 治療師輕輕的移動病人的肢體，病人在無視覺輔助下可說出肢體動作的方向性(例如向上或向下)的感覺能力為：
(A)肌動覺(kinesthesia) (B)本體覺(proprioception) (C)實體覺(stereognosis) (D)重量覺(barognosis)
- 56 下列那一治療模式(model of practice)是直接處理病人失能(disability)與角色殘障(handicap)層次的問題？
(A)生物力學(biomechanical)治療模式 (B)復健(rehabilitative)治療模式
(C)動作學習(motor learning)治療模式 (D)神經發展(neurodevelopmental)治療模式
- 57 對於腦傷而引起記憶力缺失者，治療師常會建議其使用不同的內在或外在幫助(internal/external aides)來代償其記憶力之缺失。下列那一方法是屬於內在幫助？
(A)日記 (B)鬧鈴手錶 (C)第一字記憶法(first letter mnemonics) (D)清楚標示的資料櫃
- 58 下列關於優質的治療上之和諧關係(therapeutic rapport)的敘述何者錯誤？
(A)是一種治療師對病人的單向關係與技術 (B)病人能有效的解讀治療師所傳送的訊息
(C)治療師能於治療的過程得到回饋 (D)治療師能專注的參與治療
- 59 肩膀疼痛常是困擾中風病人的一個問題，請問下列那一個做法不是預防肩膀問題發生的方法？
(A)病人在從事日常生活活動時，要注意患側手的擺姿，不要任其拖垂在身後
(B)治療師扶病人行走時，要避免僅由病人患側手臂處攙扶拖曳病人
(C)要求病人在病房或家中做被動關節運動，需確實做到最大正常角度，例如肩關節屈曲運動需做到180°
(D)避免自己任意用懸吊式滑車(overhead pulley)做被動關節運動

- 60 下列何者不是上肢義肢腕部組件(wrist unit)的常見型式？
 (A)球加插槽型(ball and socket) (B)自主張開型(voluntary open)
 (C)恆有摩擦力型(constant friction) (D)快速變換型(quick change)
- 61 依SOAP病歷書寫法，評估的結果應記錄於何項？ (A)A (B)P (C)O (D)S
- 62 下列何者為動態評估(dynamic assessment)方法所特有，而不為傳統的認知心理測驗所強調？
 (A)開始測驗前，需受測者先行推估自己的表現會怎樣 (B)測驗完成後，受測者需自己自省所使用的策略為何
 (C)在施測過程中，可適度給予受測者提示，觀察其反應是否會改變 (D)對照常模來判定測驗表現
- 63 接受關節置換的病人於術後早期應遵循下列那些注意事項，以避免人工關節之離位？
 (A)手術側之關節勿作外展的動作 (B)手術側之關節勿作內旋的動作
 (C)穿鞋襪時，不可將腳抬高起來穿脫，而要彎下腰去穿 (D)家居生活上，要盡量選擇矮的椅子／凳子坐，不要坐高椅子
- 64 下列關於單側忽略(unilateral neglect)的敘述何者正確？
 (A)半側偏盲的患者比單側忽略患者更不易查覺自己的缺失
 (B)根據現有研究指出，單側忽略病患除行動能力會受影響外，其他日常生活功能皆不受影響
 (C)治療時，常會教病人學習搜尋被忽略空間的策略
 (D)「視覺刺激消滅測驗與面對測驗」(test of extinction and confrontation test)是用來檢查半側偏盲，而非單側忽略
- 65 下列那一測驗可用來檢查病人是否有迪擴凡疾病(de Quervain's disease)的症狀？
 (A)芬扣斯坦測驗(Finkelstein's test) (B)愛倫測驗(Allen test)
 (C)舉掉手臂測驗(drop arm test) (D)泰諾症狀測驗(Tinel sign test)
- 66 欲改善病人的被動關節活動度，常會用拉扯(stretch)的方法，下列關於此項治療技術的敘述何者正確？
 (A)主動拉扯的療效通常較被動拉扯為佳，且不易造成傷害
 (B)治療師在拉扯病人的關節時，應拉到最大角度後，再停15~30秒才放開
 (C)治療師在施用被動拉扯的技術時，速度愈快愈好，病人不會痛
 (D)離病人關節產生攣縮(contracture)的時間已有數年之久，但施予拉扯的技法，仍可明顯地改善該關節活動度
- 67 一般而論，職能治療師選擇治療活動時，為達成治療目標，活動最好能符合某些活動選擇的標準。下列何者不是活動選擇的標準？
 (A)病人對該活動感興趣 (B)符合病人的年紀、文化與生活角色，對其有意義
 (C)活動非常簡單，病人可輕易完成，建立成就感 (D)病人需重複多次方能完成該活動，其目的為達到治療效果
- 68 病患發病住院期間，若在某一日常生活評估工具中得滿分，出院後的獨立生活情形皆良好，反之則易發生意外。請問這代表該測驗的何種心理計量特性良好？
 (A)內容效度(content validity) (B)重測信度(test retest reliability)
 (C)內在一致性(internal consistency) (D)預測效度(predictive validity)
- 69 下列何者不是一位「省思的治療師(reflective therapist)」始具備的特色？
 (A)會先完整的分析病人問題，始進行治療 (B)當治療效果不如預期時，會檢視現有之假設與治療法，並嘗試新方法
 (C)以理論為基礎與後盾方施行治療 (D)能與病人建立起良好的治療關係(therapeutic rapport)
- 70 若以問題導向的病歷書寫法(problem-oriented medical recording)來撰寫病人的初評報告，其中應包含那些部分才算完整？
 (A)病人主訴、檢查結果、出院目標 (B)病人基本資料(含病史與評估結果)、問題清單、治療計劃
 (C)所從事之職能活動的過程及結果 (D)日常生活功能、工作能力與休閒娛樂三方面之評估結果
- 71 在以個案為中心(client-centered)的職能治療模式中，對個案職能功能異常(occupational dysfunction)的評估，應由下列何步驟開始？
 (A)要求病人指出在他生活中對其有意義與重要的生活角色 (B)評估病人的日常生活活動是否獨立
 (C)評估病人的感覺、動作、認知等功能 (D)以上皆可
- 72 以徒手肌力測驗施測下列何種動作的2分(poor)等級時，若無其他原因，應讓病人平躺，以去除地心引力的影響？
 (A)肩關節外旋(shoulder external rotation) (B)髖關節內旋(hip internal rotation)
 (C)由闊筋膜張肌所控制的髖關節外展(hip abduction) (D)以上皆非
- 73 在頭部外傷病人急性期，仍陷於昏迷狀態時，職能治療的內容通常不包含下列何者？
 (A)利用關鍵點控制法(key point control)幫助病人整合原始反射 (B)施行被動關節運動，預防關節攣縮
 (C)給予感覺刺激 (D)給予病人正確擺姿
- 74 一右下肢截肢病人，因截肢部位對觸覺過份敏感，而影響其穿義肢的意願與日常功能。職能治療師可能用下列那一種方法來施行減敏感(desensitization)治療？
 (A)於施行減敏感治療的初期，可要求患者將殘肢浸於一裝滿小方塊積木的大箱中，並試圖承受50%的體重
 (B)先試用質地細緻的東西按摩患肢，再逐漸改用質地較粗的東西
 (C)先用高頻率的按摩器按摩患部，再逐漸調用低頻率
 (D)作減敏感按摩時，應先按摩患部，再逐漸擴及周圍皮膚
- 75 在一般情形下，職能治療師分析類風濕性關節炎病人的問題與治療時，較不會使用下列何種治療模式？
 (A)復健治療模式 (B)生物力學治療模式 (C)神經發展治療模式 (D)人類職能模式
- 76 改善肌肉耐力(muscle endurance)的治療原則為何？
 (A)高阻力(大於可抗最高阻力的50%)，重複多次的活動 (B)低阻力(小於可抗最高阻力的50%)，重複多次的活動
 (C)低阻力(小於可抗最高阻力的50%)，重複少次的活動 (D)高阻力(大於可抗最高阻力的50%)，重複少次的活動
- 77 下列關於敘事(narrative)於職能治療的運用何者錯誤？
 (A)治療師通常藉此告知病人其他人復健成功的經驗 (B)治療師可藉以得知各種職能對病人的意義與重要性
 (C)治療師可藉以得知病人對失能(disability)的主觀感受 (D)治療師可利用敘事過程與內容來評估甚至治療病人
- 78 職能治療的過程常被比擬為學習的過程，亦如同學習過程一樣，許多外在的因素皆會影響治療效果，下列何者屬外在因素？
 (A)病人的知覺缺失 (B)治療活動時所需操弄物體的大小 (C)病人對該活動的熟悉程度 (D)病人的注意力
- 79 截肢患者接受截肢手術後，需纏繞繃帶於殘肢上，協助殘肢的消腫與成型，以利日後穿戴義肢。下列關於繃帶使用法的敘述何者正確？
 (A)繃帶纏法是由殘肢末端向近端，一圈繞著一圈纏繞上去的
 (B)一天要將繃帶解下3~4次，檢查殘肢是否有承受壓力點或紅痕
 (C)需將殘肢近端的繃帶纏得較緊，末端纏得較鬆 (D)穿戴一個現成的束套(elastic shrinker)效果通常較綁繃帶更好
- 80 測量手部2~5指的內收與外展的角度時，是以那一指為基準來決定內收與外展的動作方向？
 (A)拇指 (B)中指 (C)小指 (D)食指