九十年第一次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　　代號：514　　全一張（正面）

類　　科：職能治療師

科　　目：生理疾病職能治療學

考試時間：一小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：(1)本試題禁止使用電子計算器。
(2)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(3)每題 1.25 分，須用 2 B 鉛筆在試卡 1～80 題劃記，於本試題上作答者不予計分。

1 正常的老化現象不包括下列那一項？ (A)可能會感受與社會接觸減少 (B)從椅子站起來時較吃力 (C)聽力變差 (D)味覺與嗅覺之閾值(Thresholds)降低

2 以下有關"Escharotomy"的敘述何者正確？
(A)用以去除肢體內過大的壓力
(B)接受此手術後患肢要禁止主動及被動活動
(C)淺二度灼傷(2nd degree superficial)的個案會需要這種處置
(D)手術方向通常與肢體的長軸垂直

3 對於過度敏感(Hypersensitivity)的病患，需作減敏感法的治療，下列對其治療的原則或技巧的敘述何者有誤？
(A)先用質地較細緻再用質地較粗糙的物體
(B)先使用震動頻率高再用震動頻率低的震動方式
(C)可使用按摩技巧
(D)可使用承受體重的壓力(Weight-bearing pressure)

4 以下針對不同副木材料特性的敘述，何者正確？
(A)奧索布蕾斯特(Orthoplast)由於垂墜性(Drapability)佳，適合一體成形的製作方式
(B)多利坊(Polyform)所含的橡膠成分較多，而且具有記憶性
(C)阿夸布蕾斯特(Aquaplast)所含的塑膠成分多於奧索布蕾斯特，因此塑性較奧索布蕾斯特好
(D)奧菲特(Orfit)的操作時間是所有材料中最長的，因此適合初學者

5 由肌萎縮症協會所鑑定出來的肌萎縮症(Muscular dystrophy)類型，共有幾種？ (A)11 (B)9 (C)7 (D)5

6 視野缺損(Homonymous hemianopsia)是中風病患常見的併發症之一，其治療方法最主要的原則為：
(A)教導病患時常將頭轉向患側
(B)教導病患時常將頭轉向健側
(C)教導病患加快掃視(Scanning)的速度與範圍
(D)教導病患減慢掃視的速度與範圍

7 當被動且快速拉扯腦中風患者手肘至完全伸直過程中，在最後關節角度約30度時發現有些微阻力(Minimal resistance)，若根據修正版愛茲渥斯量表(Modified Ashworth Scale)對痙攣的分類，應屬於那一級？
(A)0 (B)1 (C)3 (D)4

8 若一位腦外傷病人僅能在疼痛刺激才張開眼睛，四肢無自主性的協調動作，上肢會不自主表現出屈曲協同動作型式(Flexor synergy pattern)，僅能發出一些無法理解的聲音，若以格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale)來評估此病人，應如何記分？ (A)E2 M5 V4 (B)E1 M3 V2 (C)E2 M3 V2 (D)E3 M1 V5

9 治療師對計程車駕駛這個職業的分析結果，應該屬於那一類的工作？
(A)靜態工作(Sedentary work) (B)輕度工作(Light work) (C)中度工作(Medium work) (D)重度工作(Heavy work)

10 暫時性梗塞(Transient ischemic attacks)是指中風特徵在多長時間內消失？
(A)1小時 (B)1星期 (C)1天 (D)1個月

11 一位中風病人患側手可往前伸直，笨拙地握住正前方之圓柱狀茶杯，並能放開此茶杯，但手臂無法高舉過頭，手指也無個別獨立動作(Individual finger movements)，根據布氏(Brunnstrom)上肢動作恢復分級，此恢復階段可能為：
(A)近端為第三階段，遠端為第二階段
(B)近端為第五階段，遠端為第三階段
(C)近端為第二階段，遠端為第四階段
(D)近端為第四階段，遠端為第五階段

12 下列訓練的項目何者較不適合以肌電生理回饋(EMG biofeedback)方式來訓練之？
(A)肌肉收縮(Muscle contraction)
(B)肌肉放鬆(Muscle relaxation)
(C)疼痛之控制(Pain control)
(D)中風後肩部控制(Shoulder control)

13 右腦傷之中風患者常會出現推者症候群(Pusher syndrome)，其主要特徵為何？
(A)病人站著時會倒向健側
(B)病人只有純粹的動作障礙，無認知知覺障礙
(C)病人無病識感
(D)坐著時，病人健側會將身體傾推至患側

14 伯巴斯(Bobath)所提之神經發展手法(NDT)，所強調的治療原則為何？
(A)避免誘發患側邊不正常的肌肉張力或動作型態
(B)中風病人急性期的治療應以訓練健側邊為主
(C)訓練中風病人患側上肢時，應先訓練手指動作再訓練肩膀動作的恢復
(D)誘發固定式之協同動作型式(Stereotyped synergy pattern)來從事日常生活活動

15 若腦中風患者在閱讀時，將"每到春季，港口的景色多變"誤讀為"巷口的景色多變"，則該患者最有可能患有下列那一個症狀？
(A)發音困難(Dysphonia) (B)構音困難(Dysarthria) (C)忽略症(Unilateral neglect) (D)失憶症(Amnesia)

16 建構性失用症(Constructional apraxia)和肢體失用症(Limb apraxia)的差別在於：
(A)前者屬於空間障礙，後者傾向於動作計劃困難 (B)前者發生在左腦傷患者之機率較右腦傷患者高，而後者剛好相反 (C)前者不影響日常生活功能，後者則會影響之 (D)前者是認知(Cognition)問題，後者是心理障礙

17 以下有關各種增加被動關節活動度的技巧何者錯誤？
(A)伸展肌主動收縮造成的主動拉伸(Active stretch)對屈曲攣縮的關節有矯正的效果
(B)在做被動拉伸(Passive stretch)的同時可用牽引(Traction)的技巧分離關節面以降低疼痛
(C)在做被動拉伸時，治療師的動作要快且力量大才可達到效果
(D)維持／放鬆(Hold/Relax)的技巧也可用來增加縮短組織的被動關節活動度

18 下列何種評估工具最不適合評量中風患者之動作技巧或動作功能方面的問題？
(A)富格梅爾測驗(The Fugl-Meyer Test)
(B)直線兩等分測驗(The Line Bisection Test)
(C)行為研究手臂測驗(Action Research Arm Test)
(D)半側癱瘓上肢功能測驗(The Functional Test for the Hemiplegic Paretic Upper Extremity)

19 對一位第五節頸椎完全損傷的病患而言，以下有關其所需要的輔具的敘述，何者錯誤？
(A)病患可利用手腕固定輔具(Wrist stabilizing device)拿起一個杯子
(B)病患可使用人力操作輪椅(Manual wheel chair)但需要加長操作桿的煞車
(C)病患在穿上半身衣服時不需任何改裝(Modification)幾乎可以獨立完成
(D)病患在寫字方面可能需要一個手背式的豎腕副木(Dorsal wrist cock-up splint)來協助握筆

20 病患經開心手術(Open-heart surgery)尚在加護病房時，職能治療師可建議病患從事以下那一類的活動？
(A)斜靠坐著且雙手支撐於桌上玩紙牌　(B)不靠背維持坐姿三十分鐘以上
(C)坐姿之下執行五至十分鐘的上肢主動運動　(D)絕對臥床休息禁止任何活動

21 判斷功能性活動是否對心臟造成過大負荷的標準為：
(A)活動結束時每分鐘心跳次數比休息時每分鐘心跳次數增加在六十下以內
(B)活動結束時每分鐘心跳次數比休息時每分鐘心跳次數增加在四十下以內
(C)活動結束時每分鐘心跳次數比休息時每分鐘心跳次數增加在二十下以內
(D)活動結束時每分鐘心跳次數比休息時每分鐘心跳次數增加在十下以內

22 對心肺功能損傷患者之耐力評估，常用代謝等同層級為指標(Metabolic equivalent level，簡稱MET)為指標，若病人玩橫牌時，所須之能量為2 MET，則相當於：
(A)每公斤體重每分鐘所需氧氣為2毫升(ml)　(B)每公斤體重每分鐘所需氧氣為7毫升(ml)
(C)每公斤體重每分鐘所需氧氣為2升(L)　(D)每公斤體重每分鐘所需氧氣為7升(L)

23 肌萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis)不可能發生於下列那種神經之退化？
(A)脊髓之前角細胞(Anterior horn cells)　(B)脊髓之動作神經元(Motor neurons)
(C)大腦皮質之動作神經元(Neurons)　(D)腦幹之動作神經核(Motor nuclei)

24 以下何者不是類風濕性關節炎(RA)病患常見的關節變形？
(A)腕關節屈曲攣縮(Flexion contracture)　(B)掌指關節尺側偏移(Ulnar drift)
(C)指節天鵝頸變形(Swan neck deformity)　(D)大拇指掌指關節脫臼(Dislocation)

25 某病患患有類風濕性關節炎已經五年，目前她的手部、腕部、肩部及膝部均有輕微程度的發炎，以下何者是最適合此病患的日常輔具？
(A)抓握式長柄背刷(Long-handled back brush)　(B)擠壓握把式的取物棒((Squeeze-grip long reachers)
(C)圓環把手的長柄背刷(Long back brush loop handle)　(D)手杖(Cane)

26 脊髓損傷患者若上肢的運動感覺功能損傷比下肢嚴重稱之為：
(A)前索症狀(Anterior cord syndrome)　(B)痛覺缺乏(Anosognosia)
(C)布朗－斯蒂症狀(Brown-Sequard syndrome)　(D)中央索症狀(Central cord syndrome)

27 若要評估職能治療師所面對的成人生理疾病患者之心理社會(Psychosocial areas)問題，下列那一種評估工具最合適？
(A)完整職能治療評估(Comprehensive Occupational Therapy Evaluation，簡稱COTE)
(B)布魯氏動作測驗(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency)
(C)畢保德圖形詞彙測驗(The Peabody Picture Vocabulary Test)
(D)工作評量系統科技(Work Evaluation Systems Technology，簡稱WEST)

28 中風患者若因腦幹肌肉張力太強而無法在床上作翻身的動作，依據傳統動作控制理論所發展的治療原則，治療師應用下列那一個方法？
(A)肌腱輕拍(Tendon tapping)　(B)慢速轉動軀幹(Slow rolling)　(C)震動技巧(Vibration)　(D)快速伸展(Quick stretch)

29 中風患者的患側上肢肌肉張力過低，若欲提高肌肉張力使之正常化，下列何種治療方法最符合路德(Rood)的治療原則？
(A)快刷(Fast brushing)　(B)延長徒手伸展技巧(Prolonged manual stretch)
(C)以低階反射誘發動作　(D)夾副木(Splinting)

30 費茲(Fitts)和伯斯那(Posner)將學習分為三個階段：①認知階段(Cognitive stage)　②自發階段(Autonomous stage)　③聯想階段(Associative stage)，該三階段有順序性，其順序應為何？
(A)①②③　(B)③①②　(C)③②①　(D)①③②

31 傳統之動作控制理論所衍生出之動作評估項目，下列那一項較不列入考慮？
(A)病人角色扮演之問題　(B)肌肉張力是否正常
(C)動作恢復(Motor recovery)的階段　(D)是否產生不正常的反射動作

32 卡爾(Carr)與謝弗(Shepherd)提出的動作再學習計劃(Motor Relearning Program)中，對於改善動作技巧，提出四個步驟，下列何者不屬於此四步驟？
(A)活動分析(Analysis of task)　(B)練習輔具使用(Practice of assistive device)
(C)練習失去的技能(Practice of missing component)　(D)訓練結果之轉移(Transference of training)

33 心理防衛機轉(Defense mechanism)常是病人罹患疾病後潛意識中舒解焦慮的過程，下列何項反應不屬於心理防衛機轉？　(A)敵意(Hostility)　(B)否認(Denial)　(C)退縮(Regression)　(D)發洩(Acting out)

34 當代活動取向途徑(Contemporary Task-Oriented Approach)中主張（或假設）下列何者？
(A)病人需要用固定的策略在單一環境中重複練習才能發展新的動作技巧
(B)對中樞神經系統病變的患者而言，首要治療目標為使肌肉張力正常化
(C)控制感覺刺激的輸入來抑制腦傷後所產生的原始反射動作
(D)功能性活動可協助動作行為的組織

35 下列何者與現代動作控制理論的主張不吻合？
(A)中樞神經系統是階層式(Hierarchical)的組織以利動作的產生
(B)動作的完成不只考慮執行者本身的特質，也需重視情境的因素
(C)由該理論所衍生的治療原則是協助病人尋求最佳策略(Optimal strategy)以達到功能性之目標
(D)由該理論所衍生的治療原則強調應提供機會讓病患在不同的情境下練習

36 下列敘述，何者最不屬於反射－階層式(Reflex-Hierarchical)動作控制理論中所主張或由其主張所衍生的治療原則？　(A)當一個人接收感覺刺激後，會產生反射動作或刻板的(Stereotyped) 動作　(B)動作的產生是由許多次系統互動的結果　(C)中樞神經系統中存有動作程式(Motor program)可控制動作表現　(D)感覺刺激可用來抑制不正常的反射動作

（請接背面）

37 〝活動分級(Activity grading)〞是職能治療師常用的專業治療技巧，以下何者不屬於可被分級(Grading)的參數？
(A)個案對活動的熟悉程度(Familiarity)　(B)治療師給予引導(Direction)的方式
(C)執行活動所需材料在空間中的位置　(D)個案本身的認知能力

38 下列何者不是從事感覺再教育(Sensory reeducation)的原則？
(A)每個活動必須包含有及無視覺回饋的情況　(B)所提供的刺激物由簡單到複雜
(C)所提供的刺激物體積由小到大　(D)訓練過程中需讓病人覺得有挑戰性但不會產生挫折感

39 根據布朗斯壯(Brunnstrom)對偏癱病人的治療理念，欲誘發患側手部的伸展可利用以下那一個聯合反應(Associate reaction)或反射(Reflex)？
(A)本體感覺牽拉反應(Proprioceptive traction response)　(B)瑞密斯現象(Raimiste's phenomenon)
(C)本能抓握反應(Instinctive grasping reaction)　(D)梭魁斯手指現象(Souque's finger phenomenon)

40 下列那一種評估工具適合檢測右腦傷患者的知覺(Perception)問題？
(A)星星刪除測驗(The Star Cancellation Test)　(B)口部及肢體失用症測驗(The Test of Oral and Limb Apraxia)
(C)普渡測驗(Perdue Pegboard Test)　(D)個人與環境適合度量表(Person-Environment Fit Scale)

41 一個病患要能獨自獨立在家中生活應具備以下那些能力：①準備簡單食物的能力　②具備基本居家安全常識與判斷力　③可以按時吃藥　④必要時有能力尋求緊急協助
(A)①③　(B)①②④　(C)②④　(D)①②③④

42 某病患因第十一胸髓受傷(T11 SCI)而造成下肢癱瘓(Paraplegia)，目前其上肢肌肉強度正常但是耐力不足，軀幹的肌肉強度是普通(Fair)，如果病患家中浴室空間有限，治療師可建議病患以那一種方式由輪椅移位到廁所？
(A)標準支軸移位(Standard pivot transfer)　(B)側邊移位(Side transfer)
(C)正面移位(Front transfer)　(D)升降機移位(Hoist transfer)

43 誘發提內爾徵兆(Tinel's sign)的方式為何？
(A)沿著周邊神經通過的路徑由肢體的遠端向近端輕拍
(B)雙手手臂掌手臂互相推擠，使雙手手腕成屈曲90度並維持此姿勢60秒
(C)在手肘極度彎曲的情況下做前臂(Forearm)的旋後(Supination)
(D)給予手肘伸展(Elbow extension)的最大阻力

44 〝以個案為中心〞的理念，對職能治療來說，首先要評估的是：
(A)個案日常生活活動獨立的程度　(B)個案的認知功能
(C)個案對自我效率(Self-efficacy)的主觀感受　(D)個案是否仍能執行病前人生角色的任務

45 對於一個一星期前剛接受完全髖關節置換術的病患而言，在日常活動中，以下那一個動作是安全的？
(A)坐在高度比膝關節高度低的椅子　(B)坐著時將患側下肢跨放在健側大腿上
(C)坐著時彎身撿取地上的物品　(D)坐著時維持雙膝微開與肩同寬

46 接受肌腱鬆解術(Tendolysis)的病患於手術後24小時以內，應該接受以下那一治療項目？
(A)完全限制活動(Immobilization)　(B)最大的被動拉伸(Maximum passive stretch)
(C)主動性關節活動(Active range of motion exercise)　(D)阻力性運動(Resistive exercise)

47 一個中風病患，他在坐或站姿之下，只可以做出髖－膝－踝關節時同時彎曲，那麼職能治療師對他的下肢運動功能的恢復評估結果可記錄為？
(A)布朗斯壯第II級的恢復(Br. Stage II)　(B)布朗斯壯第III級的恢復(Br. Stage III)
(C)布朗斯壯第IV級的恢復(Br. Stage IV)　(D)布朗斯壯第V級的恢復(Br. Stage V)

48 以下何者為鈕扣指(Boutonniere deformity)的形成原因？
(A)深層屈指肌肌腱(Flexsor digitorum superficialia)斷裂　(B)第二環形拉環(A2 pully)斷裂
(C)伸指肌腱中央束斷裂(Extensor tendon central slip)　(D)蚓狀肌(Lumbrical)肌腱斷裂

49 某病患因第四頸髓受傷(C4 SCI)而造成四肢癱瘓(Quadriplegia)，他除了有良好的頸部動作控制能力之外，四肢完全沒有功能，請問這個病患所需要的輪椅以下何者最適當？　(A)手推輪圈具有突出桿的輪椅　(B)腳踏板可以昇高九十度的輪椅　(C)具有加長煞車操縱桿的輪椅　(D)具有下巴操作控制器的輪椅

50 某病患因為軀幹以及下肢肌肉無力導致容易在輪椅上身體會倒向雙側，這種情形可以用以下那些輔具來改善？　①楔形椅墊(Wedge cushion)　②軀幹雙側的支撐物(Bilateral trunk support)　③大腿板(Lapboard)　④椅背上的皮帶(Seat belt)　(A)①②　(B)①②③　(C)②④　(D)①②③④

51 以下那一種情況的個案可能需要前置型踝－足副木(Anterior ankle-foot orthosis or Bisurfaced static ankle-foot orthosis)的矯正？
(A)踝關節骨折且接受閉鎖式復位(Close reduction)之後　(B)中風病患合併有足內翻(Foot inversion)的問題
(C)腳趾背伸肌腱斷裂　(D)阿基理氏肌腱斷裂(Achilles tendon rupture)

52 一個前臂處橈神經斷裂的病患，在急性期過後，可能需要以下那一種副木來協助患手的功能？
(A)對掌副木(Short opponent splint)　(B)抗爪狀手變形副木(Anti-claw hand splint)　(C)背式腕部副木加上指環以協助掌指關節伸展(Dorsal forearm-based dynamic wrist and MCP assistive-extension orthosis)　(D)手指槽式副木(Finger gutter)

53 金(King)與尼克森(Nixon)發展一套心肺功能訓練法，其訓練原則簡稱SABRES，以下對SABRES的敘述何者正確？
(A)S代表學習站立的姿勢，A表示控制冒險行為的產生　(B)B代表學習正確呼吸法，RE代表活動量的增加
(C)A代表學習控制適當的警醒程度(Level of arousal)，RE代表休息量的增加　(D)S代表控制睡眠的質與量，B代表學習正確呼吸法

54 下列關於多發性硬化症(Multiple sclerosis)的敘述何者正確？
(A)可能有複視(Diplopia)的情況產生　(B)該疾病不會影響病人的動作能力（如：肌力、姿勢控制）
(C)好發於10歲以下兒童　(D)常起因於中樞神經系統之灰質區病變

55 對於巴金森症(Parkinson's disease)患者的治療手法，下列何者不適當？
(A)利用本體神經肌肉誘發手法(PNF)降低僵直(Rigidity)現象　(B)利用音樂來維持動作的規律性
(C)利用大叫（如：停止）來幫助行走越來越快的病人停下來　(D)利用強光來改善面部缺乏表情的問題

56 以下敘述是有關職能治療師對類風濕性關節炎(RA)病患的治療，何者錯誤？
(A)在急性發炎期要建議病人每天一次無阻力的等張肌肉收縮(Isometric exercise)
(B)在急性期仍要建議及教導病人每小時做關節活動運動以預防關節僵硬
(C)在非急性期，如果病患在運動後疼痛持續一小時以上，治療師應建議病患減少運動量
(D)在急性期即使有關節僵硬現象，仍要避免被動拉張(Passive stretch)發炎的關節

57 截肢者殘肢的包紮(Wrapping) 其主要目的為： (A)幫助傷口癒合(Wound healing) (B)減敏感治療(Desensitization) (C)維護皮膚的清潔(Skin hygiene) (D)幫助殘肢的收縮與塑型(Shrinking & shaping)

58 治療師可利用科技來協助老年人減輕老化所產生的問題，下列何者不適合？
(A)電話數字放大 (B)電視螢幕放大 (C)電鈴聲或電話聲壓低 (D)裝設生命呼叫系統(Life call systems)以便與緊急中心(Emergency service)連線

59 以下那一種情況不會影響到低溫熱塑性材料的使用壽命(Durability)？
(A)長時間曝露在陽光之下 (B)長時間受到正向壓力 (C)經常性受到彎折的力量 (D)以冷水清洗

60 ①仰臥時，髖關節與膝關節同時彎曲 ②俯臥時，髖關節不動，膝關節彎曲 ③側臥，髖關節正中位置(Neutral position)，只彎膝關節。在正常情況下，這三個位置所測得的膝關節屈曲(Flexion)最大角度有何差別?
(A)①所測得比較大 (B)②所測得比較大 (C)③所測得比較大 (D)沒有差別

61 針對類風濕性關節炎(Rheumatic arthritis, RA)的個案，以下何者無法達到保護關節的目的？
(A)用肩膀背包包 (B)疲的時候要休息 (C)用手掌端盤 (D)用右手關水龍頭

62 某病人橈骨遠端骨折，而且X光片顯示靠近腕骨的斷端往背側移位，使其手部呈現有如倒置的叉子(Up-side-down fork)，這病人的骨折類型為： (A)史密斯骨折(Smith's fracture) (B)可利斯骨折(Colle's fracture) (C)巴頓骨折(Barton's fracture) (D)蒙太奇骨折(Montaggis's fracture)

63 測量前臂的旋前(Pronation)的主動活動度(AROM)時，治療師要注意受測者的那一個代償動作？
(A)上臂的內轉(Upper arm internal rotation) (B)上臂的外轉(Upper arm external rotation)
(C)腕部的伸展(Wrist extension) (D)腕部的彎曲(Wrist flexion)

64 下列對於巴金森症症狀(Parkinsonism)的敘述，何者為誤？ (A)休息式顫抖(resting tremor) (B)言語中缺乏情緒表達 (C)可能多汗，皮膚油膩 (D)眼球顫顫(Nystagmus)

65 病患腕部骨折後，接受閉鎖性復位，醫師為病人打上石膏，為免廢用肌無力(Disuse weakness)，腕部肌肉力量可以用以下那一個方法訓練？
(A)等長收縮運動(Isometric contraction exercise) (B)等張向心收縮運動(Concentric contraction)
(C)等張離心收縮運動(Eccentric contraction) (D)以上三者都可以

66 一位剛接受正中神經縫合手術的病患，職能治療師應該給予的副木型式及穿戴副木的時間是：
(A)背側制動副木，手腕成屈曲，穿戴一至二週 (B)背側制動副木，手腕成伸展，穿戴一至二週
(C)背側制動副木，手腕成屈曲，穿戴二至三週 (D)背側制動副木，手腕成伸展，穿戴二至三週

67 徒手肌力測驗(MMT)的計分方式中，Fair與Good的差別為何？
(A)Fair可抗地心引力和阻力，Good無法抗地心引力 (B)Fair無法抗地心引力，Good可抗地心引力和阻力
(C)Fair可抗地心引力和阻力，Good無法抗阻力 (D)Fair可抗地心引力，Good可抗地心引力和阻力

68 工作強化的目標包括下列五項中之那些項目：①建立個案最佳體能狀態與能力 ②探索職業興趣 ③降低重返工作的焦慮 ④訓練最大的認知與心理社會功能 ⑤提昇重返工作的信心
(A)①②③④⑤ (B)①②③⑤ (C)①③④⑤ (D)①②⑤

69 若一胸椎損傷的個案到職能治療室接受治療時，抱怨頭昏些微頭痛，且臉色發白，此時治療師應立即做的處置為何？ (A)請醫師處理 (B)讓病患坐在輪椅，並儘量將椅背放平 (C)讓病患坐輪椅，但把椅背墊高 (D)讓病患站起來閉起眼睛

70 皮膚移植(Skin graft)是大範圍或深度體表軟組織傷害的補救方式，接受這種手術的病患通常幾天後傷處可以開始做主動運動？ (A)二十四小時以內 (B)三天以內 (C)七天以後 (D)十四天以後

71 "以個案為中心"的治療過程是比較符合職能治療專業理念的治療模式，請問以下那一個評估工具是以"以個案為中心"的理念而設計的？
(A)加拿大職能表現評量(Canadian Occupational Performance Measure) (B)巴氏量表(Barthel Index)
(C)傑森-泰勒手功能測驗(Jebsen-Taylor Hand Function Test) (D)盒子與積木測驗(Box and Block Test)

72 以下何者不屬於獨立功能量表(FIM)量測的範圍？
(A)行動能力(Mobility) (B)溝通能力(Communication) (C)自我照顧能力(Self-care) (D)使用大眾運輸工具的能力

73 所謂"Dysmetria"指的是： (A)無法執行快且重複性的動作 (B)無法預估到達目標物所需的動作幅度 (C)無法做出連貫的動作 (D)無法適時做出動作反應

74 若患者無法同時開車及收聽路況報導，則最可能有下列那一種注意力問題？
(A)持續性注意力(Sustained attention) (B)選擇性注意力(Selective attention)
(C)交替性注意力(Alternating attention) (D)分配性注意力(Divided attention)

75 彈回現象(Rebound phenomenon of Holmes)是指：
(A)缺乏在執行動作過程中，停止該動作以避免撞到物體的能力 (B)產生自發性動作(Voluntary movement)時會顫抖 (C)在閉眼及雙腳併攏的情況下無法維持平衡 (D)走路時需有較寬的底面積(Wide-based)才穩

76 賽門－威斯坦單纖維(Semmes-Weinstein monofilaments)測驗可檢測那一種感覺障礙？
(A)本體覺 (B)溫度覺 (C)痛覺 (D)觸覺

77 短肘上截肢者(Short A/E)殘肢包紮的方式(Wrapping)以下何者正確？
(A)由近端往末端纏繞 (B)以環狀的纏繞方式包紮
(C)纏繞時壓力愈大愈好 (D)最後可繞到軀幹以幫助固定

78 實施感覺評估(Sensory evaluation)時，應注意之技巧或原則不包括下列那一項？
(A)治療師與病人溝通的語言是患者可書寫或常講的語言 (B)給予感覺刺激的間隔應固定(Regular intervals)
(C)測試環境中的溫度必須適當，讓患者覺得舒適 (D)給予感覺刺激時，應去除聽覺的提示(Auditory cue)

79 當治療師訓練病人轉位時，先要求病人練習由輪椅轉位至床5次，接著是輪椅至馬桶5次，最後是輪椅至一般椅子5次，這種按照順序的練習方式在學習理論中稱為： (A)固定式練習(Blocked practice) (B)隨機式練習(Random practice) (C)心像練習(Mental practice) (D)大量練習(Mass practice)

80 下列那一項頭部外傷患者的併發症，可藉由「被動關節運動」、適當的「擺姿」及「副木」而改善之？
(A)外傷後癲癇(Post-traumatic epilepsy) (B)異位性骨化(Heterotopic ossification)
(C)水腦症(Hydrocephalus) (D)呼吸性肺炎(Aspiration pneumonia)