九十年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　　代號：514　　全一張（正面）

類　　科：職能治療師
科　　目：生理疾病職能治療學
考試時間：一小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：(1)本試題禁止使用電子計算器。
(2)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(3)每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡1至80題劃記，於本試題上作答者不予計分。

1 以下對老年人肌肉骨骼系統的變化情形，何者較不正確？
(A)肌肉纖維(muscle fiber)數目會降低　(B)脂肪與結締組織量減低
(C)肌力降低　(D)執行從椅子站起來的動作較吃力

2 加拿大職能表現量表(The Canadian Occupational Performance Measure，簡稱 COPM)和動作過程技巧評估(Assessment of Motor Process Skills，簡稱 AMPS)常用來評估日常生活功能，下列之敘述何者為非？
(A)前者是半結構化的測驗　(B)前者是患者對自己職能表現的認知及評估
(C)後者只評量工具性日常生活功能之表現(IADL)　(D)後者所評量的過程技巧(process skills)與個人之注意力(attentional)、計畫(planning)和組織(organizational)能力相關

3 以下有關各種副木(splint)在不同周邊神經損傷的應用何者正確？
(A)副木對神經損傷的病患主要的目的是制動(immobilization)
(B)對於尺神經在手肘處受到壓迫的病患，其副木設計應將手肘擺在屈曲 90 度的位置
(C)一般而言，神經損傷只需要靜態副木　(D)正中神經損傷(median nerve injury)的病患需要一個副木來拉扯(stretch)大拇指與食指間的蹼間區(web space)

4 肌肉力量不足是周邊神經系統損傷之後常見的後遺症，這一類的肌肉力量訓練原則為：
(A)使肌肉在抗最大阻力下做重複性的收縮　(B)使肌肉在抗中等阻力下做重複性的收縮
(C)使肌肉在抗最大阻力下做單次收縮　(D)使肌肉在抗中等阻力下做單次收縮

5 阿茲海默症(Alzheimer's disease)是好發於老年人的退化性疾病，對於這一類病患職能治療師在設計活動時，以下何者正確？　(A)可以選擇兒童活動以符合其心智狀態　(B)可利用口語指示或書面指示來訓練個案的理解力　(C)可利用對活動的參與度(involvement)來分級適合的活動　(D)可以盡量提高活動的複雜性以挑戰其心智能力

6 菲萊測驗(Phalen's test)是用以測試：　(A)媽媽手　(B)腕道症候群　(C)網球肘　(D)高爾夫球肘

7 莫伯格拾物測驗(Moberg Pick-up test)主要是在測試病患那一方面的能力？
(A)觸覺辨識能力(tactile gnosia)　(B)手指靈巧度(finger dexterity)
(C)前景背景知覺能力(figure-ground perception)　(D)手眼協調能力(eye-hand coordination)

8 以下何者不包括在多發性硬化症(multiple sclerosis)患者的職能治療目標之中？
(A)動作協調與肌力的訓練　(B)患者居家與工作環境的改裝(modification)
(C)節省能量及工作簡化的教育　(D)促進動作起始(initiation)及維持良好姿勢的習性

9 以下那一個變數是治療師據以判斷病患是否可以開始接受義肢製作裝置的指標？
(A)個案日常生活獨立評估技巧　(B)個案殘肢(stump)周長的測量
(C)個案皮膚感覺度的測量　(D)個案殘肢包紮(wrapping)技巧的測量

10 以下那一個描述表示有內在肌緊縮(intrinsic tightness)的現象？
(A)不論將掌指關節(MP)被動的擺在屈曲(flexion)或伸張(extension)，近端指間關節(PIP)的被動活動表現一致
(B)在掌指關節伸張時近端指間關節的被動屈曲角度小於在掌指關節屈曲時的角度
(C)在掌指關節伸張時近端指間關節的被動屈曲角度大於在掌指關節屈曲時的角度
(D)當掌指關節伸張時(extension)，指間關節無法完全伸張(total extension)

11 根據威勒生(Wellerson)等人所提義肢檢查(check out)標準，以下何者正確？
(A)使用肘關節下(BE)截肢義肢的病患，必須在肘彎曲 120° 時可以打開末端裝置(terminal device)70%~100%
(B)使用肘關節上(AE)截肢義肢的病患，在肘關節鎖住於伸張(extension)的情況下，應至少可以做出肩屈曲與外展各 90°
(C)使用肘關節上(AE)截肢義肢的病患，在肘關節伸張(extension)時，應至少可以張開末端裝置 70%
(D)使用肘關節下(BE)截肢義肢的病患，不論有無穿戴義肢應可表現出相同的前臂旋前與旋後(pronation & supination)

12 一個前臂及手部背面灼傷的病患，且在腕關節正上方有傷口，治療師為此病患急性期所設計的副木應該：
(A)將手腕及掌指、掌間關節擺成伸張的位置
(B)將手腕擺在中性位置(neutral position)，掌指關節伸張(total extension)，指間關節屈曲(flexion)
(C)將腕關節擺成屈曲，掌指關節、掌間關節屈曲
(D)將腕關節擺成中性位置(neutral position)，掌指關節至少 30~60 度的屈曲，指間關節完全伸張(total extension)

13 以下何者是預防類風濕性關節炎患者掌指關節發生變形(deformity)的方法？
(A)用左手以順時針方向擰瓶蓋　(B)用右手以順時針方向開啤酒瓶開瓶器
(C)協助自己由坐椅站起時，手要緊握椅子扶手，以增加起動力　(D)每天動做關節運動以重建肌力

14 以下有關不同神經損傷的表徵何者有誤？
(A)橈神經的損傷會影響到抓握的力量(grip power)
(B)爪狀手(claw hand)變形只發生在較遠端靠近腕部的尺神經損傷
(C)弗羅門症狀(Fromen's sign)主要是發生於尺神經損傷的個案
(D)正中神經損傷，常見的手部變形是"猿狸手"(Ape hand)

15 若病患截肢位置是在肘關節以上至少 2 英吋處，其所配用的義肢應不包括以下何種單元(unit)或構造？
(A)肘栓(elbow hinge)　(B)內固定式肘單元(internally locking unit)
(C)外固定式肘單元(externally locking unit)　(D)抬舉輔助單元(lift assist unit)

16 以下那一類的輔具不是接受全人工髖關節置換術的病人所需要的？
(A)取物棒(reacher)　(B)穿衣棒(dressing stick)　(C)升高的廁所座椅(raised toilet seat)　(D)轉位板(transfer board)

17 以下有關靜態副木(static splint)與動態副木(dynamic splint)比較的敘述，請選出正確者？
(A)動態副木對肢體會施加外力，而靜態副木則否
(B)動態副木可以矯正關節的攣縮(contracture)，靜態副木則否
(C)提供發炎的關節休息(resting)的較佳選擇是靜態副木而非動態副木
(D)靜態副木可以提供較佳的組織修復環境，動態副木則否

18 某病患屈指肌腱斷裂，經手術重接，治療師可於何時利用加瑪握力器(Jamar dynamometer)進行握力的測試？
(A)手術後 3 週　(B)手術後 5 週　(C)手術後 7 週　(D)手術後 9 週

19 主動輔助運動(active-assistive exercise)不適用以下那一等級肌肉強度的肌肉力量訓練？
(A)第 0 級(zero)　(B)第一級(trace)　(C)第二級亞級(poor minus)　(D)第三級亞級(fair minus)

20 造成累積性創傷病變(cumulative trauma disorders)的危險因子不包括以下何者？
(A)工作的重複性　(B)工作環境太過悶熱　(C)工作中身體姿勢不良　(D)長期維持某一固定姿勢

21 關節攣縮病患在接受活動訓練之前，常會接受熱療，以提升活動治療的效果，以下何者不屬於這一類熱療的媒介？　(A)超音波(ultrasound)　(B)蠟浴(paraffin)　(C)固流治療(fluidotherapy)　(D)干擾波(IFC)

22 有關於席倫(Thelen)所提出之動態系統模式(Dynamic Systems Models)之敘述，何者爲非？　(A)有機體(organism)有自我組織(self-organization)的能力來完成外在任務或環境的要求　(B)中樞神經系統是唯一控制行爲的因子　(C)任何系統參數(parameter)的改變皆會影響系統的平衡　(D)有機體會受情境因子影響而調整動作行爲模式

23 巴氏量表(Barthel index)是臨床上常用以評估病患日常生活功能的工具，若病患在該量表得分爲滿分，代表：
(A)該病患在自我照顧(self-care)活動上需要別人幫忙　(B)該病患在工具性日常生活活動需要別人幫忙
(C)該病患可自行獨立處理洗澡、上廁所等活動　(D)該病患在工具性日常生活活動方面可獨立完成

24 下列對落臂測驗(drop arm test)的敘述，何者正確？
(A)此測驗用來檢測旋轉套(rotator cuff)是否損傷　(B)此測驗用來檢測棘上肌(supraspinatus)肌腱炎
(C)檢測方式是在尺神經上給予輕敲　(D)檢測方式是將手肘屈曲 60 度，由治療師在手肘上給予壓力

25 若治療師發現脊髓損傷患者頭痛、冒汗、面色潮紅、瞳孔收縮，則下列敘述何者爲誤？
(A)將患者頭抬高，並檢查導尿管是否暢通　(B)是一種自主性反射失調(autonomic dysreflexia)
(C)替患者加蓋毛毯保暖　(D)若不立即處理，可能導致死亡

26 視知覺障礙可類分爲視覺刺激物辨認(identification)及定位(localization)困難兩大類，以下有關這兩類視知覺障礙的敘述，何者正確？　(A)空間定向不能(spatial disorientation)可因視覺辨認困難而形成　(B)持續表現測驗(Vigil continuous performance test)測試的是視覺辨認能力　(C)視覺辨認困難主因是枕葉至頂葉之通路受損　(D)視覺定位困難主因是枕葉至顳葉之通路受損

27 對於瑞奧認知功能階段(Rancho Level of Cognitive Functioning)第五至第六期的頭部外傷患者，下列之職能治療項目或目標何者最不適當？
(A)提供結構化環境
(B)要求病人在治療師簡單的提示下(如：今天是星期一，請擬出工作計畫)自行計畫一週的工作
(C)訓練病人分辨不同物體顏色及形狀之相同、相異點
(D)治療師提供簡單有限度的提示，要求患者執行簡化的日常生活活動(如：只包含 5 步驟的活動)

28 若治療師要求患者練習梳頭髮的活動時，給予外在回饋爲「妳沒有梳到左邊的頭髮」及「妳梳頭髮時，手肘的彎曲度不夠」，此兩者在動作學習理論中，稱爲：
(A)前者爲結果之回饋(knowledge of results)，後者爲表現之回饋(knowledge of performance)
(B)前者爲表現之回饋，後者爲結果之回饋　(C)兩者皆爲表現之回饋　(D)兩者皆爲結果之回饋

29 下列何者不是失用症(apraxia)患者在接受施測時可能出現的錯誤？
(A)以食指當牙刷刷牙　(B)在沒有提供牙刷的情況下要求做刷牙動作時，病人會假裝拿著牙刷刷臉
(C)行單手模時，手肘的位置不對　(D)畫人形時，只畫人的右半部

30 下列何者是增進腦傷個案自我覺知(self-awareness)功能最適宜的方法？
(A)從事活動前由個案自評可能的活動表現，完成後治療師評量實際表現，並給予個案回饋
(B)提供音樂刺激來提醒個案活動的開始　(C)提供記錄活動步驟的記事本供個案查閱
(D)提供多樣化的刺激供個案自我探索

31 對於「感覺再教育」的敘述，何者不正確？
(A)適用於中風及截肢患者　(B)適用於已有溫度覺、觸覺等，但觸覺定位、兩點區辨能力受損者
(C)每一活動必須包含有及無視覺回饋，以利學習　(D)環境必須吵雜以提升訓練效果

32 降低觸覺敏感(hypersensitivity)之治療技巧何種正確？
(A)可使用按摩技巧　(B)先使用振動頻率高再用振動頻率低的振動方式
(C)所提供刺激物品特性的順序爲粗糙→光滑硬物→質軟物　(D)先用質地較粗糙再用質地較細緻的物品刺激

33 下列何項測驗最不適合用來評估手部靈巧度(dexterity)？
(A)箱子與木塊測驗(box and block test)　(B)九孔插板測驗(nine hole peg test)
(C)凹槽插洞板(grooved pegboard)　(D)反彈測驗(rebound test)

34 針對右利者(right hander)而言，下列有關左大腦半球和右大腦半球損傷之敘述何者不正確？
(A)左腦受損者常有空間探索缺失　(B)右腦受損者可能保留口語表達功能
(C)右腦受損可能造成左側忽略　(D)左腦受損可能造成左側肢體動作功能減損

35 爲使患者能安全地從事居家生活活動，下列對居家或個人用品調整之敘述，何者較不適當？
(A)爲輪椅代步的患者準備長柄夾，拿取置於地面的物品　(B)電話應放置在容易拿取的位置
(C)爲中風患者準備較寬鬆、鈕釦較大的衣服
(D)對以輪椅代步的患者而言，洗衣機最好使用上開口(up-loading)而非前開口(front-loading)

36 對於膝關節退化性疾病(degenerative joint disorders)患者，應注意之治療原則，下列何者爲非？
(A)利用蹲站活動增加膝關節之肌肉力量　(B)避免長時間走路，中間應休息
(C)馬桶高度不可太低　(D)上下樓梯採用側行方式，以減少膝關節承受之壓力

37 下列何者不是職能治療領域的哲理基礎？
(A)人的生命是一個持續調適(adaptation)的過程　(B)有目的性的活動可用來防止或調節失能(dysfunction)狀態
(C)人可藉由有目的性的活動來影響其健康和周遭的環境
(D)人的發展是被動的，需由其他的人給予適當活動來輔助其成長

(請接背面)

38 下列何項與多情境認知治療模式(Multicontext Treatment Approach)中的主張相違背？
(A)提供各種練習環境　(B)提供後設認知訓練(metacognitive training)
(C)以代償方式爲主　(D)強調概化過程(generalization)

39 若利用腰部張力反射(tonic lumbar reflex)來促進中風患者站立時患側下肢的承重能力，則應要求病人身體轉向那一側？　(A)患側　(B)健側　(C)以上皆可　(D)身體不需要轉向任一側

40 關於後天性免疫不全症候群(AIDS)的敘述，何者爲非？
(A)由病毒所引起　(B)初期症狀者可給予耐力與肌力訓練
(C)放鬆(relaxation)訓練或壓力處理(stress management)訓練會使病情惡化
(D)若孕婦爲 HIV 帶原者，可經由血液或母乳垂直傳染，致使嬰兒出生後可能成爲愛滋病患者

41 對於「吃」這項活動(eating activity)的相關訓練，下列敘述何者較不正確？
(A)對協調有問題的患者，可在腕部加重量(weighted wrist cuff)以利進食
(B)爲幫助抓握能力受限之患者進食，需將湯匙握柄變細
(C)可在盤子下放置防滑墊，以固定盤子　(D)對關節角度受限之患者，可使用旋轉式湯匙(swivel spoon)

42 卡爾(Carr)與雪菲(Shepherd)提出的動作再學習計畫(Motor Relearning Program)中，認爲可使用五種策略來增進患者的學習效果，請問這不包括下列何者？
(A)口語指示與說明　(B)給予即時且正確的回饋
(C)特殊的練習，但治療師不可帶著病人肢體協助其動作之完成　(D)向患者示範該如何正確地做出該動作

43 感覺功能障礙實體缺失(astereognosia)者，在日常生活中，可能遭遇下列那一種問題？
(A)跌到尖物時因無法察覺而被刺傷　(B)從皮包裡掏零錢時，若無視覺輔助，無法辨別
(C)洗澡時無法辨別水溫之高低　(D)若將原子筆放在擺滿雜物的桌上則無法找出原子筆

44 若職能治療師欲對患者做駕駛(driving)訓練，應優先評估患者那些能力？
(A)視力、身體狀況(physical measurement)、視知覺及認知能力　(B)溝通能力、社交能力、解決問題能力
(C)視力、表達能力、書寫能力　(D)身體狀況、書寫及閱讀能力、社交能力

45 一般而言，在皮膚移植之後，多久可以開始溫和的主動活動？
(A) 24 小時以內　(B) 3 天以內　(C) 5~7 天　(D) 7~14 天

46 下列何種治療性關係(therapeutic rapport)品質較低？
(A)治療師與病人互動時，皆把注意力放在對方身上　(B)治療師與病人互動時，病人對治療師的反應很少
(C)治療師與病人互動時，對對方的感受是正向的　(D)治療師與病人互動時，病人與治療師的合作度高

47 下列何者不是當代動作控制理論的主張？
(A)功能性活動的完成是由個人特質與情境因子互動而產生　(B)提供患者在不同的情境下做活動練習
(C)以肌肉張力及不正常反射動作的評估爲主　(D)功能性活動可協助動作的組成與執行

48 "Dysdiadochokinesia" 是指：　(A)產生不自主扭曲性的動作　(B)重複交替性的動作產生障礙
(C)閉眼走路會失去平衡　(D)產生自主性動作時會顫抖

49 一個有下背痛的病患於臥床休息時，最好採用以下那一種姿勢？
(A)仰臥雙膝彎曲　(B)側臥雙膝彎曲　(C)俯臥　(D)都可以

50 有關動作控制的描述何者正確？
(A)封閉迴路系統(closed-loop system)控制不需利用感覺回饋來修正動作中之錯誤
(B)開放迴路系統(open-loop system)控制是以動作程式執行動作
(C)快速的動作(在 160msec 內完成)由封閉迴路系統控制　(D)學習新的動作技巧主要由開放迴路系統控制

51 下列何者與認知、性格、抽象理解有關？
(A)額前皮質(prefrontal cortex)　(B)島葉(insula)
(C)中央前回(precentral gyrus)　(D)中央後回(postcentral gyrus)

52 肘道症候群(cubital tunnel syndrome)主要是那一條神經受壓迫？
(A)肌皮神經(musculo cutaneous nerve)　(B)尺神經(ulnar nerve)
(C)橈神經(radial nerve)　(D)正中神經(median nerve)

53 外傷性脊髓損傷可能造成前索症狀(anterior cord syndrome)，該症狀是指：
(A)動作和感覺功能會有不同形式的喪失，但本體感覺之功能保留　(B)上肢肌肉無力症狀較下肢嚴重
(C)受傷同側之本體感和動作能力喪失　(D)受傷對側之痛覺及溫度覺喪失

54 下列對肌肉力量(muscle strength)之敘述何者較正確？
(A)肌肉力量指當關節被動地被拉扯時，肌肉所產生的阻力
(B)肌肉骨骼系統在負重情況下，肌肉所產生的張力(tension)來維持姿勢或控制動作
(C)痙攣是肌肉力量產生問題的一種現象　(D)肌肉無力(muscle weakness)可用兩點區辨器來評估

55 某中年婦女於家中浴室不慎滑倒，結果造成寇理斯骨折(Colle's fracture)，經急診室醫師閉鎖式復位(close reduction)之後，以石膏固定，並轉介到職能治療做復健治療，請問此時職能治療師應該給予病患的治療性活動，以下何者不適當？　(A)每小時適量的主動運動四指，但大拇指不可做任何活動　(B)做適量的手腕伸、屈肌(flexor, extensor)等長收縮(isometric contraction)運動　(C)做適量手肘的主動關節活動　(D)做適量肩部的主動關節活動

56 治療師在提供活動給老人時，下列那一項原則較正確？
(A)慢性性、回復性的活動應盡量避免，以防老人沮喪　(B)活動困難度要高於老年人的能力，以防老化
(C)活動步驟的重複性愈高愈好，以提高老人動機
(D)活動需有目的性的(purposeful)，因老年人會持續很長的一段時間從事該活動

57 中風患者的患側上肢呈現痙攣(spasticity)，下列治療方式何者較符合路德(Rood)的處理原則？
(A)延長伸展(prolonged stretch)　(B)輕敲(tapping)
(C)使用振動器(vibrator)刺激　(D)快速伸展(quick stretch)

58 以下對布朗斯壯(Brunnstrom)所發展出來的運動治療途徑(Movement Therapy Approach)之敘述，何者爲非？
(A)腦傷後，動作的恢復是依照發展順序(developmental sequence)　(B)利用低階反射來誘發動作
(C)不可使用本體感及外感性(exteroceptive)刺激來改變動作表現
(D)新產生的正確動作必須經過練習才能獲得其技巧

59 與喪失高頻聽覺的老人溝通時，應注意： (A)講話速度放慢並壓低聲調 (B)講話速度放慢並提高聲調
(C)先大喊老人的名字以引起注意 (D)講話時，不要讓老人看到講話者以免分散注意力

60 下列專有名詞之解釋何者正確？
(A)型態學(或動量學)(kinematics)指施力時肌肉之活化情形
(B)動力學(kinetics)指動作之時空特質 (C)運動覺(kinesthesia)指對關節運動的軌跡與方向的認知
(D)運動不能(akinesia)指被牽扯的肌肉會不自主的交替收縮和放鬆

61 下列那一項教導較符合中風個案的代償性復健途徑(Compensatory Approach)？
(A)訓練動態站立平衡 (B)訓練健側肢操作日常生活活動
(C)做患肢關節壓迫(joint compression)動作來增加患側的張力 (D)做視覺掃瞄(visual scanning)能力的訓練

62 以下何者可用以測驗「dysmetria」？
(A)鼻子－手指－鼻子測驗(nose-finger-nose test) (B)足的翻轉測驗(foot pat test)
(C)手的翻轉測驗(hand pat test) (D)閉眼時，站立測驗

63 「Hemianesthesia」是指：
(A)喪失觸覺 (B)喪失痛覺 (C)喪失本體覺與運動覺 (D)喪失所有感覺功能

64 若中風患者的患側上肢近端動作在布朗斯壯的第四級(Brunnstrom stage IV)，則可從事下列那一個動作？
(A)手肘伸直時，做旋前旋後(supination-pronation)的動作 (B)手放至身後(hand behind body)
(C)手臂伸直高舉過頭(arm forward and overhead) (D)手臂水平側伸(arm to side-horizontal position)

65 以下對於能量節約(energy conservation)的方法，何者正確？
(A)使用電動設備 (B)做事時中間不要休息，一口氣做完
(C)站著工作比坐著工作好 (D)工作安排上，先把粗重工作集中一起做完，再做輕鬆的工作

66 半側偏盲(hemianopsia)與單側忽略症(unilateral neglect)之差別在於：
(A)前者爲空間概念缺損，後者爲視野缺損 (B)前者爲視野缺損，後者爲注意力缺損
(C)兩者皆屬感覺缺損(sensory impairments)問題 (D)前者爲視神經損傷，後者爲腦神經損傷

67 某病患下肢因灼傷接受皮膚移植，那麼在手術後何時可以開始行走(ambulation)？
(A) 1~3 天 (B) 3~5 天 (C) 5~7 天 (D) 7~9 天

68 壓力衣(compression garment)是灼傷病患控制疤痕組織的重要利器，治療師應建議病患何時開始每天 23 小時穿訂製的壓力衣？
(A)傷口癒合前 (B)傷口癒合後 3 週 (C)傷口癒合後 6 週 (D)傷口癒合後 9 週

69 以下何者不是引發腕道症候群(carpal tunnel syndrome)的危險因子？
(A)懷孕後期 (B)類風濕性關節炎(RA) (C)重複性的手腕彎曲及伸直 (D)大拇指用力的外展

70 對初期的水腫，處理的方法不包括以下何者？
(A)熱敷(hot pack) (B)提供傷處壓力(compression)
(C)提高傷處(elevation) (D)向心按摩(retrograde massage)

71 以下有關扳機指(trigger finger)的敘述何者正確？
(A)它有可能是由伸指肌腱發炎產生節結(nodule)的結果
(B)它的表徵爲手指一旦彎曲，伸直就有困難且劇烈疼痛
(C)治療師可給予一個副木穿戴在手背處以限制手指伸直
(D)它可以是職業傷害的累積，也可能是類風濕性關節炎引起的

72 肌肉骨骼系統的外傷組織修復後常遺留有被動關節活動度受限的現象，而被動拉扯(passive stretch)是解決此一問題常用的治療手法，以下有關被動拉扯技巧的注意事項何者錯誤？
(A)治療師需要注意病患是否有骨質疏鬆的問題 (B)被動拉扯(stretch)時治療師施力愈大愈快效果會愈好
(C)可事先用主動抑制的技巧(active inhibition)來放鬆目標關節
(D)病患可忍受的程度是決定拉扯時間長短的重要參考因素

73 以下那一種狀況對腰椎椎間盤所造成的壓力最大？
(A)直立站立，雙手不提重物 (B)坐在無靠背的椅子，上半身維持直立
(C)站立時上半身前傾，髖關節彎曲 (D)坐姿下，上半身前傾，使髖關節彎曲角度增加

74 某病患一星期前接受人工髖關節置換術，目前出院在家，居家職能治療師應針對病患的日常生活技巧給予以下那一個建議？
(A)坐下之前先將患側下肢往前跨一步，並使用較高的椅子 (B)撿拾地上的物品時要屈膝且腰部維持直立
(C)臥床時，側臥於健側，使患側下肢自然下垂，置於床面 (D)穿襪時將患側下肢置於健側大腿上

75 狹心症(angina pectoris)和心肌梗塞(myocardial infarction)二者的差別在於：
(A)前者痛點在胸骨下，後者痛點在左胸
(B)前者疼痛區域較固定，後者疼痛區域會擴散(radiation)
(C)前者疼痛的程度較輕微，後者疼痛的程度較嚴重
(D)前者的症狀可藉由休息緩解，後者則無法藉由休息來緩解其疼痛

76 手傷病患，經治療師施以帝內爾測驗(Tinel's test)發現爲正向反應(positive)，這表示：
(A)神經的再生持續進行中 (B)肌腱的修復是成功的
(C)骨骼的癒合已經完全 (D)關節的發炎已經改善

77 以下特徵，何者不屬於手部神經損傷的症狀？
(A)將手浸泡水中 5 分鐘仍不見皮膚縐摺 (B)失去主動運動功能
(C)失去被動運動功能 (D)肌肉力量降低

78 24 小時內接受橈神經在前臂遠端處縫合手術的病患被醫師轉介到職能治療，接受副木的量製，此時治療師應該給予的副木以下何者較爲恰當？
(A)腕副木並將腕關節置於伸張 30 度的位置 (B)對掌副木(short opponents splint)
(C)拇指槽狀副木(thumb spica splint) (D)掌指關節伸張輔助副木(MP extension assisted splint)

79 某病患三個星期前因割腕自殺造成屈指深淺肌的斷裂，被親友發現立即送醫，做血管、肌腱的縫合，目前病患的主要問題有：手部水腫，手部主動與被動活動度受限，現階段治療師應給予病患的復健活動，以下何者不適當？ (A)以患手從事輕度的插釘板(peg board)活動 (B)教導病患傷處深度按摩(deep massage)
(C)教導病患做同時完全的手腕、掌指關節與指間關節伸張活動，以達拉扯(stretch)的效果
(D)以消腫繃帶來消腫

80 治療前訓練多發性硬化症(multiple sclerosis)的個案時，以下何者正確？
(A)維持個案體溫恆定 (B)使用最大阻力運動
(C)重複肌力訓練運動直到疲勞爲止 (D)減少休息時間增加運動訓練時間