

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)本試題禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)本科目試題共計80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡1~80題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 1 胸髓第十二節損傷者 (complete T12 SCI) 之行走能力的復健目標為何？
(A)以站立作為一種運動 (exercise) (B)社區行走 (community ambulator)
(C)室內行走 (household ambulator) (D)無法行走 (nonambulator)
- 2 若有一病人抱怨手拿之物常掉，且手會麻痛，尤其是睡覺時常因此痛醒，以下何者為不正確的治療方法？
(A)手腕擺位於伸展 70 度 (wrist extension 70 degrees) (B)避免重複做手腕屈曲、伸展動作
(C)睡覺時應戴上副木 (D)避免暴露於寒冷的環境中
- 3 風濕性關節炎病人的手指伸肌 (finger extensors) 肌腱最常斷裂在那個部位？
(A)尺骨遠端 (distal end of the ulna) (B)橈骨遠端 (distal end of the radius)
(C)李斯特結節 (Lister's tubercle) (D)掌指關節部位 (MP level)
- 4 關於手部屈曲肌腱 (flexor tendon) 受傷病人的處理何者為宜？
(A)給予腹側副木 (volar splint) (B)腕關節擺位於自然伸張姿態 (neutral extension) (C)若使用橡皮筋，強度要超過能使掌指及指間關節屈曲到極限 (full flexion of metacarpophalangeal and interphalangeal joints) 的力量
(D)應 24 小時戴著副木
- 5 傳統動作控制理論中之本體神經肌肉誘發 (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 途徑，下列何者為放鬆 (relaxation) 技巧？
(A)節律性啟動 (rhythmic initiation) (B)節律性穩定 (rhythmic stabilization)
(C)節律性旋轉 (rhythmic rotation) (D)連續性誘發 (successive induction)
- 6 在護理之家工作的治療師為了鼓勵院內老人參與活動，先和老人會談，了解老人的生命史，和老人一起找出從過去到現在覺得較有意義的活動，然後再提供類似的活動讓老人參與。請問這樣的做法是基於下列何種理論？
(A)活動理論 (Activity theory) (B)人生階段理論 (Life span theory)
(C)繼續理論 (Continuity theory) (D)脫離理論 (Disengagement theory)
- 7 下列何者非肩外旋 (shoulder external rotation) 動作之主要控制肌肉 (prime mover)？
(A)脊下肌 (infraspinatus) (B)肩胛下肌 (subscapularis)
(C)小圓肌 (teres minor) (D)後三頭肌 (posterior deltoid)
- 8 下列何者為認知能力之表現？
(A)辨識能力 (gnosis) (B)定向力 (orientation) (C)空間關係 (spatial relations) (D)動作計劃能力 (praxis)
- 9 高頸髓損傷患者使用之輪椅功用，下列何者之必要性最低？
(A)扶手可拆卸 (B)腳踏板可抬高 (C)椅背可後仰 (D)可放置桌板
- 10 下列有關中樞神經對視覺刺激處理歷程的敘述，何者不正確？
(A)視覺刺激由枕葉傳至頂葉之通路主司視覺定向 (localization)
(B)視覺刺激由枕葉傳至顳葉之通路主司視覺辨識 (discrimination)
(C)反射性快速眼動 (saccades) 完全由枕葉調節控制
(D)「背流」 (dorsal stream) 與「腹流」 (ventral stream) 兩道視覺刺激處理路徑均連接至額葉系統
- 11 依美國職能治療學會刊行的第三版「職能治療標準辭彙」，「側化」 (laterality) 與「雙側整合」 (bilateral integration) 屬於何類職能表現要素？
(A)感覺動作 (B)認知 (C)心理社會 (D)生理發展
- 12 格拉斯哥昏迷量表 (Glasgow Coma Scale) 不涉及下列何者之測試？
(A)睜眼反應 (B)對手指指甲施以痛壓的動作反應 (C)對足底施以針刺的反射反應 (D)口語反應
- 13 下列何處腦傷較可能併生眼球運動困難、呼吸困難及平衡失調？
(A)顳葉 (B)腦幹 (C)基底核 (D)額葉
- 14 下列有關知覺評估的敘述，何者有違機動性評估 (dynamic assessment) 的主張？
(A)測試過程中，個案使用的策略也是觀察的參數 (B)評估時個案親屬在場與否也構成特定的表現情境
(C)評估步驟與指示語可依測試目的而彈性調整 (D)個案表現的解析必須依循測驗手冊的常模對照
- 15 下列何者不是腦傷後感覺再教育 (sensory reeducation) 的原則？
(A)所提供的觸覺刺激物由二度空間的小物件漸進至三度空間的大物件 (B)所提供的活動分別在有及無視覺回饋下進行 (C)所提供的刺激物件由少到多漸增 (D)應考慮個案的專注能力
- 16 一位偏癱的腦中風個案所執行的刪除測驗 (cancellation test) 結果呈現測驗紙上雙側均有過量遺漏目標物的跡象。該個案最可能的問題是下列何者？
(A)單側偏盲 (hemianopsia) (B)空間關係缺失 (C)注意力缺失 (D)建構能力失調 (construction disorder)
- 17 布朗斯壯動作恢復級數 (Brunstrom Level of Recovery of Voluntary Movement) 屬下列何種度量尺度 (scale)？
(A)類別 (nominal) (B)級距 (ordinal) (C)等距 (interval) (D)等比 (ratio)
- 18 下列有關「治療性關係」 (therapeutic rapport) 的敘述，何者不正確？
(A)治療性關係的建立主賴個案對治療師的移情 (transference)
(B)正向性治療關係能降低個案對失能的焦慮 (disabling anxiety)
(C)正向性治療關係有助於導引個案解決遭遇到的問題
(D)治療性關係的品質與治療師及個案間的非口語行為 (nonverbal behavior) 互動有關

- 19 以下用來增強前臂骨折 (forearm fracture) 病人手腕穩定度的活動中，那一項的效果較不明顯？
 (A)治療性粘土運動 (therapeutic putty exercise) (B)刻痕較深的皮雕活動
 (C)以螺絲起子組合傢俱 (D)食指指畫 (finger painting)
- 20 何時為穿上永久性義肢的最佳黃金時期，以達到最好的復健效果？
 (A)截肢後六個月 (B)截肢後六十天 (C)截肢後三十天 (D)截肢後一年
- 21 一般將癱瘓症分成前中後三期，下列何者屬於前期現象？
 (A)短期記憶困難 (B)長期記憶困難 (C)吃飯、穿衣、個人清潔衛生等有困難 (D)缺乏情感反應冷淡
- 22 手部感覺四個層次：①區辨(discrimination)，②辨識(recognition)，③偵測(detection)，④量化(quantification)，從基礎到高層的順序為？
 (A)③①④② (B)①④③② (C)③②①④ (D)①②③④
- 23 下列那種患者較需避免高溫濕熱的環境？
 (A)多發性硬化症 (Multiple Sclerosis) (B)風濕性關節炎 (Rheumatoid Arthritis)
 (C)肌肉萎縮症 (Muscular Dystrophy) (D)肌肉萎縮側索硬化症 (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
- 24 若腦傷病患能意識到週遭正在發生之問題，此能力為何種覺知型態？
 (A)智力覺知 (intellectual awareness) (B)及時覺知 (emergent awareness)
 (C)預期覺知 (anticipatory awareness) (D)覺知缺乏 (no awareness)
- 25 依美國職能治療學會刊行的第三版「職能治療標準辭彙」，下列何者歸屬於職能表現情境 (performance context)？
 ①發展面向 (developmental aspect)；②生命週期 (life cycle)；③失能狀態 (disability status)；④物理環境 (physical environment)；⑤社會文化環境 (social and cultural environments)
 (A)④⑤ (B)③④⑤ (C)①②④⑤ (D)①②③④⑤
- 26 測量關節活動時，當病患之主動關節活動度 (AROM) 小於被動關節活動度 (PROM) 時，最可能是下列何種問題？
 (A)關節沾黏 (B)骨折 (C)肌腱發炎 (D)肌力不足
- 27 心臟復健「SABRES」原則中，「A」是指？
 (A) Awake，清醒 (B) Arousal，警覺度 (C) Alternative，替代 (D) Arise，提高
- 28 心臟病患於活動後，心跳若持續大於多少數值，則表示活動超過心臟負荷？
 (A)每分鐘 100 下 (B)每分鐘 120 下 (C)每分鐘 140 下 (D)每分鐘 160 下
- 29 以下何種輔具最可能不是全髖關節置換 (total hip arthroplasty) 的病人需要的？
 (A)拾取器 (reacher) (B)馬桶加高器 (raised toilet seat)
 (C)洗澡手套 (bath mitt) (D)穿衣輔助棒 (dressing stick)
- 30 下列何者最不需要使用電動輪椅？
 (A)年老無力者 (B)肌肉萎縮者 (C)中風病患併有心臟疾病者 (D)馬尾束受損者 (cauda equina injury)
- 31 下列有關右利者 (right handers) 左右大腦半球功能專擅 (hemispheric specialization) 之描述，何者有誤？
 (A)左大腦主司語言；右大腦主司視覺空間能力
 (B)左大腦專擅語言記憶；右大腦專擅圖形記憶
 (C)左大腦以概念相似組織資料；右大腦以結構相似組織資料
 (D)左大腦是合成者 (synthesizer)；右大腦是分析者 (analyzer)
- 32 下列何者不是視覺功能階層中，底層的基本視覺技巧 (visual foundation skill)？
 (A)視力 (visual acuity) (B)視覺注意力 (visual attention)
 (C)視野 (visual field) (D)眼球動作功能 (oculomotor function)
- 33 中風病患無法遵從施測口令，且動作執行及物品使用均有困難，此為何種缺失？
 (A)意想運動障礙失用症 (ideomotor apraxia) (B)建構性失用症 (constructional apraxia)
 (C)臉頰顏面失用症 (buccofacial apraxia) (D)意念性動作失用症 (ideational apraxia)
- 34 某截肢個案之患肢給予觸覺刺激時，甚感疼痛。治療師應優先提供何種治療？
 (A)被動性關節活動度運動 (B)感覺再教育 (C)教導代償原則 (D)減敏感治療
- 35 下列那個治療活動最符合現代活動導向處理方法 (contemporary task-oriented approach) 的精神？
 (A)在站立桌 (standing table) 推木箱 (B)在治療床上練習四肢承重的動作
 (C)在廚房練習打蛋 (D)用前三手指拿積木並翻轉
- 36 在生物力學中，描述動作的軌跡、速率、加速度及位移方向等特性之學門為？
 (A)運動學 (kinematics) (B)動力學 (kinetics) (C)靜力學 (statics) (D)動態學 (dynamics)
- 37 職能治療師建議個案居家環境之改造，以增進生活獨立功能，此種處理途徑主依何種治療參考架構？
 (A)生物力學 (B)神經發展 (C)復健 (D)人類職能
- 38 職能治療師加強個案工作承受度 (work tolerance)、工作速率、工作習慣及態度，使個案具備符合工作環境要求的漸近性治療方案稱為？
 (A)職前評量 (prevocational evaluation) (B)工作制約 (work conditioning)
 (C)職業訓練 (vocational training) (D)工作強化 (work hardening)
- 39 依路德 (Rood) 動作控制理論，下列何者不屬於動作誘發 (facilitation) 技巧？
 (A)持續性拉張 (maintained stretch) (B)快速撫觸 (quick stroking)
 (C)震動 (vibration) (D)肌腱敲打 (tendon tapping)
- 40 下列有關應用玻巴斯 (Bobath) 理論於中風病患之治療原則，何者有誤？
 (A)治療應避免使用增加異常張力之活動與動作 (B)正常動作形態之建立應全然依循動作發展次序
 (C)強調肢體兩側之對稱性使用 (D)治療應涵蓋動作品質及功能表現之增進
- 41 對中風病患進行治療時，下列何者不屬於動作再學習理論所強調的？
 (A)活動分析 (B)喪失的動作成分 (missing components) 之練習
 (C)抑制反射活動及原始動作型態 (D)練習之轉移
- 42 外傷性脊髓損傷者，若出現上肢的運動功能損傷比下肢嚴重時，為下列何種症候群的特徵？
 (A)中索症候群 (central cord syndrome) (B)前索症候群 (anterior cord syndrome)
 (C)後索症候群 (posterior cord syndrome) (D)布朗斯圭症候群 (Brown-Séquard syndrome)

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 43 菲梭氏測驗 (Phalen's test) 可用來診斷下列何者？
(A) 橈側隧道症候群 (radial tunnel syndrome) (B) 腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome)
(C) 蓋樣隧道症候群 (Guyon's tunnel syndrome) (D) 前臂隧道症候群 (cubital tunnel syndrome)
- 44 下列有關各家傳統控制理論之描述，何者不正確？
(A) 路德 (Rood) 主張選擇適當的感覺輸入，以誘發適當的動作反應
(B) 布氏 (Brunnstrom) 強調利用有目的的活動來誘發動作產生
(C) 玻巴斯 (Bobath) 強調抑制不正常張力，以建立正常動作型態
(D) 本體神經肌肉誘發 (PNF) 強調人類均有未開發之動作潛能
- 45 弗若門氏徵兆 (Froment's sign) 是：
(A) 正中神經 (median nerve) 受損引起 (B) 橈神經 (radial nerve) 受損引起
(C) 掌內肌 (intrinsic muscles) 無法作用 (D) 伸拇長肌 (extension pollicis longus) 無法作用
- 46 關於爪狀手 (claw hand) 以下何者為是？
(A) 為橈神經 (radial nerve) 受損引起
(B) 第四、第五指的掌指關節呈現過度伸張 (hyperextension of MP joints of the ring and small fingers)
(C) 魚際肌 (thenar muscles) 萎縮無力
(D) 腕關節呈現過度伸張 (wrist hyperextension)
- 47 以下動作何者最易引發媽媽手 (de Quervain's disease)？
(A) 手腕重複屈曲、伸展 (B) 手肘及手腕快速全部伸展 (total extension)
(C) 手腕來回做尺側、橈側偏移 (ulnar-radial deviation) (D) 手臂抬高過頭
- 48 下列何種截肢除了會喪失手部及腕部功能外，亦會喪失大約百分之五十的旋前旋後功能？
(A) 部分手缺失 (partial hand) (B) 腕關節以下缺失 (wrist dislocation)
(C) 長肘關節以下缺失 (long below elbow) (D) 短肘關節以下缺失 (short below elbow)
- 49 在布朗斯壯 (Brunnstrom) 動作治療理念中，上肢之屈肌協同 (flexor synergy) 成分，不包括下列何者？
(A) 肩胛縮回與上抬 (scapular retraction and/or elevation)
(B) 肩膀外展及外旋 (shoulder abduction and external rotation)
(C) 肘彎曲 (elbow flexion)
(D) 前臂旋前 (forearm pronation)
- 50 下列那一種物理因子之治療媒介 (physical agent modalities) 較無降低痙攣 (spasticity) 之功效？
(A) 超音波 (B) 電刺激 (C) 冷療 (D) 肌電生理回饋
- 51 下列那一評估工具主要是用來評估從事日常功能性活動的能力？
(A) 普渡插板測驗 (Purdue Pegboard) (B) 傑布森手功能測驗 (Jebsen Test of Hand Function)
(C) 明尼蘇達操作速率測驗 (MRMT) (D) 盒與木塊測驗 (Box and Block Test)
- 52 有關加拿大職能表現測量 (Canadian Occupational Performance Measure)，下列敘述何者錯誤？
(A) 以個案為導向 (client-centered) 的評估工具 (B) 利用半結構性 (semi-structure) 的面談來完成
(C) 幫助治療師擬定治療目標的先後順序 (D) 以了解病人的表現長處為主要目的
- 53 下列那一評估工具可依受測者的能力和興趣來選擇測試的活動？
(A) 動作及程序技巧評估 (Assessment of Motor and Process Skills)
(B) 加拿大職能表現測量 (Canadian Occupational Performance Measure)
(C) 巴氏量表 (Barthel Index)
(D) 寇門生活技巧評估 (Kohlman Evaluation of Living Skills)
- 54 一套評量工具中各項目對同一現象之測量結果是否一致，可視為何種心理計量特質？
(A) 內部一致性 (internal consistency) (B) 施測者內信度 (intrarater reliability)
(C) 施測者間信度 (interrater reliability) (D) 效度 (validity)
- 55 瑞裘認知功能量表 (Rancho Level of Cognitive Functioning Scale) 是職能治療師用來評估腦傷個案意識或認知功能之一種評估工具。若個案出現嚴重混淆並有攻擊性行為，此個案可能處於瑞裘認知功能量表之第幾級？(A) III (B) IV (C) V (D) VI
- 56 在評估生理殘障個案之工作能力，職能治療師所使用之莫帕 (VALPAR system)，是屬於那一類之工作評估工具？
(A) 工作現場評估 (work site evaluation) (B) 工作樣本 (work sample)
(C) 情況評估 (situational assessment) (D) 心理計量評估工具 (psychometric instrument)
- 57 一個患有巴金森氏症 (Parkinson's disease) 的家庭主婦把一些較費力的家事安排在一天中的什麼時候做最適合？
(A) 吃完富含蛋白質的早餐後 (B) 多巴胺的藥效發揮時 (C) 午後兩三點時 (D) 傍晚五六點時
- 58 關於慢性阻塞性肺疾 (chronic obstructive pulmonary disease) 之處置，何者為非？
(A) 教導病人壓力處理技巧，以避免焦慮引起耐力及力量下降
(B) 教導病人能量節省 (energy conservation) 的原則，以避免肌肉失用萎縮 (disuse atrophy)
(C) 教導病人工作分析 (task analysis) 的方法，以便簡化工作
(D) 教導病人依活動的需求調和呼吸，以提高肌力。
- 59 關於燒燙傷病人急性期的處理，何者為非？
(A) 需減緩水腫的產生，且將未受傷的部位擺位於抗畸形姿勢 (anti-deformity position)
(B) 副木使用的目標之一為預防壓力產生
(C) 植皮手術後固定 (immobilize) 部位應只限於受傷區域，不必限制鄰近關節
(D) 最好使用彈繮固定副木

- 60 以下關於心臟病患對活動反應的描述，何者不正確？
 (A) 上肢的活動比下肢活動易引發心血管症狀
 (B) 肌肉等長收縮 (isometric contraction) 活動會影響血流，增加心臟負擔
 (C) 溫度較高的環境中，心臟需將血液導向末梢，因而減慢心跳
 (D) 餐後的任何活動都會引發心跳加速，增加心肌需氧量
- 61 類風濕關節炎病人在日常生活中，應避免採用何種姿勢？
 (A) 以手掌壓瓶蓋 (B) 燙衣服時手肘盡量伸直 (C) 以雙手捧杯子 (D) 以手背托腰而非手指
- 62 下列四種疾病當中，那兩種疾病具有緩解與復發 (remissions and exacerbations) 的特性？①風濕性關節炎 ②多發性硬化症 (Multiple Sclerosis) ③肌肉萎縮側索硬化症 (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ④肌肉萎縮症 (Muscular Dystrophy)
 (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
- 63 下列何種症狀較不會出現在單側小腦損傷之患者？
 (A) 肌肉痙攣 (spasticity) (B) 動幅障礙 (dysmetria)
 (C) 意念性震顫 (intention tremor) (D) 輪替動幅障礙 (dysdiadochokinesia)
- 64 下列有關中風後健側承重不能症候群 (pusher syndrome) 之敘述，何者不正確？
 (A) 常發生於右腦損傷者 (B) 肢體健側常出現伸展動作
 (C) 常伴隨感覺及知覺之障礙 (D) 主要導因為患側嚴重的動作功能障礙
- 65 關於下背痛 (low back pain) 病人的處理原則，何者為非？
 (A) 建議病人坐高腳椅 (B) 工作檯面宜高於肩部
 (C) 單腳彎膝跪下，以抱起地上重物 (D) 身體面向正在從事之活動 (tasks)
- 66 類風濕性關節炎病患較少出現何種畸形病變？
 (A) 天鵝頸畸形 (swan-neck deformity) (B) 橈側偏移 (radial deviation)
 (C) 手腕脫位 (wrist subluxation) (D) 扳機指 (trigger finger)
- 67 中風病患之手部動作呈現粗略抓握 (mass grasp) 及鉤式抓握 (hook grasp)，但無主動伸展及釋放動作，此為布朗斯壯 (Brunnstrom) 手部恢復之何階段？
 (A) II (B) III (C) IV (D) V
- 68 對於腦傷引起之記憶缺失，下列何者屬外在性代償記憶輔助 (external compensatory memory aids)？
 (A) 日誌、記事本 (diaries, notebooks) (B) 內心排練 (rehearsal)
 (C) 視覺影像 (visual imagery) (D) 語意推敲 (semantic elaboration)
- 69 在活動分析與合成中，下列何者屬潛藏式活動特性 (underlying task characteristics)？
 (A) 刺激型態 (type of stimuli) (B) 刺激安排 (stimuli arrangement)
 (C) 動作需求 (movement requirements) (D) 情境及非情境策略 (situational/nonsituational strategies)
- 70 關節鬆動 (joint mobilization) 禁止用於何種情況？
 (A) 關節囊緊縮 (joint capsule tightness) (B) 韌帶沾黏 (ligamentous adherence)
 (C) 關節發炎 (joint inflammation) (D) 肌肉戒護性收縮 (muscle guarding)
- 71 下列那個活動最適合急性期的風濕性關節炎病人？
 (A) 主動關節運動 (active ROM) (B) 溫和的伸展運動 (gentle stretch)
 (C) 等長收縮運動 (isometric exercise) (D) 抗阻力收縮運動 (resistive exercise)
- 72 下列何者非被動拉張 (passive stretching) 之合宜方法？
 (A) 固定式裝具器具 (orthotic devices) (B) 關節動作技術 (joint mobilization technique)
 (C) 徒手拉張 (manual stretching) (D) 動態式副木 (dynamic splint)
- 73 下列有關現代發展理論 (contemporary developmental theories) 的敘述，何者正確？
 (A) 隨著大腦成熟，動作、知覺、認知功能依固定時程——各自發展
 (B) 小孩發展未必依循固定的發展里程碑
 (C) 在近端肢體的穩定度足夠後才能發展遠端肢體的動作
 (D) 皮亞傑的認知理論符合當代發展理論的精神
- 74 有關「年齡有關的記憶缺損」(age-associated memory impairment) 的敘述，下列何者有誤？
 (A) 常為老人癡呆症的前兆
 (B) 好發於五十歲左右
 (C) 症狀包括容易忘記名字或是找不到東西
 (D) 把事物作有組織的整理可以減少此記憶缺損造成的困擾
- 75 以下何種姿勢對腰椎椎間盤 (lumbar disc) 壓力最大？
 (A) 挺直站立 (B) 坐在無椅背的椅子上 (C) 坐在椅子上前傾觸摸地板 (D) 站立並向前彎腰握手
- 76 根據吉柏森 (E. Gibson) 的主張，知覺 (perception) 形成主要是受到下列何者的引導？
 (A) 對個人有意義的目標 (B) 感覺刺激 (C) 神經構造 (D) 生理需求
- 77 和聽力減損的老人到餐廳用餐，下列何種作法最適宜？
 (A) 避免和他說話而讓他困窘 (B) 用高頻率的聲音和他說話
 (C) 選在餐廳客人較少時去用餐 (D) 用大聲吼叫的方式和他說話
- 78 有關殘肢的準備 (pre-prosthetic training of stump)，下列何者為非？
 (A) 需保持殘肢的清涼及乾燥 (B) 繃帶的包裝應從幻痛出現時開始
 (C) 過度敏感導因於神經瘤 (neuroma) 的產生 (D) 當殘肢塑型完成時，可不需再使用繃帶
- 79 下列何者不是治療右腦傷後單側忽略之合宜策略？
 (A) 右大腦賦活 (right hemispheric activation) (B) 空間動作導引 (spatiomotor cuing)
 (C) 口語提醒個案凝視右側視域之閃光刺激 (D) 視覺掃描訓練 (visual scanning training)
- 80 在認知復健中，矯正 (remedial) 及適應性 (adaptive) 途徑之差異為？
 (A) 前者強調受損技巧之重建，後者則強調代償性活動的運用
 (B) 前者使用日常性活動，後者則使用知覺動作
 (C) 多重情境治療途徑 (multicontext treatment approach) 強調適應性途徑的運用應優先於矯正性療法
 (D) 矯正性途徑較不需要類化 (generalization) 過程