

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 1 癌症一般可分為四期，每一期皆根據腫瘤侵犯範圍、淋巴結數目、轉移等三項因子考量，請問下列敘述何者正確？
 - (A)第一期患者平均存活五年的機率為 20 % ~ 50 %
 - (B)第二期患者的腫瘤侷限在所侵犯的器官內，不需開刀，預後良好
 - (C)第三期患者被侵犯的淋巴結擴展至全身及許多器官
 - (D)第四期患者腫瘤擴散到原發性腫瘤器官外的許多器官
- 2 一位有心肺功能障礙的患者，經評估其可執行 2.5 METs 的活動，請問不建議從事下列何項活動？
 - (A)熱水淋浴
 - (B)穿脫衣服
 - (C)自己從床移到椅子上坐
 - (D)梳頭髮
- 3 對於阿茲海默症 (Alzheimer's disease) 患者所提供的治療介入，下列何者不適當？
 - (A)將複雜的活動分級化與簡化
 - (B)使用輔具，如日曆、記事本
 - (C)教育照顧者在日常生活中，給患者最多的協助
 - (D)維持與外界的社交活動
- 4 關於下背痛 (low back pain) 患者的職能治療介入，以下何者不適當？
 - (A)教導工作簡化 (work simplification) 及節省能量 (energy conservation) 的原則
 - (B)將常用的物品儘量置於腰部到胸部間的高度
 - (C)使用適當的輔具來協助處理家務
 - (D)教育患者避免採用蹲姿或跪姿拿腳邊的重物
- 5 關於膝關節置換術 (total knee replacement) 患者的注意事項，下列敘述何者正確？
 - (A)從床移位到椅子時，不要彎曲髖關節，採用膝關節屈曲姿勢較適宜
 - (B)建議仰臥睡姿
 - (C)膝關節建議多做內轉 (internal rotation) 及外轉 (external rotation)，以維持關節活動度
 - (D)睡覺時，患側腳不可抬高
- 6 一個手部外傷的病患，若要預防手部功能的喪失，在需要制動時，一般會以副木將手部制動於一個安全的姿勢，所謂「安全的姿勢」指的是以下那一個姿勢？
 - (A)腕關節屈曲，掌指關節伸直，指間關節伸直
 - (B)腕關節背曲，掌指關節伸直，指間關節儘量伸直
 - (C)腕關節背曲，掌指關節屈曲，指間關節伸直
 - (D)腕關節屈曲，掌指關節屈曲，指間關節屈曲
- 7 身心障礙者輔助科技介入評估的第一步驟為：
 - (A)評估個案技巧
 - (B)評估個案的需求
 - (C)分析輔具的特性
 - (D)輔具個別化設計評估
- 8 根據史篇瑟 (Spencer) 對實體環境 (physical environments) 的分類，檢測居家環境建築障礙的檢核表，是屬於那一層級的評估？
 - (A)社區層級 (community scale)
 - (B)社會層級 (societal scale)
 - (C)立即層級 (immediate scale)
 - (D)近端層級 (proximal scale)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 9 在認知復健中，矯正 (remedial) 及適應性 (adaptive) 途徑之差異為何？
(A)前者強調受損技巧之重建，後者強調變化情境及代償性活動之運用
(B)前者使用基本日常性活動，後者則使用感覺動作
(C)多重情境治療途徑 (multicontext treatment approach) 強調適應性途徑的應用優先於矯正性療法
(D)適應性途徑較需要類化 (generalization) 過程
- 10 一位右腦傷的腦中風個案畫人物時，遺漏左側邊的眼睛和上肢，該個案最可能的問題是下列何者？
(A)本體覺缺失 (B)主體背景區辨缺失
(C)注意力缺失 (D)建構能力失調 (constructional disorder)
- 11 下列何者不是視覺功能階層中，底層的基本視覺技巧 (visual foundation skill)？
(A)眼球追蹤功能 (visual tracking) (B)視覺注意力 (visual attention)
(C)視野 (visual field) (D)眼球聚焦功能 (convergence)
- 12 下列何者屬於本體神經肌肉誘發 (proprioceptive neuromuscular facilitation) 手法中之放鬆 (relaxation) 技巧？
(A)節律性旋轉 (rhythmic rotation) (B)節律性穩定 (rhythmic stabilization)
(C)節律性啟動 (rhythmic initiation) (D)連續性誘發 (successive induction)
- 13 測量病患關節活動度是肌肉骨骼外傷病患治療中基本的評估方法，有關主動關節活動度與被動關節活動度測量結果的解釋，以下何者敘述正確？
(A)通常主動關節活動度稍大於被動關節活動度
(B)主動關節活動度可以表示病患活動關節的意願，而被動關節活動度則否
(C)主動與被動關節活動度均可代表動作的協調度
(D)當主動活動度小於被動活動度時，表示關節面的契合度不良
- 14 治療師要求注意力缺損患者作簡單的數學活動（如：加、減法練習），在練習時並放新聞報導的電視節目，這個治療活動主要是針對那一種注意力的缺損作訓練？
(A)持續性注意力 (sustained attention) (B)交替性注意力 (alternating attention)
(C)選擇性注意力 (selective attention) (D)分散性注意力 (divided attention)
- 15 高度治療性關係 (high therapeutic rapport) 是指下列何種情形？
(A)治療師與患者在語言與非語言的表現上，皆將注意力放在對方身上
(B)治療師和患者彼此間的評價是負向的
(C)患者失能的焦慮會升高
(D)患者扮演傾聽的角色，由治療師主導兩者關係的發展
- 16 下列那一項較符合中風個案的代償式治療途徑 (compensatory approach)？
(A)訓練靜態性站立平衡能力，增進兩側下肢承重能力
(B)用前三指拿積木翻轉，訓練手部靈巧度
(C)訓練健側肢單手操作日常生活活動
(D)在治療床上練習四肢承重的動作
- 17 根據玻巴斯 (Bobath) 的治療原則，使肌肉張力正常化的技巧不包括下列那一項？
(A)軀幹旋轉 (trunk rotation) (B)利用患側載重 (weight bearing)
(C)以關鍵點控制手法 (key points of control) (D)利用電刺激法 (electrical stimulation)
- 18 癌症病患在接受化療後，可能產生的副作用不包括下列那一項？
(A)貧血 (anemia) (B)血小板數目增加
(C)疲勞 (fatigue) (D)功能受限的焦慮 (function-limiting anxiety)

(請接第三頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 19 下列對建構性失調 (constructional disorders) 的敘述中，何者最為不恰當？
(A)左、右腦傷後皆有可能發生
(B)與日常生活功能表現缺損相關
(C)個案的自發性描繪 (spontaneous drawing) 的表現一定較仿畫 (copied drawing) 的表現差
(D)在積木堆排 (block design) 測驗中常呈構型混亂
- 20 有關傳統動作控制學派的敘述，下列何者為非？
(A)路德 (Rood) 強調合宜的感覺刺激輸入可誘發動作
(B)布朗斯壯 (Brunnstrom) 以及玻巴斯 (Bobath) 均贊同以低階反射誘發動作
(C)本體神經肌肉促進 (PNF) 學派強調透過本體感覺的刺激來促進動作的恢復
(D)路德強調動作模式之誘發應依一定的發展順序
- 21 單側小腦損傷的患者可能會出現那些症狀？①動幅障礙 (dysmetria) ②意念性震顫 (intention tremor) ③輪替動幅障礙 (dysdiadochokinesia) ④肌肉痙攣 (spasticity)
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①③④
- 22 定向力 (orientation) 是屬於何種能力之表現？
(A)知覺 (perception) (B)認知 (cognition) (C)感覺 (sensation) (D)動作 (motoricity)
- 23 對於感覺功能評估原則之描述，何者不正確？
(A)必須減少不必要的干擾，以免個案分心
(B)在測試過程中，室溫也是必須考量的因素
(C)讓受測者放鬆和感覺舒適
(D)在測試時所給予的刺激，其間隔應固定 (regular intervals)
- 24 對於感覺再教育 (sensory reeducation) 的原則，何者為非？
(A)治療師必須監控 (monitor) 病人治療過程的進展
(B)每次練習時間約 10~15 分鐘，兩天一次即可
(C)進行感覺訓練時，環境必須安靜以降低干擾
(D)感覺再教育需持續一段時間，直到病人恢復至停滯階段 (plateau)
- 25 在訓練半側癱瘓的中風患者穿衣活動時，治療師會提供不同種類的衣服 (例如：寬鬆及較緊的毛衣) 且無固定順序給個案做多次練習。試問此法運用何種動作學習理論的原則？
(A)整體練習 (whole practice) (B)意念練習 (mental practice)
(C)隨機練習 (random practice) (D)局部練習 (part practice)
- 26 在公車上從口袋掏零錢時，無視覺輔助下，無法辨別 1 元與 50 元之差別，是何種功能缺損？
(A) allesthesia (B) astereognosis (C) anosognosia (D) paresthesia
- 27 為使患者能安全地從事日常生活活動，下列對於相關用品調整之敘述，何者較不適當？
(A)為輪椅代步的患者準備長柄夾，拿取置於地面的物品
(B)為方便患者單手開罐，可使用固定器先將罐子固定
(C)為中風患者準備較寬鬆、鈕釦較大的衣服
(D)對以輪椅代步的患者而言，洗衣機最好使用上開口 (up-loading) 而非前開口 (front-loading)
- 28 有關席倫 (Thelen) 所提出之動態系統理論 (dynamic systems theory) 之主張，何者正確？
(A)有機體 (organism) 有自我組織 (self-organization) 的能力來完成外在任務或環境的要求
(B)中樞神經系統是唯一控制行為的因子
(C)是階層式 (hierarchical) 的控制系統
(D)有機體會不受情境因子影響而調整動作行為模式

(請接第四頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 29 職能治療師在神經性退化疾病 (neurodegenerative disease) 的治療上，可扮演的角色不包括下列何項？
(A)在安全考量下，協助病患增強日常生活功能的獨立性
(B)預防或緩和更進一步的惡化，並增進生活品質
(C)替病患治癒疾病
(D)作環境改造，調整工作行為模式等，以增進病患繼續工作的機會
- 30 對腦外傷患者實施監督評量表 (Supervision Rating Scale) 評估，其目的為：
(A)病人需接受照顧者照護與監督的程度 (B)病人實行基本日常生活的能力
(C)生產力及與社會再接再軌的能力 (D)認知與情緒障礙的程度
- 31 慢性阻塞性肺疾 (chronic obstructive pulmonary disease) 可能產生的症狀或問題不包括下列何項？
(A)呼吸困難與咳嗽 (B)運動或活動量 (physical activity) 減少
(C)疲倦 (D)食慾過佳及營養過剩
- 32 一位腦外傷個案：在痛刺激下有睜眼反應；動作方面無法服從口令且出現不正常屈曲 (abnormal flexion)；問話時有答非所問的混淆情形 (confused conversation)。若依照 Glasgow Coma Scale，該個案的昏迷指數為何？
(A)E₂M₃V₄ (B)E₃M₄V₃ (C)E₁M₂V₃ (D)E₂M₂V₂
- 33 愛滋病 (AIDS) 感染途徑包括下列那幾項？①輸血 (即接受已感染愛滋病之血液) ②胎兒由已感染愛滋之母體所傳染 ③空氣污染 ④傷口接觸到已感染愛滋病之血液
(A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)②③④
- 34 單側忽略症 (unilateral neglect) 與半側偏盲 (hemianopsia) 之差別在於：
(A)前者為注意力缺損，後者為視野缺損 (B)前者為脊椎神經損傷，後者為臂神經叢損傷
(C)前者為視野缺損，後者為空間概念缺損 (D)前者為視神經損傷，後者為聽神經損傷
- 35 病患甲在一次家中意外中造成手部背面三度灼傷，該病患被送到醫院後，在急性期，職能治療師所定的治療項目，以下列何者最適當？
(A)如果傷處接受植皮，應於術後馬上給予其傷口處做按摩，以降低形成過度肥大的疤痕
(B)如果沒有接受其他外科手術，應該教導病患保持傷口乾燥，以降低發炎的情形
(C)鼓勵病患於功能性活動中使用其患處，以協助降低傷後的水腫
(D)如果傷處接受植皮，術後應馬上以副木將患部擺在抗變形的位
- 36 在沒有杯子的情形下，中風患者執行假裝 (pantomime) 去拿杯子的活動時，動作錯誤最明顯，當治療師執行該動作後，中風病人模仿 (imitation) 此動作時，所表現的錯誤較少，給予杯子時，執行該活動時的表現最好，此為何種缺失？
(A)意想運動失用症 (ideomotor apraxia) (B)建構性失用症 (constructional apraxia)
(C)臉頰顏面失用症 (buccofacial apraxia) (D)意念性動作失用症 (ideational apraxia)
- 37 關於對中風患者實行侷限誘發動作治療 (constraint-induced movement therapy) 的敘述，何者有誤？
(A)又稱強迫使用動作治療 (forced use movement therapy)
(B)可矯正「已學習不使用肢體」(learned nonuse) 的問題
(C)患側邊已有些微自主性動作比完全癱瘓的病人適合此治療方式
(D)治療法為限制患側邊不能執行活動，以強迫健側邊之使用
- 38 下列有關動作發展理論 (motor developmental theories) 的敘述，何者有誤？
(A)根據系統 (systems) 學派，動作改變是由多重系統互動的結果
(B)根據系統學派，環境因素不影響動作發展及表現
(C)根據神經發展 (neuromaturational) 學派，在近端肢體的穩定度足夠後，才能發展遠端肢體的動作
(D)根據神經發展學派，中樞神經受損導致動作退化為較低層級及刻板型態 (stereotyped) 的動作
- 39 就類風濕性關節炎的病患而言，治療師所提供的手部副木可以提供那些功能？①提供關節支持並降低疼痛 ②增加關節活動度並預防變形力量的發生 ③降低關節發炎的現象 ④導正關節活動時的力量，避免變形力量的發生
(A)僅①②③ (B)僅②③④ (C)僅①③④ (D)①②③④

(請接第五頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 40 以下有關各種不同程度燒燙傷的表徵，何者正確？
(A)就傷口疼痛程度而言，3 度灼傷大於深 2 度灼傷
(B)就日後形成疤痕的程度而言，深 2 度大於淺 2 度
(C)就起水泡的程度而言，深 2 度大於淺 2 度
(D)就出血的情形而言，3 度大於深 2 度
- 41 以下那一種活動方式，是下背疼痛病患不適合從事的？
(A)以前後相反的方向使用坐式馬桶 (B)曲膝拿起置於地上的重物
(C)舖床時跪在地上 (D)以俯臥的方式睡覺
- 42 以下是職能治療師預防燙傷病患疤痕過度增生的處置方法，請選出最適當者？
(A)壓力衣的壓力只要病患可以忍受，應該愈大愈好
(B)為充分達到預防的效果，即使仍有傷口仍應積極進行按摩運動
(C)壓力衣或其他提供壓力的輔助，只要病患可以忍受，應該一天 24 小時的穿戴
(D)為了達到充分預防的效果，壓力應覆蓋包括指尖的部分
- 43 低張力 (hypotonia) 的治療可用激化技巧 (facilitation techniques) 改善之，下列何種不屬於激化技巧？
(A)快速伸展 (quick stretch) 技巧 (B)高頻震動 (vibration) 技巧
(C)快刷 (brushing) 技巧 (D)適中溫暖法 (neutral warmth)
- 44 燒燙傷之後傷處持續搔癢 (pruritis)，治療師應給予以下那一項建議？
(A)使用熱敷以減緩症狀 (B)要保持皮膚的乾燥
(C)穿彈性衣或彈性手套 (D)多泡熱水
- 45 臨床癒合 (clinical union) 是治療師決定骨折病患治療方式的重要參考標準。以下何者是骨折臨床癒合的表徵？
(A)骨痂形成 (B)骨折線消失 (C)疼痛消失 (D)活動度增加
- 46 病患骨折後經外固定或傷口縫合後，常有疤痕沾黏的問題，預防或處理疤痕沾黏的方法，不包括以下何者？
(A)儘早自主性活動 (B)以向心的方向按摩 (retrograde massage)
(C)被動拉伸運動 (passive stretch) (D)深層按摩 (deep pressure massage)
- 47 接受肩關節置換術的病患何時可開始被動以及主動輔助關節活動 (PROM & AAROM)？
(A)術後 2~3 天 (B)術後 2~3 週 (C)術後 4~6 週 (D)術後 6~8 週
- 48 肩帶 (shoulder complex) 骨折，常需早期活動，以預防活動功能受限，一般而言，如果肩帶骨折後接受內固定手術，於術後的何時，病患可開始主動肩關節活動？
(A)1~2 天 (B)7~10 天 (C)21~28 天 (D)42~56 天
- 49 前臂末端的骨折常造成腕關節的功能受限，包括腕關節動作肌肉無力，一般而言，腕關節動作肌的肌力訓練，應在內固定器取出後多久開始進行？
(A)2 週後 (B)4 週後 (C)6 週後 (D)8 週後
- 50 腕道症候群 (carpal tunnel syndrome) 主要是以下何者引起的？
(A)尺側神經 (ulnar nerve) 受到壓迫 (B)正中神經 (median nerve) 受到壓迫
(C)肌腱過長 (D)肌腱過短
- 51 以下那一種方式可以偵測 cubital tunnel syndrome 的存在？
(A)將手肘伸直且手指用力屈曲 (B)將手肘伸直且手指用力伸直
(C)將手肘屈曲到 60° 以上馬上伸直手肘 (D)將手肘屈曲到 60° 以上且維持 60 秒
- 52 以下那一個方法不屬於周邊神經壓迫的保守性療法？
(A)神經滑動運動 (nerve gliding exercise) (B)肌腱滑動運動
(C)神經減敏感活動 (desensitization) (D)類固醇注射

(請接第六頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 53 阻斷運動 (block exercise) 的目的是：
(A)促進單一肌腱的滑動 (B)促進神經的滑動
(C)增加感覺的回饋 (D)減低過度敏感的現象
- 54 以下那一個動作是操作 MAS (mobile arm support) 完成「將食物送入口中」這個動作所不需要的？
(A)肩關節外轉 (B)軀幹旋轉使面向 MAS
(C)將重心轉移遠離 MAS (D)在肱骨內收的同時作肩部下壓的動作
- 55 以下那一種骨折型態癒合最快？
(A)橫向骨折 (transverse fracture) (B)斜向骨折 (oblique fracture)
(C)螺旋狀骨折 (spiral fracture) (D)關節內骨折 (intra-articular fracture)
- 56 關節保護 (joint protection) 策略是職能治療師必須教導給關節炎的病患，以減少活動中的疼痛與預防變形的發生，以下何者不是正確的關節保護策略？
(A)如果在休息狀態仍有關節疼痛的現象，則表示病患必須降低活動的參與
(B)必須移動重物時，儘量用推拉的方式來取代攜帶 (carrying) 方式
(C)工作時要避免經常變更姿勢，以免過度活動造成關節承受的壓力增加
(D)從事適當的關節運動來維持關節周圍肌肉力量的平衡，以確保關節活動時不會產生造成關節變形的力量
- 57 如果病患的指間關節被動屈曲活動度受限是屬於內在緊縮 (intrinsic tightness)，應採下列何種治療方式？
(A)在掌指關節 (MP joint) 伸展的姿勢下，幫病患的指間關節往伸展的方向做被動拉伸 (passive stretch) 的運動
(B)在掌指關節伸展的姿勢下，幫病患的指間關節往屈曲的方向做被動拉伸的運動
(C)在掌指關節屈曲的姿勢下，幫病患的指間關節往伸展的方向做被動拉伸的運動
(D)在掌指關節屈曲的姿勢下，幫病患的指間關節往屈曲的方向做被動拉伸的運動
- 58 下列關於關節炎的敘述，何者正確？
(A)類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis) 是系統性自體免疫 (autoimmune) 疾病
(B)類風濕性關節炎，會侵犯大關節，而不會侵犯小關節
(C)退化性關節炎是結締組織發炎現象呈現進行性的緩解及惡化，特別是在滑液囊關節的滑液囊膜 (synovial membrane)
(D)退化性關節炎患者會有早晨關節僵硬 (morning stiffness) 的現象
- 59 以下有關舟狀骨 (scaphoid) 骨折的敘述何者最正確？
(A)只要 x-ray 上看不到骨折線表示它已癒合 (B)可能需要長臂副木 (long arm splint) 的保護
(C)傷後 6 週通常可回復傷處正常活動 (D)它發生無法癒合 (non-union) 的機率很低
- 60 上肢功能較下肢功能差是那一類型脊髓損傷之表徵？
(A)前索症候群 (anterior cord syndrome) (B)後索症候群 (posterior cord syndrome)
(C)中央索症候群 (central cord syndrome) (D)布朗-斯罕症候群 (Brown-Sequard syndrome)
- 61 脊髓損傷患者常因長時間不動 (immobilization) 而容易造成褥瘡，請問以下何者正確？
(A)在床上，至少每間隔四小時執行一次壓力舒緩運動 (release pressure)，且每次需做至少 3~5 分鐘
(B)在輪椅，至少每間隔一小時執行一次壓力舒緩運動 (release pressure)，且每次需做至少 1 分鐘
(C)治療師在教導第四節頸椎損傷患者時，應教導其以手勾住輪椅把手，並將身體倒向一側，以紓解壓力
(D)治療師在教導第五節頸椎損傷患者時，應教導其以手撐起身體，以紓解壓力

(請接第七頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 62 一位 C5 tetraplegia 脊髓損傷患者最不需要使用下列那一種輔具？
(A)電動牙刷 (B)萬用套 (universal cuff)
(C)移動式手臂支持器 (mobile arm supports) (D)頭控滑鼠
- 63 以下何者是適合類風濕性關節炎 (RA) 病患的肌肉力量訓練方式？
(A)最大阻力的運動訓練 (B)以低阻力的家事活動訓練
(C)以不抗阻力的運動訓練 (D)以高度重複性的運動訓練
- 64 治療師提供一位患者丟接球活動 (治療師與患者互相丟接球)，並提供另一位患者投籃的活動以訓練雙手協调度，根據珍泰爾活動分類 (Gentile's taxonomy of task categories)，此兩者活動的屬性為何？
(A)兩者皆為封閉式活動 (closed tasks) (B)前者為封閉式活動，後者為開放式活動 (open task)
(C)兩者皆為開放式活動 (D)前者為開放式活動，後者為封閉式活動
- 65 對於頸椎第七節損傷患者，下列所設定的復健目標那一項最不可能達到？
(A)能夠獨立使用輔具進食
(B)上肢能獨立進行穿脫衣物，下肢則須在協助之下進行
(C)能夠獨立進行簡單的食物準備工作
(D)能自行推動輪椅並橫越馬路
- 66 當治療多發性硬化症 (multiple sclerosis) 病患時，下列敘述何者不正確？
(A)在同一時段內重複訓練肌肉力量，直至非常疲累為止
(B)可提供適合的有氧運動
(C)教導病患節省能量 (energy conservation) 技巧
(D)若有痙攣現象，可提供適當的伸展 (stretch) 運動
- 67 關於吉蘭－巴瑞症候群 (Guillain-Barré syndrome) 的特徵，下列敘述何者正確？
(A)是因中樞神經系統神經纖維外之髓鞘遭到破壞，而產生的病變
(B)較常發生於年輕人約 20~24 歲，和老年人約 70~74 歲身上
(C)會造成單側下肢麻痺
(D)會引發低血壓及震顫 (tremor)
- 68 有關阿茲海默症 (Alzheimer's disease)，下列敘述何者正確？
(A)在病症初期或第一階段，就會影響感覺和動作功能
(B)病患在第二階段時 (輕至中度退化)，完全喪失兒時的記憶
(C)第二階段，應儘量避免學習新的活動或任務
(D)第二階段 (中度退化) 應給予被動關節活動度 (PROM) 的治療方案
- 69 下列有關帕金森氏症 (Parkinson's disease) 的敘述，何者最不適當？
(A)病程具有緩慢的緩解與復發 (remission and exacerbation) 特性
(B)可能因基底神經節之黑質部位無法適當地產生多巴胺而造成
(C)會有休息式震顫 (resting tremor)
(D)在進行日常活動時，可能有起動困難 (akinesia) 及動作過程緩慢 (bradykinesia)
- 70 以下有關 de Quervain's diseases 的敘述何者最適當？
(A)治療師可給一個副木限制大拇指所有關節的活動
(B)它會造成板機指的現象
(C)它會影響到腕關節的橈側偏移
(D)若以手術處理，術後一般不需制動 (immobilization)，只需短期減少活動

(請接第八頁)

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學

- 71 根據美國 American College of Rheumatology 對類風濕性關節炎 (RA) 病患的功能性能力的分級，那一種能力的病患適合參與肌肉力量的訓練？
(A)第一～第二級 (B)第二～第三級 (C)第三～第四級 (D)第一～第四級
- 72 包紮截肢後的殘肢，其目的為何？①降低知覺過度敏感的現象 ②使殘肢達到最好的收縮狀態
③增加殘肢活動度 ④增加殘肢的肌力
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 73 川步麗 (Trombly) 所提出的職能功能模式 (occupational functioning model) 將生活角色滿意 (satisfaction with life role) 層級分為三部分，下列何者不屬於這三部分？
(A)自我維持角色 (self-maintenance roles) (B)自我前進角色 (self-advancement roles)
(C)自我控制角色 (self-control roles) (D)自我提升角色 (self-enhancement roles)
- 74 鈕釦指變形 (boutonniere deformity) 的處置方式，如果需要副木擺位，應擺在以下那一個姿勢？
(A)將指間關節伸展
(B)將指間關節固定在屈曲姿勢
(C)將近端指間關節固定在屈曲，遠端指間關節固定在伸展的姿勢
(D)將近端指間關節固定在伸展，遠端指間關節固定在屈曲的姿勢
- 75 下列何者符合「標準防治感染」的方法？
(A)接觸過病患的手套可消毒後再使用
(B)用過的針頭與針筒放在塑膠袋內包好，丟入一般垃圾桶
(C)治療個案時穿著涼鞋較輕鬆且方便
(D)可戴上護眼罩防止病患體液接觸眼睛
- 76 脊髓損傷患者可能有以下那些併發症？①體溫失調 ②深層靜脈栓塞 (deep vein thrombosis)
③憂鬱症 ④長期記憶缺損
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 77 根據川步麗 (Trombly) 所提出的職能功能模式 (occupational functioning model) 為評估依歸時，其有關評估原則或方法的敘述，下列何者不適當？
(A)由上而下之途徑 (top-down approach)
(B)為平行封閉式途徑 (parallel and closed-lope approach)
(C)治療師須先決定患者在日常生活中所需扮演的角色及所從事的任務
(D)可用加拿大職能表現量表 (Canadian Occupational Performance Measure) 評估患者所需扮演的角色
- 78 如果手部外傷後，發生手部曲指肌腱的緊縮 (tightness)，以下現象不一定會發生？
(A)被動指間關節屈曲受限 (B)被動指間關節伸展受限
(C)主動指間關節伸展受限 (D)主動指間關節屈曲受限
- 79 若治療目標訂在讓病人儘可能獨立，其方法可包括：改造環境以彌補病人殘存的功能缺失，上述的目標基於何種途徑 (approach)？
(A)認知－知覺 (cognitive-perceptual) (B)動作學習 (motor learning)
(C)神經發展 (neurodevelopmental) (D)復健 (rehabilitative)
- 80 下列對動作及過程技巧評量 (Assessment of Motor and Process Skills) 的敘述，何者正確？
(A)只評估動作表現要素 (motor performance components)
(B)評估項目包括：穿衣、飲食、盥洗三大項目
(C)主要目的在探討工具性日常生活活動表現與動作過程技巧之相關性
(D)與佛帕 (VALPAR) 工作樣本評估內容相仿