

九十二年第二次專門職業及技術人員醫事人員、營養師、獸醫人員檢覈筆試暨醫師、牙醫師檢覈筆試分階段考試
九 十 二 年 專 門 職 業 及 技 術 人 員 中 醫 師 檢 覈 筆 試 試 題

類 科：物理治療師
科 目：神經疾病物理治療學
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 對抬臀 (bridging) 運動之訓練效果描述，何者最不適當？
(A)可幫助病人使用便盆 (bed pan) (B)可訓練早期之床上行動力 (bed mobility)
(C)可增加患側下肢之承重能力 (D)目標放在增進病患之關節活動度
- 2 下列何種疾病不是因基底核病變所造成的？
(A)妥瑞氏症候群 (Tourette's syndrome) (B)亨庭頓氏病 (Huntington's Disease)
(C)阿茲海默氏病 (Alzheimer's Disease) (D)威爾森氏病 (Wilson's Disease)
- 3 腦中風病患常見之步態包括：①兩腳間距過寬 ②健側的擺盪期較長 ③站立期 (stance phase)患側膝關節後頂 (hyperextended) ④患側膝蓋在擺盪期呈僵直 (stiff knee)
(A)①③ (B)③④ (C)①③④ (D)①②③④
- 4 中風患者在仰臥 (supine) 的姿勢下引起全身性伸肌張力 (extensor tone) 增強為何種反射異常之表現？
(A)對稱性頸張力反射 (symmetric tonic neck reflex)
(B)不對稱性頸張力反射 (asymmetric tonic neck reflex)
(C)對稱性張力迷路反射 (symmetric tonic labyrinthine reflex)
(D)腰張力反射 (tonic lumbar reflex)
- 5 導致出血性腦中風最主要的危險因子為：
(A)週邊血管疾病 (Peripheral arterial disease) (B)糖尿病 (Diabetes)
(C)冠狀動脈疾病 (coronary heart disease) (D)高血壓 (hypertension)
- 6 中風病患肩關節半脫位的處理方法何者最不適當？
(A)要做肩關節被動關節活動至最大極限 (B)矯正肩胛骨位置
(C)鼓勵從事能穩定肩膀肌肉的活動 (D)改善不良張力 (muscle tone)
- 7 下列何者是中風病患在站立期 (stance phase) 膝關節過度伸張 (hyperextension) 的可能原因？
(A)踝關節蹠屈痙攣 (ankle plantarflexion contracture)
(B)踝關節背屈角度過大 (excessive ankle dorsiflexion)
(C)膝伸肌收縮過慢
(D)髖關節過度外展 (hip abduction)

- 8 有關中風病患擺位之描述何者正確？
(A)當病患有嚴重的單側忽略 (unilateral neglect)時必須將患側面向房間入口
(B)當病患有胃管時最好保持完全平躺的姿勢
(C)在輪椅上保持骨盆在後傾之角度 (pelvic posterior tilt)
(D)側躺在好側 (unaffected side)，並用小枕頭墊高，可伸展 (elongate) 患側
- 9 請選出訓練中風病患行走能力最符合工作取向模式之訓練方式？
(A)在平行桿內訓練行走 (B)在治療床上以膝行走 (kneel walking)
(C)進行側向登階以訓練患側髖外展肌 (D)由治療室走向病房
- 10 下列何者屬於上運動神經元損傷後之負向症狀 (negative signs)？
(A)痙攣 (spasticity) (B)陣攣 (clonus)
(C)屈曲回縮反射 (flexor withdrawal reflex) (D)肌力不足 (muscle weakness)
- 11 下列何者有關中風病患之復健結果 (outcome) 描述為正確？
(A)大多數病患即使使用助行器材也無法恢復行走能力
(B)大多數病患出院後需要住進特殊安養機構
(C)嚴重的半側視覺空間忽略 (severe visuospatial hemineglect)復健的成效較差
(D)復健成效不會受年齡影響
- 12 下列關於中風後異常協同動作 (abnormal synergy) 之描述，何者為正確？
(A)異常協同 (abnormal synergy) 在布朗斯壯第四期 (Brunnstrom Stage IV) 最明顯
(B)肩胛骨回縮 (scapula retraction) 為上肢伸張協同動作 (extensor synergy)
(C)踝關節外翻 (ankle eversion) 為下肢伸張協同動作 (extensor synergy)
(D)前臂內旋 (forearm pronation) 屬於上肢伸張協同 (extensor synergy)
- 13 下列那條大腦血管栓塞 (cerebral thrombosis) 後，最易造成暈眩 (vertigo)？
(A)前大腦動脈 (anterior cerebral artery) (B)中大腦動脈 (middle cerebral artery)
(C)後大腦動脈 (posterior cerebral artery) (D)內頸動脈 (internal carotid artery)
- 14 腦中風後，患者在肢體偏癱側的下肢比上肢顯著，受損的腦血管最有可能為？
(A)前大腦動脈 (anterior cerebral artery) (B)中大腦動脈 (middle cerebral artery)
(C)基底動脈 (basilar artery) (D)後大腦動脈 (posterior cerebral artery)
- 15 根據布朗斯壯 (Brunnstrom stage) 中風後動作能力恢復分期的描述，下列何者最不正確？
(A)第一期時，病患之肌肉張力為低張狀態 (B)第二期時，痙攣 (spasticity) 開始出現
(C)每一位中風病患都會由第一期發展至第六期 (D)進入第四期後，協同動作 (synergy) 開始被打破
- 16 中風後如出現內斜視 (convergent strabismus) 則可能是第幾對腦神經受傷？
(A) II (B) III (C) IV (D) VI
- 17 中風病患在擺盪期中如果髖關節沒有足夠的屈曲 (flexion) 常可觀察到那些異常的步態？①繞圈動作 (circumduction) ②軀幹前彎 (trunk forward) ③髖外轉 (external rotation) ④腳趾拖行 (toe drag)

(A)①

(B)②③

(C)③④

(D)①③④

- 18 在台灣造成中風的原因中僅次於腦梗塞 (cerebral infarction) 的是？
(A)蜘蛛膜下腔出血 (subarachnoid hemorrhage)
(B)顱內出血 (intracerebral hemorrhage)
(C)硬腦膜下腔出血 (subdural hemorrhage)
(D)腦部動靜脈畸型 (arteriovenous malformation of the brain)
- 19 對創傷性腦外傷者而言最難處理的失能狀況是？
(A)偏癱 (hemiplegia) (B)同側性偏盲 (hemianopia)
(C)肌張力不正常 (abnormal muscle tone) (D)行為缺損 (behavioral deficit)
- 20 在脊髓損傷後有一段時間呈無反射狀態 (areflexia) 稱為：
(A)脊髓休克 (Spinal shock) (B)薦餘容 (Sacral Sparing)
(C)失聯 (Diaschisis) (D)神經根逃脫 (Root escape)
- 21 根據美國脊髓損傷協會 (ASIA) 對脊髓損傷 (impairment) 之分類，在神經層級 (neurological level) 以下之主要肌肉 (Key muscle) 肌力小於 3 者屬於：
(A) A 級 (B) B 級 (C) C 級 (D) D 級
- 22 脊髓損傷的病患在急性期擺位與關節活動必須注意：①下半身癱瘓 (paraplegia) 者伸膝抬腿 (straight leg raise) 不得超過 60 度 ②下半身癱瘓者髖關節屈曲 (hip flexion) 不得大於 90 度 ③四肢癱瘓者 (tetraplegia) 在肩關節週圍之肌肉不得進行牽張 (stretching)
(A)① (B)①② (C)①②③ (D)②
- 23 創傷性腦傷病患在蘭克斯洛斯亞米哥斯第四層級時 (Rancho Los Amigos Level IV) 可以：①進行正式之身體檢查 ②進行以觀察為主的檢查 ③開始教導新的技巧 ④教育訓練以家屬為主
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 24 下列何種類型的創傷性腦傷最無法有效地被電腦斷層掃描或核磁共振儀偵測？
(A)顱骨內血腫 (intracranial hematoma) (B)硬腦膜下血腫 (subdural hematoma)
(C)瀰漫性神經軸損害 (Diffuse axonal injury) (D)腦內出血 (intracerebral hematoma)
- 25 在大多數已開發國家中意外死亡的死因佔第一位者為？
(A)外傷性腦損傷 (traumatic brain injury) (B)外傷性脊髓損傷 (traumatic spinal cord injury)
(C)心臟衰竭 (D)腦缺氧
- 26 有關原发性腦損傷 (primary brain damage) 之陳述何者最正確？①腦震盪即為失去意識 (Loss of consciousness) 的腦傷症狀統稱 ②腦挫傷 (cerebral contusion) 易發生於額葉與顳葉 ③瀰漫性神經軸突損傷 (diffuse axonal injury) 即常發生在中腦
(A)① (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 27 一創傷性腦損傷患者右上肢有明顯的痙攣 (spasticity) 而左上肢有動作失調 (ataxia) 則此病患腦傷位置：①右大腦半球 ②右小腦 ③左大腦 ④左小腦
(A)①② (B)①③ (C)③④ (D)②③

- 28 中央脊髓症候群 (Central Cord Syndrome) 之臨床表徵包括：①痛覺與溫度覺一定缺損 ②上肢較下肢嚴重 ③動作功能受損較感覺功能嚴重 ④失調型步態 (Ataxic gait)
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)①②③④
- 29 徒手肌力測驗至少需達幾分以上才表示此肌肉力量足以應付執行日常功能之需求？
(A) 3⁻ (Fair minus) (B) 3⁺ (Fair plus) (C) 4 (Good) (D) 5 (Normal)
- 30 腰椎第 2 節的關鍵肌肉為？
(A)髂腰肌 (Iliopsoas) (B)股四頭肌 (Quadriceps)
(C)脛前肌 (Tibialis anterior) (D)伸踇長肌 (Extensor hallucis longus)
- 31 有關布朗思圭爾 (Brown-Séquard's Syndrome) 的描述何者正確？
(A)較多因車禍造成
(B)與受傷脊髓異側的感覺異常
(C)肌力衰弱發生在脊髓受損之異側 (contralateral side)
(D)受傷部位為脊髓的前外側
- 32 在脊髓損傷病患身上最容易發生異位骨化 (Heterotopic ossification) 的關節為：
(A)髖關節 (B)腕關節 (C)踝關節 (D)指關節
- 33 在台灣造成創傷性脊髓損傷最常見的原因？
(A)車禍 (B)暴力事件 (C)跌倒 (D)運動傷害
- 34 脊髓損傷在第幾節以上就可能產生自律神經反射異常 (Autonomic dysreflexia)？
(A)第 6 胸髓 (T₆) (B)第 8 胸髓 (T₈) (C)第 10 胸髓 (T₁₀) (D)第 12 胸髓 (T₁₂)
- 35 腰椎第 2 節脊髓損傷患者利用膝-踝-足支架 (Knee-ankle-foot orthoses) 進行功能性行走 (functional ambulation) 之快步態為：
(A)擺盪超越步態 (swing-through gait) (B)擺盪中止步態 (swing-to gait)
(C) 3 點步態 (3-point gait) (D) 4 點步態 (4-point gait)
- 36 脊髓損傷患者能利用兩側踝-足支架 (ankle-foot orthoses) 與拐杖 (crutches) 達成功能性行走 (Functional ambulation) 的最高 (最近頭端) 神經損傷層級 (neurological level)？
(A)腰髓第 1 節 (L₁) (B)腰髓第 2 節 (L₂) (C)腰髓第 3 節 (L₃) (D)腰髓第 4 節 (L₄)
- 37 下列有關完全脊髓損傷病人呼吸與咳嗽的能力何者正確？
(A)損傷神經層級為頸髓第 3 節患者即使在急性期也一定不需呼吸器幫忙
(B)損傷神經層級為頸髓第 4 節患者即使可獨立呼吸也不能有效的咳嗽
(C)損傷層級為第 5 頸髓者已具備良好強迫吐氣 (forced exhalation) 的能力
(D)損傷層級為第 5 胸髓者已可控制腹肌因此呼吸與咳嗽之能力均正常
- 38 脊髓損傷後無法使用徒手肌力測驗 (manual muscle test) 來訂定受傷的神經階層 (neurological level) 的脊髓是：

(A)第5頸節 (C₅) (B)第1腰節 (L₁) (C)第4腰節 (L₄) (D)第1薦節 (S₁)

- 39 下列對去皮質僵直 (Decorticate rigidity) 之描述那些是正確的？①下肢與軀幹呈伸張狀 (extension) ②上肢呈伸張狀 (extension) ③受傷部位高於上四疊體 (superior colliculus) ④受傷部位在上四疊體與前庭核 (vestibular nucleus)之間
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③ (D)①④
- 40 傳統的玻巴斯 (Bobath) 學派乃依據那兩個動作控制理論發展而來？①反射理論 (reflex theory) ②層階理論 (hierarchical theory) ③系統理論 (systems theory) ④基模理論 (schema theory)
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 41 交互抑制作用 (reciprocal inhibition) 乃透過那一種中間神經元所媒介？
(A) A 類初級抑制性中間神經元 (Ia inhibitory interneuron)
(B) B 類初級抑制性中間神經元 (Ib inhibitory interneuron)
(C) A 類次級抑制性中間神經元 (IIa inhibitory interneuron)
(D) B 類次級抑制性中間神經元 (IIb inhibitory interneuron)
- 42 基底核中接受傳入訊息的構造為：①殼核 (putamen) ②尾狀核 (caudate) ③蒼白球 (globus pallidus) ④視丘下核 (subthalamic nucleus)
(A)①② (B)③④ (C)②④ (D)①③
- 43 有關牽張反射 (stretch reflex) 之敘述何者正確？①受器為肌梭 (muscle spindle) ②由 A 類初級 (Ia) 傳入纖維媒介者為單突觸反射 (monosynaptic reflex) ③膝反射 (knee jerk) 主要由 Ia 之傳導所造成 ④肌梭對牽張之敏感度由 運動神經元所調控
(A)①② (B)①③④ (C)①④ (D)①②③④
- 44 主要負責偵測肌肉收縮力量改變的受器是：
(A)肌梭 (muscle spindle) (B)高爾基氏器 (Golgi tendon Organ)
(C)關節受器 (joint receptor) (D)麥氏囊 (Meissner's Corpuscle)
- 45 以下有關斯康堡 (Schaumburg) 周邊神經損傷之分類，何者正確？
(A)第一級傷害會造成周邊神經完全斷裂分離
(B)第二級傷害造成軸索分離但神經膜仍然完整
(C)第三級傷害只造成可逆的傳導阻斷 (reversible conduction block)
(D)第三級又叫神經失用症 (Neurapraxia)
- 46 有關軸突裂傷 (Axonotmesis) 之敘述，何者不正確？
(A)神經管 (neural tube) 是完整的
(B) M 波的振幅不變
(C)受傷 2-3 週後由肌電圖檢查一般可得纖維震顫電位 (fibrillation)
(D)受傷部位以下的軸突受損
- 47 腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome) 為那條神經受壓迫而引起？

- (A)尺神經 (ulnar nerve) (B)橈神經 (radial nerve)
(C)正中神經 (median nerve) (D)肌皮神經 (musculocutaneous nerve)
- 48 在 PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation)的動作模式 (pattern) 中下列敘述何者有誤？
(A) PNF 執行多關節動作
(B) PNF 強調螺旋的 (spiral) 與對角 (diagonal)的動作
(C)外展 (abduction) 的動作是給予阻力最有效的方向
(D)動作模式的命名以在近心端 (proximal) 關節發生之動作爲本
- 49 要誘發側翻或是由側翻坐起最好選用之方法爲：
(A)砍劈 (chopping) (B)抬舉 (Lifting)
(C)下肢 D 1 伸張 (extension) (D)下肢 D 2 伸張 (extension)
- 50 被認爲能引發最有效的本體感覺誘發的基本誘發方法爲：
(A)徒手接觸 (manual contact) (B)阻力 (resistance)
(C)口令 (verbal commands) (D)牽張 (stretch)
- 51 以下敘述何者不是利用關鍵點控制 (key point control) 來抑制肌肉張力的例子？
(A)維持頭部屈曲的姿勢以降低軀幹與四肢的伸張
(B)將大拇指外展並伸張以降低手腕與手指的屈曲張力
(C)將股骨 (femur) 外轉與外展可降低下肢內收與伸張張力
(D)請患者面對鏡子以抑制頸部歪斜造成姿勢不良
- 52 就路德 (Rood) 的理論而言，動作控制能力之發展分期順序爲①穩定控制 (stability) ②自發性活動 (mobility) ③動態穩定 (controlled mobility) ④技巧性動作 (skill)
(A)①②③④ (B)②①③④ (C)②①④③ (D)①③②④
- 53 維持在穩定的直立姿勢下 (upright posture) 還能進行重量轉移 (weight shifting) 的能力稱爲：
(A)行動力 (mobility) (B)穩定力 (stability)
(C)動態穩定力 (controlled mobility) (D)技巧 (skill)
- 54 下列何者爲兩點辨識 (Two-point discrimination) 屬於的神經檢查分類？
(A)複合的皮質感覺 (combined cortical sensation) (B)深層感覺 (proprioceptive sense)
(C)表淺感覺 (superficial sense) (D)協調能力 (coordination)
- 55 以下何項檢查不屬於 Body scheme 與 Body image 之範圍？
(A)單側忽略 (unilateral neglect) (B)左右辨識
(C)手指認識不能 (Finger agnosia) (D)觸覺認識不能 (Tactile agnosia)
- 56 Modified Ashworth scale 測試肌肉張力之結果爲 0 分的表現，依照原量表的描述，下列何者爲正確？
(A)肌肉張力輕度高張 (hypertonus) (B)肌肉張力爲低張
(C)肌肉張力呈僵直狀態 (rigidity) (D)肌肉張力並無增加
- 57 在平整的地面上如果受到小幅度的推擠，一般人會採取何種動作策略來維持平衡？①足踝策略

(ankle strategies)或②髖策略；而這種策略屬於③固定支撐策略 (fixed-support strategies)或④改變支撐策略 (change-support strategies)

- (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

58 從坐到站的過程中第一個被啟動的肌肉通常是：

- (A)脛前肌 (tibialis anterior) (B)臀大肌 (gluteus maximus)
(C)股二頭肌 (biceps femoris) (D)股直肌 (rectus femoris)

59 傅格梅爾測試 (Fugl-Meyer assessment of physical performance) 是用來評估①中風病患的動作功能 (motor function) ②中風病患的失能程度 (degree of disability) ③中風病患的功能限制 (functional limitation) ④中風病患的損傷程度 (degree of impairment)

- (A)①② (B)①②③ (C)①②③④ (D)①④

60 傅格梅爾量表 (Fugl-Meyer Assessment) 的評估項目中不含：

- (A)動作功能 (B)平衡能力 (C)疼痛 (D)協調能力

61 上運動神經元損傷與下運動神經元損傷在神經學檢查的表現上最明顯的不同是：

- (A)肌肉無力 (B)感覺損傷 (C)肌肉張力表現 (D)肌肉萎縮

62 以下那一種測驗不是用來評估平衡能力？

- (A)朗博格測驗 (Romberg test) (B)功能伸手取物測驗 (Functional Reach test)
(C)伯格量表 (Berg scale) (D)擺錘測驗 (Pendulum test)

63 下列何種活動項目通常不包含在基本日常生活活動 (Basic activities of daily living) 的評估中？

- (A)整理家務 (B)進食 (C)上廁所 (D)穿衣

64 以下何種感覺屬於表淺感覺 (superficial sensation)？

- (A)運動覺 (kinesthesia) (B)振動覺 (vibration) (C)痛覺 (Pain) (D)關節深部感覺

65 下列有關亨廷頓氏病 (Huntington's disease)，何者不正確？

- (A)基底核 (basal ganglia)中的~~迴~~路過份活化 (B)是一種遺傳性疾病
(C)發病後並不會影響平均壽命 (D)基底核內 GABA 之濃度降低

66 以下關於巴金森氏病 (Parkinson's Disease) 的描述何者錯誤？

- (A)因黑質多巴胺 (dopamine) 供應不足 (B)病患之肌肉張力為高張狀態 (hypertonicity)
(C)疾病初期症狀常為單側 (D)病患常有意圖性顫抖 (intention tremor)

67 有關巴金森氏病 (Parkinson's Disease) 患者步態特徵何者不正確？

- (A)跨步長 (stride length) 變短 (B)可能產生腳尖先著地 (toe-strike) 的步態
(C)可能會越走越慢，腳步也愈小稱為碎步步態 (D)步態中下肢主要關節的活動範圍下降

68 下列檢查方法那一種不能用來檢查小腦病變患者肌肉張力不足的現象 (hypotonicity)？

- (A)肌肉觸診 (muscle palpation) (B)深層肌腱反射 (Deep tendon reflex) 檢查
(C)被動屈曲單一手手指檢查 (D)患者用腳掌快速拍打地板測試

69 有關小腦內齒狀核 (Dentate nucleus) 之描述何者正確？

- (A)是脊髓小腦 (spinocerebellum) 的輸出部位 (B)輸出至前庭神經核 (vestibular nuclei)

- (C)與動作執行 (motor execution) 功能最密切 (D)與動作計劃 (motor planning) 的能力有關
- 70 什麼治療活動可以暫時降低失調 (ataxia) ?
(A)減少肢體負重 (B)增加肢體活動速度
(C)法蘭克氏運動 (Frenkel's Exercise) (D)被動關節活動 (passive range of motion exercise)
- 71 對於動作失調 (ataxia) 病患之治療原則何者有誤 ?
(A)應強調近端 (proximal) 肢體穩定度 (stability) (B)由慢速度之動作開始
(C)強調動作的精準度 (D)由穩定程度最低的姿勢開始訓練
- 72 關於多發性硬化 (Multiple Sclerosis) 預後 (prognosis) 之描述最正確為：①發作後只出現一個徵候 (symptom) 常有較好的預後 ② 40 歲以後才發病殘障程度與復發機會均較大 ③進行性 (Progressive) 多發性硬化預後較差
(A)①③ (B)② (C)①②③ (D)③
- 73 下列何者是後小兒麻痺症候群 (post-polio syndrome) 最常見的臨床表徵 ?
(A)肌肉肥大 (hypertrophy) (B)異常的疲倦 (fatigue)
(C)頭痛 (D)對熱的耐受度降低
- 74 下列有關肌萎縮性側索硬化 (Amyotrophic Lateral Sclerosis) 何者最正確？①最常見的運動神經元疾病 ②發病後壽命不會比正常人低 ③早期的臨床指標為肌束震顫 (fasciculation) ④動眼神經核極少受侵犯
(A)③ (B)④ (C)①② (D)①③④
- 75 以下何者為神經去髓鞘 (demyelinating) 性疾病者：①肌萎縮性側索硬化 (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ②基安巴瑞氏症候群 (Guillain-Barré syndrome) ③多發性硬化 (Multiple Sclerosis) ④小兒麻痺 (poliomyelitis)
(A)①③ (B)②④ (C)②① (D)②③
- 76 最愛侵犯神經根 (nerve root) 與周邊神經而導致急性運動神經病變與低張型的痙攣的疾病是 ?
(A)肌萎縮性側索硬化 (ALS) (B)基安巴瑞氏症候群 (Guillain-Barré syndrome)
(C)多發性硬化 (Multiple Sclerosis) (D)小兒麻痺 (poliomyelitis)
- 77 下列何種疾病可以預期病患接近完全回復正常功能的可能 ?
(A)肌萎縮性側索硬化 (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
(B)巴金森氏症 (Parkinson's Disease)
(C)基安巴瑞氏症候群 (Guillain-Barré syndrome)
(D)亨庭頓氏症 (Huntington's disease)
- 78 後小兒麻痺症候群 (post-polio syndrome) 的治療原則為減輕肌肉負擔，而要達成此目標最有效的方法為 ?
(A)重量訓練 (B)減輕體重 (C)漸進性阻力訓練 (D)有氧運動
- 79 下列那一人種得到多發性硬化 (Multiple Sclerosis) 的可能性最高 ?
(A)白種人 (B)黑人 (C)亞洲人 (D)愛斯基摩人

80 被稱為夏氏三重徵候 (Charcot's triad) 的多發性硬化臨床表徵包括：①偏癱 (hemiplegia) ②意圖性顫抖 (intention tremor) ③掃描式語言 (scanning speech) ④眼球震顫 (nystagmus)

(A)①②③

(B)①②④

(C)①③④

(D)②③④