

九十三年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題

代號：4111
頁次：8-1

類 科：職能治療師
科 目：生理疾病職能治療學
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 職能治療師“以職能為終點”(occupation-as-end)之治療性運用是下列何項？
(A)教導中風病人穿褲子的技巧
(B)安排喜愛烹飪活動的手外傷病人從事刨蘿蔔活動，以增進手部抓握能力
(C)運用治療室推拉箱活動，增進肌肉萎縮症患者肩部肌力
(D)以上皆是
- 依據「職能功能模式」(the occupational functioning model)，下列何者最能提昇生理疾病病患執行日常活動的自信？
(A)治療師給予正向回饋與鼓勵
(B)個案在真實情境中有成功執行之經驗
(C)個案在特定情境中反覆練習熟練
(D)個案觀看執行活動的錄影紀錄
- 所謂解剖姿勢(anatomical position)所指為何？
(A)平躺姿勢，上肢自然垂放兩側，手面向下，下肢微分開
(B)坐立姿勢，手垂放兩側，二腳平放在地面
(C)站立姿勢，雙手自然垂放兩側，手面向內，二腳微分與肩同寬
(D)站立姿勢，雙手自然垂放，手面向前，二腳合併(feet together)
- 有關下列職能評量結果的敘述何者有誤？
(A)加拿大職能表現測量(Canadian Occupational Performance Measure)可得知個案最需要進行訓練的活動
(B)動作及程序技巧評估(Assessment of Motor Process Skills)可得知個案在動作功能與程序執行上的困難
(C)巴氏量表(Barthel Index)的評量結果可得知病人執行洗澡活動的困難是平衡或是認知障礙所引起
(D)用克蘭貝爾日常活動量表(Klein Bell ADL Scale)評量時可得知個案執行活動時在何步驟有困難
- 有關評量結果在統計上的意涵，下列何者是正確的？
(A)平均值(mean)代表樣本中大多數人的分數
(B)施測者間評量結果之相關係數(interclass correlation coefficient)值愈大，代表不同治療師評量的一致性愈差
(C)標準差(standard deviation)愈大，代表個案表現愈偏離平均值
(D)評量結果之常模(norm)對應所繪出的曲線通常為直線型
- 測量肩關節彎曲(shoulder flexion)之關節活動度(range of motion)，下列敘述何者正確？
(A)量角器的軸心位置應置於肩峰突(acromion process)下方一吋(inch)
(B)軸心位置一旦固定，量測過程不可再移動
(C)量角器活動臂(movable arm)應貼近手臂上緣
(D)量角器固定臂(stationary arm)應垂直於地面
- 個案若受手肘彎曲張力痙攣(spasticity)影響導致伸直角度受限，手肘之被動關節活動度最有可能記錄為下列何者？
(A) $0^{\circ} \sim 130^{\circ}$ (B) $0^{\circ} \sim 150^{\circ}$ (C) $20^{\circ} \sim 150^{\circ}$ (D) $20^{\circ} \sim 180^{\circ}$
- 計算手部完全主動動作(total active movement, TAM)的方法為下列何者？
(A) (PIP+DIP)彎曲角度
(B) (MP+PIP+DIP)彎曲角度
(C) [(MP+PIP+DIP)彎曲角度] + [(MP+PIP+DIP)伸直角度]
(D) [(MP+PIP+DIP)彎曲角度] - [(MP+PIP+DIP)伸直受限之角度]

- 9 由前方桌面拿握杯子喝水時，肘關節的主要動作肌肉為何者？
(A)二頭肌 (biceps) (B)肱肌 (brachialis)
(C)肱橈肌 (brachioradialis) (D)三頭肌 (triceps)
- 10 執行徒手肌力測量 (manual muscle testing) 時，下列何者不在同一姿勢下測量？
(A)膝關節彎曲 (knee flexion) - F 級 (B)膝關節伸直 (knee extension) - P 級
(C)髖關節伸直 (hip extension) - G 級 (D)肘關節伸直 (elbow extension) - G 級
- 11 當一位 70 歲甫接受心臟繞道手術後患者，在訓練穿鞋活動後測量其心跳速率 (heart rate) 為 120 下，血壓 180/100 mmHg，對個案而言此活動強度約相當於最大攝氧量 (VO_{2max}) 的比率？
(A) 50% (B) 60% (C) 80% (D) 100%
- 12 為避免上題患者於參與阻力性活動訓練時發生危險，下列監控方式何者是較不適用？
(A)測量體溫是否增高 (B)血壓是否急劇增加
(C)是否可持續談話 (D)心電圖 (electrocardiogram) 是否有異常
- 13 量測靜態耐力 (static endurance) 的指標是下列何者？
(A)柏格指數 (Borg Scale of Perceived Exertion)
(B) 25%最大收縮肌力 (maximum volume contraction) 之持續時間
(C)心跳速率 (heart rate)
(D)梅特 (MET)
- 14 較符合近代任務導向途徑 (task-oriented approach) 之假設與原則的敘述為下列何者？
(A)強調運用正確動作模式，重複練習至技巧熟練
(B)動作行為是多系統間平行互動、自我調節的結果
(C)評估時主要考慮神經生理因素所造成的影響
(D)中樞神經系統損傷後有一預期恢復之順序
- 15 有關神經學名詞的解釋下列何者是正確的？
(A) dysmetria - 動作分解為多個小部份，無法連續平順執行
(B) hypokinesia - 缺乏肌力與張力執行活動
(C) chorea - 節律性小幅之不自主動作
(D) dystonia - 近端肢體或軀幹肌肉強力收縮
- 16 下列何者不是為心肌梗塞 (myocardial infarction) 可能之醫療處置方式？
(A)心血管繞道手術 (coronary artery bypass) (B)抗凝血劑 (thrombolytic)
(C)瓣膜重建 (valve replacement) (D)血管造型 (percutaneous transluminal angioplasty)
- 17 職能治療師至安養護機構進行環境諮詢，下列建議何者是正確的？
(A)通道之扶手離地高度約 100 公分
(B)門寬至少 70 公分
(C)馬桶旁扶手離地高度約 40 公分
(D)最方便讓乘坐輪椅老人拿取之物品放置高度約離地 40~130 公分
- 18 依據內政部現行「身心障礙者輔助器具補助標準表」之規定，申請特製輪椅補助之敘述，下列何者是正確的？
(A)只要經醫師確認需求，各障礙類別均可申請特製輪椅
(B)特製輪椅至少需治療師提出三項以上特製配件之評估處方
(C)個案先購買到適合之特製輪椅，再請治療師開立輔具評估建議書
(D)特製輪椅專指特殊尺寸之輪椅

- 19 有關傷口癒合的過程與復健的原則，下列何者有誤？
(A)發炎期 (inflammation) — 建議「止動」 (immobilization)
(B)增生期 (fibroplasias) — 進行主動運動以免僵硬
(C)成熟期 (maturation) — 可開始提供阻力性關節運動
(D)成熟期 (maturation) — 運動已無法改變膠原纖維排列
- 20 尺神經 (ulna nerve) 斷裂個案，手術後手需擺位在何種抗變形姿勢 (anti-deformity position)？
(A)掌指關節：彎曲 45°，手指關節：完全伸直 (B)掌指關節：彎曲 45°，手指關節：微彎
(C)掌指關節：彎曲 90°，手指關節：完全伸直 (D)掌指關節：完全伸直，手指關節：完全伸直
- 21 承上題，姿勢可達到預防變形產生的主要理由為何？
(A)掌指關節與手指關節關節保持在最大活動角度
(B)掌指關節與手指關節所有肌腱維持最長狀態
(C)掌指關節的側韌帶 (collateral ligament) 與手指關節腹板保持最長
(D)掌指關節腹板與手指關節韌帶 (ligament) 保持最長
- 22 靜態大拇指固定副木 (thumb spica) 最不適用在下列何種情況？
(A)僵硬大拇指 (stiff thumb) (B)媽媽手 (De Quervain's disease)
(C)大拇指關節炎 (D)滑雪選手指 (skier's thumb)
- 23 抑制高張肌肉的技巧不包括下列何者？
(A)室溫 (neutral warmth) (B)關節壓縮 (joint approximation)
(C) C 式冰刺激 (c-icing) (D)維持—放鬆 (hold-relax)
- 24 依據動作學習理論，證實正常人運用下列何種回饋與練習方式組合，可達到較佳學習與類化 (generalization) 效果？
(A)立即回饋 (immediate feedback)，隨機練習 (random practice)
(B)總結回饋 (summary feedback)，段落練習 (block practice)
(C)立即回饋 (immediate feedback)，段落練習 (block practice)
(D)總結回饋 (summary feedback)，隨機練習 (random practice)
- 25 頸髓第六節完全損傷 (C6) 之診斷依據是下列何者？
(A)手腕伸直肌力：F 以上，C6 皮膚知覺神經根範圍 (dermatome) 之感覺正常
(B)手腕伸直肌力：N，C6 感覺喪失，C5 以上感覺正常
(C)手腕伸直肌力：F 以下，C6 感覺正常
(D)手腕伸直肌力：F 以下，C6 感覺喪失，C5 以上感覺正常
- 26 中索症候群 (central cord syndrome) 之臨床表徵為下列何者？
(A)肢體近端動作喪失，遠端動作保存 (B)除本體覺保存外，其餘感覺與動作喪失
(C)受傷同側肢體之動作與本體覺喪失 (D)上肢無力較下肢無力明顯
- 27 脊髓損傷個案的血壓，若突然出現收縮壓增加 20 mmHg 以上、頭痛、冒汗、皮膚潮紅、胸口緊、呼吸困難等現象，可能為何種症狀？
(A)姿位性低血壓 (postural hypotension) (B)自主神經反射失調 (autonomic dysreflexia)
(C)心絞痛 (angina pectoris) (D)深層靜脈血栓 (deep vein thrombosis)
- 28 在上題情形下，治療師之處置下列何者是正確的？
(A)個案維持坐姿，放鬆衣物 (B)將個案立即平躺
(C)作人工呼吸 (D)將下肢抬高
- 29 脊髓損傷個案之功能預後，下列何者是最可能達成的？
(A) C5 完全損傷個案可自行以撐高方式 (push-up) 方式減壓
(B) C6 完全損傷個案可於室內、外獨立推行輪椅
(C) C7 完全損傷個案可獨立進行各種位置轉位活動
(D) C8 完全損傷個案可不用任何輔具獨立進食


- 30 大學男生 20 歲 C6 完全損傷，1 個月前受傷，目前在復健病房中開始接受職能治療，評估顯示：
(1)中度憂鬱 (depression)，缺乏參與復健動機，日常活動均依賴家人，(2)傷部以下肌力與感覺喪失，且肌耐力差，(3)無法自行進食、刷牙、盥洗、寫字、打電話、使用電腦（此為個案希望能自己操作的事務）；為增進個案動機，職能治療師的評估計畫，下列何者是最不適切的？
(A)要求家屬勿協助個案日常活動
(B)安排參加病友團體聚會
(C)操作簡易活動，增進其自信
(D)與個案建立治療性關係，討論未來其可進行之功能目標
- 31 承上題，個案之短程職能治療目標，下列何項是較不適合的？
(A)教導皮膚保護之原則與技巧
(B)教導使用電話技巧
(C)增進上肢肌力及耐力
(D)訂購輪椅並教導推行技巧
- 32 配合類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis) 病人對於殘障調適的過程，治療師較適合教導關節保護原則，並能獲得較佳治療效益是在下列何階段？①震驚期 (shock) ②反抗期 (defense) ③承認期 (acknowledge) ④調適期 (adaptation)
(A)①②③④ (B)②③④ (C)③④ (D)①④
- 33 類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis) 病人最不可能出現關節變形是下列何種？
(A)掌指關節腹側脫位 (MP joint volar subluxation) (B)掌指關節橈側偏向 (MP joint radial deviation)
(C)掌指關節尺側偏向 (MP joint ulna deviation) (D)腕關節橈側偏向 (wrist joint radial deviation)
- 34 有關類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis) 治療原則，下列何者是正確的？
(A)進行關節活動度運動，疼痛是必然且要忍耐的 (B)易疲勞的活動應集中時段完成，以便休息
(C)從事活動時若出現疼痛應立即停止 (D)從不需考慮肌力訓練活動
- 35 有關不同程度燒燙傷之敘述下列何者是正確的？
(A)淺層燒傷 (superficial burn) 只傷及表皮 (epidermis)，患部會發紅但不會疼痛
(B)淺層部份皮膚燒傷 (superficial partial-thickness burn) 會出現水泡且疼痛
(C)深層部份燒傷 (deep partial thickness burn) 通常不考慮植皮 (skin graft)
(D)全皮膚燒傷 (full-thickness burn) 疼痛異常，且必須植皮 (skin graft)
- 36 急性期燒燙傷病患之職能治療處置，下列何者是正確的？
(A)敷料紗布 (dressing) 會妨礙關節活動進行，應建議病人拿除
(B)個案傷處未出現變形時，可不用先製作擺位副木
(C)植皮術後 5~10 天內不適合進行關節運動
(D)關節運動必定會疼痛，可不需理會
- 37 協助截肢病患選擇義肢機械手 (hooks) 或美觀手 (cosmetic hand) 時，下列敘述何者有誤？
(A)機械手可較精確的抓握 (B)機械手較耐用、易維護
(C)機械手價格較便宜 (D)機械手重量較重
- 38 職能治療師執行上肢義肢檢測的原則，下列何者是正確的？
(A)站立時義肢尖端至地面需與健手大拇指尖至地面高度相等
(B)拉 50 磅重物時，套筒 (socket) 位移不可大於 2 吋
(C)8 字型背帶交叉處應位於頸椎第七節以上，偏向截肢側
(D)穿戴肘下截肢義肢時，手肘彎曲角度應與未穿戴時彎曲角度相同
- 39 穿戴肘下截肢時，欲打開機械手 (hook) 拿到桌面上杯子其控制動作為下列何者？
(A)肩關節彎曲 (shoulder flexion) 及肩胛前突 (scapular protraction)
(B)肩關節伸直 (shoulder extension) 及肩胛後突 (scapular retraction)
(C)肩關節外展 (shoulder abduction)
(D)肩關節內收 (shoulder adduction)

- 40 正常之血氧濃度 (oxygen saturation) 至少應大於？
(A) 72% (B) 85% (C) 92% (D) 95%
- 41 個案於心血管繞道手術後，運動測試 (stress test) 結果其最大心跳速率為每分鐘 120 下，此情況最適合的活動訓練強度是相當於下列何者？
(A)心跳速率為每分鐘 30 下 (B)心跳速率為每分鐘 40 下
(C)心跳速率為每分鐘 80 下 (D)心跳速率為每分鐘 120 下
- 42 教導慢性阻塞性肺病個案「圓唇吐氣、腹式呼吸」之方式，下列何者是正確的？
(A)使用嘴巴吸氣與吐氣
(B)吸氣時間約為吐氣時間兩倍
(C)可配合腹式呼吸，吸氣時肚子應可摸到凹陷
(D)配合使用吸塵器時，推出時應吐氣，拉回時應吸氣
- 43 承上題，下列輔具那些是可能需要建議個案使用的？①浴椅 ②長柄夾 ③加粗把柄湯匙 ④穿襪輔具
(A)① (B)①②③ (C)①②④ (D)①②③④
- 44 有位慢性阻塞性肺病 (chronic obstructive pulmonary disease) 70 歲男性獨居，出院後居家職能治療師之評估顯示認知功能正常，可推輪椅行走，但約執行 4 分鐘活動即出現呼吸急促 (short of breath)，下列治療內容中那些是適切的？①教導呼吸技巧 ②教導節省體能之執行日常活動技巧 ③提供可能需要之輔具 ④提供跑步機 30 分鐘增加其體耐力
(A)①② (B)②③ (C)①②③ (D)①②③④
- 45 單側臉頰及嘴唇無力的中風個案，應運用下列何種代償性方式促進其進食功能？
(A)提供較軟食物，餵食到肌力較強之後側方 (B)提供流質食物，餵食時頭傾向較無力側
(C)利用冰水刺激其口腔動作反應 (D)利用酸性食物，刺激其口腔動作反應
- 46 病人的頭頸部姿勢最可能影響下列那一吞嚥階段？
(A)口腔準備期 (oral preparatory) (B)口腔期 (oral)
(C)咽喉期 (pharyngeal) (D)食道期 (esophageal)
- 47 針對以輪椅行動之肢體障礙者，其居家無障礙環境之設計原則，下列項目中那些是適切的建議？①通道寬度大約 80 cm ②廁所內迴旋空間直徑 150 cm 以上 ③洗手台面下需淨空 ④需要電動閃光門鈴
(A)①② (B)①③ (C)①②③ (D)①②③④
- 48 有關老化的敘述下列何者是正確的？
(A)老年通常對於高頻聲音較能分辨
(B)角膜之斑狀退化 (macula degeneration) 導致老人中央視野較週邊視野清楚
(C)老人功能衰退主要歸因為運動量不足
(D)根據魏式智力測驗結果顯示，老人思考推理能力較口語能力差
- 49 小腦損傷個案，較不可能應用到下列何項輔具？
(A)吸盤碗 (B)較輕之加大柄湯匙 (C)衣服扣子改為粘黏帶 (D)有蓋附吸管杯
- 50 職能治療師針對中風病人進行侷限誘發動作治療 (constraint-induced movement therapy) 的主要理論支持為下列何者？
(A)增進雙側肢體整合的機會 (B)患側肢有「學習不使用」的傾向
(C)環境可誘發患肢動作 (D)利用剩餘的功能解決問題
- 51 格拉斯哥昏迷量表 (Glasgow Coma Scale) 各項呈現最高分時，其表示方式下列何者是正確的？
(A) E3M5V6 (B) E4M5V6 (C) E4M6V5 (D) E5M5V6
- 52 職能治療進行急性期腦外傷個案之床邊治療，為避免顱內壓 (intracranial pressure) 增高，下列擺位建議何者是正確的？
(A)頭頸姿勢約彎曲 30 度 (B)頭部平躺不要加墊枕頭
(C)側躺姿勢 (D)頭頸偏向一側較佳

- 53 針對嚴重躁動 (agitation) 的腦外傷個案，下列職能治療的處置何者是較不適當的？
(A) 安排安靜、少干擾的環境
(B) 每日例行活動時間表固定
(C) 從事某項活動時，一旦出現躁動現象，即要準備更換活動或環境
(D) 選擇桌上安靜的上肢手功能活動，以較小肢體活動為佳
- 54 依據卡爾與雪佛 (Carr and Shepherd) 所提出的動作學習之治療途徑，若因個案出現肌肉張力過高，而導致踝關節攣縮 (contracture)，影響其行走平衡能力，則下列描述何者是正確的？
(A) 肌肉張力高為「正向特徵」 (positive feature)，關節攣縮為「負向特徵」 (negative feature)
(B) 肌肉張力高為「正向特徵」 (positive feature)，關節攣縮為「適應性特徵」 (adaptive feature)
(C) 肌肉張力高為「負向特徵」 (negative feature)，關節攣縮為「適應性表徵」 (adaptive feature)
(D) 肌肉張力高為「負向特徵」 (negative feature)，關節攣縮為「正向特徵」 (positive feature)
- 55 有位大學生因車禍導致腦外傷，經六個月復健訓練後，目前狀況為：其日常生活均可自理，但仍有一般性大腦皮質障礙 (general cerebral dysfunction)，影響其訊息處理速度，表達、推理能力、計劃、組織與記憶力，且能力與情緒明顯會受嘈雜環境的干擾。個案希望下個月可回學校繼續就學，治療師的處置方式下列何者是較適切的？
(A) 不建議個案再回學校就學
(B) 尊重個案的決定，下月結案就學
(C) 建議需延後就學時間，加強認知策略的運用，及心理上支持，以調適入學後可能產生之挫折感
(D) 建議回學校訓練，盡量在安靜無干擾的環境，以免產生行為問題
- 56 多發性硬化症 (multiple sclerosis) 的病因是下列何者？
(A) 免疫系統異常引起關節軟組織與骨骼遭破壞
(B) 中樞神經系統去髓鞘化 (demyelination)
(C) 運動神經元 (motor neuron) 遭破壞
(D) 腦內神經傳導物質多巴胺 (dopamine) 分泌過量
- 57 針對上肢出現屈曲協同動作模式 (flexor synergy) 的中風個案，應運用下列何種抑制反射模式 (reflex inhibition pattern, RIP) 之概念於日常活動中？
(A) 患手勾拿手提袋
(B) 穿衣時協助至臀部後方拉衣服
(C) 鼓勵患手拿餅乾到嘴
(D) 健手帶領患手拿抹布擦桌面
- 58 髖關節置換術後，當關節承重達下列何種程度時，職能治療師可考慮開始訓練站姿下執行日常活動？
(A) 部分承重 (partial weight bearing)
(B) 觸地承重 (touchdown)
(C) 50% 承重
(D) 完全承重 (full weight bearing)
- 59 髖關節置換術患者術後六星期內日常活動的執行建議，下列何者是正確的？
(A) 可彎腰穿鞋
(B) 拿助行器走路轉彎時，先轉上半身面向轉彎方向，再轉下半身
(C) 平躺時於大腿間放置三角枕
(D) 坐椅時可加小板凳墊腳
- 60 針對中風病人進行感覺再教育 (sensory re-education) 的主要恢復機轉假設為下列何者？
(A) 開發大腦皮層其它領域建立其感知圖像 (cortical representation)
(B) 學習適應新的感知圖像 (cortical representation)
(C) 神經細胞有自然恢復的能力
(D) 提供足夠刺激，誘發反應
- 61 針對主要有動作忽略 (motor neglect) 的個案，下列何項治療方式是較適切的？
(A) 在左側提供閃光提示刺激
(B) 要求個案在閱讀報紙時，應看到最左列的提示紅線
(C) 戴眼罩
(D) 要求個案用左手拿左方的盥洗用具

- 62 週邊神經系統損傷個案的感覺再教育，於下列何種情況時開始進行較為適當？
(A)還未有感覺時即可開始 (B)具有痛觸覺時可開始
(C)具有深動觸覺 (deep moving touch) 時 (D)具有輕觸覺 (light touch) 時
- 63 針對單側忽略 (neglect) 個案，治療師使用戴眼罩方式，其主要的治療理論基礎是下列何者？
(A)賦活化 (activation) 右大腦半球 (B)建立注意力放到左側的習慣
(C)增加空間動作的提示 (D)提醒個案意識到自己的問題
- 64 針對分配性注意力 (divided attention) 作訓練是下列何者？
(A)治療師唸一段文章，要求每當唸到出現“好”字時，要拍一下桌子
(B)做抄寫練習時，同時播放新聞廣播
(C)從撲克牌中，挑出“梅花”花色及所有 J, Q, K 牌
(D)若唸到紅色的“綠”字時，仍要唸出“綠”
- 65 有關桃格利氏 (Toglia) 多重情境治療途徑 (multicontext approach) 之敘述，下列何者有誤？
(A)適用於認知障礙之訓練
(B)訓練成功一項活動後即設計類似活動的訓練，以便轉移 (transfer)
(C)強調相同的執行策略，需在不同情境中練習
(D)治療師需針對個案的執行表現，提供詳細的回饋
- 66 使用手推輪椅下坡時，下列何種方式是正確的？
(A)正向向下，身體重心向後傾 (B)正向向下，身體重心向前傾
(C)倒退向下，身體重心向後傾 (D)倒退向下，身體重心向前傾
- 67 依據 Bernstein 所提出的動作控制理論，自由度 (degree of freedom) 之定義為下列何者？
(A)關節活動度
(B)指動作反應之靈活度
(C)指動作時所需控制之肌肉、關節數目、動作單位 (single motor unit)
(D)指所儲存動作程式 (motor program) 的數量
- 68 Gibson 之生態治療途徑 (ecological approach) 主張人類動作行為的產生與下列何項因素最直接相關？
(A)外在刺激的輸入與否 (B)環境之一致性
(C)個人對環境之功能性感知 (D)環境中存在刺激的足夠性
- 69 Thelen 與 Fisher 所描述之的動態系統理論 (dynamical systems theory) 為下列何者？
(A)動作發展主要受神經發展成熟度影響
(B)動作模式是連續性逐步發展的
(C)多項控制參數 (control parameter) 同時改變時，才有可能導致動作行為的改變
(D)動作行為是人體與環境中多項參數自我調節之結果
- 70 感覺功能測量的目的不包括下列何者？
(A)畫出脊髓損傷病人的身體感覺範圍—觸覺
(B)診斷是否為腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome) —痛覺
(C)了解中風病人穿衣時動作不協調之原因—本體覺 (proprioception)
(D)預估手外傷病人可否勝任機械工之工作—實體感覺 (stereognosis)
- 71 臨床上治療師觀察到在測量左手感覺時，患者右手接受到刺激，要求左手做動作時，右手卻先有反應，此現象稱之為：
(A)異處感覺 (allesthesia) (B)消弱現象 (extinction)
(C)患肢否認 (anosognosia) (D)半側運動不能 (hemiparesis)
- 72 觀察個案刪除測驗 (cancellation test) 的表現，下列何者可做為區分「半側忽略」(unilateral neglect) 與「半側偏盲」(hemianopsia) 之依據？
(A)二者的掃描策略皆凌亂無組織，偏盲者尤其傾向左側
(B)偏盲者較會有自我重新掃描的現象
(C)半側忽略者通常會在合理的時間內完成
(D)二者遺漏的數目差不多

- 73 治療師評估一位髖關節置換手術且有心律不整的婦人，發現個案雖有獨立完成穿衣活動之能力，但其先生擔心她過度勞累而堅持要協助其完成，治療師因此修正了治療目標，下列何項可說明此情況？
(A)治療師考量社會文化等情境因素之推理結果 (B)此治療師溝通能力不足
(C)治療師與個案的治療性關係建立不夠 (D)治療師不願浪費醫療資源
- 74 分離失用症（disassociation apraxia）患者的臨床表現為下列何者？
(A)拿梳子做刷牙動作 (B)無法模仿他人的動作
(C)無法依口令完成動作，但自發性情況下可完成 (D)從事連續步驟性活動有困難
- 75 Wilson 和 Evans 提出適用於嚴重記憶力障礙者之「無錯誤學習」（error-free learning）方式，其原則為下列何者？
(A)要求個案記住其練習時所犯的錯誤 (B)儘可能讓個案嘗試錯誤（trial-and-error）
(C)主要運用內在學習（implicit learning）的機制 (D)強調在各種不同情境下學習
- 76 上肢伸直連鎖動作模式（extensor synergy）中反應最強的部分是下列何者？
(A)手肘伸直 (B)前臂旋前（pronation）
(C)前臂旋後（supination） (D)肩關節內收（shoulder adduction）
- 77 治療師為腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）個案製作豎腕副木之敘述，下列何者是正確的？
(A)副木應保持腕關節伸直（wrist extension） 30° 姿勢
(B)描繪副木紙型時，筆與紙的交角應為 45°
(C)副木遠端邊緣不可超過手掌摺痕（palmar crease）
(D)由於穿戴時工作不便，故通常建議睡覺時戴即可
- 78 下列那一動態副木（dynamic splint）使用拉力的方式正確？



- 79 評估一名中風個案盥洗活動時，職能治療師觀察到個案刷完牙後有遲疑（hesitation）或停留（preservation）現象，此個案最可能有下列何項失能？
(A)學習障礙 (B)動作計劃障礙 (C)動作協調障礙 (D)認知障礙
- 80 職能治療師若要評量個案對自我執行活動的主觀感受，需選用下列何項評估工具？
(A)加拿大職能表現測量（Canadian Occupational Performance Measure）
(B)凱茲指標（Katz Index）
(C)巴氏量表（Barthel Index）
(D)動作及程序技巧評估（Assessment of Motor and Process Skills）