

94 年第一次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、
中醫師、心理師、呼吸治療師、營養師、獸醫人員考試試題

代號：3110
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：職能治療師
科 目：生理障礙職能治療學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 1 某小妹因家暴導致嚴重腦傷，其腦幹功能惡化而瞳孔持續放大達一週，則在 Glasgow Coma Scale 中的睜眼項目中，其表現最可能為何？
(A)偶而可自主睜眼 (B)可在口語大聲要求下睜眼
(C)給予痛覺刺激時仍可能睜眼 (D)即使給予痛覺刺激仍無法睜眼
- 2 有關身體圖像 (body scheme) 的敘述下列何者不正確？
(A)可以人形繪圖測驗來評估
(B)與對自身能力之不切實際的期盼無關
(C)身體圖像有問題的病人對自己及別人身體可能產生混淆
(D)右側腦中風病人可能出現身體圖像缺損
- 3 下列何者不屬於錐體外神經病變徵兆？
(A)舞蹈症 (chorea) (B)肌張力異常 (dystonia)
(C)震顫 (tremor) (D)測距不良 (dysmetria)
- 4 創傷性腦傷的病患若躁動 (agitated) 且意識混亂 (confused)，其 Rancho Los Amigos 認知功能層級為何？
(A)第二級 (B)第四級 (C)第六級 (D)第八級
- 5 有關陣攣 (clonus) 的描述，下列何者正確？
(A)與痙攣 (spasticity) 無關 (B)常見於足踝及手指屈肌
(C)為一種非重複性的肌肉持續收縮 (D)承重 (weight bearing) 無法抑制陣攣
- 6 下列對類風濕關節炎個案的建議，何者不正確？
(A)前一晚及早晨下床前做溫和的關節運動，可減輕晨起關節僵硬 (morning stiffness)
(B)外出時使用背包，避免拿手提袋
(C)建議以手指背面 (dorsum of the fingers) 撐椅子扶手站起
(D)避免長時間保持同一姿勢，以免肌肉疲倦而減弱對關節的支持作用
- 7 測量肌力等級為 P 時，應具備的完整步驟包括下列何者？①擺位 (position) ②固定 (stabilize) ③觸摸 (palpate) ④觀察 (observe) ⑤給阻力 (resist) ⑥給肌力等級 (grade)
(A)僅①②③④⑥ (B)僅①②③④⑤ (C)僅①②③④ (D)①②③④⑤⑥
- 8 帕金森氏疾病病人可能會出現的僵硬為下列何者？①鉛管型僵硬 (lead pipe rigidity) ②齒輪型僵硬 (cogwheel rigidity) ③去皮質型僵硬 (decorticate rigidity) ④去大腦型僵硬 (decerebrate rigidity)
(A)①③ (B)①② (C)②④ (D)③④
- 9 下列何者非慢性肺阻塞的伴生症狀？
(A)進食困難 (B)憂鬱 (C)感覺異常 (D)體重增加
- 10 有關慢性肺阻塞患者的日常活動原則，何者不正確？
(A)出力時或將東西推離身體時配合吐氣
(B)活動時若血氧濃度低於 90% 時，才需考慮使用氧氣
(C)避免手臂近端懸空 (shoulder holding) 的姿勢下工作
(D)室內溼度高有助氧氣溶於肺泡，進而增加活動耐力
- 11 下列何者可在坐姿下，測得 G 級肌力？①肩關節屈曲 ②膝關節屈曲 ③髖關節外展 ④肩胛上提 (scapular elevation)
(A)①③ (B)②④ (C)①④ (D)③④
- 12 下列何種情況可施行徒手肌力檢查？
(A)疼痛 (B)發炎
(C)骨折未癒 (D)肌肉痙攣但具自主控制動作

- 13 有關徒手肌力檢查的注意事項，下列敘述何者正確？
(A)姿勢不會影響測試結果 (B)應先確知欲測試之關節活動度大小
(C)無需考慮性別因素 (D)為一標準化肌力測試
- 14 關於中風病患的上肢處理，何者正確？
(A)使用滑車（overhead pulley）系統將患側手臂被動地高舉過頭，以保持關節活動度
(B)有肩胛（scapula）動作障礙的個案可自行以好手帶患手舉高過頭
(C)肩關節半脫垂者使用肩吊帶（shoulder sling）可有效使肱骨頭（humeral head）復位
(D)侷限誘發治療（constraint-induced therapy）可改善患側習得失用（learned nonuse）的情況
- 15 有關正常人的頸關節活動度敘述，下列何者正確？
(A)頸部屈曲活動度大於頸部背伸活動度約 15 度
(B)頸部轉動活動度小於頸部背伸活動度
(C)頸部側彎活動度遠小於頸部屈曲活動度
(D)頸部轉動活動度大於頸部屈曲活動度
- 16 下列何者姿勢較能有效控制呼吸困難（dyspnea）？①採直立坐姿 ②雙腳伸直 ③採半平躺姿勢
④雙膝彎曲約 45 度
(A)①④ (B)②③ (C)①② (D)③④
- 17 有關 EADL（electronic aids to daily living）的敘述，下列何者正確？
(A)為 ADL 評估的必要項目之一
(B)主要歸在 BADL 的活動項目內
(C)電源開關（power switching）控制是最簡單的 EADL 控制設計
(D)與 IADL 相關性甚少
- 18 下列關於①復健科技（rehabilitation technology） ②輔助科技（assistive technology） ③萬用設計（universal design）之敘述，何者正確？
(A)②常應用在醫院臨床為主 (B)③若普及則②之使用將可降低
(C)①應用在居家為主 (D)①與②名詞同義，可交替使用
- 19 有關教導日常生活技巧所用的倒序連鎖教導方式（backward chaining），下列陳述何者不正確？
(A)治療師的協助將逐漸減少 (B)由活動的最後一個步驟開始教起
(C)病人容易成功而有完成感 (D)不適合用在腦傷病人
- 20 手部燒燙傷的處理，何者為是？
(A)掌面燒傷者掌指關節（MP joint）應擺位於略微過度伸展（slight hyperextension）姿勢
(B)手背燒傷者指間關節（IP joint）應擺位於微曲（slight flexion）姿勢
(C)掌面燒傷者須防止天鵝頸病變（swan neck deformity）產生
(D)第一指間隙（web space）燒傷者拇指擺位於橈側外展（radial abduction），可促進對掌（opposition）功能
- 21 下列何者不屬胰島素相關症狀（insulin-related illnesses）反應？
(A)瞬間發作 (B)嘔吐 (C)饑餓 (D)皮膚蒼白及濕潤
- 22 布朗斯壯（Brunnstrom）認為上肢屈曲協同最弱的動作為下列何者？
(A)手肘屈曲 (B)前臂旋上 (C)肩外展 (D)肩內轉
- 23 當病人手肘無法抗引力屈曲時，若需要以手就口（hand to mouth），最常出現的代償性動作為下列何者？
(A)手腕背伸 (B)手指屈曲 (C)肩關節外轉 (D)肩關節外展
- 24 當治療目標著重在評估及增強肌力、以及預防關節畸型時，最常被使用的治療模式為：
(A)復健治療模式 (B)生物力學模式 (C)神經發展治療模式 (D)動作控制模式
- 25 依以下何種職能表現的參考架構，職能治療師最常使用熱敷來減輕疼痛，增加軟組織柔軟度？
(A)目的性活動（purposeful activities） (B)附屬方法（adjunctive methods）
(C)使能活動（enabling activities） (D)職能活動（occupations）

- 26 有關創傷性腦傷個案躁動期處理的技巧，何者不正確？
(A)避免回應個案不適當的怪異言語
(B)活動中若出現躁動的現象，應及時更換活動
(C)治療時將束縛帶或約束行動的器具拿掉
(D)以精細動作活動（fine motor activity）協助個案安靜
- 27 下列何者不屬職能表現情境（occupational performance contexts）因素？
(A)年齡 (B)教育程度 (C)信仰 (D)疾病診斷
- 28 依 Fleming 所提，職能治療師對於「自己將如何與病人溝通？」的思考路徑是屬那類問題？
(A)程序問題（procedural questions） (B)交互互動問題（interactive questions）
(C)條件問題（conditional questions） (D)敘事問題（narrative questions）
- 29 ①查閱病歷（chart review） ②會談（interview） ③觀察（observation） ④家訪（home visiting）。下列何者是職能治療師於急性醫院裡最常用的評估方式？
(A)①③④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①②④
- 30 有關執行功能（executive functions）異常之腦傷病人，下列敘述何者不正確？
(A)導致病人行為及人格可能改變
(B)常因大腦額葉功能受損時出現
(C)會伴隨記憶能力缺損
(D)病人常因執行功能異常而不敢嘗試能力內的事務
- 31 進行阻力等長式運動時，當給予阻力時，病人需持續肌肉收縮約多久？
(A) 2~3 秒 (B) 5~6 秒 (C) 10~15 秒 (D) 20~30 秒
- 32 為使熱療能達到最佳效果，熱療時應將欲處置之軟組織溫度提升至幾度？
(A) 105~113°F (B) 80~95°F (C) 93~100°F (D) 115~120°F
- 33 關於全膝關節置換（total knee replacement），何者為非？
(A)臥床時以仰躺為最佳姿勢
(B)若需側躺，避免躺於開刀側肢體
(C)以骨泥固定的人工關節（cemented prosthesis）可較早開始承重
(D)膝關節屈曲須完全禁止
- 34 全髖關節置換（total hip replacement）的個案應避免以下何種動作？
(A)在可忍受的範圍內，以開刀側肢體側躺 (B)坐輪椅時將患側腿抬高
(C)坐椅子前緣，身體向後斜靠椅背 (D)雙手撐椅子扶手，腳向前滑出站起
- 35 關於多發性硬化症（multiple sclerosis）的疲倦症狀，何者錯誤？
(A)導致失能的主要原因之一 (B)可以是原發性或睡眠品質不佳造成的
(C)早晨症狀最明顯 (D)體溫升高會加重疲倦程度
- 36 以下那一個手功能測驗的內容是模擬日常生活中的活動？
(A) Jebsen Test of Hand Function (B) Box and Block Test
(C) Purdue Pegboard Test (D) Nine-Hole Peg Test
- 37 以神經發展治療方法而言，下列何者不是常用的肌肉張力正常化的技巧？
(A)患側承重（weight bearing） (B)軀幹重複轉動
(C)適當的患側擺位 (D)提供阻力動作
- 38 拇指長時間反覆按電腦空白鍵（space bar）和郵件分類動作易造成何種共同的過度使用傷害？
(A) carpal tunnel syndrome (B) de Quervain's disease
(C) Guyon tunnel syndrome (D) thoracic outlet syndrome
- 39 脊髓損傷患者要獲得最好的肌腱動作（tenodesis）需強化以下那塊（群）肌肉？
(A)二頭肌（biceps） (B)三頭肌（triceps）
(C)屈指長肌（long finger flexors） (D)伸腕肌群（wrist extensors）
- 40 吃東西時舌頭反覆蠕動而食物一直被推出嘴巴，最有可能是：
(A)口部感覺異常 (B)舌頭直伸張力高（tongue thrust）
(C)往上頂能力差（poor elevation） (D)肌肉張力低（decreased tone）
- 41 下肢膝上截肢的病人應避免將患側長期擺在那種姿勢？①髖關節屈曲 ②髖關節外展 ③髖關節內轉 ④髖關節內縮
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④

- 42 若脊髓損傷患者其手指能主動屈曲，但抓握能力及精細動作都不佳，最有可能的損傷層級為：
(A) C1-3 (B) C5 (C) C7 (D) T2
- 43 何者不是帕金森氏症（Parkinson's disease）與阿茲海默症（Alzheimer's disease）共有的典型症狀？
(A)憂鬱（depression） (B)譫妄（delirium） (C)視知覺障礙 (D)平衡困難
- 44 關於帕金森氏症（Parkinson's disease）的介入，何者不正確？
(A)以搖晃動作（rocking motion）克服啟動困難（akinesia）
(B)末期個案最適合使用語音啟動的環境控制系統
(C)增加姿勢彈性的運動（postural flexibility exercise）應強調軀體伸展
(D)利用有節奏的聽覺刺激改善步伐長度（stride length）及行走速度
- 45 關於脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis），何者正確？
(A)只影響上運動神經元 (B)大多於二十幾歲發病
(C)合併感覺及認知功能異常 (D)可能出現吞嚥功能障礙
- 46 關於以下疾病的處理，何者正確？
(A)後小兒麻痺症候群（postpolio syndrome）個案應避免過度強化肌力
(B)小兒麻痺症（poliomyelitis）個案須強調感覺功能的評估
(C)儘量於單一療程內完成重症肌無力（myasthenia gravis）個案所有肌肉的徒手肌力測量
(D)治療性運動可防止肌肉失養症（muscular dystrophy）個案肌肉持續的萎縮
- 47 有關創傷性腦傷的僵直症狀，何者正確？
(A)去大腦皮質僵直（decorticate rigidity）上肢呈現屈曲、內收及外旋姿勢
(B)出現去大腦皮質僵直（decorticate rigidity），其預後比去大腦僵直（decerebrate rigidity）差
(C)去大腦僵直是腦幹及錐體外路徑受損造成的
(D)通常脫離昏迷狀態後，僵直的程度會加重
- 48 下列何者不是 C4 脊髓損傷個案仍保有的功能？
(A)自行咳嗽 (B)自行吸氣
(C)轉頭 (D)提高肩胛（scapular elevation）
- 49 有關脊髓損傷的併發症（complications），何者不正確？
(A) C4-7 損傷的個案常伴有肩膀疼痛（shoulder pain）
(B)受傷後 24 到 72 小時內痙攣（spasticity）最嚴重，之後隨時間降低
(C)異位性骨質增生最常發生在髖關節及膝蓋
(D) T4-6 以上受傷者易發生自主神經反射失調（autonomic dysreflexia）
- 50 針對不同的心臟疾病患者之出院時的居家計畫（home program），何者不正確？
(A)開心手術（open heart surgery）之後的前幾個月，避免雙手同時抬舉或推拉東西
(B)心肌梗塞之後一至二個月內活動量限制於 2 至 4 METs 內
(C)充血性心臟衰竭（congestive heart failure）患者需特別強調工作簡化及能量節省原則
(D)放置心臟支架的患者的居家計畫應包括多樣性的有氧運動
- 51 有關感覺喪失（sensory loss）之敘述，下列何者不正確？
(A)與忽略症完全無關 (B)使用感覺喪失肢體參與活動的動機可能下降
(C)肢體協調能力下降 (D)感覺喪失肢體常有意外受傷的現象出現
- 52 下列有關徒手肌力檢查之敘述，何者正確？
(A)只能測得單一肌肉之肌力 (B)測量結果不受施測者影響
(C)該檢查之結果判定不參照常模 (D)該檢查結果可得知病人肌耐力
- 53 類風濕關節炎與退化性關節炎的比較，何者正確？
(A)皆有晨起關節僵硬（morning stiffness）現象 (B)類風濕關節炎主要侵襲軟骨
(C)退化性關節炎最常發生在頻繁使用的手指關節 (D)類風濕關節炎的關節腫脹是骨質增生的結果
- 54 以下防範創傷性腦傷者顱內壓（intracranial pressure）升高的床上擺位，何者正確？
(A)平躺下，頭部後傾約 30 度 (B)頸部稍微向後傾，以利靜脈回流
(C)避免頭轉向一側，致壓迫內頸靜脈 (D)避免側躺，但可趴睡（prone）
- 55 有關燒燙傷的早期處理，何者不正確？
(A)可以焦痂切除術（escharotomy）來改善肢體末端循環不良的問題
(B)體液補充（fluid resuscitation）量需考慮病患體重
(C)預防因大量失血引起的敗血性休克
(D)臉部燒傷者須懷疑併有吸入性灼傷（smoke inhalation），並照胸部 X 光

- 56 何者不是心臟病患運動不耐（exercise intolerance）的可能症狀？
 (A)過度的全身性疲倦
 (B)體溫驟升
 (C)在一至三天內不尋常的體重增加
 (D)傳至左半邊牙齦、下巴或耳朵的牽涉痛（referred pain）
- 57 下列何者係參據布朗斯壯（Brunnstrom）動作復原階段評估所發展而得？
 (A) The Functional Test for the Hemiplegic Upper Extremity
 (B) Fugl-Meyer Assessment
 (C) The Arm Motor Ability Test
 (D) The Motricity Index
- 58 有關正常肌肉張力的描述，下述何者不正確？
 (A)正常人之間肌肉張力大小略有不同
 (B)愛好運動者通常比不愛好運動者有較高的正常肌肉張力
 (C)正常肌肉張力可能會因年齡、性別、職業不同而有別
 (D)前庭系統功能與正常肌肉張力無關
- 59 有關肘關節屈肌之肌力為 F^+ 之敘述，下列何者正確？
 (A)該肌力不足以做出抗地心引力方向之動作
 (B)該肌力比 G 級肌力高
 (C)該肌力在抗地心引力下，可以使肘關節作完全可用活動度（available ROM）之動作
 (D)該肌力需在不抗地心引力姿勢下始能測得
- 60 以下何種疾病較不會影響呼吸功能？
 (A)小兒麻痺症（poliomyelitis）
 (B)重症肌無力（myasthenia gravis）
 (C)肌肉失養症（muscular dystrophy）
 (D)杭亨頓氏症（Huntington's disease）
- 61 關於下背痛的處理，何者錯誤？
 (A)抬重物時身體宜儘量靠近物體
 (B)冰敷與熱敷交替使用更能減輕疼痛
 (C)應坐重心較低的矮椅子以防失去平衡
 (D)急性疼痛期避免做運動
- 62 有關多發性硬化症（multiple sclerosis）的介入及預後，何者錯誤？
 (A)大多數個案最後都會嚴重失能（severely disabled）
 (B)抗痙攣的藥物可能加重疲倦
 (C)即使能獨立行走，可使用電動行動輔具以減少能量消耗
 (D)教導伸展運動可改善疼痛症狀
- 63 有關實體覺（stereognosis）的敘述，下列何者不正確？
 (A)可喻為「觸視」覺（seeing with the hands）
 (B)為觸覺（tactile）之高功能區辨與整合技巧
 (C)主屬大腦額葉功能
 (D)能否從口袋中正確挑出十元硬幣，與此功能有關
- 64 治療網球肘（lateral epicondylitis）時，若以帶子（strap）限制伸肌群過度出力收縮，可能引起什麼後遺症？
 (A)腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）
 (B)高爾夫球肘（medial epicondylitis）
 (C)扳機指（trigger finger）
 (D)橈隧道症候群（radial tunnel syndrome）
- 65 掌指關節（MCP joints）屈曲姿勢下被動將手指向尺側推，這是測此關節何構造的鬆緊或完整性？
 (A) A1 滑車（pulley）
 (B)腹側板（volar plate）
 (C)橈側副韌帶（radial collateral ligament）
 (D)屈指長肌（flexor digitorum longus）肌腱
- 66 主張反射性動作是自主性動作的前驅動作（precursors）者為何？①路得治療策略（Rood approach）
 ②布朗斯壯治療策略（Brunnstrom approach） ③本體神經肌肉誘發治療策略（proprioceptive neuromuscular facilitation approach） ④神經發展治療策略（neurodevelopmental treatment）
 (A)①②③④ (B)僅②③④ (C)僅①②③ (D)僅①②④
- 67 「腦死」指腦部何處遭受無法復原之損壞？
 (A)腦幹 (B)間腦 (C)大腦皮質 (D)錐體束

- 68 關於左側空間忽略症的遮蔽眼療法 (eye patching) 及其原理，下列何者正確？
(A) 調整視覺輸入型態來直接活化右腦，抑制左腦活動的療法，因需控制刺激輸入，且價格偏高，患者需經特別訓練，才能使用該療法
(B) 雙眼所接受的感覺輸入，除經內膝體 (medial geniculate nucleus) 傳至對側視覺皮質外，亦有部分刺激傳至同側大腦
(C) 分別遮蔽右眼的右半側及左眼的左半側，能完全阻斷進入左腦的視覺刺激，並增加右腦的活化程度
(D) 分別遮蔽雙眼右半側優於遮蔽右眼，因前者更能阻斷進入左腦的視覺刺激，降低左腦活化程度
- 69 基底核 (basal ganglia) 與小腦 (cerebellum) 受損後，其相關動作缺失為何？①休息性顫抖 (tremors at rest) ②意圖性顫抖 (intention tremors) ③測距不能 (dysmetria) ④運動過弱 (hypokinesia) ⑤動作失調症 (ataxia) ⑥舞蹈症 (chorea)
(A) 基底核受損：①④⑤；小腦受損：②③⑥ (B) 基底核受損：②④⑤；小腦受損：①③⑥
(C) 基底核受損：①④⑥；小腦受損：②③⑤ (D) 基底核受損：②③⑤；小腦受損：①④⑥
- 70 關於腦塑性 (plasticity) 的敘述，下列何者錯誤？
(A) 為腦傷復健成效之可能機制
(B) 涉及腦部結構及電生理上的改變 (anatomical and electrophysiological changes)
(C) 指凋亡的神經組織再生後，重新掌管原有功能
(D) 腦部受損後，可藉由功能重組，牽動未受損區域，形成新的神經連結
- 71 神經組織受損後，下列何種神經傳導物質過量釋出會造成神經毒性？
(A) dopamine (B) norepinephrine
(C) glutamate (D) γ -aminobutyric acid (GABA)
- 72 左、右大腦功能專擅之不同，下列敘述何者錯誤？
(A) 左大腦半球對動作順序性 (motor sequences) 具有專擅性，而右大腦半球則在動作維持 (motor sustainability) 上扮演主要角色
(B) 左大腦半球對開放式迴路系統 (open-loop system) 具有專擅性，而右大腦半球則在封閉式迴路系統 (closed-loop system) 上扮演主要角色
(C) 左大腦半球對於訊息整體性 (holistic manner) 的構築具有專擅性，而右大腦半球則在訊息細節 (details) 的分析扮演主要角色
(D) 左大腦半球對於語言的表達與接收 (expressive and receptive language) 具有專擅性，而右大腦對於非語言刺激 (non-verbal stimuli) 的處理上扮演主要角色
- 73 下列有關視知覺「腹流」與「背流」的敘述何者正確？①腹流涉及枕葉－顳葉路徑 ②腹流涉及臉孔辨識功能 ③背流涉及枕葉－頂葉路徑 ④背流涉及視覺空間定位功能 ⑤背流支援動作 (action) 之形成
(A) 僅①③ (B) 僅②④ (C) 僅①②③④ (D) ①②③④⑤
- 74 下列何者不符近代任務導向動作控制途徑 (contemporary task-oriented approach to motor control) 的主張？
(A) 腦傷後的動作復原無絕對固定的順序
(B) 神經系統的動作控制屬層級性控制 (hierarchical control)
(C) 任務要求 (task demands) 為影響動作行為的侷限因子 (constraint)
(D) 治療過程以個案特質為考量核心 (client-centered)
- 75 下列何者為分析動作品質 (movement quality) (如肢體位移的時空特性) 的生物力學儀器？
(A) kinematic analysis (B) kinetic analysis (C) EMG (D) goniometer
- 76 對於長期臥床或行動不便的中風患者，需注意其腿部溫度、顏色、血液循環等表徵，以偵防何種可能造成惡化、甚至死亡的問題？
(A) deep venous thrombosis (B) dehydration
(C) constipation (D) anaemia
- 77 承上題，下列何種方法較無法預防此種問題？
(A) 投以藥物 (B) 網綁彈性繃帶
(C) 早期從事適當的下肢活動 (D) 提供各種感覺刺激
- 78 利用肌電生物回饋法 (EMG biofeedback) 訓練肌肉力量較小的病人時，在初期為偵測到較廣的訊號，各電極貼片採何種貼法最適當？
(A) 面積小且靠近 (B) 面積小且分離 (C) 面積大且靠近 (D) 面積大且分離
- 79 下列何者為肌電圖 (electromyography) 所可測量的參數？
(A) 最大自主收縮量 (maximum voluntary contraction)
(B) 反應時間 (reaction time)
(C) 運動最高速度 (peak velocity)
(D) 神經傳導速度 (nerve conduction velocity)
- 80 重度腦傷後若瞳孔對光反射消失而持續放大，此可能涉及第幾對腦神經的功能異常？
(A) II 及 III (B) IV 及 VI (C) V 及 VII (D) IX 及 X