

94 年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題

代號：2110
頁次：7-1

類 科：物理治療師

科 目：復健學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何者為近數十年來腦性麻痺盛行率未明顯下降的最主要因素？
(A)高危險早產兒存活率提高 (B)新生兒照護技術的退步
(C)孕婦的產前檢查不確實 (D)出生率的降低
- 2 眼睛能自行張開、不能遵從命令、對痛刺激有縮手反應、無法發出任何聲音的腦傷病患，其 Glasgow 昏迷指數為何？
(A) E5V1M4 (B) E4V1M4 (C) E4V0M4 (D) E4V0M5
- 3 動脈血液氣體檢查 (arterial blood gas) 發現患者血中二氧化碳分壓 (PaCO_2) 為 28 mmHg，下列何者為最可能原因？
(A)仍屬正常
(B)肺部通氣不足 (hypoventilation)
(C)肺部過度通氣 (hyperventilation)
(D)肺泡換氣及血液灌流不均 (ventilation and perfusion inequality)
- 4 一位 21 歲男性腦傷病患，接受物理治療時常常無法安靜接受指導，也記不住 10 分鐘前教的動作，偶爾會發脾氣亂罵人。依據 Rancho Los Amigo 醫學中心提出的認知功能等級，此病患屬於第幾級？
(A) III (B) IV (C) V (D) VI
- 5 下列何者不屬於新生兒原始反射 (primitive reflex)？
(A)對稱性頸部張力反射 (symmetric tonic neck reflex)
(B)不對稱性頸部張力反射 (asymmetric tonic neck reflex)
(C)手掌抓握反射 (palmar grasp)
(D)降落傘反應 (parachute reaction)
- 6 一個月大的嬰兒，頭經常轉向右側，斜傾向左側，其左側胸鎖乳突肌可摸到硬塊，下列敘述何者錯誤？
(A)應為斜頸症 (B)應馬上轉診小兒外科開刀矯正
(C)可安排肌肉骨骼超音波檢查 (D)應安排物理治療
- 7 下列何者不是右大腦半球受傷最常見的機能障礙？
(A)視覺空間障礙 (visual-spatial disorder) (B)單側忽略 (one-side neglect)
(C)動作計畫功能障礙 (motor planning impairment) (D)言行反覆症 (perseveration)
- 8 有關中腦動脈梗塞患者運動功能的表現，下列敘述何者最正確？
(A)上肢功能通常比下肢好 (B)肩關節的功能通常比手指好
(C)踝關節的功能通常比膝關節好 (D)手指的機能通常最早恢復
- 9 關於老年人的生理變化，下列敘述何者錯誤？
(A)老年人體內脂肪比率下降，故易產生急性藥物副作用
(B)貧血在老年人較常見，常因為缺鐵或慢性疾病引起
(C)老年人下痢 (diarrhea) 常見的原因是長期便秘、藥物副作用、感染
(D)血液中的尿素氮 (BUN)、肌酸酐 (creatinine) 不是監測老年人腎功能變化敏感的指標
- 10 關於老年人的尿失禁，下列敘述何者錯誤？
(A)排尿紀錄 (voiding diary) 是了解老年人尿失禁原因簡單又有用的方法
(B)攝護腺肥大引起排尿不順，與尿失禁無關
(C)泌尿系統以外的疾病常是引起老年人尿失禁的原因，如便秘、腰椎狹窄、藥物等
(D)定時排尿 (timed voiding) 是解決許多老年人尿失禁的有效方法

- 11 關於老年人跌倒的問題，下列敘述何者錯誤？
(A)姿勢性低血壓、藥物副作用、視力缺損、下肢無力都是造成老年人跌倒的原因
(B)運動（如太極拳）可以預防跌倒
(C)安全的環境是預防老年人跌倒重要的一環
(D)大部分老年人跌倒會造成股骨骨折
- 12 心電圖上的 QRS 波代表下列何種生理現象？
(A)心房去極化 (B)心室收縮 (C)心室再極化 (D)心房到心室的傳導
- 13 有關術後立即裝配義肢（immediate post-surgical prosthesis fitting）的描述，下列何者錯誤？
(A)可減少術後疼痛 (B)術後第二天便可站立
(C)最適合外傷病人 (D)對病人心理有助益
- 14 關於老化現象，下列敘述何者錯誤？
(A)老化不是一種疾病，但對疾病及傷害的敏感性增加
(B)不同的器官系統，老化的速度不一
(C)老化使維持體內恆定（internal homeostasis）的功能降低
(D)牽涉多個器官系統的功能（如跑步），因為相互之間的代償，比單一器官所執行的功能，受老化影響小
- 15 下列有關脊膜脊髓膨出（meningomyelocele）患者的敘述，何者錯誤？
(A)屬於神經管缺陷（neural tube defect）
(B)常合併 Chiari type I malformation
(C)常合併大小便失禁
(D)懷孕時，母親血液 alpha-fetoprotein 值及超音波檢查有助於早期診斷
- 16 以肉毒桿菌毒素治療肌肉痙攣，下列敘述何者錯誤？
(A)具有永久性的療效
(B)為局部性的治療方式
(C)可能產生抗體，影響療效
(D)施打技術較酚劑（phenol）神經阻斷術簡單
- 17 一位腦性麻痺患童不需要輔具就可以行走，但無法走得很遠。以 Gross Motor Function Classification System 分類，是屬於：
(A) level I (B) level II (C) level III (D) level IV
- 18 有關生產過程中發生的臂神經叢傷害（traumatic obstetric brachial plexopathy），下列何者錯誤？
(A)多屬於 axonotmesis 的神經傷害
(B)常發生於產程困難及胎兒過大的狀況
(C)絕大多數功能恢復不錯
(D)以 Erb's palsy 為最常見
- 19 關於頸椎退化性病變（cervical spondylosis），下列敘述何者錯誤？
(A)病患可能有頸部疼痛、上肢疼痛、頸椎壓迫等症狀
(B)退化主要影響椎間盤，較少影響其他骨關節
(C)頸椎第五到第七節常受影響
(D)X 光檢查有退化性變化者，往往沒有症狀
- 20 下列有關第二型脊髓肌肉萎縮症（spinal muscle atrophy type II）的敘述，何者錯誤？
(A)患者有明顯肌肉張力過低 (B)動作發展遲緩
(C)肢體感覺正常 (D)肌肉酵素值很高
- 21 胸腔復健中常教導患者的腹式呼吸法，下列敘述何者最正確？
(A)呼氣時腹部凸起 (B)以口緩緩吸氣
(C)吸氣時胸部膨脹 (D)吸氣及吐氣時間比為 1：2
- 22 有關裘馨氏肌肉萎縮症（Duchenne muscular dystrophy）的敘述，何者錯誤？
(A)屬於性聯遺傳 (B)最先影響遠端肌肉群的力量
(C)小腿有假性肥大（pseudohypertrophy）現象 (D)肌肉酵素值很高

- 23 下列何者不是有氧運動的一般原則？
(A)採小肌肉群運動 (B)運動前暖身 5~10 分鐘
(C)每次達運動目標心跳時，維持 20~30 分鐘 (D)運動後需做 5~10 分鐘緩和運動
- 24 早產兒長時間使用高濃度的氧氣治療「呼吸窘迫症候群」時，最易產生下列何種合併症？
(A)肺纖維化 (B)視網膜病變 (C)肺泡塌陷 (D)腦內出血
- 25 進行痰液的姿勢引流 (postural drainage) 時，患者採平躺 (supine)，下肢抬高約 35 度，此時是引流下列何肺葉之蓄痰？
(A)上葉 (B)下葉 (C)下葉外側基支 (D)下葉前側基支
- 26 在小兒麻痺後症候群 (post-polio syndrome) 的患者，下列何者為最適合的運動？
(A)長跑 (B)游泳 (C)重量訓練 (D)爬樓梯
- 27 下列那一種情況，患者不適合接受叩擊 (percussion) 的治療？
(A)血小板只有 80000 每立方毫米 (B)慢性心臟衰竭
(C)穩定性心肌梗塞 (D)急性肺栓塞
- 28 40 歲男性，休息時心跳為 80 beat / min，則其心跳儲存量 (heart rate reserve) 為多少 beat / min？
(A) 80 (B) 90 (C) 100 (D) 110
- 29 截肢後立刻給予石膏型義肢，下列何者不是它的優點？
(A)減少感染 (B)減少水腫 (C)減少疼痛 (D)增加組織癒合
- 30 以單側膝上義肢步行，比正常雙腿走路大約要增加多少%耗能？
(A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 60
- 31 罹患下肢缺陷的孩童，何時開始應裝上義肢？
(A) 10~18 個月 (B) 3~4 歲 (C) 6~7 歲 (D) 13~14 歲
- 32 心肌梗塞患者，發病後第三天，無胸痛，血壓及心跳正常，仍然不適合下列何種動作？
(A)刷牙 (B)梳頭 (C)爬樓梯 (D)洗臉
- 33 乳癌病人接受「改良式根除性乳房切除術」(modified radical mastectomy) 後，一個月內最常發生那種現象？
(A)肩部僵硬，前屈 (flexion) 及外展 (abduction) 關節活動度受限
(B)手術側上肢淋巴水腫
(C)手術側上肢萎縮無力
(D)肩部後展 (extension) 及內收 (adduction) 關節活動度受限
- 34 下列有關癌症復健的敘述，何者錯誤？
(A)復健治療可以增進癌症病人的生活品質
(B)癌症復健是以支持性或緩和性治療為主，目的為減少病人的疼痛
(C)復健治療可以增進癌症病人的日常生活功能
(D)癌症病人若早期接受復健治療，會有較佳的功能預後
- 35 下列關於運動時能量來源之敘述，何者錯誤？
(A)運動時能量來源可分為「有氧」及「無氧」兩個系統
(B)ATP-PC (phosphocreatine) 系統提供能源的速度最快，但無法持久
(C)肝醣水解 (glycolysis) 提供的能源屬於「無氧」系統
(D)ATP-PC 系統提供的能源屬於「有氧」系統
- 36 下列關於有氧運動之敘述，何者最正確？
(A)有氧運動訓練可以增加個人之最大耗氧量 ($VO_2 \max$)
(B)有氧運動時主要的能量來源是身體內儲存的醣份
(C)跳高是屬於有氧運動的一種
(D)四百公尺賽跑是屬於有氧運動的一種

- 37 一短跑選手改練馬拉松長跑，數週後感覺小腿前側疼痛且逐漸加劇。理學檢查發現脛骨上三分之一處有壓痛及敲痛點，下肢肌力及膝關節活動度正常。小腿 X-光檢查無異狀，但骨骼掃描見到脛骨上三分之一處顏色異常，最可能的診斷是：
- (A)後脛骨肌腱炎 (posterior tibialis tendinitis)
 - (B)前脛骨肌腱炎 (anterior tibialis tendinitis)
 - (C)小腿間室症候群 (compartment syndrome)
 - (D)脛骨壓迫性骨折 (stress fracture)
- 38 下列關於運動傷害處理原則的敘述，何者錯誤？
- (A)控制疼痛及發炎反應為優先處理步驟
 - (B)應先做肌力強化運動，再開始做關節活動運動
 - (C)肌肉或肌腱受傷後造成的關節活動度受限，應先施行被動式關節活動運動
 - (D)職業運動員受傷後，仍然要盡量維持其心肺耐力
- 39 下列關於肌肉力量訓練 (strength training) 之敘述，何者錯誤？
- (A)等長 (isometric) 肌肉收縮包括向心 (concentric) 及離心 (eccentric) 收縮二種形式
 - (B)等長肌肉收縮時不會引起關節活動
 - (C)抬舉啞鈴主要屬於等張 (isotonic) 肌肉運動
 - (D)膝前十字韌帶斷裂，接受修補手術後，早期不直接接受膝部等速 (isokinetic) 肌力訓練
- 40 有關於大輪的位置及大小對輪椅使用的影響，下列敘述何者錯誤？
- (A)大輪往後移，穩定性越高
 - (B)大輪往後移，病患推動越容易
 - (C)大輪越大，病患推動需要力量越小
 - (D)大輪往後移，前方小輪 (front caster) 較易晃動 (flutter)
- 41 一年輕女性跑步及上、下樓梯時感覺前膝部酸痛，經診斷為「髕股骨疼痛症候群」 (patello-femoral pain syndrome)，下列復健原則，何者錯誤？
- (A)應加強膝部 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的伸展 (extension) 肌力
 - (B)應加強大腿後肌 (hamstrings) 的柔軟度
 - (C)應完全恢復髕骨的活動度 (full patellar mobility)
 - (D)應多做「完全蹲下、站起將膝部完全伸直」之運動，以增強肌力
- 42 下列何者不是急性運動傷害的處理原則？
- (A)絕對臥床休息，保護受傷部位
 - (B)在受傷處冰敷以減輕疼痛、腫脹
 - (C)用彈性繃帶壓迫患肢以減輕腫脹
 - (D)將患肢抬高以減輕腫脹
- 43 關於病患座位系統 (seating system) 的選用，下列敘述何者錯誤？
- (A)座位系統一般分為現成的 (off the shelf)、組裝式 (modular) 及定製式 (custom-molded)
 - (B)定製式座位系統減壓功能優良，且病患移位會更容易
 - (C)病患感覺系統正常與否是選用座位系統的重要考量
 - (D)可仰躺式 (recline) 輪椅及可後傾 (tilt in space) 輪椅可減少臀部壓力
- 44 下列何種病患的下肢會出現下運動神經元疾病徵象 (lower motor neuron signs) ？
- (A)胸椎第四節脊髓損傷
 - (B)中心脊髓症候群 (central cord syndrome)
 - (C)馬尾束症候群 (cauda equina syndrome)
 - (D) Brown-Sequard 症候群
- 45 依據國際脊髓損傷神經功能分類標準，C6 的指標肌肉 (key muscles) 為何？
- (A)肘屈肌群
 - (B)肘伸肌群
 - (C)腕屈肌群
 - (D)腕伸肌群

- 46 上肢肌力皆在 3 分以下，下肢指標肌肉中有四組肌力為 3 分、其餘肌力為 2 分的頸椎第五節骨折病患，其 ASIA Impairment Scale 為何？
(A) A (B) B (C) C (D) D
- 47 脊髓損傷患者發生自主神經異常反射（autonomic dysreflexia），下列何者為最常見原因？
(A)膀胱脹 (B)便秘 (C)褥瘡 (D)姿勢改變
- 48 脊髓損傷患者發生自主神經異常反射（autonomic dysreflexia）時，下列何者為第一優先的處置？
(A)給與降血壓藥 (B)平躺 (C)坐起 (D)檢查肚子
- 49 下列何者對脊髓損傷而言不是痙攣（spasticity）的好處？
(A)減少深部靜脈栓塞
(B)減少肌肉萎縮的程度
(C)對部分病患而言，伸肌張力有助於站立
(D)減少褥瘡的機會
- 50 對於脊髓損傷發生異位性骨化症的患者而言，何種運動最能減少併發症？
(A)被動關節運動 (B)上肢肌力訓練 (C)上肢肌耐力訓練 (D)吸肌訓練及擴胸運動
- 51 對於運動功能在 C7 的完全性脊髓損傷患者而言，下列目標何者最有困難？
(A)利用輔具自行進食 (B)利用輔具自行穿衣
(C)利用輔具自行導尿 (D)平面移位
- 52 下列何者是評估腦傷預後的最佳參考指標？
(A) Glasgow 昏迷指數
(B)病患年紀
(C)腦部電腦斷層
(D)創傷後失憶時間（post-traumatic amnesia duration）
- 53 早產兒合併的腦性麻痺，下列何種肢體障礙最多？
(A)痙攣型單邊癱瘓（spastic hemiplegia） (B)痙攣型雙邊癱瘓（spastic diplegia）
(C)痙攣型四肢癱瘓（spastic quadriplegia） (D)痙攣型單肢癱瘓（spastic monoplegia）
- 54 對於 T1 完全性脊髓損傷患者而言，下列目標何者最有困難？
(A)自行灌腸 (B)自行導尿
(C)戶外以輪椅代步 (D)室內利用長腿支架站立
- 55 對於常常躁動不安，而且失憶的腦傷病患，下列何種治療最不適當？
(A)盡量讓病患從事日常生活活動，接受各種刺激 (B)盡量不使用約束帶
(C)利用行為療法，減少病患的激動 (D)適當的藥物治療
- 56 下列對於持續植物人狀態（persistent vegetative state）的描述，何者錯誤？
(A)有睡－醒週期 (B)可以叫醒 (C)沒有語言能力 (D)沒有恢復意識的機會
- 57 關於嬰幼兒腦傷與成人腦傷的比較，下列敘述何者錯誤？
(A)嬰幼兒腦傷較不易出血 (B)嬰幼兒較易從昏迷中甦醒
(C)嬰幼兒腦傷的功能預後較成人好 (D)嬰幼兒腦傷患者需要更長時間的追蹤與評估
- 58 關於截肢，下列敘述何者錯誤？
(A)後天截肢遠比先天因素造成的截肢多
(B)下肢截肢多因為血管疾病，而糖尿病是重要的危險因子
(C)腫瘤、外傷造成的下肢截肢在年輕人較常見
(D)上肢截肢最常因腫瘤造成
- 59 關於截肢的後遺症，下列敘述何者錯誤？
(A)治療截肢前的肢體疼痛無法預防截肢後的幻肢痛（phantom limb pain）
(B)義肢承筒（socket）近端太緊，遠端與殘肢接觸不良，會造成水腫、水泡、色素沉澱甚至感染
(C)截肢後的神經瘤（neuroma）通常受到疤痕或外在壓迫才有症狀
(D)截肢後要慎防殘肢攣縮（contracture）

- 60 關於膝下截肢（transtibial amputation），下列敘述何者錯誤？
(A) 膕骨承重承筒（patellar tendon bearing socket）是膝下義肢的標準設計
(B) 膕骨肌腱（patellar tendon）、股骨髁（femoral condyle）、腓骨頭（fibular head）為可承重區
(C) 膕旁肌腱（hamstring tendon）、脛骨脊（tibial crest）不宜承重
(D) 可由襪套（socks）的數目來增加承筒和殘肢的密合度
- 61 下列何者不是腦傷病患發生異位性骨化症最常見的位置？
(A) 肘關節 (B) 肩關節 (C) 膝關節 (D) 踝關節
- 62 關於膝上截肢（transfemoral amputation），下列敘述何者錯誤？
(A) 多中心義膝（polycentric knee）優點是穩定性較好
(B) 氣壓或液壓義膝（pneumatic or hydraulic knee）適用於活動力不好的病患
(C) 固定式義膝（locking knee）適用於虛弱的患者
(D) 義足越前則義膝穩定性越好
- 63 關於手動式輪椅（manual wheelchair），下列敘述何者錯誤？
(A) 可折式（folding）輪椅推動起來較固定式（rigid）輪椅不耗能
(B) 氣壓輪胎（pneumatic tire）重量輕且抗震，缺點是較需維修
(C) 對於手功能不好的患者，可於手推環（push rims）上加裝突起物（projections）
(D) 扶手（armrest）常被病患用來輔助移位
- 64 關於電動輪椅（power wheelchair），下列敘述何者錯誤？
(A) 電動輪椅可以保護病患的上肢，避免像手動輪椅使用者，常造成上肢疼痛的問題
(B) 手動輪椅與電動輪椅不適用於同一病患
(C) 四肢癱瘓的患者可以使用口部的吸和吐（sip and puff）來控制電動輪椅
(D) 代步車（scooter）一般來說穩定性較電動輪椅差
- 65 關於殘障者的環境適應（environmental adaptation），下列敘述何者錯誤？
(A) 斜坡斜度最好不要大於 1:12（1 呎高度：12 呎坡長）
(B) 斜坡頂端有一空間供輪椅迴轉
(C) 殘障停車位要靠近房屋入口
(D) 門口處不要點燈，以節省電源
- 66 關於失能病患的進食，下列敘述何者錯誤？
(A) 進食要有足夠的上肢關節活動度、肌力、協調性
(B) 盤子下的防滑墊可幫助手功能不好的病患進食
(C) 餐具絕不可用輔具固定在病患手上，以免造成不便
(D) 上肢關節活動度不好的病患可以使用長吸管、長柄餐具
- 67 關於失能病患的自我照顧，下列敘述何者錯誤？
(A) 手功能不好的病患，最好穿緊身及少鈕釦的衣服
(B) 可使用 button aid 輔具幫忙扣鈕釦
(C) 可使用長柄鞋把子幫忙穿鞋
(D) 手功能不好的病患可使用有魔鬼氈作固定的衣服、鞋子
- 68 關於骨性關節炎，下列敘述何者錯誤？
(A) 是最常見的關節炎 (B) 老年人較常見
(C) 在男性的發生率較高 (D) 肥胖、骨關節外傷、過度使用都是危險因子
- 69 關於失能病患的日常生活，下列敘述何者錯誤？
(A) 感覺功能不好的病患，可每天用長柄鏡子檢查身體各處
(B) 手功能不好的病患可使用電動牙刷
(C) 浴室、廁所可加裝扶手，以方便虛弱失能的病患使用
(D) 馬桶座位通常要降低，以方便虛弱失能的病患使用
- 70 對於膝蓋骨性關節炎的治療，下列敘述何者錯誤？
(A) 減重
(B) 關節活動運動及股四頭肌（quadriceps）肌力訓練
(C) 鞋墊內側加高
(D) 於對側手拿手杖

- 71 關於類風濕性關節炎，下列敘述何者錯誤？
(A)常影響周邊關節與脊柱關節
(B)常伴有關節周圍骨質疏鬆的現象
(C)手部關節常有脫位、變形的情形，可用支架矯正
(D)關節炎常為對稱性分布
- 72 外側踝關節第二度扭傷（2nd degree sprain）後之復健原則，下列敘述何者錯誤？
(A)在能夠以正常步態行走前應使用拐杖，避免受傷下肢因承受體重而造成疼痛、腫脹
(B)應增強使踝關節穩定之肌肉力量
(C)應先以石膏將踝部固定三週，使韌帶癒合
(D)應加強踝關節的本體感覺訓練（proprioceptive training）
- 73 下列關於人類關節炎的敘述，何者錯誤？
(A)僵直性脊椎炎（ankylosing spondylitis）常侵犯薦髂關節（sacroiliac joint）與脊柱關節
(B)感染性關節炎多為對稱性分布
(C)痛風性關節炎常侵犯大腳趾
(D)全身性紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus）也會有關節炎的表現
- 74 下列有關腦中風之敘述，何者錯誤？
(A)大部分急性腦中風的死亡發生在第一個月
(B)腦出血的早期死亡率較腦梗塞高
(C)高血壓的控制可能是造成近來腦中風發生率降低的原因
(D)腦中風後前幾天的死亡，主要是因為肺炎
- 75 有關腦中風的危險因子，下列敘述何者錯誤？
(A)高血壓增加梗塞性及出血性中風的危險
(B)慢性心房顫動（atrial fibrillation）的病患，可能要以口服抗凝血劑或阿斯匹靈來預防中風
(C)戒菸無法降低腦中風及心肌梗塞的危險
(D)研究發現同半胱胺酸血症（homocysteinemia）會增加中風的危險
- 76 關於中大腦動脈（middle cerebral artery）梗塞，下列敘述何者錯誤？
(A)在急性期，眼睛會偏向病灶側
(B)會有對側肢體無力，同側感覺異常
(C)左大腦病灶常引起失語症（aphasia）
(D)右大腦病灶會引起忽視症候群（neglect syndrome）
- 77 關於年輕人發生的腦中風，下列敘述何者錯誤？
(A)整脊（chiropractice）跟中風完全無關
(B)蛋白 C 或 S 缺乏（protein C or S deficiency）為造成中風的凝血異常因素
(C)自體免疫疾病是造成年輕人腦中風的原因之一
(D)藥物如口服避孕藥是年輕人腦中風的危險因子之一
- 78 關於失語症（aphasia），下列敘述何者錯誤？
(A) Broca aphasia 通常表現為說話不流利（non-fluent），但理解能力還好
(B) Wernicke aphasia 通常表現為說話流利，但理解能力很差
(C)經皮層失語症（transcortical aphasia）的複述能力（repetition）很差
(D)失語症要與口齒不清（dysarthria）分別，兩者病灶部位不同
- 79 關於腦中風的併發症，下列敘述何者錯誤？
(A)應藉由適當的擺位來預防肩關節脫位引起的疼痛
(B)早期反射性交感失養症（reflex sympathetic dystrophy），可給予類固醇治療
(C)吸入性肺炎及尿路感染是腦中風早期常見的併發症
(D)病患經診斷有靜脈栓塞（deep vein thrombosis），應鼓勵其下床多活動，以促進血液循環
- 80 用言語所測得智商主要是代表下列何部分的功能？
(A)右大腦半球 (B)左大腦半球 (C)腦幹 (D)小腦