


1. 治療師依照王小姐脊髓損傷的狀況所造成的日常活動、工作、休閒上之障礙，並依此來擬定職能治療的介入方式，是依據下列那一種臨床推理過程？
 - A. <正確答案> 科學的（scientific）推理過程
 - B. 故事的（narrative）推理過程
 - C. 實用主義的（pragmatic）推理過程
 - D. 倫理的（ethical）推理過程
2. 某病人肘部（elbow）之被動關節幅度（PROM）檢查結果的紀錄是「20—140 度」，表示：
 - A. 正常幅度（normal range）
 - B. 肘彎曲之限制（flexion limitation）為 20 度
 - C. <正確答案> 肘伸直之限制（extension limitation）為 20 度
 - D. 肘伸直之幅度（extension range）為 140 度
3. 小明接電話時常以「喂，找誰」開始對話，其可能在那一個職能要素出了問題？
 - A. 自我表達
 - B. 問題解決
 - C. <正確答案> 社會行為
 - D. 調適技能
4. 要個案做出撥電話的動作，是在評量下列那一類動作計畫能力？
 - A. 近端及物性動作（proximal transitive）
 - B. 近端非及物性動作（proximal intransitive）
 - C. <正確答案> 遠端及物性動作（distal transitive）
 - D. 遠端非及物性動作（distal intransitive）
5. 治療師觀察到淑美可以停下手邊工作去接電話，表示淑美具備有下列那一種能力？
 - A. 覺察性注意力
 - B. 選擇性注意力
 - C. 持續性注意力
 - D. <正確答案> 注意力移轉
6. 有關疼痛的評估，下列敘述何者錯誤？
 - A. 疼痛的感受是很主觀的，每個人的感受是有差異的

- B.疼痛多以 self-report 方式評估
- C.<正確答案> Numeric Pain Intensity Scale 是以 0－5 分作為自我評估的打分
- D.Visual Analog Scale 是在 10 公分直線上標記疼痛強度的位置
- 7.日常活動評估時，治療師常會評估病患所需要的協助，下列那一種協助屬於「身體協助（physical assistance）」？
- A.<正確答案> Physical guidance
- B.Standby assistance
- C.Activity setup
- D.Nonverbal assistance
- 8.要了解個案的職能剖析（occupational profile），需要收集下列那些資訊？①生活型態 ②居家環境 ③身體功能 ④職能發展史 ⑤興趣價值觀 ⑥社會參與度
- A.①②④
- B.<正確答案> ①④⑤
- C.②③⑥
- D.③⑤⑥
- 9.在 Brunnstrom 所提出之動作恢復階段中，當病人的手臂能側平舉，且手肘打直時能做旋前和旋後動作，表示病人上肢動作至少恢復到：
- A.階段 3
- B.階段 4
- C.<正確答案> 階段 5
- D.階段 6
- 10.家長敘述個案在家裡與學校常粗心犯錯、常忘記老師指定的家庭作業、常弄丟文具或玩具、不遵守輪流規則、常插話、在座位上經常翻動鉛筆盒與書本、手敲桌子、課堂上的美勞作品也草率完成，可建議此個案接受那一類疾病的鑑定？
- A.學習疾患（LD）
- B.廣泛性發展疾患（PDD）
- C.<正確答案> 注意力缺失過動疾患（ADHD）
- D.抽動疾患（tic disorders）
- 11.下列何者為評估手部關節活動度的工具？
- A.<正確答案> 量角器（goniometer）
- B.握力器（dynamometer）
- C.指力器（pinchmeter）

D. 量筒 (volumometer)

12. 如圖所示，應該是那條神經受傷？



A. 正中神經

B. 尺神經

C. <正確答案> 橈神經

D. 腓神經

13. 下列何者是採用從上而下 (top-down approach) 的評估方式時，最先開始評估的項目？

A. 肌肉張力

B. 感覺功能

C. <正確答案> 職能表現

D. 認知程度

14. 下列何種情況不適合轉介做職業輔導評量？

A. 身心障礙者在庇護工場中已經工作兩年，就業服務人員不知道此位身心障礙者是否應該繼續留在此庇護工場

B. <正確答案> 無法確認身心障礙者的聽力損失程度

C. 無法確認身心障礙者的問題工作行為

D. 無法確認身心障礙者執行某項工作的工作技能

15. 在人類職能模式 (MOHO) 中，評估個案是否瞭解本身的能力與限制是屬於下列那一個概念的範疇？

A. 價值 (values)

B. 技巧 (skills)

C.<正確答案> 個人因果關係 (personal causation)

D.角色 (roles)

16.關於運用發展學的參考架構來評估個案，下列敘述何者錯誤？

A.年齡用來做為發展任務的原則

B.<正確答案> 每位成年人的發展階段已達成熟

C.疾病影響正常的發展

D.失能視為未發展出和年齡相符的技巧

17.Allen 採用縫製皮革測驗，這是屬於何種評估方法？

A.團體測驗

B.標準化測驗

C.<正確答案> 模擬工作測驗

D.觀察法

18.治療師進行初步評估時，下列何項不是最主要的目的？

A.<正確答案> 說明治療目標

B.進行資料收集

C.確認功能分析

D.建立信賴關係

19.第六頸髓以下（包括第六）完全損傷的脊髓損傷個案，沒有輔具幫忙下可以自行完成那個動作？

A.<正確答案> 聳肩

B.伸手拿桌上的橘子

C.翹起大拇指

D.用手拿鑰匙開門

20.下列有關評估工具與其所評估的功能之配對，何者正確？

A.感覺組織測驗－感覺功能

B.功能性伸手測驗－上肢關節活動度

C.<正確答案> 箱子與積木測驗－手部精細動作協調性

D.米勒學齡前幼兒評估－手部精細動作協調性

21.根據美國勞工部對工作之生理需求的分級（physical demand levels），34%至 66%的工作時間需負重 20 磅的工作，其等級為：

A.輕度（light）

經試題疑義會議決議，本題更正答案為B或C。

- B. <正確答案> 中度 (medium)
- C. 重度 (heavy)
- D. 極重度 (very heavy)
22. 下列有關肌肉張力的敘述，何者正確？
- A. 肌肉僵直 (rigidity) 好發於錐體系統受損的個案，如巴金森氏症
- B. 下運動神經元 (lower motor neuron) 受損時，個案容易出現肌肉痙攣 (spasticity) 的情形
- C. <正確答案> 上運動神經元 (upper motor neuron) 受損時，個案容易出現肌肉痙攣 (spasticity) 情形
- D. 肌肉僵直與肌肉痙攣 (spasticity) 不會同時存在於同一肌群中
23. 下列有關「記憶」的敘述，何者正確？
- A. 忘記 30 分鐘前的對話，代表立即記憶 (immediate memory) 有問題
- B. 一般認為記憶產生的步驟依序為：編碼 (encoding)、想起 (retrieval)、儲存 (storage)
- C. <正確答案> 知道如何騎腳踏車代表程序記憶 (procedural memory) 沒有問題
- D. 給個案 10 張照片，之後希望他從 20 張照片中找出原本的 10 張，此種方法稱為暗示回想 (cued recall)
24. 當病歷上紀錄大華的 Global Assessment of Functioning Scale 得分為 55，表示什麼意思？
- A. 大華的行為嚴重受到妄想和幻聽的影響
- B. 大華可能有自殺意念或無法繼續工作
- C. <正確答案> 大華可能出現平坦的情緒和不著邊際的言語
- D. 大華的症狀是受到心理壓力源的影響而產生
25. 在團體活動中，有位病人把成員當作是他的聽眾，一直談論非團體導向的議題、感覺或意識型態等，是符合下列何種「個人角色」？
- A. 阻擋者 (blocker)
- B. 尋求認可者 (recognition-seeker)
- C. <正確答案> 自白者 (self-confessor)
- D. 支配者 (dominator)
26. 根據 Hocking (2001) 的職能分類，下列何項與個案所從事之職能活動 (occupation) 的「意義 (meaning)」有關，不是與其功能或形式有關？
- A. 在什麼場所可以觀察到個案的職能活動
- B. 什麼時間可以觀察到個案的職能活動
- C. <正確答案> 那些範疇的職能活動是個案所勝任的

D.個案的優缺點

27.根據皮膚知覺神經根分布圖（dermatome），下列那一條神經在體表皮膚沒有支配區？

A.<正確答案> C1

B.T1

C.L1

D.S1

28.如照片所示，下列敘述何者錯誤？



A.稱為 Genu valgum

B.一般俗稱是 X 形腿或 knock legs

C.<正確答案> 常會出現踮腳尖走路（tiptoe walking）

D.可以測量兩腳內踝間距（intermalleolar distance）來看嚴重程度

29. 如照片所示，下列敘述何者錯誤？



- A. **<正確答案>** 稱為 clubfoot
- B. 一般俗稱是扁平足
- C. Pronated foot 亦屬之
- D. 足底韌帶過鬆會造成這種現象
30. 下列有關日常生活活動的評量工具中，何者將「異常的行為」列入考慮？
- A. 功能性獨立評量（Functional Independence Measure）
- B. **<正確答案>** 生活常規任務調查表（Routine Task Inventory）
- C. 加拿大職能表現測量（Canadian Occupational Performance Measure）
- D. 巴氏量表（Barthel Index）
31. 治療師記載病歷時，須儘量將格式統一（如：條列式或描述段落式），是符合下列何項溝通的準則？
- A. 讀者的知識程度（knowledge of the reader）
- B. 清楚明晰（clarity）
- C. 完整（completeness）
- D. **<正確答案>** 連貫（consecutiveness）
32. 徒手肌力測驗（Manual muscle test）不適用於下列何種個案？
- A. 格巴二氏症候群（Guillain-Barré syndrome）
- B. **<正確答案>** 巴金森氏症
- C. 關節炎

- D. 燒燙傷
33. 下列何種參考架構強調兒童在坐、爬、站、走之各式靜、動態姿勢控制下之重心與平衡之維持？
- A. Acquisitional
- B. SI
- C. <正確答案> Biomechanical
- D. Occupational
34. 下列何者在人類發展過程中，最不會影響個人健康的生活型態及日常生活？
- A. 生病
- B. 配偶或親人去世
- C. <正確答案> 正常老化過程
- D. 殘障
35. 「MET」是代表參與活動所需的心肺耐力單位，1 MET 相當於下列何者？
- A. <正確答案> 每分鐘每公斤體重攝氧量 3.5 毫升
- B. 每秒鐘每公斤體重攝氧量 3.5 毫升
- C. 每分鐘每公斤體重攝氧量 35 毫升
- D. 每秒鐘每公斤體重攝氧量 35 毫升
36. 下列何者為測量肌力強度（muscle strength）的方法？
- A. Tinel Test
- B. <正確答案> Manual Muscle Testing
- C. Moberg Pick-up Test
- D. Finkelstein's Test
37. 當職能治療師接到腦中風個案，決定先評估其姿勢和動作能力時，表示治療師最有可能是採用下列何種介入模式？
- A. 復健
- B. <正確答案> 動作控制
- C. 感覺再教育
- D. 心理分析
38. 下列何項反應不屬於中腦階層（midbrain level）的反應？
- A. neck righting
- B. <正確答案> optic righting
- C. labyrinthine righting acting on head

- D. body righting on body
39. 病患無法分辨水龍頭向那邊轉是熱水，那邊是冷水，病患請了水電工將家中的水龍頭都裝上冷熱水混合閥，病患是運用下列那一種過程技巧（process skills）？
- A. 適應（accommodates）
- B. <正確答案> 調整（adjusts）
- C. 利益（benefits）
- D. 注意／反應（notices/responds）
40. 當個案無法完成複雜的煮飯活動，治療師利用 multicontext approach 的觀點，分析煮飯活動由簡而繁的運動模式。此時治療師是採用那一種活動分析？
- A. 以活動爲主的活動分析
- B. <正確答案> 以理論爲中心的活動分析
- C. 以職能爲基礎的活動分析
- D. 以問題爲導向的活動分析
41. 下列何種活動對風濕性關節炎（RA）是需要避免的？
- A. 利用長柄夾取物
- B. <正確答案> 用手旋緊水龍頭
- C. 倒水入杯時水壺不提離桌面
- D. 暖身操
42. 爲脊髓損傷病人進行活動分析（activity analysis）時，有關活動的表現要素（performance components）中，何者不屬於知覺處理（perceptual processing）之範圍？
- A. 物體辨識（stereognosis）
- B. 肌動覺（kinesthesia）
- C. <正確答案> 視力（visual acuity）
- D. 左右分辨（right-left discrimination）
43. 爲脊髓損傷病人進行活動分析（Activity analysis）時，有關活動的表現環境（performance contexts）中，下列那一項與時間方面（temporal aspects）無關？
- A. 生命週期（Life cycle）
- B. <正確答案> 文化的（Cultural）
- C. 時間的（Chronological）
- D. 發展的（Developmental）
44. 有關射飛鏢活動之分析，下列敘述何者錯誤？
- A. 需要有 palmar pinch 的能力

B. Shoulder girdle 是維持動作穩定的基礎

C. <正確答案> Biceps 是射出飛鏢的重要動力來源

D. 需要 eye-hand coordination

45. 在本體神經肌肉誘發術（PNF）的治療原理中，下列何項因素可促進動作的學習？

A. 刺激強度，刺激的頻率

B. 活動的難易度，刺激強度

C. 活動的難易度，活動的重複性

D. <正確答案> 刺激頻率，活動的重複性

46. 當治療師面對一個注意力不集中的個案時，將原本 10 個步驟的活動簡化為 5 個步驟讓個案完成，此時治療師正運用何種理念？

A. 人體工學（ergonomics）

B. 輔助技術（assistive technology）

C. 環境調整（environmental modification）

D. <正確答案> 分級（grading）

47. 承擔重量（weight bearing）是常用於中風病人的臨床治療技術，下列相關敘述，何者正確？①可以壓抑（inhibit）高肌肉張力（high muscle tone） ②可以提昇（facilitate）低張力肌肉之張力 ③高張力（hypertonic）病人可使其患側在下側躺以承擔重量，可以降低其痙攣（spasticity） ④低張力（hypotonic）病人可使其患側在下側躺以承擔重量，可以改變其肌肉之拉張弱反射（minimize a stretch weakness of musculature）

A. <正確答案> ①②③④

B. 僅①②③

C. 僅①③

D. 僅②④

48. 依據 Tuckman（1965）分析出之團體發展階段，若團體成員有高度的凝聚力，當出現衝突時，可以公開討論並設法解決時，這種情形符合那項發展階段？

A. 衝突期（Conflict）

B. <正確答案> 表現期（Performing）

C. 規範期（Norming）

D. 控制期（Control）

49. 當感覺統合出現注意力集中、控制和自信、有抽象思考及推理能力時，是符合 Ayres 提出的那一個感覺統合層次？


A. 第三層

B. <正確答案> 第四層

C. 第五層

D. 第六層

50. 如圖所示，對結締組織（connective tissue）施予牽張力量（stress），受力（load）與組織形變（deformation）關係曲線應為何者？



A. 曲線 A（棕色線）

B. 曲線 B（藍色線）

C. <正確答案> 曲線 C（紅色線）

D. 曲線 D（綠色線）

51. 當我們治療嬰幼兒或青少年時，應把握下列那些基本原則？①提供 evidence-based 治療
②提升個案在職能方面的參與 ③提供 children-centered 或 adolescent-centered 的治療
④瞭解相關的法律規定及社會服務資源

A. ①②③④

B. <正確答案> ①②④

C. ②③④

D. ①③④

52. 美慧是一位 35 歲的已婚女性，罹患重症肌無力，需以輪椅代步。下列那一種方式是以角色勝任度作為治療目標的介入方式？

A. 教導她正確疾病概念

B. 教導她獨立穿衣盥洗

C. <正確答案> 教導她簡易餐點製作

D. 協助她連結社會資源

53. 下列那一項是針對一側肢體功能不足者的處理原則？
- A. 將屬於個案的物品，貼上標籤
 - B. 加強使用物品色彩的對比
 - C. <正確答案> 雙手操作的工作改為單手操作
 - D. 使用較重的器具
54. 下列那些治療目標是可測量的？①增加自信心 ②飲食均衡的營養 ③規劃並執行假日生活安排 ④對自己的行為負責
- A. ①②
 - B. <正確答案> ②③
 - C. ③④
 - D. ①④
55. 利用感覺輸入誘發動作反應是 Rood 採用的主要介入方式。下列何者屬於抑制的技巧？
- A. 快刷（fast brushing）
 - B. 快速拉張（quick stretch）
 - C. <正確答案> 慢慢轉動（slow rolling）
 - D. 冰（icing）
56. Yalom（1985）指出病人參加團體治療，其目的是為了改變一些問題行為，包括那幾項？
- A. 僅沈默或精神病態行為
 - B. 僅沈默、引人注意或精神病態行為
 - C. <正確答案> 獨佔、沈默、引人注意或精神病態行為
 - D. 焦慮、引人注意或沈默
57. 下列何種方法最不適合用來減輕水腫（edema）？
- A. 抬高（elevation）
 - B. 束壓（compression）
 - C. 主動關節活動（active ROM exercise）
 - D. <正確答案> 熱療（heat）
58. 治療師採用開放式問句較能達成有效的溝通。下列那些是開放式問句？①為什麼...？ ②你如何...？ ③你是否...？ ④你可以...？
- A. <正確答案> ①②
 - B. ①③④
 - C. ②③④

D. ①②③④

59. 以團體成員間的互動程度做為團體分類的基礎，是那一位學者所提出的主張？

A. <正確答案> 摩西（Mosey）

B. 艾倫（Allen）

C. 費得勒（Fidler）

D. 桃格莉雅（Toglia）

60. 髖關節置換 2 個月的個案，下列處置何者正確？

A. <正確答案> 睡覺時側躺，患側在下

B. 睡覺時側躺，患側在上

C. 坐姿時將患腳蹠於好腳之上

D. 撿地上的東西時應彎腰，避免彎膝蓋

61. 在玻巴斯（Bobath）技術中，肩胛前伸（scapular protraction）是用於：

A. 抑制上肢伸直痙攣

B. 誘發上肢屈肌收縮

C. <正確答案> 抑制上肢屈曲痙攣

D. 增進上肢穩定度

62. 根據玻巴斯（Bobath）所提的關鍵點控制手法（key-point control），在遠端方面不包括那個部位？

A. <正確答案> 肩

B. 手

C. 腳

D. 大拇指

63. 下列那一個敘述是屬於自身的治療性使用（therapeutic use of self）治療介入？

A. 鼓勵活動參與

B. <正確答案> 示範適當應對行為

C. 教導製作感恩卡片

D. 提供職業輔導評量

64. 某中風病人有動作計畫障礙，對此職能治療師的處置，下列敘述何者錯誤？

A. 宜在熟悉環境中進行熟悉活動開始

B. 日常生活活動如果病人做不出來，職能治療師可以手握病患之手引導其動作學習

C. <正確答案> 如果病人不會操作其日常使用之工具，最好教他改用特殊輔具

- D.教導時，動作之口令應切分成單一動作指令，越短越好
- 65.在動作學習（motor learning）中，回饋（feedback）扮演重要角色，下列敘述何者錯誤？
- A.有感覺障礙的個案，內在回饋（intrinsic feedback）會較差
 - B.結果知識（knowledge of results）讓個案知道這次動作的實際結果
 - C.<正確答案> 表現知識（knowledge of performance）提醒個案下一步如何正確完成目標
 - D.結果知識（knowledge of results）與表現知識（knowledge of performance）都是提供外在回饋（extrinsic feedback）的來源
- 66.治療單側忽略（unilateral neglect syndrome）的方法包括：
- A.冰刺激健側手部
 - B.<正確答案> 以健側手帶患側手跨越身體中線
 - C.從事沒跨越身體中線活動
 - D.只用健側手操作活動
- 67.左側偏癱（left hemiplegia）的病患，上下樓梯的方法為何？
- A.<正確答案> 上樓時，右腳先上階梯，左腳再跟上；下樓時，左腳先下階梯，右腳再跟下
 - B.上樓時，左腳先上階梯，右腳再跟上；下樓時，右腳先下階梯，左腳再跟下
 - C.上、下樓時，皆由健側（右腳）先上、下階梯，患側（左腳）隨後
 - D.上、下樓時，皆由患側（左腳）先上、下階梯，健側（右腳）隨後
- 68.對於視障者無法自己過馬路，協助者應該如何適當協助？
- A.使視障者站在協助者之側後方，握住協助者之手
 - B.<正確答案> 使視障者站在協助者之側後方，握住協助者之手肘
 - C.協助者站在視障者之側後方，握住視障者之手
 - D.協助者站在視障者之側後方，握住視障者之手肘
- 69.當治療師建議個案將所有需要到樓上完成的事情列成清單，累積數項後一次上樓完成，是採用何種理念？
- A.環境改造
 - B.輔具運用
 - C.<正確答案> 能量節省
 - D.功能重建
- 70.下列何者不是學校系統職能治療師的工作範圍？
- A.<正確答案> 建議更換不配合個案治療計畫的老師
 - B.教導個案使用輔具

C. 教導班級老師正確的疾病認知

D. 建議學校增設無障礙設施

71. 目前有關動作學習的研究結果顯示，下列那些練習模式對連續性活動（continuous tasks）的學習效果較佳？①隨機式練習（random practice） ②集中反覆式練習（blocked practice） ③變化式練習（variable practice） ④固定式練習（constant practice）

A. <正確答案> ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

72. 依照片所示，病患配戴的是 modified Kleinert splint，以下敘述何者錯誤？



A. 適用於屈指肌腱接合（flexor tendon repair）之病患

B. 腕（wrist）及掌指關節（MCP）必須要維持在屈曲（flexion）位置

C. 須配合復健運動，以增加肌腱的滑動，減少沾黏發生

D. <正確答案> 屬 dynamic splint，需作復健運動時才配戴

73. 職能治療師常會教導記憶力缺失個案使用內在（internal）或外在（external）策略來增進記憶力，請問下面那一種是內在策略？

A. 計時器來提醒自己該做的事情

B. 記事本來記錄每天要做的事情

C. 錄音帶說出要做的事情

D. <正確答案> 按照字母搜尋所要找尋物品名稱的字首

74. 對心肺功能障礙之病患，進行職能治療時，其「收縮血壓」較平時超出多少時，就應立即停止治療？

- A. 5—10 mmHg
- B. 10—15 mmHg
- C. <正確答案> 15—20 mmHg

D. 20—25 mmHg

75. 下列那類的治療對象，最適合採用人本主義模式的參考架構？

A. <正確答案> 參加社區就業輔導的個案

B. 精神病合併智能不足的個案

C. 急性期的精神病人

D. 重度障礙的慢性精神病人

76. 以拿吹風機吹乾自己頭髮為例，下列有關肌肉收縮的敘述，何者正確？

A. 慢慢伸手去拿桌上的吹風機，對手指屈指肌而言是做等長收縮（isometric contraction）

B. 手緊握吹風機維持不放時，對手指屈指肌而言是做向心收縮（concentric contraction）

C. 將吹風機由桌上拿起吹自己的頭髮，對肱二頭肌而言是做離心收縮（eccentric contraction）

D. <正確答案> 吹完頭髮將吹風機慢慢由頭上放回桌上，對肱二頭肌而言是做離心收縮（eccentric contraction）

77. 關於年齡與相應發展之遊戲類型，下列配對何者錯誤？

A. 0—2 歲，exploratory play

B. 2—4 歲，symbolic play

C. <正確答案> 4—7 歲，practice play

D. 7—12 歲，games with rules

78. 下列關於視覺功能之敘述何者錯誤？

A. 根據華倫（Warren）模型，基礎的視覺技巧包括了眼動技巧（oculomotor skills）、視野（visual fields）、視力（visual acuity），而在判定為視知覺問題時，須先排除視覺基本技巧的問題

B. 透過評估活動複雜度（complexity）、熟悉度（familiarity）、可預測度（predictability）等等有助於評估視知覺缺損對於功能（functions）影響程度

C. <正確答案> 判定忽略症須考量半側偏盲（hemianopsia）與感覺缺失兩問題，該診斷始可建立過動態評估（dynamic assessment）方式，有助於瞭解忽略症之介入途徑與該患者進步空間

D. 刪除測驗（cancellation tests）除可用於評估忽略症外，亦可用於持續性注意力的評估

79. 製作包含到前臂的副木（forearm splint），最理想長度為多少前臂的長度？

A. 3/4

B. <正確答案> 2/3

C. 1/2

D. 1/3

80. 下列那一項不是心理演劇中最主要達成的治療目標？

A. 澄清個案的感覺

B. <正確答案> 增加個案對職能治療的了解

C. 增強和催化個案的情緒表現

D. 幫助個案洞察自己的行為