

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

※注意：本試題禁止使用電子計算器

列印日期：098/02/10

列印時間：10:08:47

1. Fugl-Meyer 運動功能評估主要是根據何者之動作恢復階段修改而來？

A. <正確答案> 布朗斯壯

B. 玻巴斯

C. 路德

D. 本體神經肌肉誘發術（PNF）

2. 根據本體神經肌肉誘發術（PNF）之定義，下列何項動作屬於下肢的 D1 屈曲動作模式？

A. <正確答案> 翹二郎腿穿鞋

B. 站姿下將腿套入褲管內

C. 跆拳道後踢

D. 上樓梯

3. 根據職能治療的倫理規範，若治療師一直無法與其服務的個案建立良好的治療性關係，爲了病人的權益，最適當的處置爲：

A. 治療師應繼續努力爲此個案服務

B. <正確答案> 將個案轉介給另一位治療師

C. 將個案停止治療

D. 請個案家屬前來與治療師會談

4. 依據路德（Rood）治療途徑之主張，個案全身以伸直肌肉張力爲主者，應誘發何種動作來改善其問題？

A. <正確答案> 仰臥回縮（supine withdrawal）

B. 翻滾（rollover）

C. 支點俯臥（pivot prone）

D. 頸部共濟收縮（neck cocontraction）

5. 利用 SOAP 型式記錄個案的進展時，治療師對個案腕關節活動度測量的結果應記錄在何部分？

A. S

B. <正確答案> O

C. A

D. P

6. 量測前臂之旋後（supination）關節角度時，下列何者正確？

- A.量角器的軸心放置於前臂靠近腕關節橈骨側
- B.<正確答案> 起始位置為手掌面居正中（midposition）
- C.固定軸為（stationary arm）為平行於地面
- D.活動軸（movable arm）橫跨於遠端尺骨及橈骨上的背側面（dorsal surface）
- 7.關於簡短病歷資料庫（Minimum data set），下列敘述何者正確？①適用於長期照護系統  
②適用於學校系統 ③提供完整而簡要的紀錄 ④僅記錄手眼協調之訓練或自我照顧能力之評估
- A.<正確答案> ①③
- B.①④
- C.②③
- D.②④
- 8.關節終感覺（End-feel）指的是下列何者？
- A.動作過程中關節表面（joint surface）所發生的動作
- B.<正確答案> 主動關節活動到終點時對進一步活動的阻力
- C.一個關節的最大活動度
- D.關節活動過程中所感受到的阻力
- 9.下列何項動作評估量表是由 Carr 及 Shepherd 所發展的？
- A.<正確答案> Motor Assessment Scale
- B.Stroke Rehabilitation Assessment of Movement
- C.Frenchay Arm Test
- D.Action Research Arm Test
- 10.老年人藉由參與團體活動並擔任下列何種角色時，其自我行為的調整會更有彈性？
- A.鼓舞者（encourager）
- B.團體觀察者（group observer）
- C.遵行者（follower）
- D.<正確答案> 妥協者（compromiser）
- 11.依職能功能模式（Occupational Functioning Model）的定義，當個案去溜狗、釣魚是屬於何種生活角色領域？
- A.自我維持（self-maintenance）
- B.自我長進（self-advancement）
- C.<正確答案> 自我增強（self-enhancement）
- D.人際互動（interpersonal relatedness）

12. 下列有關工作強化 (work hardening) 的內容，其實施由先至後的步驟何者正確？①功能性能力評估 ②了解該工作關鍵性之需求 ③增進體能耐受度至該工作之基本需求 ④工作模擬訓練 ⑤工作分析
- A. ①②③④⑤  
B. ⑤①④③②  
C. <正確答案> ②⑤①③④  
D. ③⑤②①④
13. 有關通用設計 (universal design) 之敘述，下列何者正確？
- A. 通用設計的原則與無障礙設計 (barrier-free design) 完全相同  
B. <正確答案> 指不受能力或殘障程度的影響，所有人皆能夠使用的產品、建築或空間的設計  
C. 其缺點為使用者依歲月的變遷或功能程度的變化，不可做產品或環境的調整  
D. 其缺點為設計及調整所需之成本負擔比量身訂做之產品來得高
14. 當老年人抱怨眼睛澀，對明暗難適應，夜視不良時，極可能是下列何種問題？
- A. <正確答案> 動眼肌肉調節不良  
B. 黃斑部病變  
C. 青光眼  
D. 老花眼
15. 下列敘述何者不是「良好調適」的特色？
- A. 符合特定目標  
B. 不能導致個案使用怪異的動作或姿勢  
C. <正確答案> 需要個案極為專注才產生反應  
D. 不造成個案的難堪
16. 下列那種輔具設計對肘關節屈曲只達 80 度的病人，在自我餵食上會有較大的助益？
- A. 湯匙加大持握柄  
B. <正確答案> 加長及彎曲湯匙握柄  
C. 以萬用套固定湯匙  
D. 使用護食盤及湯匙
17. 移動式手臂支撐架 (mobile arm support) 可以協助患者完成下列那一項日常生活活動？
- A. 穿衣  
B. 洗澡  
C. <正確答案> 塗口紅

D.移位

18. 下列那一項活動，不屬於工具性日常生活活動（instrumental ADL）之範圍？

A. 到郵局劃撥

B. <正確答案> 戴隱形眼鏡

C. 逛街購物

D. 洗衣服

19. 有關行動輔具的敘述，下列何者錯誤？

A. 前臂拐杖（forearm crutches）適用於下肢無力，但平衡能力良好者

B. 四腳拐（quad cane）適用於單側偏癱患者

C. 助行器（walker）適用於小腦損傷的患者

D. <正確答案> 腋下拐（axillary crutches）適用於胸髓完全損傷的患者

20. 下列何者不包括工作態度及行為的處理？

A. 工作復健（work rehabilitation）

B. 工作強化（work hardening）

C. <正確答案> 工作適能（work conditioning）

D. 產業治療（industrial therapy）

21. 下列有關肌力不佳者書寫方法的考量，何者錯誤？

A. 筆身的材質，以摩擦力較大的為佳

B. <正確答案> Cock-up 副木幫助手指擺位，可協助書寫

C. 若使用鉛筆，挑選軟筆芯者

D. 若手臂肌力太差，可訓練使用口含棒（mouth stick）寫字

22. 有關各種個案之開車合適性評估考量，下列何者錯誤？

A. 多發性硬化症個案視力可能受影響，需特別評估視力

B. <正確答案> C4-5 頸髓損傷個案無開車潛力，不需評估合適性

C. 腦性麻痺個案可能會影響認知能力，需評估注意力及問題解決等能力

D. 一般老年人能力退化的影響有限，不需特別評估開車合適性

23. 有關不同類型個案的輪椅選擇，下列敘述何者錯誤？

A. 自主神經反射失調（dysreflexia）的個案較適合電動傾斜式輪椅（power recline）

B. 固定式骨架輪椅（rigid wheelchair）操控上較省力，適合心肺功能差的個案

C. <正確答案> 軀幹控制力及平衡能力差的個案，適合重量較輕的輪椅（lightweight wheelchair）

- D.手動傾斜式輪椅（manual recline）不適合認知能力不佳者
- 24.若須於手動或電動輪椅間擇一考量，下列何者較不適用電動輪椅？
- A.<正確答案> 認知能力不佳者
- B.漸進性功能喪失者
- C.耐力不佳者
- D.上肢操控能力不佳者
- 25.收集個案職能表現（occupational performance）相關的資料，最重要的方式是下列何者？
- A.測量
- B.<正確答案> 訪談個案
- C.觀察
- D.詢問家屬
- 26.依現行公告「身心障礙者生活輔助器具補助標準表」之規定，領有身心障礙手冊者，需要一臺特製輪椅，並欲向政府申請補助之有關流程，何者正確？①訂購取得輪椅 ②取得醫師診斷 ③治療師評估處方建議 ④申請補助
- A.①→②→③→④
- B.<正確答案> ②→③→①→④
- C.②→③→④→①
- D.④→②→③→①
- 27.建議單側偏癱個案使用代償方式來增進日常生活功能時，下列何項建議較不適切？
- A.<正確答案> 安裝繩梯於床尾
- B.使用鬆緊帶褲頭的褲子
- C.使用電動開瓶器
- D.使用高邊盤及防滑墊
- 28.下列何者符合「以職能為目標」（occupation-as-end）之精神？
- A.訓練個案站立踢球，以增進動態平衡之能力
- B.訓練個案用剪刀剪斷籐條，以訓練手部內在肌群之肌力
- C.<正確答案> 教育個案穿衣技巧，並訓練如何使用穿衣輔具完成著裝
- D.製作豎腕副木（wrist cock-up splint）以減輕個案麻痛等不適症狀
- 29.改善個案的關節活動度、肌肉力量及耐力的治療性方法（therapeutic approach）為下列何者？
- A.運動學習法（motor learning approach）

- B.<正確答案> 生物力學法 (biomechanical approach)
- C.感覺運動法 (sensorimotor approach)
- D.神經發展治療法 (neurodevelopmental treatment approach)
- 30.當職能治療師對個案說：「你打開蓋子了！」是屬於下列何種回饋？
- A.<正確答案> 結果理解 (knowledge of results)
- B.表現理解 (knowledge of performance)
- C.內在回饋 (intrinsic feedback)
- D.鼓勵 (encouragement)
- 31.當被動且快速去拉扯腦中風患者手肘至完全伸直過程中，在最後關節角度約 50 度時發現有些微阻力 (minimal resistance)。根據修正版愛茲波斯量表 (modified Ashworth Scale) 對於痙攣的分類，此現象屬於那一級？
- A.1
- B.<正確答案> 1+
- C.2
- D.3
- 32.有關肢體失用症 (limb apraxia) 的治療策略，下列敘述何者錯誤？
- A.常採用串連式 (chaining) 部分練習的技巧
- B.<正確答案> 宜採用具有一系列步驟的活動，增進病患的類化能力
- C.儘量避免使用口語指示 (verbal instruction)
- D.適合設計粗動作型態的活動
- 33.在進行烹飪活動時，能察覺到瓦斯爐有故障，此屬於何種察覺能力 (awareness) ？
- A.智能性察覺 (intellectual awareness)
- B.<正確答案> 緊急性察覺 (emergent awareness)
- C.預測性察覺 (anticipatory awareness)
- D.生理性察覺 (physical awareness)
- 34.Arnadottir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (簡稱 A-ONE) 主要用在評估病患的何種功能？
- A.<正確答案> 日常生活與認知功能
- B.日常生活與學習功能
- C.日常生活與動作協調功能
- D.日常生活與智力

35. 病患因身體圖像覺 (body scheme) 缺失而影響到穿衣功能表現，因此治療師設定一系列的穿衣步驟，透過提示及反覆練習，讓病患重新建立穿衣功能；此位治療師是運用下列何種手法？
- A. 治療性手法 (Remedial approach)
  - B. <正確答案> 適應性手法 (Adaptive approach)
  - C. 試誤性手法 (Trial and error approach)
  - D. 矯正性手法 (Corrective approach)
36. 就認知功能而言，當腦傷病患無明顯肢體動作障礙，卻無法單憑治療師的口令仿做出刷牙的動作，但是在用餐後卻能拿著牙刷完成刷牙的活動，此一病患可能罹患：
- A. 模仿性失用症 (imitation apraxia)
  - B. <正確答案> 意動性失用症 (ideomotor apraxia)
  - C. 意念性失用症 (ideational apraxia)
  - D. 工具使用性失用症 (tool using apraxia)
37. 家庭主婦要將廚房用具分門別類收納到櫥櫃裏，需要運用那一項認知功能？
- A. <正確答案> 概念形成 (concept formation)
  - B. 創造功能 (creative function)
  - C. 推理能力 (reasoning)
  - D. 問題解決 (problem solving)
38. 下列那一項症狀不屬於錐體束外障礙 (extrapyramidal disorder) 的表現？
- A. 舞蹈症 (chorea)
  - B. 肌張不全 (dystonia)
  - C. 震顫 (tremor)
  - D. <正確答案> 共濟失調 (ataxia)
39. 患者左手肘關節曾因骨折造成被動屈曲角度為  $0^{\circ}$ - $110^{\circ}$ ，進行左手肘關節屈曲的徒手肌力測驗 (Manual Muscle Testing) 時，病患表現可將左肘關節屈曲到  $110^{\circ}$ ，且可抵抗中度的阻力，則該紀錄為：
- A. F 級
  - B. F-級
  - C. <正確答案> G 級
  - D. N 級
40. 下列有關多重情境治療途徑 (multicontext treatment approach) 的敘述，何者錯誤？
- A. 強調學習是人與環境互動的結果

- B.<正確答案> 強調學習應在固定的單一情境裡，多次重複練習
- C.利用活動分析，逐步達成不同程度之學習轉移
- D.強調培養自我監督、自我調節的高層次認知能力
- 41.在執行徒手肌力檢查時，同一動作重複檢查次數最好不要超過幾次？
- A.2 次
- B.<正確答案> 3 次
- C.4 次
- D.5 次
- 42.嚴重腦傷病人可能會出現的僵硬為下列何者？①鉛管型僵硬（lead pipe rigidity） ②齒輪型僵硬（cogwheel rigidity） ③去皮質型僵硬（decorticate rigidity） ④去大腦型僵硬（decerebrate rigidity）
- A.①③
- B.①②
- C.②④
- D.<正確答案> ③④
- 43.個案可以在吵雜的治療室中專心排拼板，則代表個案的何種注意力應無明顯問題？
- A.持續性注意力
- B.<正確答案> 選擇性注意力
- C.交替性注意力
- D.分散性注意力
- 44.雙手交叉至身體前方欲脫下套頭衣服的起始動作是屬於 PNF 中的那一種上肢動作模式？
- A.對稱 D<sub>1</sub> 屈曲
- B.對稱 D<sub>1</sub> 伸張
- C.對稱 D<sub>2</sub> 屈曲
- D.<正確答案> 對稱 D<sub>2</sub> 伸張
- 45.下列那一種不是阿茲海默氏症（Alzheimer's disease）常見的問題？
- A.失用症（apraxia）
- B.失語症（aphasia）
- C.<正確答案> 失動症（akinesia）
- D.失辨症（agnosia）

46. 有關帕金森氏症（Parkinson's disease），下列敘述何者錯誤？
- A. 可能是因為環境因子所導致
  - B. 患者腦部黑質的細胞退化
  - C. 可能是染色體突變導致的
  - D. <正確答案> 患者腦部的多巴胺（dopamine）濃度過高
47. 下列關於重症肌無力（myasthenia gravis）之敘述，何者正確？
- A. 大腦皮質病變引發
  - B. 平滑肌及骨骼肌皆會受到影響
  - C. 較少使用的肌肉較不易出現異常性疲勞
  - D. <正確答案> 易影響控制眼睛及口咽部的肌肉
48. 某腦傷患者可在大聲口令下睜開眼睛，對痛覺刺激有不正確的彎曲動作，語言有混亂現象，其昏迷指數應為何？
- A. <正確答案> E3M3V4
  - B. E3M4V4
  - C. E3M3V3
  - D. E4M4V4
49. 訓練單側肘下截肢時，那一組動作可控制末端構造（Terminal device）開合的動作？
- A. <正確答案> 肩胛骨外展及肩肱彎曲
  - B. 肩胛骨內收及肩肱彎曲
  - C. 肩胛骨外展及肩肱伸直
  - D. 肩胛骨內收及肩肱伸直
50. 關於中風病人之感覺測驗，下列敘述何者正確？
- A. 兩點分辨測驗（two-point discrimination test）可以完全預測病人能否分辨手中之物品為何物
  - B. Monofilament 觸覺測驗可以完全預測病人能否分辨手中之物品為何物
  - C. <正確答案> Monofilament 觸覺測驗不能取代 Pinprick 測驗
  - D. 兩點分辨測驗比 Monofilament 觸覺測驗更具敏感度
51. 下列何者不是心臟病患者運動不耐（exercise intolerance）的徵兆？
- A. <正確答案> 兩天內體重降低五磅（約 2.3 公斤）
  - B. 過度疲勞
  - C. 左側牙齦、下巴及耳朵具轉移疼痛（refer pain）

D.噁心嘔吐

52. Volkmann's contracture 時，下列那些組織受損最少？

A.正中神經

B.<正確答案> 三頭肌 (triceps brachii)

C.橈側伸腕肌 (extensor carpi radialis)

D.屈指深肌 (flexor digitorum profundus)

53. 燒燙傷面積的計算除了「九倍定律」外，對於小面積的燒燙傷亦可用何種方法計算？

A.以手掌 (含手指) 為 1% 來計算

B.<正確答案> 以手掌 (不含手指) 為 1% 來計算

C.以雙手掌 (含手指) 為 5% 來計算

D.以雙手掌 (不含手指) 為 5% 來計算

54. 前臂骨折在解除固定的兩週後可以開始肌力強化的運動，在運動進行中應強調那一個關節的穩定性 (stability) ？

A.肩關節

B.肘關節

C.<正確答案> 腕關節

D.掌指關節

55. 治療扳機指 (trigger finger) 製作副木時應如何擺位，以避免指節產生屈曲現象？

A.<正確答案> 將掌指關節固定於完全伸直 (full extension) 的位置

B.將掌指關節固定於完全屈曲 (full flexion) 的位置

C.將掌指關節固定於過度伸直 (hyperextension) 的位置

D.不用固定掌指關節

56. 馬尾束症候群 (cauda equina syndrome) 中會受影響的功能是？①排尿 ②排便 ③行走

A.僅①②

B.僅②③

C.僅①③

D.<正確答案> ①②③

57. 對下列各種進行性神經性退化疾病之敘述，何者錯誤？

A.<正確答案> 重肌無力症 (myasthenia gravis) 個案在乙醯膽鹼 (acetylcholine) 的接受器數目有增多的現象

- B. 帕金森氏症 (Parkinson's disease) 患者之腦內神經傳導物質多巴胺 (dopamine) 分泌過少
- C. 多發性硬化症 (multiple sclerosis) 患者之中樞神經系統神經纖維有去髓鞘化之現象
- D. 肌萎縮性側索硬化症 (amyotrophic lateral sclerosis) 是大腦皮質腦幹及脊椎運動神經元被破壞的疾病
58. 心肺復健時，下列何者不是停止運動測試的標準？
- A. 劇烈胸痛
- B. 頭暈
- C. <正確答案> 流汗太多
- D. 噁心想吐
59. 下列關於舟狀骨骨折 (scaphoid fracture) 之敘述，何者錯誤？
- A. 是腕骨骨折最常見的一種
- B. 常在手腕鼻咽槽 (snuffbox) 處出現壓痛現象
- C. <正確答案> 骨折之遠端部份 (distal fragment) 易發生缺血性壞死
- D. 若不治療可導致手腕之嚴重關節炎
60. 有關「交感神經反射異常」(reflex sympathetic dystrophy) 之敘述，下列何者錯誤？
- A. 急性期除紅腫、疼痛外，關節活動度也會減少
- B. 肘部關節較少被侵犯
- C. <正確答案> 發病兩週內即可在 X 光檢查發現典型的骨質疏鬆變化
- D. 是導致腦中風者偏癱側的肩關節疼痛病因
61. 脊髓損傷個案使用束腹通常是為了改善其何種問題？
- A. 膀胱膨脹
- B. 坐姿平衡不良
- C. 自律神經反射障礙
- D. <正確答案> 姿勢性低血壓
62. 美國脊髓損傷協會建議測試個案下列何種感覺功能，以輔助診斷其受傷部位？
- A. 輕觸及辨物覺
- B. 刺痛及溫度覺
- C. 本體及二點辨識覺
- D. <正確答案> 輕觸及刺痛覺
63. 脊髓那一部位完全損傷的個案需使用爪狀手模式來拿物品？

- A. C4
- B. C6
- C. <正確答案> C8

D. T1

64. 老年人在記憶過程中，通常那一步驟呈現較明顯的退化現象？
- A. 注意力
  - B. 處理訊息
  - C. 貯存訊息
  - D. <正確答案> 抽取訊息
65. 對患有肌萎縮性側索硬化症第五期的個案，下列有關職能治療的介入，何者錯誤？
- A. <正確答案> 加強肌力訓練
  - B. 處理疼痛問題
  - C. 預防褥瘡之產生
  - D. 床及輪椅之擺位
66. 對患有亨丁頓症（Huntington's disease）早期的個案，職能治療師應提供下列何種介入方法，以解決其認知問題？
- A. 建議玩拼圖、棋類，以增加思考能力
  - B. <正確答案> 建議減少環境的干擾物，以增加專注力
  - C. 建議整理櫥櫃、抽屜，以增加分類能力
  - D. 建議自己預估活動表現，以增加病識感
67. 針對腫瘤個案的慢性疲勞問題，職能治療師宜提供下列何種介入方式？
- A. 提供個案肌耐力訓練
  - B. 教導照顧者對個案提供完全照護之技巧
  - C. <正確答案> 教導個案工作簡化的原則
  - D. 提供個案心理情緒的支持
68. 關於下肢截肢患者的擺位，下列何者錯誤？
- A. 避免髖關節屈曲彎縮，宜採趴睡姿勢
  - B. <正確答案> 膝下截肢患者仰臥時，宜在膝蓋下方放置枕頭
  - C. 膝下截肢患者坐輪椅時，宜把殘肢放在延伸的小腿板上
  - D. 避免大腿外展外轉彎縮，不宜在雙腿間放置枕頭
69. 燒傷病患除了常見的彎縮問題外，其常見的後遺症不包括下列何者？

- A. 搔癢症
- B. 異位骨化
- C. 小口畸形
- D. <正確答案> 不耐寒冷

70. 風濕性關節炎突發疼痛時，下列何者不是適當處理？

- A. <正確答案> 提供動態副木
- B. 提供靜態休息用副木
- C. 教導關節保護技巧
- D. 提供輔助器具

71. 下列有關肘隧道症候群（cubital tunnel syndrome）之敘述，何者正確？

- A. 為手肘外側的橈神經（radial nerve）受到傷害或壓迫時所產生症狀的通稱
- B. 臨床上可由 Froment's 徵狀得知該症候群神經壓迫之程度，Froment's 徵狀即是觀察患者是否可做小指內收之動作
- C. 神經壓迫較嚴重的患者會出現垂手（drop hand）及拇指內收肌萎縮的症狀
- D. <正確答案> 神經長期受壓迫患者常抱怨握拳的力氣變小，日常生活中的精細動作亦變得不靈活

72. 差別性手指肌腱滑動運動（differential digital tendon gliding exercises）有那些姿勢？

- ① straight hand    ② full fist    ③ hook    ④ straight fist    ⑤ intrinsic-plus

A. <正確答案> ①②③④⑤

B. 僅①③⑤

C. 僅②④

D. 僅①②④

73. 下列那個建議，無法正確地協助患者解決日常生活活動所產生下背痛之問題？

- A. 當患者欲使用洗手台刷牙或洗臉時，建議其運用長跪姿勢或抬起一腿置於矮板凳上
- B. 當患者欲如廁時，建議其以相反方向（面向後方）坐在馬桶上如廁
- C. <正確答案> 起床應採側臥後撐起的方式

D. 為減少下背部脊柱承受的壓力，平躺睡覺時不建議採雙膝彎曲姿勢

74. 下列有關輕度腦傷（mild brain injury）的敘述，何者錯誤？

- A. 典型症狀如頭痛、頭暈等
- B. 會出現暫時性神經功能障礙
- C. 病人約在一至三個月內能恢復正常
- D. <正確答案> 不一定有意識昏迷

經試題疑義會議決議，本題答案更正為一律給分

75. 手指伸展機制（extension mechanism）中的側帶（lateral band）若向腹側移位，易造成何種手指變形？
- A. 鈕釦指（boutonniere deformity）
  - B. 扳機指（trigger fingers）
  - C. <正確答案> 天鵝頸（swan-neck deformity）
  - D. 掌指關節半脫垂（MCP joint subluxation）
76. 拇指副木（thumb splint）的組成中，那一部分位在虎口（web space）處？
- A. opponens bar
  - B. <正確答案> C bar
  - C. thumb post
  - D. hypothenar bar
77. 下列針對慢性阻塞性肺病（COPD）患者之敘述，何者錯誤？
- A. <正確答案> 熱及潮溼空氣有利於呼吸
  - B. 身體向前傾、手臂擺放在桌面上有利於呼吸
  - C. 用力抬舉時配合吐氣心肺系統負擔較小
  - D. 放鬆坐著將腳抬高有利於呼吸技巧訓練
78. 在手傷病患治療過程中，有時候會出現包含有疼痛、水腫、皮膚顏色改變及感覺功能異常等現象，謂之複合性區域疼痛症候群（complex regional pain syndrome），這時候職能治療師應如何指示病患？
- A. 忍耐劇烈疼痛，繼續做關節主動運動與被動關節運動
  - B. 忍耐劇烈疼痛，只鼓勵做被動關節運動
  - C. 避免劇烈疼痛，只鼓勵做被動關節運動
  - D. <正確答案> 避免劇烈疼痛，只鼓勵做關節主動運動
79. 一般將屈指肌腱依照解剖位置分為五區，以利受傷時的定位，第二區（Zone II）的位置是在下列何項？
- A. 由腕隧道區近端到屈指肌腱的起點
  - B. 由腕隧道區遠端到 A-1 滑車（pulley）
  - C. <正確答案> 由 A-1 滑車到屈指淺肌終點
  - D. 由 A-1 滑車到屈指深肌終點
80. Barthel Index 評估病人日常生活功能，共有幾個項目？
- A. 8
  - B. 9

C.<正确答案> 10

D.12