98年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：098/07/21　　列印時間：10:04:41

1.職能治療病歷 SOAP 紀錄中的 P 爲：

A.進步描述（progress）

B.問題描述（problem）

C.<正確答案>計畫描述（plan）

D.病人描述（patient）

2.中風個案患側上肢處於布氏（Brunnstrom）動作恢復第四階段，則個案患肢可做下列何種動作？

A.伸直手臂碰觸前方頭頂高度的汽球

B.伸直手臂碰觸身體側面的牆壁

C.<正確答案>伸直手臂碰觸前方桌面上的筆

D.可用手比出剪刀、石頭、布

3.依據布氏（Brunnstrom）的觀點，上肢伸直協同動作中，下列何者爲最強的元素？

A.肩胛外展（protraction）

B.<正確答案>肩部內收及內轉

C.手肘伸直

D.前臂旋前（pronation）

4.治療師欲增加個案低張力上肢的動作，宜用下列何項促進技巧？

A.中度溫暖（neutral warmth）

B.慢速輕撫（slow stroking）

C.關節迫近術（joint approximation）

D.<正確答案>移動式輕觸（light moving touch）

5.根據職能功能模式（Occupational Functioning Model, Trombly, 1993）之假說，下列何者爲個案最高之治療目標？

A.歸屬感與成就感

B.日常生活、工作與休閒活動的功能獨立

C.各項功能的促進與預防疾病的復發

D.<正確答案>自我效能與自尊

6.有關輪椅座位的深度（seat depth），下列敘述何者正確？①恰當深度為由臀部最後方至膝窩處減 1-2 英吋　②恰當深度為由臀部最後方至膝窩處加 1-2 英吋　③當座深太深時，必要時可以加厚的背墊　④當座深太淺時，必要時可以把靠背換成較鬆之帆布靠背

A.<正確答案> ①③

B.①④

C.②③

D.②④

7.有關幫助病患進行肩上舉（shoulder flexion）應注意之事項，下列敘述何者正確？①治療師應一手握肱骨（humerus），一手動肩胛（scapula）　②肱骨上舉時肩胛應下轉（downward roration）　③當肱骨上舉（humerus flexion）達 60 度時，若肩胛沒有任何活動時，應先鬆動肩胛否則不能再舉高肱骨　④當肱骨上舉達 90 度時，若肩胛沒有任何活動時，應先鬆動肩胛否則不能再舉高肱骨

A.<正確答案> ①③

B.①④

C.②③

D.②④

8.低血糖之個案較容易出現下列何項症狀，需立即停止治療活動？

A.臉色潮紅

B.<正確答案> 躁動行為

C.舌頭乾燥

D.嘔吐

9.為終止感染途徑，洗手時需使用洗手乳，並搓洗手部至少幾秒以上才為有效的洗手？

A.5

B.10

C.20

D.<正確答案> 30

10.治療師強調以增強物（reinforcement）來介入輔導生理障礙個案的心理調適，是屬於下述何種理論模式？

A.心理動力模式

B.<正確答案> 認知行為模式

C.人類職能模式

D.健康模式（wellness model）

11. 當個案發生生理障礙後，顯得六神無主，害怕孤單，無法控制情緒，此爲心理調適階段理論的那一期？

A. 警戒期（vigilance）

B. <正確答案> 瓦解期（disruption）

C. 忍受期（enduring the self）

D. 重生期（striving to regain the self）

12. 關於使用輪椅個案其家中環境可近性（accessibility）之建置，下列何者正確？

A. <正確答案> 馬桶之高度約爲 17－19 英吋高，方便輪椅之轉位

B. 斜坡建置之坡度角度約爲 10－12 度

C. 一般電燈開關之高度至少需 18 英吋高

D. 廚房的空間建置以直線形（straight）爲最佳，其次爲 L 型（L-shape）配置

13. 關於靜態漸進式副木（static progressive splint）的敘述，下列何者正確？

A. <正確答案> 隨著個案情形之進步不需另行製作一個新的副木，僅需在原副木上做黏扣帶、樞紐或螺栓調整即可

B. 需搭配使用高型態的懸臂架

C. 力量的施予應依循 600-800 g 且以間歇性爲原則

D. 施力越大，效果越好

14. 有關職能治療環境中的安全性考量，下列何者錯誤？

A. 執行床邊（bedside）治療時，需時時注意是否壓迫或牽扯到個案身上之導管，如導尿管、餵食管、注射管等

B. 當個案往前跌倒時，治療師應及時拉住個案腰帶並扶住肩部或前胸，將之引導至直立姿勢

C. <正確答案> 當個案癲癇突發時，應即刻讓個案在安全的地點側躺，開口避免嘔吐物阻塞氣道，並想辦法限制其不自主的抽搐動作

D. 治療個案前應先將所需空間及器具備妥，如需離開個案應請同僚或照護者協助注意個案情形

15. 職能治療師協助個案選擇輪椅時，下列敘述何者錯誤？

A. 個案認知能力的表現會影響手動或電動輪椅的選擇

B. <正確答案> 應建議個案選擇結構設計上較複雜的輪椅，以具備更多的功能

C. 對於常需旅行之個案，可建議選擇一輕量化（lightweight）之輪椅

D. 靠背具有傾斜功能的輪椅在傾斜過程中，易誘發出個案下肢伸直高張力之情形

16. 關於正常傷口癒合（normal wound healing）的過程，下列敘述何者正確？

A.<正確答案> 重塑期（remodeling phase）的疤痕組織較有彈性、更平滑，且更強韌

B.急性發炎期（inflammatory phase）一般是傷後 24 至 48 小時，最多持續至 3 週

C.再生期（regeneration phase）時，因受傷組織再生，故易產生疤痕

D.增生期（proliferation）之特徵爲大量纖維母細胞增生

17.針對步態有運動失調（ataxic gait）的個案，下列何種輔具最適合其使用？

A.四足型枴杖（Quad cane）

B.<正確答案> 轉輪型助行器（Rolling walker）

C.側邊跨步型助行器（Sidestepper walker）

D.前臂型撐杖（Forearm crutches）

18.有關輪椅在公車或火車內的固定方式，下列何者正確？

A.<正確答案> 輪椅需有四個位置點固定於車廂內

B.輪椅固定的方向須爲面向側邊，以免煞車時摔出輪椅

C.固定輪椅時，固定繩（器）需牢固地固定輪椅的腳踏板及推輪

D.個案於交通工具中需繫上安全帶，安全帶之兩端固定於車廂中

19.下列何種量表較著重在病人的主觀需求與治療目標的優先順序？

A.巴氏量表（Barthel Index）

B.功能獨立量表（Functional Independence Measure, FIM）

C.<正確答案> 加拿大職能表現量表（Canadian Occupational Performance Measure, COPM）

D.克蘭貝爾日常生活活動量表（Klein-Bell ADL Scale）

20.關於啓動電動輔具控制介面的方式，下列敘述何者錯誤？

A.<正確答案> 搖桿是以電磁力量（electromagnetic energy）啓動的介面

B.滑鼠是以機械力量（mechanical force）啓動的介面

C.吹吸開關是以氣流（air pressure）啓動的介面

D.接觸式開關（contact switch）是以靜電（static electricity）啓動的介面

21.一位小腦損傷個案，其上肢協調控制不佳，職能治療師可能建議下列何項輔具？

A.長柄梳

B.<正確答案> 吸盤碗

C.穿襪輔助器

D.移動式手臂支撐架（mobile arm support）

22.關於以敘述性訪談（narrative interview）收集個案職能表現（occupational performance）的資料，下列何者錯誤？

A.<正確答案> 強調個人對未來的情況和想法

B.著眼個案對遭遇的困難的主觀看法及詮釋

C.是深度且較完整的訪談

D.個案可充分表達其感受及情感

23.何者不屬於 Burwash 的 Work Practice Model 中八個介入及評估的領域？

A.探索（exploring）

B.維持（keeping）

C.<正確答案> 增強（strengthening）

D.選擇（choosing）

24.有關工作強化（work hardening）中工作忍受度基準（work tolerance baseline）的建立，何者正確？

A.可用 Valpar 9（全身性關節活動度）了解個案的肌力

B.回顧醫療史不需包括和目前傷病無關的過去的病史

C.工作行爲及習慣的觀察比起生理功能評估耗時較短，可先進行

D.<正確答案> Valpar 1（小工具使用）及 Valpar 4（上肢功能性關節活動度）常被用來評估手部協調度

25.有關不同類型個案在日常生活中的工作原則，下列敘述何者錯誤？

A.下背痛的個案應避免扭轉軀幹

B.協調不佳者應固定上肢近端，進行手部操弄

C.<正確答案> 肌力不足者使用的工具握把應儘量減少摩擦力

D.耐力低者應於身體開始疲乏之前就先休息

26.下列何者使用間接選擇的輸入控制？

A.撥打電話

B.使用電子計算機

C.使用音響播放 CD

D.<正確答案> 調整電子時鐘的時間

27.關於按鍵（switch）的考量，下列敘述何者正確？

A.操控的部位越接近頭部，聽覺回饋（auditory feedback）音量需較大

B.<正確答案> 手肘控制的按鍵，外層應包裹軟布

C.若以腳部控制，選用小尺寸的按鍵

D.只有單隻手指有操控能力者，宜使用靈敏度低的按鍵

28.下列何項是臨床上用以增進個案自我察覺（self-awareness）能力最適當的方法？

A.<正確答案> 從事活動前由個案自我評量，完成後再印證並給予回饋

B.利用記事本內之相關人、事、地紀要，提醒患者

C.利用設定鈴聲，提醒患者去看記事本

D.提供給個案之刺激物儘量單純化

29.下列何種狀況治療師較有可能考慮進行駕駛車輛之評估？

A.雙眼視野在 100 度左右

B.<正確答案> 下半身癱瘓且獨立乘坐輪椅

C.近三個月內有癲癇症狀

D.具嚴重痙攣但未服藥控制

30.下列有關感覺喪失所使用代償技巧之敘述，何者錯誤？

A.注意保暖及避免燙傷

B.穿戴手套工作，以免重複性磨擦引起皮膚損傷

C.<正確答案> 不要塗抹乳液，儘可能保持皮膚乾燥

D.已受創發炎的皮膚要完全休息

31.對老年個案環境改良的建議，下列那些項目最適當？①抽屜、衣櫥門上標明內容物　②儘量固定傢具及物品的位置　③調整椅子、床鋪、櫥櫃的高度　④瓦斯爐、烤箱等安裝安全開關

A.僅③④

B.僅①②④

C.僅②③④

D.<正確答案> ①②③④

32.下列那一評估工具可兼具評估病人的基本（basic）及工具性（instrumental）日常生活功能？

A.Klein-Bell ADL Scale

B.Functional Independence Measure　（FIM）

C.Assessment of Motor and Process Skills　（AMPS）

D.<正確答案> Canadian Occupational Performance Measure　（COPM）

33.下列何者不包括在功能獨立測量（Functional Independence Measure）量表中？

A.大小便控制

B.<正確答案> 休閒旅遊

C.溝通

D.社會認知

34.下列針對動作不協調個案之代償原則，何者錯誤？

A.使用重的工具

B.<正確答案> 降低工作台面之摩擦力

C.穩定近端肢體

D.使用輔具來固定被操作之物品

35.關於輪椅的測量敘述，下列何者正確？

A.座椅的寬度即為個案臀部的寬度

B.合適的椅背高度約位於耳朵下緣處

C.<正確答案> 扶手高度為手肘彎曲 90 度下緣至輪椅椅面（含座墊）

D.腳靠（footrest）的最低點之高度為至少離地 1 英吋

36.有關德洛姆（DeLorme）的漸進式阻力訓練之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 10 次最大反覆（repetition maximum）是指個案在運動中保持協調，且可連續作 10 次整個動作範圍內（full range）的最大阻力

B.一次最大反覆，是為等長運動的肌肉運動

C.要依 25%→50%→75%最大反覆比率訓練各重複 10 次

D.主要目的為增強肌耐力

37.下列何種運動最適合用在肩外展肌力等級為 F 的病人在平躺時從事的肌力訓練？

A.離心阻力式運動

B.<正確答案> 等張阻力式運動

C.等張主動式運動

D.等長阻力式運動

38.下列認知評估工具，何項不屬於標準化工具？

A.<正確答案> 動態式評估方法（Dynamic Interactional Assessment）

B.廚房活動評估（Kitchen Task Assessment）

C.Arnadottir 職能治療日常生活活動神經行為評估表（A-ONE）

D.執行功能表現活動評估（Executive Function Performance Task）

39.下列何者為簡易視野測試方法？

A.刪除測驗（cancellation test）

B.交替測驗（alternating test）

C.碰觸測驗（attachment test）

D.<正確答案> 面對測驗（confrontation test）

40.針對腦傷病患有複視（diplopia）問題，下列那一項處置策略是不適當的？

A.部分遮蔽

B.使用稜鏡

C.眼球動作訓練

D.<正確答案> 轉頭使用單側眼睛

41.陣攣（clonus）是由於拮抗肌受到快速牽張（quick stretch）引發肌肉重複收縮形成，最常出現在下列那些肌群？

A.肘屈肌與腕屈肌（elbow flexors and wrist flexors）

B.膝伸肌與髖伸肌（knee extensors and hip extensors）

C.髖內收肌與膝屈肌（hip adductors and knee flexors）

D.<正確答案> 手指屈肌與踝蹠屈肌（finger flexors and ankle plantar flexors）

42.教導下背痛（low back pain）患者使用正確的身體機制（body mechanics）原則時，下列何者錯誤？

A.持續久站時，利用小凳子將一腳抬高

B.坐在書桌前工作時，身體儘量靠近桌面，避免軀幹前彎

C.搬重物時，物體儘量靠近身體

D.<正確答案> 撿地上的東西時，利用上半身下彎取代髖關節、膝關節彎曲

43.下列何種測驗，通常不是用來測試半側忽略的現象？

A.<正確答案> 對比敏感度測驗（contrast sensitivity test）

B.仿畫（copying tasks）

C.直線二等分（line bisection）

D.刪除測驗（cancellation test）

44.對視力與視知覺問題的處理，下列敘述何者錯誤？

A.改善病患複視（diplopia）的現象，不適合利用完全遮蔽（occlusion）的方法

B.物理性環境的調整（如足夠的光線或避免雜亂的擺設），可用以處理視力差與視野的問題

C.<正確答案> 加註標記（anchoring）提示最適合處理有動作性半側忽略，較不適合處理有感覺性半側忽略現象

D.動作空間線索（spatiomotor cueing）最適合處理有動作性半側忽略，較不適合處理有感覺性半側忽略現象

45.下列何者不是阿茲海默氏症（Alzheime’s disease）的退化性病理變化？

A.出現腦組織老年性斑塊（senile plaque）

B.出現腦組織神經纖維纏結（neurofibrillary tangle）

C.<正確答案> 神經細胞變小

D.神經元及突觸數目減少

46.下列關於裘馨氏肌肉失養症（Duchenne’s muscular dystrophy）之敘述，何者錯誤？

A.骨盆及下肢肌肉最先受影響

B.<正確答案> 小腿外觀呈現嚴重萎縮（atrophy）

C.大部分至 12 歲就須以輪椅代步

D.通常生命極限為 30 歲

47.吞嚥困難者的食物選擇原則，下列何者錯誤？

A.形狀與質地要一致

B.味道好，溫度適中

C.<正確答案> 密度愈小愈好

D.易被移除或抽吸出來的食物

48.中風病人之肩半脫位（shoulder subluxation）與肩關節疼痛之相關敘述，下列何者正確？

A.肩半脫位在中風病人不會出現向上脫位現象

B.肩關節疼痛大多是肩半脫位所引起

C.<正確答案> 吊肩帶不一定能停止肩關節疼痛

D.吊肩帶通常可有效矯治肩半脫位問題

49.可幫助脊髓損傷的個案，強化肌腱固定（tenodesis）抓握的是下列那個副木？

A.<正確答案> Flexor hinge splint

B.Wrist cock-up splint

C.Short opponens splint

D.Long opponens splint

50.肌肉及感覺的神經支配完好，但肌肉纖維持續退化的退化性疾病為下列何者？

A.重症肌無力（myasthenia gravis）

B.<正確答案> 肌肉失養症（muscular dystrophies）

C.小兒麻痺症（poliomyelitis）

D.古巴二氏症候群（Guillain-Barré syndrome）

51.關於義肢，下列敘述何者錯誤？

A.肘下截肢（below elbow）爲橈骨橫斷截肢（transradial amputation）之同義詞

B.主動關閉機制（voluntary closing mechanism）具有較好的本體回饋

C.主動關閉機制爲上肢義肢末端保持打開，直到拉線力量夠大將之關閉

D.<正確答案> 主動張開機制（voluntary opening mechanism）病人的接受度較差

52.下列何種運動神經元（motor neuron）損傷會導致肌肉張力增加？

A.上運動神經元及下運動神經元

B.<正確答案> 僅上運動神經元

C.僅下運動神經元

D.上運動神經元及下運動神經元均不會導致肌肉張力增加

53.下列有關退化性關節炎的敘述，何者錯誤？

A.會出現的症狀可能包括關節觸痛（joint tenderness）、早晨僵硬（morning stiffness）

B.<正確答案> 手部關節的退化性關節炎比起其他關節來說，是最容易造成失能的

C.常好發膝蓋、髖關節等部位

D.退化性關節炎不一定都是進行性的

54.心臟病病人進行活動時，合宜的心跳及血壓反應爲：

A.活動時比靜止時每分鐘增加超過 20 次

B.靜止時每分鐘超過 120 次

C.<正確答案> 姿勢變化時收縮壓下降 8mmHg

D.收縮壓隨著活動下降

55.滑雪人指（skier’s thumb）是指那一條大拇指韌帶斷裂？

A.<正確答案> 掌指關節尺側韌帶

B.掌指關節橈側韌帶

C.指間關節尺側韌帶

D.指間關節橈側韌帶

56.下列有關無其他併發症之脊髓完全損傷病患功能預後之敘述，何者錯誤？

A.第七頸髓損傷者可獨立於室內推標準型的輪椅

B.<正確答案> 第七頸髓損傷者移位可以完全獨立

C.第八頸髓損傷者可利用輔具獨立自行清洗上半身

D.第六胸髓損傷者可利用輔具獨立自行清洗全身

57.類風濕性關節炎患者爲避免手腕變形，下列何者是使用罐頭的最佳方式？

A.<正確答案> 應利用右手逆時針方向開罐，左手順時針關罐

B.應利用左手逆時針方向開罐，右手順時針關罐

C.應利用左右手一起逆時針方向開罐

D.應利用左右手一起順時針方向關罐

58.爲頸髓第五節完全損傷者設立功能性目標時，下列何項活動需要他人完全協助才得以完成？

A.臀部減壓

B.用餐具進食

C.<正確答案> 穿脫下半身衣物

D.輪椅移行

59.與患有失語症中風個案的溝通原則爲何？①治療師說話應大聲且清楚　②利用筆談　③減少周圍的噪音　④利用動作或手勢

A.①②

B.<正確答案> ③④

C.①③

D.②④

60.職能治療師可以用 LEARN 的 5 字要訣去面對老年人個案，下列關於這 5 字的敘述何者錯誤？

A.L 表示用心傾聽（listen）

B.E 表示仔細解釋（explain）

C.<正確答案> R 表示尊重其意見 (respect)

D.N 表示協調一致的處置（negotiate）

61.下列何者不是主動學習環境的特色？

A.要求個案相互討論需求

B.<正確答案> 安排個案的座位成緊密的直線形

C.提供多媒體說明示範供做練習

D.描述個案的進步

62.強化肌力訓練時，下列原則何者錯誤？

A.肌力爲 trace 時，可做等長收縮運動

B.<正確答案> 肌力爲 fair plus 程度時，可做輔助的等張主動運動

C.肌力為 fair 程度時，可做主動等張運動

D.肌力為 good 程度時，可做主動等張阻力運動

63.第二期心臟復健為出院後 1－2 週開始，適當的運動心跳速率為下列何者？

A.等於依年齡調整後之最大心跳速率

B.等於 220 減去年齡所得的數字

C.<正確答案> 介於 50－85%的依年齡調整後之最大心跳速率

D.90%的依年齡調整後之最大心跳速率

64.關於第三期心臟復健的社區復健活動，下列敘述何者錯誤？

A.常以團體活動進行之

B.仍要常量測血壓及心跳速率

C.<正確答案> 已不必每月作心電圖檢查

D.注重危險因子控制之衛教

65.下列何者是對老年人正確的認識？

A.容易混亂或記憶喪失是正常老化現象

B.老年人的行為模式都非常相似

C.老年人都會比年輕人較固執己見

D.<正確答案> 老年人對性行為仍存有渴望

66.職能治療師教導「後外側手術置換全髖關節的病患」坐到椅子上的步驟，下列何者錯誤？
①先將患側腳往前伸直　②好腳往後屈曲靠近椅面下方　③雙手撐住椅子兩側把手
④緩緩坐下，屁股儘量往後靠到椅背

A.①

B.②

C.③

D.<正確答案> ④

67.關於燒傷病患壓力衣的敘述，下列何者錯誤？

A.最好在疤痕長出的 3 週內就開始穿著

B.<正確答案> 壓力從 35mmHg 開始，逐漸遞減

C.每天穿著 23 小時

D.穿著長達 12 至 18 個月

68.本體神經肌肉促進術（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation）所使用的手法中，下列何者不能用來增加個案的關節活動度？

A.重覆收縮（repeated contraction）

B.<正確答案> 節奏啓動（rhythmic initiation）

C.節奏轉動（rhythmic rotation）

D.收縮放鬆（contract-relax）

69.下列關於癌症患者職能治療之敘述，何者正確？

A.職能治療開始介入時機爲癌症末期之安寧照顧（palliative care），以協助患者之心理及情緒調適爲主

B.<正確答案> 針對接受化療（chemotherapy）之患者，可藉職能治療協助處理因藥劑副作用所影響的日常生活表現

C.燒燙傷爲接受化療的患者常造成之副作用，因此治療師可藉由處理燒燙傷個案的原則來治療患者

D.隨著疾病之惡化，臂神經叢功能亦受到影響，若適時給予治療仍可使手部功能逐漸恢復正常

70.下列何組動態副木的機械效益（mechanical advantage）爲最佳？①施力臂爲 5 公分，阻力臂爲 3 公分，施力的表面積爲 4 平方公分　②施力臂爲 3 公分，阻力臂爲 5 公分，施力的表面積爲 4 平方公分　③施力臂爲 5 公分，阻力臂爲 5 公分，施力的表面積爲 8 平方公分

A.<正確答案> ①

B.②

C.③

D.①＝②＝③

71.下列關於身體兩點區辨覺（two-point discrimination）的敘述，何者正確？

A.正常的腳趾之兩點區辨距離會小於手指之兩點區辨距離

B.正常的前臂之兩點區辨距離會小於拇指之兩點區辨距離

C.<正確答案> 正常的背部之兩點區辨距離會小於小腿之兩點區辨距離

D.正常的腳背之兩點區辨距離會小於腳趾之兩點區辨距離

72.全皮層（full-thickness）燒燙傷的特色爲何？

A.泛紅（erythema）

B.<正確答案> 發白，感覺遲鈍（pale white, painless）

C.潮濕疼痛（weeping, pain）

D.起水泡（blister）

73.下列那一項不是職能治療針對肌萎縮性側索硬化症（ALS）主要的介入計畫？

A.提供輔具

B.<正確答案> 改善認知功能

C.牽張（stretching）運動

D.教導節省體力之原則

74.帕金森氏症（Parkinson's disease）所引起的症狀中，何種症狀最早出現？

A.僵直（rigidity）

B.動作緩慢（slowness of movement）

C.姿勢屈曲（typical stooped posture）

D.<正確答案> 顫抖（tremor）

75.下列有關 Guillain-Barré syndrome 的敘述，何者錯誤？

A.<正確答案> 從手部開始出現症狀

B.因周邊神經去髓鞘化引起

C.可能會引起臉部肌肉麻痺

D.會出現姿勢性高血壓及心跳過速

76.爲敘述屈肌肌腱損傷之部位，將手掌及手指部分劃分爲五塊解剖區域，「無人地（no man's land）」是指下列何者？

A.第一區域

B.<正確答案> 第二區域

C.第三區域

D.第四區域

77.某腦中風病患之右手無法以觸摸查辨物品，其腦傷之部位最可能爲：

A.左額葉（left frontal lobe）

B.<正確答案> 左頂葉（left parietal lobe）

C.左顳葉（left temporal lobe）

D.左枕葉（left occipital lobe）

78.下列何項測驗是引用日常生活相關活動來評估手功能？

A.普渡插板測驗（Purdue Pegboard Test）

B.明尼蘇達操作測驗（Minnesota Rate of Manipulation Test）

C.<正確答案> 傑布森手功能測驗（Jebsen Test of Hand Function）

D.九洞插板測驗（Nine-Hole Peg Test）

79.在第一背側隔間（first dorsal compartment）所引起之狹窄性腱鞘炎，其起因多是下列那組肌腱發炎所致？

A.<正確答案> 外展拇長肌（APL）及伸拇短肌（EPB）

B.內收拇肌（ADP）及屈拇長肌（FPL）

C.外展拇長肌（APL）及伸拇長肌（EPL）

D.外展拇短肌（APB）及橈側伸腕肌（ECR）

80.承上題，臨床上常用下列何種測試方法去評估並診斷此疾病？

A.Semmes-Weinstein Monofilament

B.<正確答案> Finkelstein’s test

C.Phalen’s test

D.Jamar dynamometer