

99年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、呼吸治療師、助產師、職能治療師、獸醫師、醫事放射師考試暨牙醫師考試分試考試

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

※注意：本試題禁止使用電子計算器

列印日期：099/07/13

列印時間：09:21:56

- 1.在SOAP病歷格式中，下列二項敘述之歸屬方式，何者正確？①病人說他可以自己穿上衣服 ②病人需要治療師幫助把衣服擺對方向，並引導其將肩膀放入衣袖裡。
A.<正確答案> ①為S，②為O
B.①為O，②為A
C.①為A，②為P
D.①為S，②為P
- 2.Fugl-Meyer運動功能評估主要是根據何者之動作恢復階段修改而來？
A.<正確答案> 布朗斯壯（Brunnstron）
B.玻巴斯（Bobath）
C.路德（Rood）
D.本體神經肌肉誘發術（PNF）
- 3.下列何種促進技巧主要作用於本體覺以引發運動反應？
A.移動式輕觸
B.快刷
C.<正確答案> 輕拍
D.冰刺激
- 4.根據Gentile之定義，下列何項屬於變化性靜止性（variable motionless）活動？
A.戴上自己的眼鏡
B.<正確答案> 在家中穿衣服準備上班
C.上、下電扶梯
D.假日時逛百貨公司
- 5.教導個案使用記事簿的習慣以減少記憶力下降之影響，此種介入方式屬於下列何種參考架構之主張？
A.認知知覺
B.生物力學
C.神經發展
D.<正確答案> 復健
- 6.對於矯正固定型攣縮（fixed contracture），下列敘述何者正確？①續列角度石膏支架（serial casting）效果優於動態副木 ②動態副木效果優於續列角度石膏支架 ③續列角度石膏支架通常每星期換掉一個 ④續列角度石膏支架通常每個月換掉一個
A.<正確答案> ①③
B.①④
C.②③
D.②④
- 7.職能治療師在使用評估工具時，不建議採用非標準化檢查表（non-standardized checklists），最主要原因是缺乏：
A.理論基礎
B.方便性
C.<正確答案> 可信度及效度
D.可閱讀性
- 8.下列何者不是基底核（Basal ganglia）受傷會出現的症狀？
A.休息式顫抖（resting tremors）
B.徐動（athetosis）
C.<正確答案> 陣攣（clonus）
D.齒輪型僵直（cogwheel rigidity）
- 9.關於個案疼痛的評估敘述，下列何者正確？
A.0-10 Numeric Pain Intensity Scale可由治療師觀察個案對疼痛的耐受程度來評估
B.Visual Analog Scale是臨床上常用給個案自評的疼痛評估工具，10分是不痛，0分為最疼痛
C.<正確答案> Brief Pain Interventory Scales可用來評估個案於日常生活活動或工作時被疼痛影響之程度
D.Pain Interference Scales及Numeric Pain Intensity Scale等工具均屬等距量尺（interval scale）記分的工具

10. 有關上肢裝具（upper extremity orthoses）的臨床應用配對下列何者正確？
- A. Buddy Straps（Buddy Tapping）：限制手指不需要的動作
 - B. Serial casting：限制手肘多餘的動作，增進關節穩定性
 - C. Resting hand splint：增進腕部及手部的活動能力
 - D. <正確答案> Tenodesis splint：藉由手腕動作帶動手指屈曲以提升手部抓握的功能
11. 下列何者屬於「以職能為目標」（occupation-as-end）所適用的策略？①教個案綁鞋帶之技巧 ②改造個案家中浴室 ③抑制四肢不自主動作 ④使用毛巾對截肢端的幻覺減敏感
- A. ②③
 - B. <正確答案> ①②
 - C. ③④
 - D. ①④
12. 將電話筒加裝支撐夾（Clip holder），可適用於那些個案？①T10-11下半身癱瘓 ②C6-7四肢癱瘓 ③半邊癱瘓 ④全盲 ⑤正中神經壓迫 ⑥類風濕性關節炎
- A. ③⑤
 - B. <正確答案> ②⑥
 - C. ①③
 - D. ②④
13. 關於溝通輔具的敘述，下列何者正確？
- A. <正確答案> 非電子式溝通系統較無法預先貯存大量的特製訊息
 - B. 合成語音系統較占記憶體，故較適合發送常用簡短訊息
 - C. 數位語音系統可提供不同的語音特色及彈性變化
 - D. 動態顯示系統的圖示或指令應放置在同一位置
14. 對於個案接受開刀後的心理調適方法，下列敘述何者較有用？
- A. <正確答案> 轉移注意力
 - B. 壓抑情緒
 - C. 減少社會互動
 - D. 與外界隔離，避免資訊干擾
15. 利用固定的環境來訓練固定的效果，是為了要個案達到下列何種目的？
- A. 概化策略
 - B. 轉移技巧
 - C. 他律行為
 - D. <正確答案> 例行事務
16. 關於外顯學習（explicit learning）與內隱學習（implicit learning），下列何者錯誤？
- A. 前者是偏重敘述的學習
 - B. 後者較接近程序式的學習
 - C. <正確答案> 後者較前者具有彈性且容易概化
 - D. 前者較後者易學也易忘
17. 對於執行精細動作能力不佳之個案，下列日常生活活動的策略，何者最適切？
- A. 建議個案可站著，藉由重力輔助增加身體穩定性執行精細活動
 - B. 工具設計及活動檯面應利用低摩擦力（low-friction）的材質
 - C. 提高桌面高度，降低重力的影響
 - D. <正確答案> 以黏扣帶取代拉鍊及鈕釦之使用
18. 在評估生理殘障個案之工作能力時，常使用莫帕系統（VALPAR system），該系統屬於那一類之工作評估工具？
- A. 生理耐力（physical endurance）
 - B. 工作現場評估（work site evaluation）
 - C. 情況評估（situational assessment）
 - D. <正確答案> 工作樣本（work sample）
19. 對於頸髓第七節損傷患者，下列所設定的復健目標那一項最難達到？
- A. 能夠獨立駕駛改裝汽車
 - B. 上肢能獨立進行穿脫衣物，下肢則須在協助之下進行
 - C. 能夠獨立進行簡單的食物準備工作
 - D. <正確答案> 能夠自行推手動輪椅並橫越馬路
20. 下列那種輔具設計對肘關節屈曲只達80度的病人，在自我餵食上會有較大的助益？
- A. 湯匙加大持握柄
 - B. <正確答案> 加長及彎曲湯匙握柄
 - C. 以萬用套固定湯匙
 - D. 使用護食盤及湯匙

21. 頸髓第八節完全損傷個案，最可能需要下列何項輔具？
- A. 萬用套 (universal cuff)
 - B. <正確答案> 長柄穿衣棍
 - C. 手腕驅動式腕手支架 (wrist-driven wrist-hand orthosis)
 - D. 口含棒 (mouth stick)
22. 下列何項代償性輔具 (adaptive devices/orthotics)，不適合用於上肢無力情況？
- A. 口含棒 (mouth stick)
 - B. <正確答案> 旋轉式湯匙 (swivel spoon)
 - C. 活動式上臂支撐架 (mobile arm support)
 - D. 懸吊器 (overhead suspension)
23. 有關輪椅擺位之敘述，下列何者錯誤？
- A. 個案的骨盆有些微的前傾可抑制不正常的反射
 - B. 凝膠式坐墊的缺點是很重，不易移動
 - C. 良好的輪椅坐姿為髖關節、膝關節和踝關節的角度皆為90度
 - D. <正確答案> 蜂巢式坐墊的缺點是耐受性不好，容易壞
24. 下列那一項活動，不屬於工具性日常生活活動 (instrumental ADL) 之範圍？
- A. 到郵局劃撥
 - B. <正確答案> 戴隱形眼鏡
 - C. 逛街購物
 - D. 洗衣服
25. 工作分析 (job analysis) 不包括下列何項？
- A. 觀察個案執行工作
 - B. 量測工作器具
 - C. 訪談同儕及上級人員
 - D. <正確答案> 探索個案的自我工作價值
26. 有關感覺減弱 (decreased sensation) 的患者，在日常生活的注意事項，何者錯誤？
- A. 穿著衣物應平整，避免皺摺於緊身處刺激摩擦皮膚
 - B. 洗澡時先開冷水，再開熱水
 - C. <正確答案> 操弄器具維持固定姿勢，避免更動
 - D. 接近會發熱的器具需提高警覺
27. 收集個案職能表現 (occupational performance) 相關的資料，最重要的方式是下列何者？
- A. 測量
 - B. <正確答案> 訪談個案
 - C. 觀察
 - D. 詢問家屬
28. 依現行公告「身心障礙者生活輔助器具補助標準表」之規定，領有身心障礙手冊者，需要一臺特製輪椅，並欲向政府申請補助之有關流程，何者正確？①訂購取得輪椅 ②取得醫師診斷 ③治療師評估處方建議 ④申請補助
- A. ①→②→③→④
 - B. <正確答案> ②→③→①→④
 - C. ②→③→④→①
 - D. ④→②→③→①
29. 使用活動式上臂支撐裝具 (mobile arm support)，其上肢關節應具有的關節活動度，下列何者錯誤？
- A. 肩屈曲及外展：0—90度
 - B. 肘屈曲—伸直：0—140度
 - C. 肩外轉：0—30度
 - D. <正確答案> 肩內轉：0—30度
30. 下列何項作法不符合保護關節的原則？
- A. 使用腰包而不要用手提皮包
 - B. 使用槓桿型門把而不要用圓形門把
 - C. 使用輕型或電動輔具
 - D. <正確答案> 長時間持續工作後再安排長時間休息
31. 有關熱療 (heat) 的敘述，下列何者正確？
- A. 熱敷包及水療屬於表層熱 (superficial heat)，而蠟療屬於深層熱 (deep heat)
 - B. <正確答案> 熱療的禁忌症包括如急性發炎期、周邊血管疾病及惡性腫瘤之個案
 - C. 慢性關節發炎的個案應禁止使用熱療以免擴大發炎反應
 - D. 熱療的生理反應乃為增進局部組織的代謝及循環功能，並刺激血管維持收縮狀態

32. 在職能功能模式(occupational functioning model)中，個體的最高階層為：
- A. 能力與技巧
 - B. 生活角色的能力
 - C. 活動與習慣
 - D. <正確答案> 自我效能與自尊感
33. 下列何種評量表要求個案分別列出其所希望從事的休閒活動及其重要性、自評表現及滿意度？
- A. <正確答案> 加拿大職能表現評量 (Canadian Occupational Performance Measure)
 - B. 興趣檢查量表 (Interest Checklist)
 - C. 休閒時間職能治療評量 (Occupational Therapy Assessment of Leisure Time)
 - D. 休閒滿意度評量 (Leisure Satisfaction Measure)
34. 病患若對自己的知覺問題缺乏察覺 (awareness) 時，常會對治療造成負面的影響。下列何種策略與提高察覺力有關？
- A. 提供給個案之刺激物盡量單純化
 - B. 個案每次完成活動，完全由治療師指出其錯誤
 - C. <正確答案> 由治療師模仿病患的表現給病患看，並指出有誤之處
 - D. 利用設定鈴聲，提醒患者去看記事本
35. 下列何項技巧不是記憶障礙的內在性代償策略技巧？
- A. 字首記憶 (first letter mnemonics)
 - B. 字義聯想 (semantic elaboration)
 - C. <正確答案> 行事曆 (day planner)
 - D. 視覺影像 (visual imagery)
36. 有關肢體失用症 (limb apraxia) 的治療策略，下列敘述何者錯誤？
- A. 常採用串連式 (chaining) 部分練習的技巧
 - B. <正確答案> 宜採用具有一系列步驟的活動，增進病患的類化能力
 - C. 儘量避免使用口語指示 (verbal instruction)
 - D. 適合設計粗動作型態的活動
37. 腦外傷患者不認得太太及其名字，但受傷後的事情都很清楚，此屬於何類型失憶症 (amnesia) ？
- A. 順行性 (anterograde)
 - B. <正確答案> 逆行性 (retrograde)
 - C. 創傷後 (posttraumatic)
 - D. 近期 (recent)
38. 一位需長期服藥的婦女，為避免自己誤記服藥與否，習慣以筆記本記錄已服用次數，此現象代表此婦女具備何種察覺能力 (awareness) ？
- A. 智能性察覺 (intellectual awareness)
 - B. 緊急性察覺 (emergent awareness)
 - C. <正確答案> 預測性察覺 (anticipatory awareness)
 - D. 生理性察覺 (physical awareness)
39. 大腦皮質損傷的患者可能會出那些症狀？①動幅障礙 (dysmetria) ②肌肉痙攣 (spasticity) ③陣攣 (clonus) ④靜止性震顫 (resting tremor) ⑤折刀式痙攣 (clasp-knife spasticity)
- A. ①②③
 - B. ②③④
 - C. <正確答案> ②③⑤
 - D. ②④⑤
40. 因意外事件導致腦傷的病患常對腦傷之前所發生的事情可以正確且清楚的描述，但是對於腦傷之後發生的事情卻記不住；此一現象稱為：
- A. 萊特定律 (Right' s law)
 - B. 方德氏定律 (Fund' s law)
 - C. 強森定律 (Johnson' s law)
 - D. <正確答案> 李伯特定律 (Ribot' s law)
41. 進行腦傷病患視覺評估時，發現病患有半側視野的缺失，一般稱為：
- A. 半側視障 (hemi-visual impairment)
 - B. 半側注意缺失 (hemi-inattention)
 - C. 半側忽略 (hemi-neglect)
 - D. <正確答案> 半側偏盲 (hemianopsia)
42. 富格-梅爾測驗 (Fugl-Meyer) 適用於那一類病患的功能測試？
- A. <正確答案> 中風病人平衡功能
 - B. 脊髓損傷動作功能

- C.腦性麻痺感覺功能
D.下肢骨折動作功能
- 43.對下肢膝上截肢（above-knee amputation）之病人其患側之擺位應避免在那一種姿勢？
A.髖關節屈曲及內縮
B.<正確答案> 髖關節屈曲及外展
C.髖關節外轉及內縮
D.髖關節外轉及外展
- 44.在執行徒手肌力檢查時，同一動作重複檢查次數最好不要超過幾次？
A.2次
B.<正確答案> 3次
C.4次
D.5次
- 45.下列有關感覺喪失的處置方法，何者錯誤？
A.避免感覺喪失區域暴露於過冷或過熱的環境
B.<正確答案> 患肢使用握柄越小的工具越適合
C.利用感覺較好的肢體去從事較具危險性的工作，如燙衣服
D.保持皮膚柔軟滋潤
- 46.下列那一項是屬於視覺記憶（visual memory）障礙的行為表現？
A.治療活動進行中，轉而去看旁邊發生的事，停止自己的活動
B.<正確答案> 無法辨認上次治療時所使用的三角形積木
C.無法在一定的時間內，將指定個數的珠珠串完
D.眼球無法追視到視野的某一部分
- 47.下列那一種不是阿茲海默氏症（Alzheimer' s disease）常見的問題？
A.失用症（apraxia）
B.失語症（aphasia）
C.<正確答案> 失動症（akinesia）
D.失辨症（agnosia）
- 48.有關職能治療對帕金森氏症（Parkinson' s disease）患者的介入策略何者錯誤？
A.<正確答案> 個案一次要做30分鐘以上的運動，以增強體力
B.運動時強調軀幹的伸張動作
C.行走訓練時，利用節律性聽覺刺激可有效改善步伐過小的問題
D.鼓勵個案多做口腔動作運動
- 49.某腦傷患者，對於刺激的反應能夠有目標導向，但需要提示，此病患在瑞裘認知功能階級（Rancho Los Amigos levels of cognitive function）中屬於那一個等級？
A.V
B.<正確答案> VI
C.VII
D.VIII
- 50.關於肘上截肢的義肢（above-elbow prosthesis）檢查標準，下列敘述何者錯誤？
A.將義肢穿上，義肢肘關節鎖緊（elbow locked）狀態下，肩關節應有之活動角度至少要有：彎曲90度，伸直30度，外展90度，旋轉45度
B.將義肢肘關節不鎖（elbow unlocked）狀態下，叫病人慢慢彎曲肩部（flex the shoulder）來引導彎曲義肢肘關節（flex the mechanical elbow），則肘關節彎曲角度範圍應可從10度彎到135度
C.<正確答案> 義肢肘關節（mechanical elbow）完全彎曲（full flexion）時，肩部彎曲（shoulder flexion）角度應不超過60度
D.截肢病人應可將義肢外展（abduct）60度，而不需鎖緊義肢肘關節（locking the elbow）
- 51.有關脊髓損傷個案的自主神經反射失調（autonomic dysreflexia），何者錯誤？
A.出現在T6以上受傷的個案
B.造成血壓突然上升，可能引發中風
C.導尿管阻塞可能會引發症狀
D.<正確答案> 一旦發生，馬上讓個案平躺，頭需放低
- 52.關於頸髓第六節完全損傷的個案介入，下列敘述何者錯誤？
A.容許手指屈肌略呈屈曲攣縮（flexion contracture），有助於肌腱固定（tenodesis）抓握
B.<正確答案> 訓練以手臂撐起方式進行減壓
C.給與短對掌副木（short opponens splint）協助抓握
D.訓練雙手打直撐在椅面，身體前傾保持坐姿
- 53.多發性硬化症（multiple sclerosis）的正確介入為下列何者？

- A.神經損害造成的原發性疼痛，可藉由牽張運動（stretching exercise）改善
- B.尚有行走能力但容易疲乏的個案，應盡量使用手推式輪椅節省體力
- C.<正確答案>垂足的個案行走時，可藉助有關節的足踝支架（hinged ankle orthosis）節省行走體力
- D.神經傳導失調導致的衰弱（weakness），可以肌力強化（strengthening）運動改善
- 54.關於電子手與機械手的敘述下列何者錯誤？
- A.<正確答案>電子手比機械手更能操作精細動作
- B.電子手比機械手重
- C.機械手藉由拉帶（cable）來控制
- D.電子手藉由肌肉收縮之訊號及電力控制
- 55.有些前臂尺骨與/或橈骨骨折病患需要使用長臂副木（long arm splint）固定，其主要目的是：
- A.限制肘關節的屈曲與伸直
- B.<正確答案>限制前臂的旋前與旋後
- C.限制肩關節的內轉與外轉
- D.限制腕關節的尺側偏移與橈側偏移
- 56.舞蹈症（chorea）是一種無目的性不自主的手舞足蹈動作，受損位置為何？
- A.腦幹（brainstem）
- B.<正確答案>基底核（basal ganglia）
- C.小腦（cerebellum）
- D.大腦（cerebrum）
- 57.根據職能治療任務導向治療方式（OT task-oriented approach），下列何者錯誤？
- A.某中樞神經（CNS）受傷一年後之病患，經職能治療而有進步，不能全歸因於自發復原（spontaneous recovery）
- B.對該病人而言，為改變其職能表現（occupational performance）所需之關鍵控制參數（critical control parameter）可能不止一種
- C.<正確答案>「表現要素（performance component）」之評估，一定不能脫離職能表現下執行
- D.A-One evaluation為在執行日常生活活動情境下，評估病人之認知及知覺系統之評估工具
- 58.下列有關退化性關節炎之敘述，何者正確？
- A.最常見侵犯掌指關節
- B.Heberden's結節（nodule）是在近端指關節上的軟組織增生所致
- C.Bouchard's node 是見於遠端指關節上的變形
- D.<正確答案> Heberden's結節好發在女性病患
- 59.腦中風後遺症當中，何者對藥物治療的反應最好？
- A.<正確答案>憂鬱症
- B.失語症
- C.吞嚥困難
- D.半側偏盲
- 60.髖關節置換術的患者在手術後，利用輔具行走時常會出現川德倫堡步態（Trendelenburg gait），此步態之特點為何？
- A.患側骨盆下傾（pelvis drop）
- B.<正確答案>健側骨盆下傾（pelvis drop）
- C.骨盆脫位（pelvis dislocation）
- D.骨盆僵硬（pelvis stiffness）
- 61.脊髓損傷個案在治療室中出現劇烈頭痛、鼻塞、呼吸困難等症狀時，治療師可採取下列何種措施因應？
- A.<正確答案>檢查尿管是否通暢
- B.使個案平躺於床休息
- C.將個案雙腳抬高
- D.教導個案腹式呼吸的方法
- 62.對腦傷個案的輪椅擺位，應從身體何部位開始？
- A.下肢
- B.軀幹
- C.<正確答案>骨盆
- D.頭頸部
- 63.下列何者為阿茲海默氏症患者初期最主要的症狀？
- A.語言障礙
- B.反應變慢
- C.計算能力下降

- D. <正確答案> 記憶力損傷
64. 對患有阿茲海默氏症後期的個案，適當的職能治療介入方式為：
- A. 對個案提供認知復健訓練，以減緩認知退化
 - B. 教導個案使用輔具，以增進生活獨立
 - C. <正確答案> 建議家屬環境改良的方法，以增進安全
 - D. 建議家屬將個案限制於輪椅內，以免發生危險
65. 對患有亨丁頓症（Huntington's disease）中期的個案，若需以輪椅代步，則輪椅最好需外加何種配備？
- A. 頭靠
 - B. 具突起物的輪圈
 - C. 後傾式椅背
 - D. <正確答案> 具特別襯墊的扶手
66. 關於下肢截肢患者的擺位，下列何者錯誤？
- A. 避免髖關節屈曲攣縮，宜採臥睡姿勢
 - B. <正確答案> 膝下截肢患者仰臥時，宜在膝蓋下方放置枕頭
 - C. 膝下截肢患者坐輪椅時，宜把殘肢放在延伸的小腿板上
 - D. 避免大腿外展外轉攣縮，不宜在雙腿間放置枕頭
67. 若個案因進步而要常修改副木，最好選用下列何種良好特性的副木？
- A. <正確答案> 記憶性
 - B. 延伸性
 - C. 彈性
 - D. 鍵結性
68. 關於肘上截肢者的義肢控制，下列敘述何者錯誤？
- A. 若要控制手肘閉鎖固定，個案可作肩胛下壓及肩外展後伸
 - B. <正確答案> 當個案作肩胛上提及肩內縮前舉時，可以控制手肘開鎖活動
 - C. 當個案在手肘閉鎖時作上臂前舉外展時，可以打開手勾
 - D. 當個案在手肘開鎖時作上臂前舉外展時，可以屈曲手肘
69. 下列關於疼痛的敘述，何者錯誤？
- A. 急性疼痛通常有明顯的發病（onset）
 - B. <正確答案> 慢性病痛通常會持續增加交感神經警覺度（sympathetic nervous system arousal）
 - C. 醫藥處置通常對急性疼痛的療效較佳
 - D. 慢性病痛通常導致性格與生活型態的改變
70. 下列關於全膝關節置換（total knee replacement）患者術後治療之敘述，何者錯誤？
- A. 使用非骨水泥（noncemented）固定之膝關節置換患者，應避免術後立即承重之情形
 - B. 術後12週內，患者應避免任何膝關節扭轉之動作
 - C. <正確答案> 為避免膝關節置換所造成的不穩定，術後8—12週內應避免膝關節屈曲之動作
 - D. 非特殊狀況下，患者應在術後1—3日後即可下床活動
71. 針對手部燒燙傷之患者，下列各時期手部固定副木（resting hand splint）之穿戴時程表或擺位何者正確？
- A. 在急性期為避免阻礙組織之修復，建議一日穿戴時間不超過3次，每次時間不超過40分鐘
 - B. 在植皮期應讓患者的手部固定在一舒服不受力之姿勢，以避免植皮皮膚受牽扯而使植皮失敗
 - C. <正確答案> 在植皮期患者應全日穿戴副木至少5日，如外科醫師有特殊考量需再延長穿戴時間
 - D. 在復健期，建議日間活動時穿戴副木，而夜間休息時則應限制副木之使用
72. 下列關於手部創傷後組織癒合（tissue healing）之敘述，何者正確？
- A. 疤痕組織的生成是在重塑期（remodeling phase）初期發生的
 - B. 在纖維母細胞增生期（fibroplasia phase）給予和緩的阻力性活動可促進組織修復
 - C. <正確答案> 傷口附近疤痕組織的強度隨著時間逐漸增強，原因是膠原纖維（collagen fiber）的強度增強所致
 - D. 在重塑期（remodeling phase）的副木應用上，僅建議使用靜態型副木，以避免已修復之疤痕組織遭破壞
73. 肱骨遠端骨折，因上過緊的石膏或繃帶導致血液循環中斷，如未適時處置，可能造成下列何種後遺症？
- A. 蘭氏症（Landry's syndrome）
 - B. <正確答案> 福克曼氏攣縮（Volkmann's contracture）
 - C. 吉巴二氏症候群（Guillain-Barré syndrome）
 - D. 周邊神經疼痛症（peripheral nerve pain syndrome）
74. 關於輕觸（light touch）及壓覺（pressure）感覺之評估，下列敘述何者正確？

- A.評估中若發現患者之輕觸覺受損，其壓覺感覺亦勢必會有影響
- B.評估輕觸覺時需用器具阻斷視覺的影響，在壓覺的部份則不需要
- C.<正確答案> 評估必須先測健側肢以建立此患者之標準，再行評估患側肢體
- D.在紀錄時，「minus (-)」是表示患者無法辨識感覺刺激及指出刺激位置
- 75.上肢那條神經損傷後，會導致病人無法在肘關節屈曲90°下用力使用螺絲起子？
- A.橈神經
- B.尺神經
- C.<正確答案> 肌皮神經
- D.正中神經
- 76.下列有關腦傷患者擺位 (positioning) 之敘述，何者錯誤？
- A.早期執行擺位可預防關節攣縮
- B.<正確答案> 側躺較仰躺易引發迷路張力反射 (TLR)
- C.患者之擺位必須持續的再評估
- D.早期提供正確的輪椅擺位有助於抑制異常張力
- 77.下列何種累積性創傷病變最有可能造成神經壓迫？
- A.狄魁文氏症候群 (de Quervain' s syndrome)
- B.<正確答案> 腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome)
- C.網球肘 (tennis elbow)
- D.高爾夫球肘 (golfer' s elbow)
- 78.有關肌腱炎 (tendinitis) 的敘述下列何者正確？
- A.網球肘 (tennis elbow) 發生於橈側屈腕肌 (flexor carpi radialis)
- B.高爾夫球肘 (Golfer' s elbow) 發生於橈側伸腕肌 (extensor carpi radialis)
- C.媽媽手 (de Quervain' s disease) 發生於屈拇長肌 (flexor pollicis longus)
- D.<正確答案> 扳機指 (trigger finger) 發生於屈指肌 (digital flexors)
- 79.下列何種疾病，不會有認知問題？
- A.亨丁頓氏舞蹈症 (Huntington' s disease)
- B.多發性硬化症
- C.後天免疫不全症候群 (AIDS)
- D.<正確答案> 古巴二氏症候群 (Guillain-Barré syndrome)
- 80.按照Brunnstrom動作恢復階段，手部出現指側抓握 (lateral prehension) 動作，且有少許伸指及拇指動作，是第幾階段？
- A.二
- B.三
- C.<正確答案> 四
- D.五