

99年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、呼吸治療師、助產師、職能治療師、獸醫師、醫事放射師考試暨牙醫師考試分試考試

類科名稱：職能治療師


科目名稱：職能治療技術學（包括職能治療之評估方法與技術、活動分析與應用、治療方法與技術）

※注意：本試題禁止使用電子計算器

列印日期：099/07/13 列印時間：09:21:57

- 治療師在治療中風的江太太時，會考慮那些是對江太太最重要的職能角色，依此來訂定職能治療的介入方式，是依據下列那一種臨床推理過程？
 - 科學的（scientific）推理過程
 - <正確答案>** 故事的（narrative）推理過程
 - 實用主義的（pragmatic）推理過程
 - 倫理的（ethical）推理過程
- 下列何者是中度體能需求？
 - 經常負重約5公斤、偶爾負重約10公斤
 - <正確答案>** 時常負重約5公斤、經常負重約10公斤、偶爾負重約25公斤
 - 時常負重約7.5公斤、經常負重約17.5公斤、偶爾負重約37.5公斤
 - 時常負重約10公斤、經常負重約25公斤、偶爾負重約50公斤
- 下列有關實體覺（stereognosis）的敘述，何者正確？
 - 請個案說明所看到物品的名稱或功能
 - 將個案患側手擺放於某一姿勢，要求個案健側手擺出與患側手相同的姿勢
 - <正確答案>** 個案閉眼，將湯匙放在個案手中，請個案說出摸到的是什麼東西
 - 個案閉眼，治療師用手指輕碰個案的皮膚，然後要求個案睜開眼睛並用手指指出被碰到的位置
- 有關疼痛的評估，下列敘述何者錯誤？
 - 疼痛的感受是很主觀的，每個人的感受是有差異的
 - 疼痛多以self-report方式評估
 - <正確答案>** Numeric Pain Intensity Scale是以0—5分作為自我評估的打分
 - Visual Analog Scale 是在10公分直線上標記疼痛強度的位置
- 為了解智能障礙者處理職務之複雜程度，治療師將個案帶到某家速食店的門市擔任櫃檯員，系統化的將顧客點餐的複雜度增加，從中觀察個案對於顧客所點餐點的處理能力，是否都能依照顧客的要求給予，以及那種類型的餐點組合個案無法應付。此時治療師所從事的職業輔導評量是下列何項？
 - 職場評估（job site evaluation）
 - <正確答案>** 情境評量（situational assessment）
 - 工作樣本評估（work sample）
 - 職業性向測驗（job aptitude test）
- 下列何種情況不適合轉介做職業輔導評量？
 - 身心障礙者在庇護工場中已經工作兩年，就業服務人員不知道此位身心障礙者是否應該繼續留在此庇護工場
 - <正確答案>** 無法確認身心障礙者的聽力損失程度
 - 無法確認身心障礙者的問題工作行為
 - 無法確認身心障礙者執行某項工作的工作技能
- 下列何種治療模式與職能行為（occupational behavior）理論無關？
 - <正確答案>** 認知行為治療（Cognitive Behavior Therapy）
 - 人類表現生態架構（Ecology of Human Performance）
 - 職能調適（Occupational Adaptation）
 - 人—環境—職能模式（Person-Environment-Occupation Model）
- 下列何者是評估腦傷個案學習潛能（learning potentials）的最佳方式？
 - 與個案面談
 - 與個案的家屬或主要照顧者面談
 - <正確答案>** 觀察個案對治療師提供之線索（cues）的反應
 - 閱讀個案的病歷
- 下列關於Global Assessment of Functioning Scale的敘述，何者正確？
 - <正確答案>** 其前身為Global Assessment Scale
 - 需考量環境限制所導致的失能
 - 分數越高表示失能越多
 - 80分表示個案有自殺企圖
- Brayman & Kirby（1982）設計的職能治療綜合評量表分為那些評量類別？
 - 自我照顧、休閒功能及工作行為

- B. <正確答案> 一般行為、人際互動行為及工作行為
 C. 自我管理、精神狀況、休閒功能及工作行為
 D. 日常生活功能、社會功能及職業功能
11. 治療師應著重於處理關節活動度低於功能性限制（functional limit）者，下列何者是「功能性限制」關節活動度？
 A. 足夠執行一般功能，但無法執行特殊功能的關節活動度
 B. 足夠執行粗動作活動，但無法執行細動作活動的關節活動度
 C. <正確答案> 足夠從事日常活動，而不需輔具協助的關節活動度
 D. 正常關節應該有的最大關節活動度
12. 佛洛伊德將人格分成那幾個部分？①id ②ego ③superego ④self-esteem
 A. 僅①②
 B. <正確答案> 僅①②③
 C. 僅②③④
 D. ①②③④
13. 如照片所示，Finkelstein' s test是用來檢查那個症狀？



- A. Carpal tunnel syndrome
 B. Dupuytren' s contracture
 C. <正確答案> deQuervain' s tenosynovitis
 D. Scaphoid instability
14. 四個月大的嬰兒應尚未出現下列何種反射或反應？
 A. 迷路翻正反應（labyrinthine righting reaction）
 B. <正確答案> 身體翻正反應（body righting reaction）
 C. 張力性迷路反射（tonic labyrinthine reflex）
 D. 張力性頸部反射（tonic neck reflex）
15. 如何評估小腦傷個案之「交替不能」（dysdiadochokinesia）的現象？
 A. 要求個案閉眼來回用手指碰自己的鼻尖
 B. 要求個案閉眼來回用手指碰治療師的手指
 C. <正確答案> 要求個案反覆做手肘彎曲和伸直的動作
 D. 要求個案走路並轉彎
16. 在職能治療領域裡，下列對參考架構（frames of reference）與模式（models）的敘述，何者錯誤？
 A. 模式的著眼點比參考架構的著眼點廣泛
 B. <正確答案> 模式比參考架構容易在專業間造成意見上的不認同（disagreement）
 C. 參考架構針對特殊領域提供指引
 D. 參考架構為理論與臨床間的橋樑
17. 下列關於記憶之敘述，何者正確？①程序記憶（procedural memory）是指能「學習動作及講出如何學得」之能力 ②程序記憶是指能「學習動作但講不出如何學得」 ③描述記憶（declarative memory）是指能「以語言說出所學得之內容及當初學得該內容時如何學得」 ④描述記憶是指能「以語言說出內容但講不出當初學得該內容時如何學得」
 A. ①③

- B.①④
C.<正確答案> ②③
D.②④
- 18.在手部結構上，近端橫向弓（proximal transverse arch）是指下列那個區域？
A.各近端指關節（PIP）橫向排列所形成的弧弓
B.各掌指骨關節（MCP）橫向排列所形成的弧弓
C.<正確答案> 各遠端腕骨（distal carpal bones）橫向排列所形成的弧弓
D.各近端腕骨（proximal carpal bones）橫向排列所形成的弧弓
- 19.下列何者不是Fidler在分析性的理論裡所提到功能與失能連續性（function-dysfunction continuum）的考量範疇？
A.自我概念（concept of self）
B.<正確答案> 物體關係（object relation）
C.無意識衝突（unconscious conflict）
D.溝通（communication）
- 20.若治療師想使用一個具有常模的精細動作測驗，來評估25歲小腦損傷個案，則下列測驗何者錯誤？
A.Purdue Peg Board Test
B.<正確答案> Minnesota Handwriting Assessment
C.Nine Hole Peg Test of Fine Motor Coordination
D.Box & Block Test
- 21.下列何者在人類發展過程中，最不會影響個人健康的生活型態及日常生活？
A.生病
B.配偶或親人去世
C.<正確答案> 正常老化過程
D.殘障
- 22.測量前臂的旋前（pronation）的活動度（ROM）時，治療師應該將量角器的軸心對準那裡？
A.腕部背面中點
B.腕部腹面中點
C.尺骨莖突外側
D.<正確答案> 橈骨莖突外側
- 23.胸大肌的徒手肌力測試結果顯示，受測者只有在坐姿之下才能執行該肌肉主要負責的動作，且只能完成一半的動作範圍，這表示胸大肌的徒手肌力測試結果是屬於下列那一等級？
A.Normal
B.Fair⁺
C.<正確答案> Poor⁻
D.Trace
- 24.關於評估工具信度的敘述，下列何者錯誤？
A.再測信度可看出評估工具的穩定度
B.折半信度可看出評估工具的內部一致性
C.<正確答案> 複本信度可看出評估工具的穩定度
D.α係數可看出評估工具的內部一致性
- 25.有關遊戲評估，下列敘述何者錯誤？
A.提供治療師了解兒童能力最好的工具
B.<正確答案> 使觀察者了解遊戲對兒童的意義
C.Smilanski（1968）以認知發展觀點，將社會戲劇遊戲（Sociodramatic Play）分為六大要素
D.Parten（1976）以社會學觀點，將遊戲分類為：單獨、旁觀、平行、聯合、合作等遊戲
- 26.根據美國智能障礙協會（American Association on Mental Retardation, AAMR），那一項不是智能障礙（Mental Retardation）診斷的要件？
A.標準化智力測驗低於正常人兩個標準差
B.適應性行為有缺陷
C.<正確答案> 溝通障礙
D.發生於18歲之前
- 27.若某一腦中風病人無法看到白色床單上的白色毛巾時，其最可能有下列那方面的問題？
A.visuomotor
B.<正確答案> visual figure ground
C.visual field
D.visual gnosis
- 28.下列對於fragile X syndrome的敘述，何者錯誤？

- A.<正確答案> 盛行率女性比男性高
B.男性個案症狀通常會比女性個案嚴重
C.男性個案通常會出現外表面貌上的明顯特徵
D.個案通常會呈現智能障礙
- 29.下列何種活動分析主要是以由上而下的模式（top-down model）來進行？
A.以活動為基礎（activity-based）的活動分析
B.以表現為基礎（performance-based）的活動分析
C.以理論為焦點（theory-focused）的活動分析
D.<正確答案> 以職能為基礎（occupation-based）的活動分析
- 30.由於中風，造成個案在認知、情緒或生理上有缺失，這是屬於何種障礙等級？
A.限制（limitation）
B.<正確答案> 缺陷（impairment）
C.失能（disability）
D.病理（pathology）
- 31.王先生腦中風後，治療師教導王先生如何穿脫衣服，此時治療師所給予的活動屬於下列何者？
A.<正確答案> 職能性活動（occupational activities）
B.目的性活動（purposeful activities）
C.準備性活動（preparatory activities）
D.體能性活動（physical activities）
- 32.為脊髓損傷病人進行活動分析（Activity analysis）時，有關活動的表現環境（performance contexts）中，下列那一項與時間方面（temporal aspects）無關？
A.生命週期（Life cycle）
B.<正確答案> 文化的（Cultural）
C.時間的（Chronological）
D.發展的（Developmental）
- 33.有一位多重障礙的學齡兒童接受專業團隊服務。團隊成員有各自的角色與任務，但成員以「角色釋放」來介入，以達到最佳的治療，此為何種專業團隊服務？
A.單一專業
B.多專業
C.專業間
D.<正確答案> 跨專業
- 34.Ayres 認為成熟的手部動作之發展，是一連續性步驟的整合而來，其第一個步驟為：
A.<正確答案> 控制頸及眼移動（control of neck and eye movement）
B.軀幹穩定及平衡（trunk stability and balance）
C.肘部動作（elbow motion）
D.粗略抓握（gross grasp）
- 35.當治療師面對一個注意力不集中的個案時，將原本10個步驟的活動簡化為5個步驟讓個案完成，此時治療師正運用何種理念？
A.人體工學（ergonomics）
B.輔助技術（assistive technology）
C.環境調整（environmental modification）
D.<正確答案> 分級（grading）
- 36.在足球賽中，在罰踢12碼球時，想踢出強勁的低球入門，下面那塊肌肉最具威力？
A.<正確答案> 股四頭肌（quadriceps）
B.膕肌（popliteus）
C.小腿環肌（cuff muscles）
D.脛骨後肌（posterior tibialis）
- 37.

照片所示是屬於那一類的握握（precision grip）？



- A. Lateral pinch
B. Tip pinch
C. **<正確答案>** Tripod pinch
D. Span grip
38. 職能活動與一般活動最大的差別在於：
A. 活動時間及地點
B. 參與動機及活動技巧
C. 年紀及性別
D. **<正確答案>** 主動參與度及情境
39. 若中風個案在羅文斯登職能治療認知評量（LOTCA）中無法完成彩色積木組合（color block design）的項目，可能有下列那些問題？①忽略症 ②執行功能障礙 ③視覺區辨（visual discrimination）障礙
A. 僅①②
B. 僅①③
C. 僅②③
D. **<正確答案>** ①②③
40. Mosey（1986）在psychosocial components of occupational therapy一書中認為，合作團體（cooperative group）是運用何種性質的參考架構所設計？
A. 分析性參考架構（analytical frame of reference）
B. **<正確答案>** 發展性參考架構（developmental frame of reference）
C. 獲得性參考架構（acquisitional frame of reference）
D. 心理分析參考架構（psychoanalytic frame of reference）
41. 下列關於打電話的敘述中，何者是針對順序性的分析？
A. 依據筆畫順序查詢電話號碼
B. 依據對話的內容組織所接收和傳達的訊息
C. **<正確答案>** 依照撥號、傾聽聲音、對話、結束對話、掛上聽筒的程序來完成任務
D. 依據之前打一般桌上型電話的成功經驗，而能使用手機或公共電話來打電話
42. 1 MET所代表的意義為：
A. $5\text{mLO}_2/\text{kg}/\text{min}$
B. $7\text{mLO}_2/\text{kg}/\text{min}$
C. **<正確答案>** 半躺臥休息的基礎代謝率
D. 心跳不超過100下的代謝率
43. 王先生因為背部疼痛無法長時間在電腦前面工作，治療師調整電腦的位置及椅子讓王先生不會因為疼痛而無法工作，然後給予王先生符合其狀況的運動及肌力增強訓練。此時治療師所採用的方式為下列那一種？
A. **<正確答案>** 從上而下（top-down）介入方式
B. 從左而右（left-right）介入方式
C. 從右而左（right-left）介入方式
D. 從下而上（bottom-up）介入方式
44. 陸德（Rood）提出施以感覺刺激來引發動作反應的理論，感覺刺激可造成抑制（inhibition）或激

發 (facilitation) 效果。下列何者不是他所提出的抑制技術 (inhibition techniques) ?

- A. neutral warmth
- B. deep tendon pressure
- C. <正確答案> heavy joint compression
- D. maintained stretch

45. 下列那一個治療目標是可測量的?

- A. 鼓勵個案能自己做決定
- B. <正確答案> 個案可列出自己的優點和缺點
- C. 協助個案發展較佳的自我概念
- D. 個案可以控制自己的挫折感

46. 職能治療師帶領團體活動，所採用的步驟其最佳順序為何?

- A. 介紹→過程→活動→應用
- B. 介紹→分享→活動→應用→類化
- C. 介紹→活動→應用→類化→分享
- D. <正確答案> 介紹→活動→分享→過程→類化→應用

47. 根據桃格莉雅 (Toglia) 的理論，若一腦傷個案原本只能半躺在病床上用水盆進行洗澡的活動，經過訓練後則可以坐在浴室內的洗澡椅上用蓮蓬頭洗澡，此現象表示該個案達到何種學習轉移的程度?

- A. 近程轉移 (near transfer)
- B. <正確答案> 中程轉移 (intermediate transfer)
- C. 遠程轉移 (far transfer)
- D. 極遠程轉移 (very far transfer)

48. Egan (1986) 提出帶領治療性團體的諮商技巧，下列那些技巧最有用? ①同理心

②真誠 ③對質 ④具體 ⑤批評 ⑥自我公開

- A. ①③⑤
- B. ①②④⑤
- C. <正確答案> ①②③④⑥
- D. ①②③④⑤⑥

49. 功能性團體模式 (functional group model) 的關鍵概念不包括下列那一項?

- A. <正確答案> 以個別為中心的行動 (individual-centered action)
- B. 自我發起的行動 (self-initiated action)
- C. 自發性的行動 (spontaneous action)
- D. 有目的的活動 (purposeful activity)

50. 有關多重情境療法 (multicontext treatment approach) 的敘述，下列何者錯誤?

- A. 強調學習是個人、情境及活動三者互動所產生
- B. <正確答案> 強調靜態式的評估 (static assessment)，藉以判斷個案是否有學習的潛能
- C. 個別獨立的認知或知覺技巧並非此療法介入的重點
- D. 適用於腦傷或精神疾病的患者

51. 若個案兩側髖關節彎曲角度只有0至60度，乘坐普通輪椅時容易出現下列那個問題?

- A. 骨盆前傾 (anterior tilt)
- B. <正確答案> 骨盆後傾 (posterior tilt)
- C. 骨盆左傾
- D. 骨盆右傾

52. 下列對於燒燙傷後尚未成熟的皮膚處理，何者正確?

- A. 皮膚癢時應用抓的，避免用拍的方式
- B. 皮膚有小水泡時應該馬上戳破，以免變成大水泡
- C. <正確答案> 洗完澡後應潤滑皮膚，避免皮膚乾燥
- D. 皮膚有疤痕時應避免穿戴彈性手套，以免關節活動度受限

53. 在玻巴斯 (Bobath) 技術中，肩胛前伸 (scapular protraction) 是用於:

- A. 抑制上肢伸直痙攣
- B. 誘發上肢屈肌收縮
- C. <正確答案> 抑制上肢屈曲痙攣
- D. 增進上肢穩定度

54. 何種副木最適合於尺神經受傷病人?

- A. Cock-up
- B. <正確答案> Anti-claw hand splint
- C. Short opponens splint
- D. Dorsal splint

55. 為精神科日間留院病人所設計的求職技巧訓練課程之團體，是屬於下列那一種團體方式？
- A. 人際與動力團體 (interpersonal & dynamic)
 - B. <正確答案> 行為與教育團體 (behavioral & educational)
 - C. 支持性團體 (support)
 - D. 維持與復健團體 (maintenance & rehabilitation)
56. 某腦傷病人其認知層級依Allen cognitive levels 為第三級。訓練穿脫衣服，最好的起始方式為：
- A. 拿一件衣服放在前方椅子上，讓他看到並示意要他穿上
 - B. 拿一件衣服放在前方椅子上並說：「請穿這件衣服」
 - C. <正確答案> 拿一件衣服放在病人膝上，並抓起病人的手說：「要怎樣把手放進袖子裡呢？」
 - D. 拿一件衣服放在病人膝上，並抓起病人的手將之放進袖子裡並使他前彎說：「就是這樣穿喔！」
57. 對於治療注意力缺失過動個案，治療師可向學校老師提出專業建議以助學習。下列何項建議不適切？
- A. 將學校指定於一星期後繳交的美勞作品，訂定每日所需完成的部分，確認每日完成進度
 - B. 允許學生可在某些自修課堂時，自行站立伸展肢體
 - C. <正確答案> 將學生座位盡量安排在靠窗的位置
 - D. 利用格子較大的作業簿練習書寫
58. 在Brunnstrom動作治療的恢復階段，手臂能往前水平伸直是屬於：
- A. 階段二 (stage II)
 - B. 階段三 (stage III)
 - C. <正確答案> 階段四 (stage IV)
 - D. 階段五 (stage V)
59. 針對風濕性關節炎病患為維持肌力，可教以「等長收縮運動」，注意每次「收縮在某固定姿勢」至多應維持約幾秒鐘？
- A. 2秒鐘
 - B. <正確答案> 5秒鐘
 - C. 8秒鐘
 - D. 10秒鐘
60. 下列關於動作治療的敘述，何者錯誤？
- A. Rood及PNF技術適合當作「活動準備動作之訓練方法 (adjunctive methods)」
 - B. Rood、PNF及NDT都可與「有目的活動 (purposeful activity)」結合使用
 - C. 由於NDT可整合應用於「有意義之職能活動 (meaningful occupation)」，故其對「動作學習」之效果比Rood及PNF為佳
 - D. <正確答案> 病患想要拆信、打電話，但這些動作目前只有健側手能參與，故不算為治療介入 (intervention) 之範圍
61. 下列何者不是本體神經肌肉促進療法 (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 的主要要素？
- A. 口語線索
 - B. 徒手的接觸
 - C. <正確答案> 肌張力正常化
 - D. 最大阻力
62. 在學校系統職能治療領域中，下列作法何者錯誤？
- A. 須與多專業密切溝通合作
 - B. <正確答案> 須以感覺統合理論與技術治療個案
 - C. 儘量選擇不干擾個案正常課程學習的治療模式
 - D. 善用同儕對個案的影響力
63. 治療師要求個案在同時有卡通播出與大人談話的環境中，注意聽治療師的指令並要求個案重述指令，主要是在訓練個案何項能力？
- A. <正確答案> 選擇性注意力
 - B. 持續性注意力
 - C. 轉移性注意力
 - D. 偵測性注意力
64. 下列何者不是由學習觀點 (learning perspective) 所發展出來的理論？
- A. Behaviorism
 - B. <正確答案> Occupational adaptation
 - C. Cognitive therapy
 - D. Multicontext treatment approach
65. 當治療師在治療視覺功能障礙個案時，建議家人固定家中擺設、排除通道上的雜物，以助個案獨

- 立自我照顧，是採用何種理念？
- A.使用輔具協助 (use assistive devices)
 - B.改變工作方法 (alter task methods)
 - C.<正確答案> 環境改造 (modify environment)
 - D.功能重建 (restoration approach)
- 66.當治療師在治療認知功能障礙個案時，進行口腔刺激與按摩，讓個案有較好的吞嚥能力，是採用何種理念？
- A.使用輔具協助 (use assistive devices)
 - B.改變工作方法 (alter task methods)
 - C.環境改造 (modify environment)
 - D.<正確答案> 功能重建 (restoration approach)
- 67.下列那一種技巧與增進腦傷個案的覺察能力無關？
- A.<正確答案> 治療師提供徒手引導 (manual guiding)
 - B.治療師提供錄影回饋 (videotape feedback)
 - C.要求個案自我預測 (self-prediction)
 - D.要求個案自我提問 (self-questioning)
- 68.針對忽略症個案，下列何種療法強調掃描策略和覺察 (awareness) 的訓練？
- A.認知障礙參考架構 (cognitive disability frame of reference)
 - B.<正確答案> 多重情境療法 (multicontext treatment approach)
 - C.認知行為治療 (cognitive behavior therapy)
 - D.艾法特療法 (Affolter approach)
- 69.張同學有智能障礙，在工廠實習時每天沒有準時出席，缺乏人際互動技巧，及無法遵循指令，請問張同學適合安置於下列那一種方案中？
- A.<正確答案> 工作調適方案 (work adjustment services)
 - B.工作活動中心 (work activity services)
 - C.安置後服務方案 (postplacement services)
 - D.職業服務方案 (vocational services)
- 70.對於心肺功能障礙的病患進行職能治療時，若心跳數少於多少時，則應終止此次職能治療活動？
- A.30次/分
 - B.40次/分
 - C.<正確答案> 50次/分
 - D.60次/分
- 71.對心肺功能障礙之病患，進行職能治療時，其「收縮血壓」較平時超出多少時，就應立即停止治療？
- A.5—10 mmHg
 - B.10—15 mmHg
 - C.<正確答案> 15—20 mmHg
 - D.20—25 mmHg
- 72.下列有關燒燙傷後產生的肥厚性疤痕 (hypertrophic scar) 之描述，何者正確？
- A.未成熟的疤痕顏色較淡，成熟的疤痕較趨於紅色
 - B.<正確答案> 未成熟的疤痕較為凸起，成熟的疤痕漸趨平坦
 - C.未成熟的疤痕較為柔軟，成熟的疤痕漸趨強韌
 - D.未成熟的疤痕較有彈性，成熟的疤痕較堅硬
- 73.手部需要長時間固定時，通常會希望擺放於「安全或抗畸形」的姿勢，對此姿勢的敘述，何者正確？
- A.腕關節屈曲20度
 - B.掌指關節屈曲30度
 - C.<正確答案> 指間關節完全伸直
 - D.拇指內收
- 74.為使長期輪椅乘坐者可以更方便自己推輪椅，並減少腕隧道症候群的產生，治療師有時會考慮將後輪軸往前移，使輪軸正好在肩膀下方，針對此改裝的優缺點敘述，何者正確？
- A.增加穩定度，使輪椅較不易往後倒
 - B.增加手與輪圈接觸的頻率
 - C.<正確答案> 減少固定距離間手推輪圈的次數
 - D.較重型的輪椅才適合此改裝
- 75.下列有關PRE及RRE的敘述，何者正確？
- A.PRE屬於等張阻力運動，RRE屬於等長阻力運動
 - B.<正確答案> PRE訓練時所使用的阻力是漸漸增加，RRE訓練時所使用的阻力是漸漸減少

- C.PRE是用來訓練肌力，RRE是用來訓練耐力
D.PRE較容易產生肌肉酸痛疲勞，RRE較容易產生拮抗肌不平衡的現象
- 76.關於特製輪椅以及坐墊（seating）處方的敘述，下列何者錯誤？
A.<正確答案> 爲了避免個案髖關節變形更加惡化，應將坐墊與背靠的夾角控制在90度角
B.可以藉由提供合適的坐墊以減緩軟組織過度壓迫所造成的疼痛
C.選擇一個適當的坐墊，應考慮到材質密度、硬度、溫度特性（thermal characteristic）、摩擦力（friction）
D.腰椎層級（lumbar level）的脊髓損傷患者需要較低的背靠，以利推動輪椅前進時手臂的活動
- 77.關於「獲得性參考架構」的敘述，下列何者正確？
A.<正確答案> 第一種獲得性參考架構是關於習慣訓練
B.摩西博士（Dr. Mosey）認爲活動治療並不是獲得性參考架構的一種
C.職能行爲參考架構不是獲得性參考架構的一種
D.不強調要與現有環境產生互動
- 78.活動式手臂支撐架（mobile arm support）對下列那一類個案最適用？
A.痙攣型腦性麻痺
B.風濕性關節炎
C.橈神經完全損傷
D.<正確答案> 頸髓損傷
- 79.有關記憶功能的策略訓練，下列敘述何者正確？
A.<正確答案> 視覺想像（visual imagery）是常用的登錄策略（encoding strategy）
B.複誦（rehearsal）是常用的提取策略（retrieval strategy）
C.記事本是常用的內在策略
D.內在策略適用於所有記憶障礙的患者
- 80.若個案兩側髖關節彎曲角度已定型，而且只有0至70度，輪椅處方應如何調整？
A.<正確答案> 調整椅背傾斜角度
B.調整座高
C.調整座深
D.調整腳踏板高度