101年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3305

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 在SOAP病歷格式中，下列敘述何者正確？①病人經評估，發現具視覺空間障礙及耐力不足，故病人獨立穿著之可能性受限制 ②繼續進行引導式穿衣練習，並強調正常之活動速度
A.①為S，②為O
B.①為O，②為A
C.①為A，②為P
D.①為P，②為S
- 以條件推理（conditional reasoning）來思考介入方式時，治療師會關心下列何種問題的答案？
A.這種診斷的預後如何？
B.個案的興趣及價值觀是什麼？
C.我應如何與個案溝通？
D.個案生活的相關情境為何？
- 下列那些活動調適的方法，可用以增進關節活動度？①改變活動相對於人的位置 ②改變槓桿的力臂 ③改變物品的尺寸 ④改變材質
A.①②
B.①③
C.②③
D.③④
- 根據職能功能模式（Occupational Functioning Model, Trombly, 1993）之假說，下列四項能力由上而下（top-down）的排列順序為下列何者？①Activities and habits ②Abilities and skills ③First-level capacities ④Competence in tasks of life roles
A.④①②③
B.③②①④
C.②③①④
D.④③①②
- 職能治療師評估個案轉位功能時，發現其需家人在旁用手輕觸個案身體以維持平衡，其標準化評估結果為下列何者？
A.準備下獨立（setup independence）
B.監督協助（standby assistance）
C.小量協助（minimum assistance）
D.中量協助（moderate assistance）
- 根據動作學習（Motor learning）之理論，下列敘述何者錯誤？
A.動作學習須主動參與才有效果
B.動作學習初期應提供足夠的回饋
C.評估其學習效果應在學習之「後」而非之「中」
D.對動作之心智練習（Mental practice）可以達到增加肌力及耐力的效果
- 有關前輪高舉（wheelie）技巧之敘述，下列何者正確？
A.無論是手動輪椅或電動輪椅於跨越障礙物時，均可利用此技巧達成目的
B.執行步驟為手握推輪（handrims）前方部位，再快速向後拉
C.治療師可讓初學者在治療室內，先利用斜坡之斜度訓練此技巧，而後再於平地上練習
D.輪椅要跨上人行道時，須面對人行道，個案身體後傾同時雙手控制推輪（handrims）以讓前輪高舉
- 下列對工作適能（Work conditioning）的敘述，何者正確？
A.每天訓練時間最多以兩小時為限
B.在復健後期進行
C.主要是進行工作環境或工作內容的調整
D.可利用工作樣本訓練工作相關能力
- 關於工作強化（work hardening）的敘述，下列何者錯誤？
A.以多專業（multidisciplinary）方式提供幫助
B.主要著重在一般性生理功能（general physical ability）的強化
C.模擬實際的工作活動

- D.工作速度及效率也是訓練要項
- 10.有關不同類型個案的輪椅選擇，下列敘述何者錯誤？
- A.自主神經反射失調（dysreflexia）的個案較適合電動傾斜式輪椅（power recline）
 - B.固定式骨架輪椅（rigid wheelchair）操控上較省力，適合心肺功能差的個案
 - C.軀幹控制力及平衡能力差的個案，適合重量較輕的輪椅（lightweight wheelchair）
 - D.手動傾斜式輪椅（manual recline）不適合認知能力不佳者
- 11.職能治療師至安養護機構進行環境諮詢，下列建議何者正確？
- A.通道之扶手離地高度約120公分
 - B.走道寬度至少60公分
 - C.馬桶旁扶手離地高度約40公分
 - D.通道扶手的直徑寬度約3.5~4.5公分
- 12.下列那一個測驗評量工具性日常生活（IADL）？
- A.巴氏量表（Barthel index）
 - B.功能獨立量表（Functional Independence Measure）
 - C.芙蘭切活動量表（Frenchay Activity Index）
 - D.克茲指標（Katz Index）
- 13.關於老年人的居家調整作法，下列何者錯誤？
- A.廁所加裝把手、止滑墊
 - B.室內加裝鏡子與玻璃，以加強光線
 - C.睡前減少液體攝取，以防半夜尿急
 - D.善用明暗對比的傢具與地面
- 14.有關左大腦半球對視覺訊息的處理特性，下列敘述何者正確？
- A.傾向注意整體概念
 - B.傾向注意局部細節
 - C.對左右側視野均會投以注意
 - D.只對左側視野投以注意
- 15.施測徒手肌力測驗時，下列敘述何者正確？
- A.為避免造成疲勞影響結果，一個動作測試僅以一次為限
 - B.為避免造成疲勞影響結果，一個動作測試重複不可超過三次
 - C.一律從抗重力姿勢開始測起
 - D.一律從無抗重力姿勢開始測起
- 16.手指伸展肌群（finger extensors）是所謂的雙關節肌群（two-joint muscles），所以正常情形下，要測量手指伸展的活動度時，應將腕關節擺位於：
- A.完全屈曲（full flexion）
 - B.中立姿勢（neutral position）
 - C.完全伸展（full extension）
 - D.任何姿勢下均不影響
- 17.「某病人在學習穿衣服的過程中，不斷的重複練習，雖無刻意教導或提示，但在不知不覺中習得穿衣的技巧。」此種學習過程較符合以下何者？
- A.Error-free learning
 - B.Explicit learning
 - C.Implicit learning
 - D.Declarative learning
- 18.下列何者是測量肌力等級為G時，應具備的完整步驟？①擺位（position） ②固定（stabilize） ③觸摸（palpate） ④觀察（observe） ⑤給阻力（resist）
- A.僅①②⑤
 - B.僅①②③⑤
 - C.僅①②④⑤
 - D.①②③④⑤
- 19.字母刪除測驗（Letter Cancellation Test）活動中表現不佳，最可能有下列那一種類型的注意力問題？
- A.持續性（sustained）
 - B.交替性（alternating）
 - C.選擇性（selective）
 - D.分散性（divided）
- 20.中樞神經系統損傷者的感覺再教育，主要依據下列何種概念？
- A.腦神經重塑
 - B.感覺神經再生

- C.減敏感
D.代償策略的建立
- 21.發現肘關節骨折的病患在前臂出現蒼白或泛青的顏色，摸不到橈動脈脈搏，感覺功能也漸漸遲鈍，可能是出現下列何症？
A.柯德曼氏缺血症（Codman's ischemia）
B.安德生氏缺血症（Anderson's ischemia）
C.巴賓斯基缺血症（Barbinski ischemia）
D.佛克曼氏缺血症（Volkmann's ischemia）
- 22.下列關於重症肌無力（myasthenia gravis）之敘述，何者正確？
A.大腦皮質病變引發
B.平滑肌及骨骼肌皆會受到影響
C.較少使用的肌肉較不易出現異常性疲勞
D.易影響控制眼睛及咽喉部的肌肉
- 23.下列那條神經受損，會造成肩胛骨內緣外掀（winging of the scapula）？
A.下肩胛神經（subscapular nerve）
B.長胸神經（long thoracic nerve）
C.腋神經（axillary nerve）
D.肌皮神經（musculocutaneous nerve）
- 24.下列有關意外性腦傷（TBI）之多重感覺刺激（multisensory stimulation）治療，何者敘述錯誤？
A.提供加速性前庭刺激以喚醒昏迷患者
B.以閃光刺激張眼反應
C.提供長時間重複且聲調平和的聽覺刺激為佳
D.以姿勢變換提供本體感覺刺激
- 25.下列何者不是意外性腦傷（TBI）之次級損傷？
A.腦骨骨折
B.顱內壓（ICP）增加
C.創傷後癲癇
D.腦水腫
- 26.下列那一項退化性疾病其病因是中樞神經系統去髓鞘化（demyelination）而造成？
A.帕金森氏症
B.後天免疫不全
C.格巴二氏症候群（Guillain-Barré syndrome）
D.多發性硬化症
- 27.治療掌內肌群（intrinsic muscles）太緊，使用功能性手部固定副木時，下列敘述何者正確？
A.應將掌指關節固定於伸直姿勢，並讓近端指節與遠端指節自由活動
B.應將掌指關節固定於屈曲姿勢，並讓近端指節與遠端指節自由活動
C.應將掌指關節固定於伸直姿勢，並將近端指節與遠端指節固定於屈曲姿勢
D.應將掌指關節固定於屈曲姿勢，並將近端指節與遠端指節固定於屈曲姿勢
- 28.腦中風之後，下列何項評量結果較能預測未來之步行能力恢復、坐姿平衡及日常生活功能？
A.軀幹控制
B.下肢感覺功能
C.下肢關節活動度
D.溝通能力
- 29.有關MAS（Motor Assessment Scale）與FMA（Fugl-Meyer Assessment）二項動作評估工具之比較，下列敘述何者錯誤？
A.MAS評估之內容與日常活動動作較相關
B.平衡方面，二者皆僅評估靜態坐姿平衡
C.評估FMA花費時間比MAS長
D.對於嚴重中風病患之進步情形評估，MAS比FMA較不敏感
- 30.關於義肢，下列敘述何者錯誤？
A.肘下截肢（below elbow）為橈骨橫斷截肢（transradial amputation）之同義詞
B.主動關閉機制（voluntary closing mechanism）具有較好的本體回饋
C.主動關閉機制為上肢義肢末端保持打開，直到拉線力量夠大將之關閉
D.主動張開機制（voluntary opening mechanism）病人的接受度較差
- 31.伸指肌腱依照解剖位置可以區分為7區，在第1、2區受傷會造成：
A.鈕釦指變形（boutonniere finger deformity）
B.球棍狀指變形（mallet finger deformity）
C.扳機指變形（trigger finger deformity）

- D.鵝頸指變形 (swan-neck finger deformity)
- 32.有關維持老年失智症病人認知功能所採取的治療策略，何者最適當？
- A.家事處理訓練時，採一次示範全程活動較佳
 - B.爲了提高持續力，活動時間應安排較長一些
 - C.緩和運動，增進身體功能
 - D.安排活動要以減少其對往事的回憶爲原則
- 33.下列何者是患有流暢性失語症 (fluent aphasia) 中風個案的表現？
- A.可依口語指示做動作
 - B.可依文字指示做動作
 - C.口齒不清
 - D.答非所問
- 34.因腦傷昏迷的個案，所呈現去大腦化僵硬 (decerebrate rigidity) 的姿勢爲何？
- A.四肢皆爲屈曲
 - B.四肢皆爲伸直
 - C.雙上肢屈曲，雙下肢伸直
 - D.雙上肢伸直，雙下肢屈曲
- 35.職能治療師可以用LEARN的5字要訣去面對老年人個案，下列關於這5字的敘述何者錯誤？
- A.L表示用心傾聽 (listen)
 - B.E表示仔細解釋 (explain)
 - C.R表示尊重其意見 (respect)
 - D.N表示協調一致的處置 (negotiate)
- 36.穿戴副木時對於皮膚最大的傷害，來自下列何種受力？
- A.拉力
 - B.壓力
 - C.張力
 - D.剪力
- 37.手部燒傷個案應以副木維持姿勢，下列姿勢何者錯誤？
- A.手腕伸張 (extension) 約30度
 - B.掌指關節屈曲 (MP flexion) 約70度
 - C.指間關節 (IP) 自然屈曲
 - D.大拇指外展伸張 (abduction and extension)
- 38.下列關於截肢患者以彈性繃帶塑形的敘述，何者錯誤？
- A.主要以螺旋環狀包紮爲主
 - B.壓力要由遠端向近端漸降
 - C.每層繃帶要重疊覆蓋約1/3到1/2繃帶寬
 - D.肘下截肢者要包到肘關節以上
- 39.關於上肢義肢的檢查標準，下列敘述何者錯誤？
- A.肘下義肢須在手肘屈曲90度時能完全打開手勾
 - B.長肘下 (long B/E) 截肢者穿上義肢後，應仍能旋轉前臂約50% 的正常角度
 - C.肘上截肢者穿上義肢後應仍能外展上臂至少達90度
 - D.肘上義肢在手肘完全屈曲時，能打開手勾至少達70%
- 40.椎間盤疾病常造成下背痛的問題，下列關於椎間盤之敘述何者正確？
- A.纖維環 (annulus fibrosus) 是由膠狀物質組成極富黏彈性的構造，其功用在於協助脊柱緩衝震力
 - B.當脊柱向前屈曲時，椎間盤內之髓核會向前方移動，故前縱韌帶受損之患者，亦出現椎間盤前突之情形
 - C.脊柱同時做伸展及轉動動作時，會對椎間盤產生最大的受力情形，故應避免此動作的發生
 - D.研究指出超過25歲後的椎間盤纖維環就會開始出現退化，椎間盤的結構也因此變得較弱
- 41.下列有關柯門氏鐘擺運動 (Codman's pendulum exercise) 的敘述，何者正確？
- A.此運動乃利用抗重力 (anti-gravity) 之原理，訓練受傷肢體之肌力
 - B.常用於肩部骨折患者術後6至8週時之治療活動，用以刺激骨痂的形成加速癒合
 - C.患者需於仰臥 (supine) 的姿勢，由治療師協助下才可執行此運動
 - D.此運動可用以處理上肢骨折患者術後水腫之情形
- 42.下列何種診斷的個案其患肢無需接受感覺再教育的介入？
- A.周邊神經損傷
 - B.植皮 (skin grafting)
 - C.中風
 - D.脊髓完全損傷

43. 當腕骨中的舟狀骨 (scaphoid) 發生骨折，製作的副木除了固定腕關節外，還要同時固定那一個部位？
- A. 拇指
 - B. 食指
 - C. 中指
 - D. 小指
44. 關於手傷後所產生的疤痕 (scar)，下列敘述何者錯誤？
- A. 與皮膚或肌腱產生沾黏，則會對動作產生限制
 - B. 發生在跨關節處，容易產生攣縮，會對動作產生限制
 - C. 尚未成熟的疤痕是呈現黃色略帶灰色
 - D. 成熟後的疤痕是柔軟、平順的
45. 有關肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 和多發性硬化症 (MS) 的比較，下列何者正確？
- A. 兩者皆是運動神經元病變引起
 - B. 前者無復發、緩解期，後者有
 - C. 兩者皆好發於女性
 - D. 兩者都是晚發性的疾病，平均都在50歲以後
46. 關於吞嚥困難病患進行吞嚥治療時，下列敘述何者錯誤？
- A. 碰觸病人的臉或口腔內部，均須戴手套
 - B. 若病人的臉色或呼吸速度突然改變，可能是食物誤入氣管，應立即停止餵食
 - C. 吞嚥後，病人聲音突然改變或發不出聲音，應立即停止餵食
 - D. 為避免食物誤入氣管，應盡量將頭轉向一側餵食
47. 下列何技巧是根據玻巴斯 (Bobath) 神經發展治療途徑之主張，用來誘發中風病人患側上肢動作功能？ ①承重 (weight bearing) ②聯合反應 (associated reaction) ③放置與維持 (place and hold) ④同側肢體聯合運動 (homolateral limb synkinesis)
- A. ①②
 - B. ②③
 - C. ①③
 - D. ②④
48. 試問轉環式湯匙叉 (swivel spork) 適合下列何種病患使用？ ①橈骨遠端骨折後，前臂旋後 (supination) 功能不佳之個案 ②小腦損傷導致上肢協調功能不佳之個案 ③腕隧道症候群導致手指感覺異常之個案 ④抓握功能不良之頸髓損傷個案
- A. ①②
 - B. ②④
 - C. ①③
 - D. ①④
49. 有關通用設計 (universal design) 的概念，下列何者正確？
- A. 較適用於腦外傷、中風、脊髓損傷的病患
 - B. 為障礙者而設計，可排除其障礙，提升其獨立性
 - C. 使用產品時需針對特定功能障礙者進行改裝與調整
 - D. 產品的操作方式簡單，不需要特別學習
50. 張太太是一位家庭主婦，每天為家事而忙碌，若根據職能治療的生態模式 (Ecology Model) 將行為表現區分為三個層次，請問張太太的那一個行為屬於「任務 (Task)」層次？
- A. 洗菜
 - B. 切菜
 - C. 可煮煮一道菜
 - D. 負責烹調家人晚餐
51. 一名腦傷病患前來接受職業復健，目標是希望重返原本的大樓清潔員工作，下列介入與內容的配對何者錯誤？
- A. 功能性能力評估 (functional capacity evaluation)：評估個案一般性的生理認知等功能
 - B. 工作強化 (work hardening)：訓練大樓清潔工作所需的功能、態度、工作耐力與其他大樓清潔工作相關的能力
 - C. 工作適能 (work conditioning)：強調個案肌肉力量、心肺肌肉耐力、動作控制的訓練
 - D. 工作任務分析 (job task analysis)：分析欲返回的特定大樓清潔的工作內容、程序、環境與所需用到的功能
52. 治療師考慮到青少年穿戴副木可能會引起別人不必要的注意，是屬於下列何種職能領域之考量？
- A. 工作
 - B. 上學

- C.自我照顧
D.社會參與
- 53.下列何者非工作樣本評量工具？
A.傑考氏職前技能評估（Jacobs Prevocational Skill Assessment）
B.明尼蘇達手部操作測驗（Minnesota Rate of Manipulation Test）
C.VALPAR 系列
D.傑伯森手功能測驗（Jebsen Hand Function Test）
- 54.下列何種測驗工具之測驗項目最接近於日常活動？
A.明尼蘇達認知測驗（Cognitive Assessment of Minnesota）
B.瑞弗蜜行為記憶測驗（Rivermead Behavioral Memory Test）
C.羅文斯坦職能治療認知評量（LOTCA）
D.神經行為認知狀態檢查（Neurobehavioral Cognitive Status Examination）
- 55.在羅文斯坦職能治療認知評量老人版（LOTCA-G）中，要個案說出剛才治療師從個案身上拿走什麼東西並放在哪裡，此項目主要在測量個案下列何種記憶力？
A.語義型記憶力（semantic memory）
B.插曲式記憶力（episodic memory）
C.程序型記憶力（procedural memory）
D.內隱性記憶力（implicit memory）
- 56.在面談時個案陳述自己中風後，手腳變得不靈活，穿衣服走路都不方便，由此推測個案具備下列何種覺察功能？
A.知性覺察（intellectual awareness）
B.緊急覺察（emergent awareness）
C.預期覺察（anticipatory awareness）
D.程序覺察（procedural awareness）
- 57.下列有關視物變形症（metamorphopsia）之敘述，何者正確？①無法用視覺分辨牙刷、筆、眼鏡、鑰匙等物品②無法用視覺分辨人臉及表情③無法看出整幅畫的意思，只能看到個別的元素④無法用視覺正確排列出大小不同的球或杯子等
A.①②③④
B.僅①②④
C.僅①④
D.僅④
- 58.在處理生理殘障個案的心理情緒問題時，治療師教導個案自我調整，如肯定的溝通技巧等，則是依據下列何種介入模式而來？
A.心理動力模式（psychodynamic model）
B.認知—行為模式
C.人類職能模式
D.安適模式
- 59.71 歲的男性中風個案，患側手掌的 Semmes-Weinstein 單纖測驗結果為 3.61，觸覺辨位（touch localization）測驗結果為 1.5 至 2 公分，則此個案患側手掌之感覺狀況為：
A.輕觸覺及觸覺辨位功能皆為正常
B.輕觸覺下降，但觸覺辨位功能正常
C.輕觸覺正常，但觸覺辨位功能下降
D.輕觸覺及觸覺辨位功能皆有損傷
- 60.針對正中神經或正中神經合併尺神經受損之個案，職能治療師會使用何種方法測試其物體辨識（object recognition）之感覺功能？
A.Moving two-point discrimination test
B.Modified Moberg pick-up test
C.Jebsen hand function test
D.Roos' test
- 61.一名60歲左側偏癱中風個案，當個案右側肢體不願意承重，使得身體中線向左邊傾倒，無法進行坐姿活動，下列評估／治療方式何者最不適當？
A.治療時，讓個案在坐姿下拿右前方的水果
B.進行坐姿治療活動時，前方給予鏡子提示其姿勢
C.評估個案是否有單側忽略的現象
D.治療時，讓個案在坐姿下綁左下方的鞋帶
- 62.左腦傷之中風患者執行桌上活動時，其動作幅度及範圍有減少之現象，則此現象稱為：
A.Limb akinesia
B.Hypokinesia

- C.Hypometria
D.Motor extinction
- 63.一名劉姓治療師使用美國國衛院腦中風評估表（NIH Stroke Scale）來評估個案，下列何項不包含在此評估表？
- A.進食能力
B.上肢動作
C.下肢動作
D.最佳語言能力
- 64.有一60歲心臟疾病之出院患者，職能治療師在設計活動時應符合其年齡所能忍受50~85%之最大心跳率（Maximum Age-Adjusted Heart Rate），試問此患者活動時其心跳率應控制在何間距？
- A.50~80 bpm
B.75~95 bpm
C.80~135 bpm
D.135~185 bpm
- 65.腦中風患者有半側忽略（unilateral neglect）的現象，當治療師給予左側手臂刺激時此患者感覺為右側受到刺激，則此現象為下列何者？
- A.Allesthesia
B.Hypometria
C.Extinction
D.Anosognosia
- 66.一名因中風而左邊偏癱的江太太，現年50歲，教育程度高職，語言功能正常，警醒程度適當。當其治療師在評估時，給江太太一張A4大小的紙，上面隨機分布了許多注音符號。治療師要求江太太念出紙上所有的注音符號時，江太太並無太大問題，相反的當治療師要求江太太用右手指指出紙上所有的注音符號時，江太太遺漏了左邊大多數的符號，而右邊的注音符號皆能正確指出。請問江太太的問題最可能是下列那一項？
- A.感覺型忽略（sensory neglect）
B.動作型忽略（motor neglect）
C.同側偏盲（homonymous hemianopsia）
D.複視（diplopia）
- 67.吉蘭-巴瑞症候群（Guillain-Barré syndrome）是一個快速且進行性的多發性神經病變，下列何者不是它的特徵？
- A.肢體的麻痺較常從兩側足部同時開始
B.心跳過慢
C.會出現姿勢性高血壓
D.出現臉部麻痺
- 68.關於解釋老人心理調適過程之「連續理論」（continuity theory），其所強調的重點或做法，下列何者正確？
- A.連續理論與撤離理論（disengagement theory）相似
B.強調參與屬於其發展階段的特定活動
C.主張老人若要維持較高生活滿意度，就應該保持和成年人一般的活動程度
D.和老人一起找出從過去到現在覺得比較有意義的活動，然後再提供類似的活動讓老人參與
- 69.提供副木給老人時，下列敘述何者錯誤？
- A.注意穿戴副木不影響其生活安全
B.要確實教會穿戴技巧與時機
C.提醒個案自己隨意調整副木
D.仔細觀察皮膚對副木的反應
- 70.類風濕性關節炎的手部固定副木，下列擺位角度何者錯誤？
- A.手腕保持伸展10度
B.拇指保持往掌面外展
C.指間關節保持平直位置
D.掌指關節保持屈曲35~45度
- 71.神經軸突再生速度，每天約長多長？
- A.0.1mm
B.1mm
C.1cm
D.10cm
- 72.下列何項感覺測試，不適合用來評估脊髓損傷的受傷層級？

- A.觸辨覺 (stereognosis)
 B.輕觸覺 (light touch)
 C.運動覺 (kinesthesia)
 D.表層痛覺 (superficial pain)
- 73.某一脊髓損傷個案之橈側豎腕長肌與短肌 (extensor carpi radialis longus and brevis) 肌力為F⁺ 等級，為增進個案手部功能，使用下列何種副木較適切？
 A.豎腕副木 (cock-up splint)
 B.短對掌副木 (short opponens splint)
 C.腹側功能性副木 (functional splint)
 D.長對掌副木 (long opponens splint)
- 74.胸髓第一節 (T1) 完全損傷的患者，不需要下列那種輔具？
 A.輪椅
 B.萬用套 (universal cuff)
 C.洗澡用的長柄海綿刷
 D.長柄取物夾
- 75.有一位婦女病患因手痛就診，醫師診斷為俗稱「媽媽手」的 de Quervain's disease ；轉介職能治療配置副木；則職能治療師會為這位婦人配置下列何者？
 A.長型對掌副木 (long forearm-based opponens splint)
 B.全掌固定副木 (forearm-based resting splint)
 C.豎腕副木 (forearm-based cock-up splint)
 D.拇指八字型副木 (forearm-based thumb spica splint)
- 76.以固定作用為主的副木 (immobilization splint) ，可以提供下列那些功能？① 保護 ② 降低疼痛 ③ 減輕發炎現象 ④ 協助動作功能
 A.僅①
 B.僅①②
 C.僅①②③
 D.①②③④
- 77.避免給予腦傷病人氣味強烈的嗅覺刺激，因為會過度刺激那一條腦神經？
 A.第三對腦神經 (cranial nerve III)
 B.第五對腦神經 (cranial nerve V)
 C.第七對腦神經 (cranial nerve VII)
 D.第九對腦神經 (cranial nerve IX)
- 78.進行關節活動度測量與記錄時，同一關節動作初評與再評的角度至多相差幾度皆可視為誤差範圍？
 A.15 度
 B.10 度
 C.5 度
 D.0 度
- 79.有一位個案第三掌骨 (3rd metacarpal bone) 穩定性骨折，且手掌及手指部位極度腫脹，職能治療製作副木應如何擺位固定？
 A.Intrinsic-minus position
 B.Kleinert tendon repair position
 C.Intrinsic-plus position
 D.Full extended position
80. (承上題) 該個案被副木固定在該姿勢之主因，為下列何組答案？① 水腫導致外在伸指肌黏連 ② 水腫造成掌指關節 (metacarpophalangeal joint) 處於一屈曲狀態 ③ 指間關節處的腹側板 (volar plate) 會因不當姿勢處於過度伸張之狀態 ④ 水腫導致指間關節 (interphalangeal joint) 呈現屈曲狀態 ⑤ 掌指關節的側韌帶 (collateral ligaments) 會因不當姿勢處於鬆弛狀態
 A.① ④ ⑤
 B.③④ ⑤
 C.①③ ⑤
 D.① ② ④