

102年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3305

類科名稱：職能治療師

科目名稱：生理障礙職能治療學

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 下列有關Carr及Shepherd的動作控制治療途徑之敘述，何者錯誤？
 - 根基於動作控制的動態系統理論
 - 提供功能性活動以練習動作控制
 - 加強個案動作適應性特徵之出現
 - 建立治療性環境，以增進個案的動作功能
- 職能治療師為加強脊髓損傷病患之肌耐力（endurance），下列敘述何者正確？①所施加之阻力（resistance）為最大阻力（maximal resistance） ②活動之時間長度及反覆次數都應漸進
 - 僅①正確
 - 僅②正確
 - ①②均錯誤
 - ①②均正確
- 職能治療師未看到病人之前，通常先看轉介單之病歷資料，並據以準備第一次可能需要之評估及治療工具。此為那一種臨床推理過程？
 - 科學（Scientific reasoning）
 - 倫理（Ethical reasoning）
 - 實用（Pragmatic reasoning）
 - 故事（Narrative reasoning）
- Mc Guire（1997）提出職能治療師在臨床紀錄（clinical documentation）寫作上有六項原則，不包含下列何者？
 - 著重在功能
 - 著重在治療之細節
 - 著重在潛在原因之分析
 - 著重在根據測量之進步描述
- 下列何項動作控制屬於開放迴路系統控制（Open-loop control）？
 - 拿裝滿水的杯子
 - 從地上撿球
 - 棒球揮棒
 - 爬樓梯
- 關於職能治療的預防性介入（preventive intervention）之敘述，下列何者正確？
 - 初級預防職能治療介入，如教育類風濕性關節炎個案保護關節之技巧、人體力學及工作簡化之概念
 - 二級預防之目的乃在減少疾病的發生率，如法規制定騎機車要戴安全帽以預防車禍腦傷
 - 三級預防之目的乃在避免一個嚴重的疾病演變為永久性的失能，透過職能治療的介入增進個案最大的功能
 - 四級預防乃運用輔助器具的介入（如副木或支架），避免疾病（如關節炎、脊柱側彎）持續地惡化
- 有關高科技輔具中的直接或間接選擇介面，下列敘述何者正確？
 - 電腦中的鍵盤屬於間接選擇
 - 直接選擇的速度較間接選擇快
 - 間接選擇的缺點是需要較好的協調能力
 - 掃描（scanning）屬於直接選擇的一種
- 下列代償原則，何者錯誤？
 - 關節活動度受限者，使用可伸長把手的工具
 - 協調能力不佳者可使用較輕的工具，較好控制
 - 記憶力不佳者，可使用記事本等外在輔助
 - 低耐力者要使用較輕的工具
- 有關自我照顧活動的發展順序，下列何者正確？
 - 移位→穿衣→梳洗
 - 脫衣→洗澡→穿衣
 - 梳洗→自我餵食→穿衣

- D.自我餵食→移位→穿衣
- 10.關於把手（grab bar）之敘述，何者錯誤？
- A.垂直地面的安裝方式主要用來協助個案拉著起身（pull up）
 - B.至少需能承受200到250磅的重量
 - C.離牆面的距離1.5吋，不需太遠
 - D.毛巾架亦可作為安全把手使用
- 11.若須於手動或電動輪椅間擇一考量，下列何者較不適用電動輪椅？
- A.認知能力不佳者
 - B.漸進性功能喪失者
 - C.耐力不佳者
 - D.上肢操控能力不佳者
- 12.職能治療師會到個案工作場所做人因工學調適（ergonomic adaptation）之建議，下列何者不屬於人因工學考量之範疇？
- A.手動工具之修改
 - B.人機控制介面之適切性
 - C.人際溝通及心理層面調整
 - D.工作檯面及空間之調整
- 13.大明要訂外送比薩當晚餐，他先打104查詢商家電話，先暫時將號碼貯存腦海裡，再將剛才所貯存的電話號碼提取出來以完成訂餐，此種將訊息暫貯存又提取的記憶稱為：
- A.事件性記憶（episodic memory）
 - B.長期記憶（long term memory）
 - C.語意記憶（semantic memory）
 - D.工作記憶（working memory）
- 14.根據理查克（Lezak, 1995）指出何項認知功能包含有意志（volition）、計畫力（planning）、有目的的行動（purposive action）及有效的表現（effective performance）四項內容？
- A.推理能力（reasoning）
 - B.執行功能（executive function）
 - C.問題解決能力（problem solving）
 - D.自我感知（self-awareness）
- 15.就認知功能而言，當腦傷病患無明顯肢體動作障礙，卻無法單憑治療師的口令仿做出刷牙的動作，但是在用餐後卻能拿著牙刷完成刷牙的活動，此一病患可能罹患：
- A.模仿性失用症（imitation apraxia）
 - B.意動性失用症（ideomotor apraxia）
 - C.意念性失用症（ideational apraxia）
 - D.工具使用性失用症（tool using apraxia）
- 16.下列何者為簡易視野測試方法？
- A.刪除測驗（cancellation test）
 - B.交替測驗（alternating test）
 - C.碰觸測驗（attachment test）
 - D.面對測驗（confrontation test）
- 17.脊髓腔內巴可芬幫浦（Intrathecal Baclofen Pump, ITB）是新近常見於中樞神經系統損傷個案之處置技術，下列那一項評估最適用於評估其使用療效？
- A.Stress Test
 - B.Ashworth Scale
 - C.Glasgow Coma Scale
 - D.Mini-mental State Examination
- 18.施測徒手肌力測驗包含六步驟，由開始施測到結束依序排列應為下列何者？①擺位（position） ②觀察（observe） ③觸摸感覺（palpate） ④施加阻力（resist） ⑤分級（grading） ⑥固定（stabilize）
- A.①②③⑥④⑤
 - B.①⑥③②④⑤
 - C.①⑥②③④⑤
 - D.①③④⑥②⑤
- 19.在肌張力正常的情形下，如果出現被動關節活動度遠大於主動關節活動度，最可能是下列那一個原因造成？
- A.關節攣縮（joint contracture）
 - B.協調障礙（coordination disorder）
 - C.肌力不足（muscle weakness）

- D.關節鬆弛（joint laxity）
- 20.下列關於knowledge of results及knowledge of performance的敘述，何者正確？
- A.屬於內在式回饋（intrinsic feedback）的一種
 - B.告訴個案「站起時身體前傾的角度不夠」是屬於knowledge of results
 - C.告訴個案「他／她已將患側的毛衣袖子拉上」是屬於knowledge of performance
 - D.告訴個案「手肘伸直的主動關節活動是0—90度」是屬於knowledge of results
- 21.使用1 MHz的超音波治療可使組織加熱厚度達幾公分？
- A.1
 - B.3
 - C.5
 - D.7
- 22.下列何者為評估忽略症的標準化套裝評估工具，並且目的為「提供病人的主要問題給治療師，並藉以擬定適當的介入方案」？
- A.Letter cancellation test
 - B.Drawing or copying
 - C.Line bisection
 - D.Behavioral Inattention Test
- 23.根據Warren所提出視知覺發展階層之架構，下列何項不屬於視覺基礎能力（foundation skills）？
- A.視覺敏銳度（visual acuity）
 - B.眼球動作控制
 - C.視野
 - D.視覺注意力
- 24.某中風病人在操作雙手串珠活動中，經常遺漏散布桌上左邊的珠子，他會多次努力掃視企圖向左侧尋找，但仍無法全找到。此病人最有可能為下列何種缺失？
- A.輕度左側忽略
 - B.重度左側忽略
 - C.二眼視力不良
 - D.左側視野缺陷
- 25.某具有獨立行走功能之中風病人，治療完畢後卻無法自行回到病房，推測其最有可能原因是下列何項缺失？
- A.form constancy
 - B.position in space
 - C.topographical orientation
 - D.body part identification
- 26.中風後，產生構音問題或發音肌肉不協調，稱為：
- A.Broca's aphasia
 - B.Wernicke's aphasia
 - C.Anomic aphasia
 - D.Dysarthria
- 27.在脊髓損傷急性期臥床時，下列何者不是上肢正確的擺位姿勢？
- A.肩關節外展約80度
 - B.肩關節外轉
 - C.肘關節完全伸展
 - D.前臂旋後（supination）
- 28.下列何者不是脊髓損傷個案姿勢性低血壓（orthostatic hypotension）的症狀？
- A.頭暈
 - B.噁心
 - C.劇烈頭痛
 - D.失去意識
- 29.多發性硬化症（multiple sclerosis）個案正確的運動原則為下列何者？
- A.為節省體能，不建議執行有氧運動
 - B.工作間穿插短暫的有氧運動，以改善疲勞症狀
 - C.避免於傍晚體力較差時運動，應於早上工作前執行
 - D.等到能穩定執行有氧及牽張運動後可考量進行肌力運動
- 30.下列何者為錯誤的後小兒麻痺症候群（postpolio syndrome）介入方式？
- A.對執行ADL的肌肉群，應強力增加其肌力訓練
 - B.建議活動執行方式以小幅調整為原則
 - C.某些個案需建議適度的減輕體重

- D.避免過度使用受侵犯的肌肉群
- 31.因應肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis）快速進展的疾病特性，下列何項介入的重要性相對較低？
- A.居家改造（home modification）
B.自主動作控制及肌力強化訓練
C.輔具建議及提供
D.面對生命終點的身心準備
- 32.有關老化問題，下列敘述何者錯誤？
- A.由於憂鬱症造成之健忘，經過治療後，記憶力可以恢復
B.正常老化人士之智力測驗結果，其語言分測驗成績（verbal subscales）比操作分測驗成績（performance subscales）退步較多
C.正常老人也會記憶力下降，常會難於找到適當用詞或忘了剛剛東西放在那裡
D.肌肉系統中，尤其是type II fiber萎縮及減少較嚴重
- 33.髖關節置換手術後的禁忌髖關節動作，不包含下列何者？
- A.外展
B.內收
C.屈曲超過90°
D.旋轉
- 34.對於類風濕性關節炎及退化性關節炎的敘述，何者錯誤？
- A.類風濕性關節炎易出現早晨僵硬（morning stiffness）
B.類風濕性關節炎好發於肩膀、髖關節等處
C.退化性關節炎常見於膝蓋、髖關節等處
D.類風濕性關節炎會有關節觸痛（tenderness）跟腫脹的情形出現
- 35.下列有關愛滋病（AIDS）之感染途徑，何者錯誤？
- A.以母乳餵食
B.輸血過程
C.不安全性交
D.與AIDS患者共用餐具
- 36.脊髓損傷個案使用束腹通常是為了改善其何種問題？
- A.膀胱膨脹
B.坐姿平衡不良
C.自律神經反射障礙
D.姿勢性低血壓
- 37.個案中風後最常出現的心理情緒反應為下列何者？
- A.否認
B.憤怒
C.憂鬱
D.情緒失控
- 38.下列何項敘述是最能代表個案處於Rancho Los Amigos認知功能第IV階段的行為特徵？
- A.聽到聲音或被拍肩膀時，個案會全身彎曲
B.可練習穿脫上衣，但很容易分心
C.當排形狀板無法完成時，會哭鬧
D.不服從治療師的指令，會哭鬧想拔掉鼻胃管
- 39.類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）患者在手部可能出現下列那些症狀？①近端指間關節（PIP joint）紡錘狀腫大 ②關節脫臼 ③哈柏登氏結節（Heberden's nodes） ④扳機指 ⑤掌指關節橈側偏移（radial drift） ⑥包查氏結節（Bouchard's nodes）
- A.①②④
B.①②③⑤
C.②④⑤⑥
D.②③④⑥
- 40.下列關於正常步態（normal gait）及病態步態（pathological gait）的敘述及處置，何者正確？
- A.正常步態在一個完整的週期中會出現3次的雙腳支撐期（double limb support phase）
B.髖關節的環繞步態（circumduction gait）是患者為代償垂足之現象，而出現之有效能性之動作
C.長期膝關節後彎（genu recurvatum）之步態，易使膝關節受力不當而使結構破壞之情形，使用功能性的足部裝具（foot orthosis）不能改善此一步態
D.正常步態的站立期（stance phase）與擺盪期（swing phase）的比例約為3：2
- 41.Glasgow Coma Scale 常用以評估急性期腦傷個案的嚴重程度，其評估內容包含：
- A.呼吸、認知、感覺反應

- B.認知、眼睛、語言反應
 - C.動作、語言、眼睛反應
 - D.感覺、語言、動作反應
- 42.下列何者最不可能是急性期燒燙傷病患之職能治療處置？
- A.製作副本
 - B.評估壓力衣的合適度
 - C.提供適當的擺位
 - D.提供適當輔具以增進獨立性
- 43.下列何種測驗常用來檢驗尺神經損害？
- A.芬可斯坦測驗（Finkelstein's test）
 - B.菲倫氏測驗（Phalen's test）
 - C.艾倫氏測驗（Allen's test）
 - D.福門氏症狀（Froment's sign）
- 44.燒燙傷患者增生疤痕（hypertrophic scar）之敘述何者正確？
- A.生成時間在傷後前半年內
 - B.未成熟的疤痕為紅色，成熟期為白色
 - C.彈性衣的壓力，在可忍受範圍下愈大愈好
 - D.按摩（massage）對疤痕並無太大助益
- 45.常有病患對自己受傷的手產生水腫（edema）現象很擔心，問職能治療師是否可以浸泡熱水來消腫。下列那一個回答是正確的？
- A.浸泡熱水可促進血液循環，是好的方法，邊泡熱水邊做運動效果更好
 - B.浸泡熱水後把手舉高，促進血液回流，同時邊做運動效果更好
 - C.應該用熱敷的方式，並把手舉高，同時邊做運動效果更好
 - D.千萬不可以浸泡熱水，因為水腫部位的皮膚很脆弱，容易燙傷
- 46.Barthel Index評估病人日常生活功能，共有幾個項目？
- A.8
 - B.9
 - C.10
 - D.12
- 47.下列何者不是活動調整（adaptation）常用的方法？
- A.改變環境
 - B.使用輔具
 - C.簡化活動步驟
 - D.提升個案的功能
- 48.分析一個活動所包含的要素，需包括那些項目？① 完成此活動所需的技巧② 完成此活動所需的身體構造與功能③ 活動的步驟順序④ 所需物品的特性⑤ 對個案的描述
- A.①②③④⑤
 - B.僅①②③④
 - C.僅②③④⑤
 - D.僅①⑤
- 49.書寫職能治療病歷時，治療目標的敘述需要包含五個要素，依序為：人（actor）、行為（behavior）、情境（condition）、程度（degree）及下列何者？
- A.預期如何執行（expected strategy）
 - B.預期執行模式（expected model）
 - C.預期何時達成（expected time frame）
 - D.預期下一個目標（expected next goal）
- 50.患者因手指關節活動度不足，其治療師給予加大握把的湯匙來進食，請問此治療師是依據何種參考架構來提供治療？
- A.生物力學參考架構
 - B.視知覺參考架構
 - C.神經發展參考架構
 - D.復健參考架構
- 51.職能治療專業對病患的介入型態有許多類型，請問：對於中風病患的患側上肢施行一些促進動作恢復技巧（facilitation techniques），是屬於何種類型？
- A.以職能為基礎的活動（occupation-based activities）
 - B.有目的的活動（purposeful activities）
 - C.預備方法（preparatory methods）
 - D.教育程序（education process）

52. 關於使用人體力學（body mechanics）處理家務（homemaking）的敘述，下列何者正確？
- A. 在搬運或抬舉物品時，儘可能將物品遠離身體，以增加力臂便於背部肌肉施力
 - B. 搬運物品的原則是：拉物（pulling）優於推物（pushing），推物又優於提物（lifting）
 - C. 在搬運低處物品時，使用背部肌肉會優於腿部肌肉，因為背部肌肉較為長且強壯
 - D. 搬物時儘可能維持肩部平行於髖部，並儘可能避免產生軀幹扭轉的情形
53. 關於步行輔具的描述，下列何者正確？
- A. 步行輔具一般可再細分為拐杖（crutches）、助行器（walkers）及輪椅（wheelchair）
 - B. 若個案的動態站姿平衡穩定性及肌耐力不佳，會建議個案先行使用「附前輪式助行器（front-wheeled walker）」協助步行
 - C. 前臂型拐杖（forearm crutches）使用上較腋下型拐杖（axillary crutches）費力且困難，因此建議活動力高的個案應使用腋下型拐杖協助步行
 - D. 具有將身體重量從雙腳分散至使用上肢之原則來協助步行的輔具，僅能建議個案使用前臂型拐杖（forearm crutches）
54. 關於偏癱個案異常步態的描述，下列何者錯誤？
- A. 患側腳之stride length通常較正常人小
 - B. cadence通常較正常人小
 - C. 患側腳之stance phase較健側腳長
 - D. walking base通常較正常人寬
55. 「專業職業復健人員將個案安置於適切的真實工作情境中訓練，使其熟悉工作內容而能順利重返職位」，上述為何種職業復健介入方式？
- A. 工作強化（work hardening）
 - B. 工作適能（work conditioning）
 - C. 職業訓練
 - D. 現場試做
56. 下列有關認知功能及其影響因素之敘述，何者錯誤？
- A. 額葉損傷會影響執行功能（executive function）
 - B. 老化過程影響結晶智慧（crystallized intelligence）顯著
 - C. 疼痛及疲勞會影響工作記憶功能（working memory）
 - D. 憂鬱不會造成記憶力下降
57. 下列那些資訊應該包含於結案報告中？① 個案從初評至結案時的功能變化狀況 ② 期間所提供的介入摘要 ③ 個案的抱怨或主訴摘要 ④ 未來的介入目標
- A. 僅①②
 - B. 僅①②③
 - C. 僅①③④
 - D. ①②③④
58. 第四節胸髓右半側損傷的個案，其左側大腿的感覺狀況為：
- A. 本體覺缺失
 - B. 疼痛覺缺失
 - C. 二點區辨覺缺失
 - D. 無任何感覺缺失
59. 下列對周邊神經損傷個案的感覺再教育訓練原則，何者正確？
- A. 訓練觸覺辨位時，刺激由輕至重
 - B. 訓練物品辨認時，物品由大至小
 - C. 先練習物品辨認，再練習觸覺辨位
 - D. 每天進行一次訓練，每次持續一小時以上，效果較顯著
60. 負責視覺主動搜尋空間功能之腦部構造為：
- A. 額葉眼動區（frontal eye field）
 - B. 下視丘（hypothalamus）
 - C. 上丘（superior colliculi）
 - D. 枕葉
61. 有關手傷後組織修復（tissue healing）的過程敘述，下列何者正確？
- A. 組織修復期程為：發炎期（inflammation）→ 重塑期（remodeling）→ 纖維母細胞期（fibroplasia）→ 成熟期（maturation）
 - B. 纖維母細胞期（fibroplasia）約從受傷後 4 天開始作用，並持續約 2~6 週，此階段患處的張力隨著膠原纖維增加而逐步增加
 - C. 成熟期（maturation）一般最多約持續 4~6 個月，此階段的膠原纖維數量急速增加，組織之結構重組亦較佳，因此可承受較強的張力
 - D. 纖維母細胞期（fibroplasia）的組織修復效應強烈，為避免日後黏連（adhesion）情形的發

- 生，建議給予動態型副木及阻力性運動，以破壞疤痕組織的增生
62. 手部治療師常會處理肌腱鬆弛術（tenolysis）後的個案，下列有關此類手術及術後照顧之敘述，何者正確？
- A. 外科執行此手術的要則，為個案的受傷組織及疤痕組織必須在仍處於未成熟的狀態下方能執行
 - B. 通常接受此手術術後約 48~72 小時之後，始建議復健活動之進行，以確保縫合組織之完整性
 - C. 此類手術後並不會造成水腫情形，因此治療目標需關注於肌腱滑動性的改善
 - D. 通常個案之被動關節活動度達最大角度時，才會建議接受此手術
63. 有關扳機指（trigger finger）的敘述及介入，下列何者正確？
- A. 最常發生位置是手部滑車系統（pulley system）中的第一十字滑車（C1 pulley）部位
 - B. 通常最優先的處置方式是以手術鬆解滑車系統（pulley system）
 - C. 主要發生原因是屈指肌腱腱鞘炎（tenosynovitis）
 - D. 針對此疾病可製作副木將掌指關節（metacarpophalangeal joint）固定於一 90 度屈曲姿勢，使肌腱滑動時避免出現扣扳機效應（triggering effect）
64. 針對屈指肌腱受損術後之復健，正確之治療觀念及介入策略為何？
- A. 如何減少黏連（adhesion）的形成及避免肌腱修復處的強度被破壞，是治療重要目標，兩者卻也相互衝突
 - B. 運用背式副木（dorsal splint）將手腕固定於伸展狀態（約 30 度）、掌指關節固定於最大屈曲角度（約 70~90 度），最能保護肌腱修復處結構的完整性
 - C. 目前臨床常用之幾個控制下運動（controlled mobilization）技巧，均是以「被動伸展（passive-extension）、主動屈曲（active-flexion）」為原則
 - D. 臨床上對於屈指肌腱受損位置多會以分區（zone）之方式描述，手指屈肌部分可分為 7 區，拇指另分出 5 區
65. 一名中風個案的家屬對治療師敘述了下列狀況：個案在早上刷牙時，錯把梳子拿來刷牙，在家屬指正他之後，他又把牙膏拿來梳頭，而且詢問個案牙刷的功用時，個案也無法說明。治療師評估個案的感覺與動作協調度之後，這兩項能力並沒有明顯的缺失。請問此個案的問題應為下列何者？
- A. 渥尼克失語症（Wernicke's aphasia）
 - B. 穿衣失用症（dressing apraxia）
 - C. 概念性失用症（conceptual apraxia）
 - D. 構音困難（dysarthria）
66. 下列何者不是後大腦動脈（posterior cerebral artery）出血所造成的臨床症狀？
- A. 辨色障礙（color agnosia）
 - B. 同側偏盲（homonymous hemianopsia）
 - C. 記憶力缺失（memory deficit）
 - D. 意念性失用症（ideational apraxia）
67. 下列關於缺血性（ischemic）中風與出血性（hemorrhagic）中風的敘述，何者正確？
- A. 後者佔所有中風病患的比率較前者高
 - B. 栓子性腦梗塞（embolic infarction）屬出血性中風的一種
 - C. 栓子性腦梗塞（embolic infarction）主要致病原因為血管硬化處的膽固醇於血管內壁沉積，屬於原地型的梗塞
 - D. 蜘蛛膜下腔出血常發生於蜘蛛膜下腔血管脆弱或動脈畸形瘤者身上
68. 針對心肺疾病之患者，若其活動量歸類於 4~6 METs（metabolic equivalents），則設計下列何種活動可協助患者達到治療之目的？
- A. 跪著擦地板
 - B. 種植幼樹苗
 - C. 鋪床
 - D. 搬運重的家具
69. 手部中指頭是屬於那個皮節（dermatome）？
- A. C5
 - B. C6
 - C. C7
 - D. T1
70. 一名中風個案，經評估後其布氏階段（Brunnstrom stage）為第三階段；治療師對其患側上肢進行和緩伸展動作，使其肩關節外旋與外展、手肘伸直、手腕中立、手指張開。請問此治療師使用的治療手法應為下列何者？
- A. 慢速反轉（slow reversal）
 - B. 節律性啟動（rhythmic initiation）
 - C. 放置與維持（place and hold）

- D.反射抑制模式（reflex-inhibiting patterns）
- 71.有一慢性阻塞性肺炎（COPD）之患者伴隨吞嚥困難（dysphagia）的現象，治療師應如何協助其吞嚥？
- A.身體往患側傾斜
 - B.身體往健側傾斜
 - C.下巴微縮身體往前傾
 - D.身體放鬆並往後傾
- 72.關於帕金森氏症症狀對功能影響的敘述，下列何者錯誤？
- A.翻正（righting）與平衡（equilibrium）反應的降低造成跌倒機率上升
 - B.血清素的缺乏（serotonergic deficits）會導致憂鬱症狀
 - C.自我照顧能力是影響自覺的生活品質（self-perceived quality of life）的關鍵因素
 - D.手部震顫比姿勢控制障礙對日常生活功能的執行影響更大
- 73.關節攣縮（contracture），如果以徒手進行持續牽張（maintained stretching）方式來增加關節活動度，每次牽張達到最大活動度時，最短應維持多少時間即可達到最佳效果？
- A.10秒
 - B.30 秒
 - C.45 秒
 - D.60 秒
- 74.關於脊髓損傷患者的感覺評估，下列敘述何者正確？
- A.評估是以感覺神經皮節的分布為依據，人體共有 25 個感覺神經皮節
 - B.S2 的感覺神經皮節分布是位於大腿背部
 - C.L4 的感覺神經皮節分布是位於小腿外側和腳掌背部
 - D.C6 的感覺神經皮節分布是在前臂內側
- 75.C7 頸髓完全損傷的意義為何？
- A.第七節及以下頸髓神經的功能完全喪失
 - B.第七節以上的頸髓神經功能完全喪失
 - C.手指屈曲肌力最少要在第3級
 - D.第七節頸髓為最後保留完整感覺與動作功能的神經節
- 76.治療週邊神經受損所致手部缺失時，下列副木何者正確？
- A.尺神經受損為第四、五指的掌指關節保持屈曲 30~45 度
 - B.橈神經受損為手腕關節保持屈曲 20~30 度
 - C.正中神經受損為手腕關節保持屈曲 30~40 度
 - D.尺肘隧道症候群為手肘關節保持屈曲 120 度
- 77.當時下載肢患者欲打開其義肢手勾整理褲頭時，下列何者效果最佳？
- A.將上臂屈曲
 - B.將上臂伸展
 - C.將雙肩一起外展
 - D.將雙肩一起內收
- 78.關於腦傷病人的預後，下列何者錯誤？
- A.去大腦皮質僵直（decorticate rigidity）的個案預後較去大腦僵直（decerebrate rigidity）的個案差
 - B.初始的 Glasgow Coma Scale 得分低於 8 分且持續超過 6 小時屬於嚴重腦傷，預後較差
 - C.創傷後失憶（post-traumatic amnesia）超過 7 天，預後較差
 - D.年齡大於 60 歲的病人預後較差
- 79.下列關於腦傷病人的評估何者錯誤？
- A.可使用Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 評估知覺能力（perceptual function）
 - B.有酒癮病史的腦傷病人需評估休閒模式（leisure patterns）
 - C.有必要了解腦傷病人受傷前的人格
 - D.評估視力相關能力前須先做知覺評估
- 80.國際防癌聯盟（International Union Against Cancer）所採用 癌症的分期系統，依疾病的侵犯程度大致分為第一期至第四期，下列相關的敘述何者正確？
- A.腫瘤僅限一處未擴散，且小於5公分 是第一期
 - B.腫瘤除了擴散到鄰近淋巴結，還波及附近器官或組織通常是第二期
 - C.已有遠端多重器官轉移通常是第三期
 - D.手術切除是最常用於第四期的醫療方式