

104年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代 號：3304

類科名稱：助產師

科目名稱：各科護理學（包括內外科、兒科、精神科與社區衛生護理學）

考試時間：1小時

座號：_____





※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 導致重症肌無力症患者出現痰多，無力咳出，且感到吸氣時有阻力的主要原因為何？
 - 氣道變狹窄
 - 無效性咳嗽
 - 肺順應性（lung compliance）變差
 - 免疫機能不良
- 有關完全腸胃道外營養（TPN）之敘述，下列何者錯誤？
 - TPN 突然停止輸液，需密切監測血糖變化，以防反彈性高血糖反應
 - 出現單側頸靜脈膨脹或手臂水腫時，需懷疑有靜脈血栓的可能
 - 因 TPN 屬於高張溶液，輸注時應選擇大靜脈注入
 - TPN 管路嚴禁使用任何藥物
- 肝硬化造成腹水的機轉為何？①肝門脈高壓 ②血漿膠體滲透壓上升 ③腎素－血管緊縮素－醛固酮（Renin-Angiotensin-Aldosterone）系統被抑制 ④醛固酮（Aldosterone）作用亢進
 - ①③
 - ①④
 - ②③
 - ②④
- 影響骨折癒合時間長短與結果之敘述，下列何者正確？
 - 緻密骨癒合較海綿骨快
 - 橈骨骨折癒合時間較指骨短
 - 孩童的骨折癒合時間較老年人長
 - 適當的骨制動會有較好的骨癒合
- 美尼爾氏症候群（Meniere's syndrome）發作時，會出現下列那三個典型症狀？
 - 眩暈（vertigo）、頭痛、中樞神經性失聰
 - 眩暈（vertigo）、耳鳴、感覺神經性失聰
 - 暈眩（dizziness）、耳鳴、傳導性失聰
 - 暈眩（dizziness）、複視、功能性失聰
- 關於穩定型心絞痛的描述，下列何者正確？
 - 多於運動時發生，休息多可緩解
 - 疼痛強度低，病人能繼續其原有活動
 - 胸痛時間長，多持續 30 分鐘以上
 - 疼痛為燒灼感，平躺時會較改善
- 病患突然出現頸靜脈怒張、中心靜脈壓升高、呼吸困難、皮膚發紺、血壓降低、脈搏壓變窄、奇異脈（paradoxical pulse）及深吸氣時脈搏變弱，則可能為：
 - 心包填塞
 - 敗血性休克
 - 房室傳導阻斷
 - 心肌炎
- 下列何者不是骨髓移植後發生移植體對抗宿主疾病（GVHD）主要被侵犯的部位？
 - 皮膚
 - 神經系統
 - 肝臟
 - 腸胃道黏膜
- 下列何者為後天免疫缺乏症候群病人最主要的致死原因？
 - 白色念珠菌感染
 - 巨細胞病毒感染
 - 肺囊蟲肺炎
 - 瀰漫性結核

- 10.腎臟移植後病人服用 Cyclosporine，其主要目的為何？
A.鎮靜止痛
B.預防感染
C.預防排斥
D.利尿消炎
- 11.收集疑似有肺結核住院病人的痰液檢體，下列何者為最適宜的時機？
A.醫囑開立後，立即收集
B.皮膚試驗後，立即收集
C.一早病人起床後，立即收集
D.病人刷牙並漱口後，立即收集
- 12.病人使用陽壓呼吸器時容易出現下列那些合併症？①氣胸 ②高血壓 ③胃部脹氣 ④腦壓上升 ⑤壓力性潰瘍
A.①③⑤
B.②④⑤
C.②③④
D.①②③
- 13.關於酸鹼不平衡的敘述，下列何者錯誤？
A.慢性腎衰竭病人易致代謝性酸中毒
B.重度腹瀉者易致代謝性鹼中毒
C.過度焦慮、歇斯底里症病人易致呼吸性鹼中毒
D.慢性阻塞性肺疾病病人易致呼吸性酸中毒
- 14.為行血液透析，病人左手臂做動靜脈瘻管（A-V fistula），下列護理措施何者正確？
A.動靜脈瘻管處，若摸到或聽到血流雜聲（bruit），表示此處凝血，應儘速處理
B.教導病人避免在瘻管處施壓、用力提重物
C.以彈性繃帶綁住，以保護瘻管
D.術後要密切測量該手臂之血壓，以評估其血液循環狀況
- 15.甲狀腺功能亢進病人之護理，下列何者正確？①採高蛋白飲食 ②採高纖維飲食 ③提供涼爽環境 ④多吃海帶
A.①②
B.②③
C.③④
D.①③
- 16.糖尿病酮酸中毒病人，在昏迷之前會出現下列何種異常呼吸？
A.庫斯馬氏呼吸（Kussmaul's breathing）
B.呼吸徐緩（bradypnea）
C.陳施氏呼吸（Cheyne-Stokes breathing）
D.畢歐氏呼吸（Biot's breathing）
- 17.有關胰島素低血糖反應的早期臨床表徵，下列何者錯誤？
A.嗜睡
B.頭痛、軟弱
C.肌肉協調不佳
D.煩躁不安
- 18.燒傷後 48 小時內之病人，體液電解質的變化，下列何者錯誤？
A.少尿
B.血鉀上升
C.血鈉上升
D.代謝性酸中毒
- 19.咪咪，一歲半，護理人員指導咪咪的媽媽有關居家事故傷害的預防，下列那一個敘述最合適？
A.限制活動範圍
B.教導那些是危險物品
C.教導不可以將東西塞入鼻孔
D.移開活動範圍內的危險物品
- 20.關於嬰幼兒時期副食品的添加時機與原則，下列敘述何者錯誤？
A.一次應給予一種新食物
B.第一選擇通常是穀類食品

- C.1 歲以內嬰兒可以進食蜂蜜，以避免便秘
D.添加雞蛋時，先開始吃蛋黃，1 歲以後再進食蛋白
- 21.下列何者是活性細菌疫苗？
A.卡介苗
B.百日咳
C.白喉
D.破傷風
- 22.嬰幼兒約在幾歲時較會出現生理性厭食現象？
A.6 個月
B.1 歲半
C.2 歲半
D.3 歲半
- 23.正常新生兒的驚嚇反射（startle reflex）約在幾個月大時消失？
A.3~4 個月
B.7~8 個月
C.11~12 個月
D.18~24 個月
- 24.有關新生兒壞死性腸炎（neonatal necrotizing enterocolitis, NEC）的預防及護理措施，下列何者錯誤？
A.週產期窒息或高危險群新生兒需提早餵食，以增加腸胃道對食物的適應
B.餵食前需測胃殘餘量，以儘早發現壞死性腸炎的早期徵兆
C.注意有無腹脹，避免包尿布或俯臥，以減輕對腹部的壓迫
D.因為母乳內含抗體（如 IgA），哺餵母乳可保護新生兒腸黏膜
- 25.有關提供適當的感官刺激促進早產兒發展，下列護理措施何者錯誤？
A.寧握護理：維持身體屈曲向身體中心靠攏的姿勢
B.袋鼠護理：讓父母與早產兒皮膚對皮膚接觸的擁抱
C.視覺刺激：光線應該要柔和，且需有日夜差別
D.聽覺刺激：可於保溫箱內持續播放柔和的輕音樂
- 26.以斯佛門-安德生計分法（Silverman Anderson Score）進行評估，某早產兒呼吸窘迫情況呈現下列徵象：①腹壁上升時，上胸壁有輕微的凹陷，②吸氣時有明顯的肋間凹陷，③劍突明顯，④鼻孔輕微擴張，⑤用聽診器可聽見呼吸困難聲。此早產兒之得分為：
A.3
B.5
C.7
D.9
- 27.下列何者是判定新生兒病理性黃疸的指標？
A.膽紅素值每日增加 2 mg/dL
B.出生 24 小時內出現黃疸
C.早產兒黃疸持續 1 星期
D.古柏試驗（Coomb's test）呈陰性反應
- 28.一位體重 3 公斤的新生兒接受照光治療，每日需額外補充多少 c.c. 的水分？
A.30~45
B.46~70
C.75~110
D.120~150
- 29.檢查幼兒的咽喉部位，下列何者為異常的表徵？
A.後咽壁呈粉紅色，無分泌物
B.可以看到呈葡萄狀的腺樣增殖體
C.可以看見扁桃腺大小約為 1+
D.扁桃腺呈橢圓形，其表面密布有許多凹陷的隱窩
- 30.下列何種情況的兒童，不宜使用耳溫槍測量體溫？
A.急性咽炎
B.急性鼻竇炎
C.聽力障礙
D.口腔黏膜破損
- 31.1~2 歲幼兒患有先天性髖脫位（congenital dislocation of the hip）時，最適當的治療方法

是：

- A. 使用法洛傑卡枕頭夾板 (Frejka pillow splint)
B. 行骨骼切開術及髌臼整形術
C. 穿戴帕米力克背帶 (Pavlik harness)
D. 先做皮膚牽引數週，再以人字形石膏固定約 6 個月
32. 有關重型海洋性貧血兒童的敘述，下列何者正確？
A. 屬於女性基因 (X 染色體) 遺傳，主要發病於男性
B. 屬於體染色體隱性遺傳，會發生溶血性貧血的症狀
C. 若父母都是帶因者，就有一半機會產下重型海洋性貧血嬰兒
D. 出生時即有貧血現象，呈現臉色蒼白、身體虛弱無力現象
33. 下列兒童非發紺型先天性心臟缺損中，無左至右分流現象的是：
A. 開放性動脈導管 (PDA)
B. 心房中隔缺損 (ASD)
C. 肺動脈瓣狹窄 (PS)
D. 心室中隔缺損 (VSD)
34. 有關患有肺炎兒童的護理措施，下列何者錯誤？
A. 採姿位引流，協助排痰
B. 給氧濃度不可超過 40%
C. 採高熱量、高蛋白且易消化的食物
D. 給氧時濕度保持在 60~80%
35. 兒童感染脊髓灰白質炎，應採取下列何種隔離措施？
A. 保護性隔離
B. 腸胃道隔離
C. 呼吸道隔離
D. 接觸隔離
36. 李太太，45 歲，結婚 15 年，曾懷過兩次孕，第一次因需要出國工作，而於懷孕 9 週行人工流產，第二胎懷男性 24 週死產，之後即未懷孕而領養一女，現年 4 歲，去年行人工受孕而生下一男一女，請問依據李太太所提供的資料，護理師所繪出的家庭圖下列何者正確？
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 
37. 吳太太今天到不孕症門診求助，很憂心的表示，自己的先生是獨子，負有傳宗接代的責任，可是結婚這麼多年還是無法懷孕，下列那一項敘述是護理師的同理心表現？
A. 我了解妳很在意無法傳宗接代，但現在除了傳統老人家外，其實一般人都還喜歡當頂客族（結婚不生小孩）
B. 妳婆婆應該是很傳統的台灣婦女，不然妳不會有那麼大壓力
C. 傳宗接代的期望，讓妳感到很大的壓力
D. 別擔心，XXX 醫師是不孕症專家，他會幫妳解決問題的
38. 下列那一個例子屬於昇華之防衛機轉？
A. 青少年喜歡打扮成偶像歌手
B. 稱呼月經為 MC
C. 媽媽生了小弟弟後，小哥哥開始尿床
D. 將打架的衝動，改以練拳擊技術參加比賽

- 39.有關使用抗鬱劑引起的抗膽鹼作用（anti-cholinergic effects），下列那一項敘述最正確？
- A.會使得唾液分泌過多，口水變多
 - B.會使得腸胃蠕動變快，容易腹瀉
 - C.會使得心跳過快
 - D.會使得小便量增加，頻尿厲害
- 40.有關傳統單胺氧化酶抑制劑（monoamine oxidase inhibitor, MAOI）之敘述，何者最正確？
- A.因其具有選擇性的特質，主要只會抑制血清素的作用
 - B.因其具有可逆性的特質，停藥後一至兩天，單胺氧化酶活性就恢復了
 - C.併用氣喘吸入劑，易產生交互作用，而發生高血壓危機
 - D.併用單胺再吸收抑制劑，也不會產生血清素症候群（serotonin syndrome）
- 41.有關公共衛生護士家訪外籍配偶時的敘述，下列何者正確？
- A.為讓個案了解衛教的內容，宜大聲重複多次，使其加深印象，能確實遵守執行
 - B.應儘可能學習個案的文化習慣與信念，以協助擬定合適護理計劃
 - C.為使其儘速適應臺灣生活，應鼓勵個案放棄故鄉的文化習慣與信念
 - D.雖是外籍配偶，但若為中國人，文化差異不大，不需特別注意
- 42.舉辦老人防跌衛生教育活動，測量其骨質密度和肌耐力之作法，是屬於三段五級中的那個活動？
- A.促進健康和復健
 - B.早期診斷和適當治療
 - C.特殊保護和早期診斷
 - D.早期診斷和復健
- 43.有關人口金字塔的描述，下列何者錯誤？
- A.反映一地區年齡構成的圖像
 - B.高齡化趨勢人口可能呈倒金字塔型
 - C.生產能力的勞動人口明顯減少時常呈葫蘆型
 - D.未開發國家常呈鐘型金字塔
- 44.影響社區人口動態之資料，下列何者錯誤？
- A.出生率
 - B.性別比
 - C.遷入率
 - D.死亡率
- 45.某地區2005年年中人口數為10,000人，而當年的肺結核患者為50人，全年內死亡總人數為100人，其中因肺結核死亡者共5人，該地區肺結核的致死率為何？
- A.0.1‰
 - B.1‰
 - C.10‰
 - D.100‰
- 46.當醫護人員發現下列那一項傳染病個案時，應於24小時內向主管機關報告？
- A.百日咳
 - B.破傷風
 - C.桿菌性痢疾
 - D.水痘
- 47.目前全民健保提供40歲以上未滿65歲之成人預防保健健康檢查的頻率為何？
- A.每5年一次
 - B.每3年一次
 - C.每2年一次
 - D.每1年一次
- 48.社區居民組成自救團體要求社區中攤商制訂營業規範並遵從之，此舉主要是達到下列那一種社區功能？
- A.生產—分配—消費
 - B.社會化
 - C.社會控制
 - D.互相支持
- 49.進行社區診斷，最適合用來評估社區民眾對問題的了解與解決問題動機之方法，下列何者正確？
- A.民意團體過程（nominal group process）

B.文獻考察（literature review）

C.擋風玻璃式調查法（windshield survey）

D.重要人物訪談（key informants interview）

50.臺灣目前1～14歲兒童主要死因，下列何者正確？

A.腸病毒

B.肺炎

C.意外事故

D.先天畸形