104年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：6105
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師㈡、中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈢（包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 黃耆為瘡家之聖藥，外瘍患者屬上熱甚者，宜下列何者？
㈠炙用　㈡鹽水炒　㈢生用　㈣慎用

2 有關中醫外科的辨證之法，下列敘述何者正確？
㈠來勢緩慢、結腫有核、按之不痛、皮色如常、久不釀膿者為痰
㈡諸癢屬實，諸痛屬虛
㈢煩熱疼痛而發於皮膚之間，腫高如弓，根聚有盤者，屬虛
㈣辨證以虛實為首要。虛者屬臟，重而難治；實者屬腑，輕而易治

3 症見身腫而皮肉重垂脹急，深按之如棉不起，淺則光亮如水疱，破則滲水，最可能的診斷為何？
㈠痰腫　㈡濕腫　㈢氣腫　㈣風腫

4 下列何者生於下唇之唇稜下陷中？
㈠鎖口疔　㈡反唇疔　㈢承漿疔　㈣龍泉疔

5 某女性患者 34 歲，反覆發作上下嘴唇皸裂脫皮、滲液糜爛 3 年，現代醫學診斷為剝脫性唇炎，中西醫多方診治乏效，常呈破裂流水，吃飯喝水疼痛異常，唇部灼痛如燎，其相關證治下列何者錯誤？
㈠俱以防風通聖散服之　㈡外以黃連膏抹之
㈢外以紫歸油抹之　㈣因血燥而成者，宜服四物消風散

6 期門穴處隱隱疼痛而微腫、手不可按、呼吸不利、轉側不能、側臥則驚、便溺艱難，此敘述為下列何症？
㈠大小腸癰　㈡腎癰　㈢胃癰　㈣肝癰

7 有關癰的證治，下列相關敘述何者錯誤？
㈠癰是一種生於皮肉之間的急性化膿性疾患　㈡癰的臨床特徵是初起結腫疼痛，按之有塊
㈢治癰之大法，忌用消散法　㈣癰成膿之後，宜切開排膿

8 百會疽別名玉頂疽，下列相關敘述何者錯誤？
㈠初起頭白堅硬，唇燥便秘煩悶，宜服黃連消毒飲
㈡若面赤過煩，口乾不渴唇潤者，最宜服十全大補湯
㈢若漫腫平塌，紫暗堅硬，宜外敷回陽玉龍膏
㈣若陽虛浮泛，用生附子餅，置兩足心湧泉穴，以洩其毒

9 有關上中下發背之敘述，下列何者錯誤？
㈠生於背部，俱屬督脈經
㈡可分為陰毒、陽毒兩種
㈢陽毒為病者，皆由氣血衰弱，或患消渴，或兼瘴嵐之邪久積臟腑而發
㈣用藥之法，有表證者可以荊防敗毒散解之

10 患者頭皮皮紅光亮，癢如蟲行，並見毛髮乾焦，成片脫落，下列方劑何者治療最適宜？
㈠神功散　㈡神授衛生湯　㈢神應養真丹　㈣神效栝蔞散

11 白屑風最宜服用下列何方治療？

⑷萬靈丹 ⑻神應養真丹 ⑽荊防敗毒散 ⑾祛風換肌丸

12 患者病膝蓋下骨空陷中隱隱作疼，患處略見胖腫而屈伸不利。下列治療方法何者最不適宜？

⑷服萬靈丹 ⑻服獨活寄生湯 ⑽以金黃散圍敷 ⑾兼用火鍼鍼膝眼穴

13 小華的媽媽某日因整天忙碌，忘記幫小華換尿片，等到晚上解開尿片時，才發現小華的前後二陰附近皮膚整片通紅如圖所示。下列相關敘述何者錯誤？

⑷初起者，不宜以苦參湯洗之，以免過度刺激 ⑻洗後若皮損而痛者，宜以「鵝黃散」撲之

⑽內服可以「消風散」加減調治 ⑾治則總以清熱利濕為主

14 有關中醫外科使用內治法的敘述，下列何者錯誤？

⑷皂角刺銳利托透，有釀膿速潰的能力，可早投在治療漫腫無頭的外科疾病

⑻傷口潰後不寐發熱，為虛火上炎，宜清養安神

⑽傷口潰後，自汗肢厥，宜用四逆治療

⑾傷口潰後新肉不生如凍色，為肉冷肌寒，宜倍用溫熱藥施治

15 一名患者，上背部出現一大小如豆粒，界限明顯，形圓質軟，可以推動，其內容物像豆腐渣樣物質具有臭味，最可能的診斷為下列何項？

⑷肉瘤 ⑻氣瘤 ⑽血瘤 ⑾脂瘤

16 濁病者，溺竅時流穢物、如瘡之膿、如目之眵、淋漓不斷、濁色發赤，最可能的診斷為下列何項？

⑷赤濁 ⑻白濁 ⑽氣淋 ⑾石淋

17 勞傷肺氣，腠理不密，外邪所搏而壅腫者，其自皮膚腫起，按之浮軟，最可能的診斷為下列何項？

⑷血瘤 ⑻筋瘤 ⑽氣瘤 ⑾癭瘤

18 下列何者不屬於丹毒？

⑷赤遊丹毒 ⑻抱頭火丹 ⑽流火 ⑾火赤瘡

19 32 歲男性，數日來皮膚發癢，鮮紅膨起成片（如附圖，左臂），夜間尤甚，白日則皮膚無症狀，下列那一種疾病診斷最不適宜？

⑷癮疹 ⑻鬼飯疙瘩 ⑽風疹塊 ⑾火赤瘡

20 一名 40 歲婦女，已婚有兩名小孩，平日上班工作壓力大，下班又需為家務繁忙，臉上出現病灶色如塵垢，形枯不澤，大小不一，小者如粟粒赤豆，大者似蓮子芡實，與皮膚相平。其最可能的診斷為下列何者？
⑷黧黑斑 ⑻雀斑 ⑽粉刺 ⑾紫白癜風

21 下列何者損傷可出現 drop-arm test 陽性反應？
⑷肩袖撕裂傷 ⑻胸廓出口症候群 ⑽橈神經損傷 ⑾網球肘

22 有關上肢 Speed's test 的敘述，下列何者錯誤？
⑷手肘先伸直，再進行之後動作 ⑻檢查時，二頭肌用力收縮
⑽二頭肌長頭肌腱發炎時，可做此檢查鑑別 ⑾又名 Yergason's test

23 《素問．宣明五氣篇》提到「五勞所傷」，其中「久坐」會導致下列何種組織傷害？
⑷筋 ⑻肉 ⑽皮 ⑾骨

24 根據《正骨心法要旨》肘骨之敘述，下列何者錯誤？
⑷跌傷矯正後，雖能垂能舉，仍以養息為妙
⑻俗名鵝鼻骨
⑽跌傷時，肘尖向上突出，疼痛不止，汗出顫慄，柴胡桂枝湯解之
⑾跌傷時，斜彎之筋，以手推摩，令其平復

25 有關肱骨外上髁炎之敘述，下列何者錯誤？
⑷常見於網球球員，故又稱之為網球肘 ⑻主要是由勞損造成的無菌性炎症
⑽前臂屈肌腱的反覆牽拉為致病主因 ⑾抗阻力伸腕時疼痛明顯

26 53 歲男性患者，主訴左肩痠痛，夜間較明顯，左肩上舉背伸不利，晨起肩關節活動僵硬，則下列相關敘述何者正確？①係年老體弱，筋肉肌腱失於濡養所致 ②創傷、風寒濕邪侵襲常為誘因 ③初期出現肌肉僵硬、條索狀硬結等病變 ④好發於單側，雙側少見 ⑤因小圓肌損傷，致肩內旋不利
⑷②③④ ⑻①④⑤ ⑽①②④ ⑾②③⑤

27 有關掌指關節扭挫傷之治療，下列敘述何者錯誤？
⑷傷後手法治療切忌過度，以免組織增生肥厚 ⑻關節淺表之軟組織微細纖維條索可以輕推撫平
⑽有側彎畸形者要注意糾正，及早恢復關節功能 ⑾應避免功能鍛鍊，以免加重疼痛腫脹

28 有關膝關節半月板之敘述，下列何者正確？
⑷半月板是一種纖維軟骨組織，本身血液循環極差，只有邊緣循環較好
⑻內側半月板較大呈「C」形如鐮刀狀，前 2/3 寬，後 1/3 窄，體部與內側副韌帶相連
⑽外側半月板較厚呈「O」形，前後等寬，外緣與外側副韌帶相連
⑾半月板內緣厚外緣薄，具有加深關節，增加穩定性和接觸面的作用

29 有關腰部扭挫傷的敘述，下列何者錯誤？
⑷腰部扭挫傷可分為扭傷與挫傷兩大類，扭傷較多見，一般均為突然遭受間接暴力所致
⑻扭傷多發生於腰骶、骶髂關節、椎間關節或兩側骶棘肌等部分
⑽腰部扭傷時，直腿抬高加強試驗常為陽性
⑾腰部挫傷多為直接暴力所致，如車輛撞擊，高處墜跌，重物挫壓等，致使肌肉挫傷，血脈破損，筋膜損傷，引起瘀血腫脹、疼痛、活動受限

30 20 歲男性患者，某日下午打籃球時遭球撞擊手指，右手食指近端指間關節疼痛腫脹，下列處置何者最不適當？
⑷檢查關節活動功能 ⑻X 光檢查 ⑽熱敷 ⑾固定制動

31 2 歲兒童剛學會走路，大人牽東他往西走，突然肘關節半屈曲疼痛不願接受觸診，哭鬧不停，檢查無腫脹現象。下列診斷及治療有那些最適宜？①照 X 光檢查是否骨折 ②麻醉後進行復位手法 ③右手握其腕上部，並慢慢將其前臂旋後 ④通常不用藥物外敷其患部緩解疼痛

(A)①③ (B)②③ (C)②④ (D)③④

32 有關腰部正常活動角度，下列敘述何者錯誤？

(A)前屈 90 度 (B)後伸 30 度 (C)側屈 40～50 度 (D)旋轉 30 度

33 兩踝間有以下三條肌腱及一條血管通過：①伸姆長肌（Extensor hallucis longus m.） ②伸趾長肌（Extensor digitorum longus m.） ③脛骨前肌（Tibialis anterior m.） ④足背動脈（Dorsalis pedis a.），其排列順序由內而外，下列何者正確？

(A)①②③④ (B)①③②④ (C)③①④② (D)③④①②

34 根據《醫宗金鑑．正骨心法》，黃同學跑步造成傷損之證，因榮衛氣滯而引起肌肉作痛之證，下列何方治療最適宜？

(A)復元活血湯 (B)復元通氣散 (C)桂枝湯 (D)葛根湯

35 22 歲陳同學，在足球比賽中，遭對方球員從右側外方快速衝撞過來，形成右膝外翻應力損傷（valgus stress），下列何處損傷最為嚴重？

(A)外側副韌帶 (B)內側副韌帶 (C)髕韌帶 (D)股四頭肌

36 根據《醫宗金鑑．正骨心法》，瘀血作痛，脹而重墜，色或青黑，甚則發熱作渴汗出者，宜先刺去惡血，後用下列何方調之最適宜？

(A)四物湯 (B)四君子湯 (C)失笑散 (D)復元通氣散

37 有關肩關節附近解剖構造標定，下列敘述何者正確？



(A)1－肱二頭肌長頭腱，2－棘上肌，4－鎖骨，5－喙突

(B)1－肱二頭肌長頭腱，2－斜方肌，4－鎖骨，5－喙突，6－肩胛下肌

(C)3－肩峰，4－肋骨，5－鎖骨，6－肩胛下肌

(D)1－肱二頭肌長頭腱，4－鎖骨，5－肩關節盂，6－胸大肌

38 外踝三條韌帶①前距腓韌帶（Anterior Talofibular lig.） ②後距腓韌帶（Posterior Talofibular lig.） ③跟腓韌帶（Calcaneofibular lig.），扭傷發生率由高到低順序，下列何者正確？

(A)①②③ (B)①③② (C)②③① (D)③①②

39 有關脛骨結節骨骺炎之敘述，下列何者錯誤？

(A)又名奧斯古德氏病（Osgood's disease）

(B)由於股四頭肌及髕韌帶長期、反覆、猛烈的收縮所致

(C)脛骨結節部分疼痛、腫大和壓痛，有明顯功能障礙

(D)慢性損傷，以致骨骺缺血壞死而引起

40 有關上肢損傷，下列敘述何者正確？
㈠長期抱持重物，造成拇指屈曲，餘四指握持拇指，手腕向尺側偏，鼻煙盒處局部壓痛，應為尺側屈腕肌損傷
㈡掌壓伏地挺身運動後，造成上臂軟組織損傷，肩前局部疼痛，屈肘抗阻時肩疼痛，上臂僅內收動作時疼痛，應為肱三頭肌損傷
㈢車禍碰撞，造成上臂骨折損傷，手腕無法作背伸動作，呈現下垂外觀，可能是肱骨骨折合併橈神經損傷
㈣腕力比賽後，造成上臂軟組織損傷，形成 Popeye's sign，多是肱二頭肌的短頭斷裂損傷

41 有關痿軟麻木一證之敘述，下列選項何者正確？①痿軟是指筋骨痿廢失用，肌肉消瘦無力，運動功能障礙　②麻木是指肢體觸覺、痛覺、溫覺障礙　③《雜病源流犀燭．麻木源流》指出：「麻木，風虛病亦兼寒濕痰血病也」　④《素問．逆調論篇》說：「衛氣虛則不仁，榮氣虛則不用，榮衛俱虛則不仁且不用，肉如故也」　⑤《景岳全書．非風》則說：「氣虛則木，血虛則麻」
㈠僅①②③　㈡僅①②④⑤　㈢僅④⑤　㈣①②③④⑤

42 50 歲男性司機，因車禍送到醫院，出現一時性的暈厥、昏迷不省人事、煩躁妄動等症狀，其損傷病機最可能為下列何者？
㈠氣滯　㈡氣閉　㈢氣脫　㈣氣虛

43 曹先生車禍受傷後，而犯勞碌，或怒氣肚腹脹悶，或過服寒涼等藥，致傷陽絡，根據《醫宗金鑑．正骨心法》，最可能有那些病候？①血塊　②衄血　③血積　④便血　⑤尿血　⑥肌肉青黑
㈠①③⑤　㈡①③⑥　㈢②④⑤　㈣②④⑥

44 根據《醫宗金鑑．正骨心法》，傷損至重，昏憒，不知人事，宜急用下列何方急救？
㈠復元通氣散　㈡獨參湯　㈢正骨紫金丹　㈣聖愈湯

45 患者受傷當時曾大量出血，挫傷後開始抱怨眩暈，同時，有腹脹滿嘔吐情形，根據《醫宗金鑑．正骨心法》，處以下列何方最適宜？
㈠柴胡四物湯　㈡六君子湯　㈢補中益氣湯　㈣二陳湯

46 一車禍碰撞致胸脇挫傷脹痛患者，X 光無骨折血胸情形，患者大便順暢，喘咳有痰，根據《醫宗金鑑．正骨心法》宜處以下列何藥物組成的方劑？
㈠柴胡、黃芩、半夏、人參、甘草、薑、青皮、山梔
㈡人參、白朮、茯苓、炙甘草、當歸、川芎、丹皮
㈢陳皮、半夏、茯苓、甘草、白朮、川芎、當歸
㈣川芎、當歸、百合、赤芍、生地黃、側柏葉、丹皮

47 根據《醫宗金鑑．正骨心法》，傷損腹痛，下列治法何者最適宜？
㈠既下而發熱用四君子湯加參朮　㈡既下而惡寒，陽氣傷，用參附湯
㈢既下而惡寒發熱，氣血傷，用十全大補湯　㈣下而泄瀉，脾腎傷，六君子湯加肉果、補骨脂

48 王小姐車禍後傷損大出血，身發熱，汗出不止，見血脫之象，根據《醫宗金鑑．正骨心法》之內傷診治，下列何方治療最適宜？
㈠獨參湯　㈡當歸補血湯　㈢聖愈湯　㈣四君子湯加炮薑附子

49 有關副甲狀腺亢進症對骨關節的影響，下列敘述何者錯誤？
㈠所謂囊腫性纖維性骨炎，即表明造骨細胞的活性增強，骨吸收並沉積了大量的纖維組織於骨髓中
㈡副甲狀腺亢進症，雖然在骨質的變化比較顯著，但多數患者均表現為骨關節疾病
㈢副甲狀腺亢進性骨軟化症對關節的影響主要是軟骨軟化、軟骨塌陷，小樑骨骨折，而這些狀況大多隨外傷而來，故有併發關節積液、關節疼痛
㈣副甲狀腺亢進引起之高鈣血症，可引起軟組織的轉移性鈣化，如在滑膜、椎間盤、肌腱、腱鞘等關節周圍軟組織均可鈣化

50 有關肋骨骨折之敘述，下列何者正確？
㈠單純單處肋骨骨折時，易發生反常呼吸
㈡單純單處肋骨骨折時，有肋間肌和其他肋骨之支持，較穩定，多無明顯移位，一般無須手法整復
㈢使用膠布固定法時，於病患吸氣胸圍最大時固定之
㈣使用寬繃帶固定法時，於病患吸氣胸圍最大時固定之

51 某 17 歲高中男生因打球跌倒，用手撐地後手腕劇痛，隨即形成如圖所示「餐叉樣」變形（silver fork deformity），為下列何處骨折？

㈠纏骨 ㈡臂骨 ㈢臑骨 ㈣壅骨

52 《左傳》已有「三折肱知為良醫」的記載，此骨折最易造成下列那條神經損傷？
㈠尺神經 ㈡正中神經 ㈢橈神經 ㈣肱神經

53 有關骨折內服用藥之敘述，下列共有幾項正確？①骨折初期治宜活血化瘀、消腫止痛，可選用復元活血湯 ②骨折中期治宜接骨續筋，可選用桃紅四物湯加骨碎補、續斷 ③骨折後期治宜壯筋骨、養氣血、補肝腎，可選用六味地黃湯、健步虎潛丸 ④骨折後期尚應適當注意補益脾胃，可用補中益氣湯加減
㈠1 ㈡2 ㈢3 ㈣4

54 有關脛骨雙髁（髁間）骨折之敘述，下列何者正確？
㈠骨折常形成倒「T」形或「Y」形骨折，甚至可侵犯膝關節面，與股骨髁間接近
㈡骨折若侵犯膝關節，一般不會關節內積血，故「浮髕」現象不顯著
㈢復位手法常使用折頂手法
㈣若骨折侵犯膝關節，因為膝關節功能代償良好，治療時不需要求解剖復位

55 造成膝關節後脫位的暴力方向和作用點敘述，下列何者正確？
㈠前方，股骨下段 ㈡前方，脛骨上端 ㈢後方，股骨下段 ㈣後方，脛骨上端

56 手指槌狀指畸形（mallet finger）造成的原因為下列何者？
㈠末節指骨基底部背側撕脫骨折 ㈡近節指骨骨折
㈢中節指骨骨折 ㈣末節指骨幹骨折

57 髖關節脫位，根據股骨頭脫出於髖臼的位置分類，髖關節後上方脫位時，股骨頭位在下列何處？
㈠腸骨部 ㈡坐骨結節部 ㈢恥骨部 ㈣閉孔部

58 肱骨幹骨折如有分離移位，下列敘述何者錯誤？
㈠整復時，應在拔伸牽引後進行提按
㈡矯正側方移位後，用合骨法使兩骨折端緊密接合
㈢手法操作要溫和，避免損傷橈神經
㈣固定包紮後，應經常注意患肢末梢血液循環，防止壓瘡

59 有關適用於骨痂改造期的內服藥物，下列敘述何者正確？
㈠以理氣止痛為主 ㈡以活血祛瘀為主
㈢以接骨續筋為主，以活血祛瘀為佐 ㈣以補肝腎、養氣血、壯筋骨為主

60 一車禍患者罹患腦震盪及鎖骨中端、肱骨幹中下三分之一交接及橈骨遠端等三處骨折，手術內固定後發現有「垂腕」現象，最可能造成此神經損傷現象之原因為下列何者？
(A)腦震盪 (B)鎖骨中端骨折
(C)肱骨幹中下三分之一交接處骨折 (D)橈骨遠端骨折

61 目得血的濡養才能視萬物，關於血的功能失常所引起眼病之敘述，下列何者錯誤？
(A)一般實火所致出血較急，量多色鮮紅
(B)虛火入血分所致目絡紅赤，赤脈不如實證多而粗大，出血多緩，一般血量不如實火多
(C)全身表現為面色蒼白，唇舌色淡，爪甲無華，疲倦無力，手足發麻，可考慮為血瘀的表現
(D)血虛患者在眼表現為胞瞼、白睛血絡淡紅不鮮，目睛乾澀，不耐久視或視物不清

62 根據《毛傳》稱「有眸子而無見」為下列何項？
(A)眺 (B)矇 (C)睨 (D)瞑

63 有關胞生痰核的敘述，下列何者錯誤？
(A)病程急，局部紅腫熱痛，易於潰瘍之眼病
(B)相當於西醫學之霰粒腫
(C)脾失健運，濕痰內聚，上阻胞瞼脈絡，與氣血混結而成本病
(D)本病腫核小者，一般無須治療，可任其自消；大者或已潰破者，宜予手術治療

64 有關漏睛的敘述，下列何者錯誤？
(A)可能一眼或二眼俱痛
(B)椒瘡嚴重可成漏睛瘡
(C)大眦頭，皮色如常，按之不痛，但見黏濁淚液隱澀不舒，當疏風清熱
(D)大眦微紅，黏稠膿液溢出，心有伏火，脾有濕熱，治宜歸芍紅花散，清心利濕

65 有關金疳的敘述，下列何者錯誤？
(A)白睛患者，形如玉粒之小泡，周圍圍繞赤脈，同氣輪屬肺，五行為金，故稱金疳，又名金瘍
(B)心肝壅熱者，白睛兩眥紅赤較甚，小便赤，便秘，治宜瀉熱黃連湯加減
(C)脾胃失調，肺金失養，氣血鬱滯，可成本病
(D)可外以黃連西瓜霜眼藥水或千里光眼藥水治之

66 有關白睛青藍的敘述，下列何者錯誤？
(A)本病初起，白睛傍黑睛緣發生紫紅色腫脹隆起，反覆發作，日久該處白睛遂變青藍
(B)多因火鬱血瘀，蒸逼所致
(C)常由金疳反覆發作而來，往往侵及風水二輪
(D)又名白珠俱青

67 患者眦部瞼弦紅赤糜爛，灼熱刺癢，甚者眦部瞼弦出血，其最有可能之診斷為下列何者？
(A)風赤瘡痍 (B)天行赤眼 (C)暴風客熱 (D)迎風赤爛

68 下列何種眼疾是黑睛疾患痊癒後遺留之瘢痕翳障，相當於現代醫學的角膜瘢痕？
(A)宿翳 (B)凝脂翳 (C)花翳白陷 (D)聚星障

69 雙眼發病，初起症輕，多見夜盲，眼珠乾澀羞明，頻頻眨目，為下列何種眼疾之表現？
(A)疳積上目 (B)聚星障 (C)混睛障 (D)風輪赤豆

70 清代在喉科方面有許多重要著作，何者不是其中之一？
㈠《重樓玉鑰》 ㈡《喉科指掌》 ㈢《尤氏喉科秘書》 ㈣《紅爐點雪》

71 有關異物入耳之敘述，下列何者錯誤？
㈠動物類異物應於蟲未死時即取出
㈡圓球形異物可用刮匙鉤出
㈢細小能移動異物，可用沖洗法沖出
㈣異物入耳應依異物的性質、形態、大小與所在位置不同，採取不同的方法取出

72 耳眩暈應辨證施治，下列何方最不適宜？
㈠歸脾湯 ㈡天麻鉤藤飲 ㈢半夏白朮天麻湯 ㈣安宮牛黃丸

73 鼻病外治法，如鼻頭紅赤或鼻孔糜爛，用清熱解毒消腫藥物塗敷，下列何者為最常用的藥方？
㈠四黃散 ㈡明礬散 ㈢硇砂散 ㈣冰硼散

74 鼻窒與現代醫學之慢性鼻炎相似，以出現鼻塞為主要特徵，在辨證施治中因肺脾氣虛，邪滯鼻竅所致，屬於脾氣虛者，宜健脾滲濕，祛風通竅，可選用參苓白朮散加石菖蒲、蒼耳子、藿香。處方中以下列何藥物，能達健脾滲濕作用？
㈠蒼耳子 、陳皮 ㈡甘草、桔梗 ㈢蓮子、薏苡仁 ㈣白朮、砂仁

75 42 歲男性瞳神甚小，珠痛拒按，痛連眉稜，抱輪紅甚，神水混濁，黑睛之後見血液沉積。伴有視力減退，口苦咽乾，煩躁易怒，舌紅苔黃，脈弦數等。有關患者瞳神疾病的治療處方，下列何者最適宜？
㈠新製柴連湯祛風清熱 ㈡龍膽瀉肝湯清瀉肝膽
㈢抑陽酒連散祛風除濕清熱 ㈣杞菊地黃丸滋養肝腎

76 某患者咽部疼痛劇烈，痛連耳根及頷下，吞嚥困難，有堵塞感，或有聲嘶。檢查時見喉核紅腫，表面黃白色膿點，逐漸連成偽膜；口臭，大便秘結，小便黃，苔黃厚，脈洪大而數。最適宜選用下列何方？
㈠十味敗毒散 ㈡托裏消毒飲 ㈢甘露消毒飲 ㈣清咽利膈湯

77 喉癰初起邪在表，治宜疏風清熱，解毒消腫，最適宜選用下列何方加荊芥、防風、白芷？
㈠仙方活命飲 ㈡金燈山根湯 ㈢托裏消毒飲 ㈣五味消毒飲

78 根據五輪學說，下列敘述何者錯誤？
㈠眼胞分上下瞼，邊緣稱瞼弦，屬脾胃
㈡血輪指兩眦分大小眦，下瞼弦近大眦的淚竅包含在內，大眦內的紅色肉狀隆起，則不歸於此範疇
㈢白睛的眼珠外壁具有保護內部組織作用，屬肺大腸
㈣黑睛位於眼部的中央，為光線進入必由之路，並有保護瞳神及其他眼內組織的作用，屬風輪

79 李先生 30 歲，某日中午至速食餐廳用餐，點勁辣雞腿堡（買一送一）和冰可樂一杯。大快朵頤，吃完第一個勁辣雞腿堡已覺飽，第二個吃到一半脘脹不舒，但仍勉強吃完。是日整日脘悶不舒，噯氣連連，有食臭味，隔日中午大便黏臭，口乾欲飲，口瘡作，瘡面紅，脈弦滑，舌紅苔黃膩。試問其口瘡的最可能病因為何？
㈠上焦肺熱痰阻 ㈡中焦食積濕熱 ㈢下焦膀胱濕熱 ㈣三焦濕熱瀰漫

80 承上題，下列處方何者最適宜？
㈠瀉白散 ㈡導赤散 ㈢龍膽瀉肝湯 ㈣保和丸