

104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、  
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術  
人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：3101  
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 關於《閻氏小兒方論》升麻葛根湯之敘述，下列何者最不適宜？
  - (A)組成為升麻、乾葛、芍藥、甘草
  - (B)本方原治痘疹，今多用於麻疹初起
  - (C)本方有解肌透疹之功用
  - (D)可用治麻疹且疹點透達順暢者
- 2 關於《傷寒六書》再造散之功用，下列何者最適宜？
  - (A)疏風解表，清肺泄熱
  - (B)助陽益氣，發汗解表
  - (C)養血解表
  - (D)發汗祛濕
- 3 關於溫下類方劑之敘述，下列何者最不適宜？
  - (A)《金匱要略》大黃附子湯適合裏寒積滯較甚者
  - (B)《備急千金要方》溫脾湯兼能益氣，適合久利氣虛者
  - (C)《金匱要略》三物備急丸力猛效捷，為急下寒積之峻劑
  - (D)源出《傷寒論》之三物白散，峻下攻積之力更勝三物備急丸
- 4 下列何者為《金匱要略》大黃附子湯之組成藥物？
  - (A)甘草
  - (B)厚朴
  - (C)細辛
  - (D)乾薑
- 5 患者證見頭痛，惡寒漸輕，身熱增盛，無汗，目疼，眼眶痛，鼻乾，心煩眠差，其脈浮微洪者。使用下列何方劑最適當？
  - (A)柴葛解肌湯
  - (B)柴胡桂枝湯
  - (C)加味香蘇散
  - (D)再造散
- 6 下列何者非《醫學心悟》加味香蘇散之組成藥物？
  - (A)木香
  - (B)荊芥
  - (C)秦艽
  - (D)蔓荊子
- 7 關於《景岳全書》濟川煎組成之敘述，下列何者最不適宜？
  - (A)大黃瀉滌腸胃，推陳致新，是為君藥
  - (B)當歸養血和血，潤腸通便，是為臣藥
  - (C)澤瀉滲利小便而泄腎濁，是為佐藥
  - (D)升麻升清陽則濁陰自降，是為使藥

- 8 下列各項敘述何者錯誤？
- (A)參苓白朮散主治脾虛夾濕證  
(B)歸脾湯是以益氣補血，健脾養心為組方依據  
(C)玉屏風散主治之汗證，夜臥尤甚  
(D)當歸補血湯主治證之脈象為洪大而虛，重按無力
- 9 下列何方兼具有清熱、消腫及活血之功能？
- (A)清胃散 (B)青蒿鱉甲湯 (C)仙方活命飲 (D)普濟消毒飲
- 10 河間地黃飲子主治瘡痍證，下列敘述何者錯誤？
- (A)證見舌強不能言，足廢不能用，口乾不欲飲，脈沉細弱  
(B)治法為補養下元，攝納浮陽，佐以開竅化痰，宣通心氣  
(C)其組成含生脈飲之組成藥物  
(D)方中熟地、山茱萸滋補腎陰；肉苁蓉、巴戟天溫壯腎陽，共為主藥
- 11 下列方劑之敘述何者正確？
- (A)百合固金湯有益氣清肺，止咳定喘之功。主治肺腎兩虛，痰熱內蘊，氣逆不降  
(B)參苓白朮散為治療肝脾不和之方  
(C)生脈散為治療衛陽不固自汗之方  
(D)玉屏風散去白朮、加枳殼，可治療利後裏急後重
- 12 下列何者不宜使用炙甘草湯？
- (A)腹瀉下痢 (B)痰中帶血 (C)自汗盜汗 (D)氣短失眠
- 13 下列敘述正確的有幾項？①《丹溪心法》大補陰丸以滋陰降火為組方依據 ②知母、黃柏是《丹溪心法》大補陰丸與《醫宗金鑑》知柏八味丸共同的組成藥物 ③《丹溪心法》大補陰丸可治陰虛火旺之骨蒸潮熱、咳嗽咯血 ④《丹溪心法》大補陰丸主治患者的尺脈細數無力
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 14 35 歲職業婦女平素常熬夜，因節食而形體消瘦，月經已持續下血、淋漓不斷一月有餘，經血色深紅、質黏稠，舌紅脈弦數。治療可用下列何方較適當？
- (A)《濟生方》歸脾湯 (B)《醫學入門》固經丸  
(C)《醫學衷中參西錄》固衝湯 (D)《傅青主女科》易黃湯
- 15 有關大、小柴胡湯的敘述，下列何者錯誤？
- (A)大柴胡湯能調和膽、胃，臨床可用於急性膽囊炎  
(B)大柴胡湯可用於少陽、陽明合病  
(C)婦人傷寒，熱入血室，可用小柴胡湯  
(D)兩者組成皆有白芍，用以疏肝、調肝

- 16 30 歲女性自述兩週前開始發燒，多在夜間與午後發熱，且每天半夜都會出汗而醒來，自覺身熱併骨節痠痛，兩週以來體重減輕 2 公斤，精神疲倦，唇紅乾但不欲飲水，舌紅少苔，脈細數。最宜選用下列何方治療？
- (A)《小兒藥證直訣》導赤散 (B)《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散  
(C)《醫宗金鑑》五味消毒飲 (D)《景岳全書》玉女煎
- 17 下列有幾項是《傷寒論》半夏瀉心湯的組成藥物？①黃芩 ②黃連 ③乾薑 ④大棗
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 18 下列有幾項是四逆散的組成藥物？①枳實 ②乾薑 ③炙甘草 ④白朮
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 19 下列何方主治腎虛濕熱下注之證？
- (A)《傳青主女科》易黃湯 (B)《醫學衷中參西錄》固衝湯  
(C)《傳青主女科》完帶湯 (D)《丹溪心法》固經丸
- 20 天台烏藥散可治療寒氣侵入下列何經脈之證？
- (A)腎 (B)肝 (C)膀胱 (D)小腸
- 21 某 58 歲男性，經常出汗，夜臥更甚 3 年，伴心悸驚惕、氣短煩倦半年，舌淡紅，脈細弱，最宜使用下列何方藥？
- (A)玄參、麥門冬、生地 (B)牡蠣、黃耆、麻黃根、浮小麥  
(C)桂枝、芍藥、生薑、大棗、甘草 (D)黃耆、防風、白朮
- 22 《丹溪心法》所載之越鞠丸為何種劑型？
- (A)蜜丸 (B)水泛丸 (C)糊丸 (D)濃縮丸
- 23 下列何者為血府逐瘀湯、身痛逐瘀湯、膈下逐瘀湯共有之藥物？
- (A)赤芍 (B)紅花 (C)五靈脂 (D)元胡
- 24 關於生化湯之主治敘述，下列何者錯誤？
- (A)產後血虛受寒 (B)產後血熱有瘀 (C)惡露不行 (D)小腹冷痛
- 25 關於暖肝煎之敘述，下列有幾項正確？①本方功用為溫肝散寒，行氣止痛 ②方中肉桂、香附溫腎散寒 ③與橘核丸皆治寒疝疼痛 ④與天台烏藥散比較，本方行氣散寒力較大
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 26 以下方劑組成含人參的有幾項？①《症因脈治》丁香柿蒂湯 ②《金匱要略》橘皮竹茹湯 ③《濟生方》四磨湯 ④《景岳全書》暖肝煎
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 27 某 28 歲女性因解尿不順暢就診，證見小便量少短赤，自覺發熱，口渴，心煩不寐，舌質紅苔微黃，脈細數，宜何方治之？
- (A)二妙散 (B)豬苓湯 (C)五苓散 (D)茵陳蒿湯

- 28 《明醫指掌》四苓散功專滲濕利水，即五苓散減去何藥？  
(A)白朮 (B)桂枝 (C)豬苓 (D)澤瀉
- 29 麥門冬湯的組成中，下列何者善降肺、胃虛逆之氣，且又使麥門冬滋而不膩？  
(A)人參 (B)橘皮 (C)甘草 (D)半夏
- 30 鎮肝熄風湯與天麻鉤藤飲的組成中，下列何藥兩方皆有？  
(A)芍藥 (B)牡蠣 (C)石決明 (D)牛膝
- 31 76 歲老伯伯來診，主訴最近數月小便頻數，混濁不清，像是淘米水，有時甚至像滑精一般，其舌淡苔白膩，脈沉，治宜下列何方？  
(A)萆薢分清飲（《醫學心悟》） (B)金鎖固精丸  
(C)萆薢分清飲（《丹溪心法》） (D)桑螵蛸散
- 32 有關五積散之敘述，下列何者錯誤？  
(A)以乾薑、肉桂溫裏祛寒 (B)以當歸、川芎、白芍活血止痛  
(C)以蒼朮、厚朴、陳皮燥濕健脾 (D)以桔梗、枳殼、青皮開胸行氣
- 33 組成為茯神、夜交藤、桑寄生、益母草、杜仲、川牛膝、黃芩、山梔、石決明、鉤藤、天麻之方劑，其敘述下列何者正確？  
(A)舌絳無苔之陰虛風動證適合應用本方 (B)煎煮時鉤藤須先煎  
(C)主治肝陽偏亢，肝熱肝風上擾證 (D)以高熱煩燥、手足抽搐、舌絳、脈弦數為主證
- 34 下列有關當歸拈痛湯的組成，正確的有幾組？①茵陳、羌活 ②人參、知母 ③豬苓、澤瀉 ④蒼朮、苦參 ⑤防風、葛根  
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 35 濕熱痹證，證見骨節煩疼，小便短赤，舌苔黃膩者，以下列何方治之？  
(A)拈痛湯 (B)蠶矢湯 (C)連朴飲 (D)宣痹湯
- 36 50 歲男性來到門診，主訴右上腹痛已 3 天，期間自覺畏寒發熱，交替發作，心煩，噁心嘔吐，口苦咽乾，頭暈目眩，便秘，舌紅苔黃膩，切診發現右上腹壓痛明顯、脈弦滑有力。最宜下列何方治療？  
(A)《傷寒論》小柴胡湯 (B)《傷寒論》大柴胡湯  
(C)《傷寒論》柴胡加芒硝湯 (D)《重訂通俗傷寒論》蒿芩清膽湯
- 37 有關清金化痰丸之組成，下列何者正確？  
(A)瓜蒌、桔梗、麥冬、桑白皮、黃芩、蘇子、桑葉、茯苓、橘紅、甘草、貝母  
(B)貝母、桔梗、瓜蒌、黃芩、麥冬、梔子、桑白皮、茯苓、桑葉、甘草、橘紅  
(C)瓜蒌、貝母、蘇子、黃芩、麥冬、桑葉、梔子、茯苓、桔梗、橘紅、甘草  
(D)桔梗、瓜蒌、貝母、黃芩、梔子、桑白皮、麥冬、知母、橘紅、茯苓、甘草

- 38 50 歲女性，停經一年，長期服用降血壓西藥，主訴頭暈目眩一週，BP: 140/85 mmHg，胸悶嘔噁，偶發潮熱，無心悸感，口不乾苦，二便正常，舌苔白膩，脈弦滑。最宜下列何方治療？
- (A)《雜病證治新義》天麻鉤藤飲 (B)《金匱要略》苓桂朮甘湯  
(C)《傷寒論》小柴胡湯 (D)《醫學心悟》半夏白朮天麻湯
- 39 下列何者為枳朮丸之組成？
- (A)枳實、白朮 (B)枳實、白朮、荷葉  
(C)枳實、白朮、荷葉、神麴 (D)枳實、白朮、荷葉、神麴、山楂
- 40 有關滌痰湯之組成，下列何者正確？
- (A)半夏、茯苓、陳皮、枳實、竹茹、甘草  
(B)半夏、茯苓、陳皮、枳實、竹茹、甘草、生薑、膽南星  
(C)半夏、茯苓、陳皮、枳實、竹茹、甘草、生薑、大棗、膽南星  
(D)半夏、茯苓、陳皮、枳實、竹茹、甘草、生薑、大棗、膽南星、人參、菖蒲
- 41 下列祛風濕藥何者也可用於小兒疳熱的治療？
- (A)威靈仙 (B)獨活 (C)五加皮 (D)秦艽
- 42 生薑用於胃熱嘔吐時，常配伍下列何組藥？
- (A)黃連、竹茹 (B)半夏、藿香 (C)黃柏、梔子 (D)龍膽草、黃柏
- 43 下列何藥用於傷寒邪在少陽，寒熱往來、胸脇苦滿、口苦、咽乾、目眩等證。其性味苦、辛，微寒。功效為和解退熱，疏肝解鬱，升舉陽氣？
- (A)菊花 (B)黃芩 (C)升麻 (D)柴胡
- 44 可用於外感發熱，頭痛、無汗、項背牽強等證，具有解肌退熱，生津，透疹，升陽止瀉的藥物是下列何者？
- (A)升麻 (B)葛根 (C)柴胡 (D)桑葉
- 45 下列敘述何者錯誤？
- (A)乾薑與高良薑同屬溫裏藥 (B)高良薑性味辛熱，能溫中祛寒，消食止痛  
(C)高良薑驅散風寒治療風寒型感冒效果比生薑好 (D)高良薑也可用於寒疝腹痛
- 46 下列何者並非石韋之功効應用？
- (A)淋疾 (B)肺熱咳嗽 (C)血熱崩漏 (D)祛風解表
- 47 下列藥物中，何者擅長於利濕濁、祛風濕，常主治小便白濁如膏？
- (A)冬葵子 (B)萆薢 (C)滑石 (D)瞿麥
- 48 下列何藥常配伍柴胡、芍藥、川芎等，用以治療肝氣鬱滯，脇肋刺痛？
- (A)沉香 (B)陳皮 (C)枳殼 (D)厚朴

49 下列何者不具清心除煩的功效？



50 用治濕阻氣滯之脘腹脹悶，腹痛及咳喘多痰最宜選：

- (A)佩蘭 (B)砂仁 (C)厚朴 (D)藿香

51 《食療本草》中「赤小豆鯉魚湯」的赤小豆作用為何？

- (A)利水消腫 (B)涼血止血 (C)活血祛瘀 (D)補脾益氣

52 用治外感暑濕，內傷生冷的病證時，最常選用下列何藥？

- (A)青蒿 (B)厚朴 (C)藿香 (D)蒼朮

53 大青葉能清熱解毒，涼血消斑，利咽消腫，最適宜用於下列何者？

- (A)骨蒸潮熱 (B)瘟疫時毒 (C)消渴客熱 (D)肝火上炎

54 下列何種藥物不具潤滑性瀉下的功效？

- (A)益智仁 (B)火麻仁 (C)郁李仁 (D)蜂蜜

55 具有清熱解毒，消癰散結之效，且常用於瘡癰腫毒、疔腮腫痛、腸風下血、痔瘡腫痛、婦女赤白帶下及燙傷，下列何藥最適宜？

- (A)地榆 (B)白蘞 (C)槐花 (D)魚腥草

56 下列何藥為溫熱病邪入少陽，寒熱往來之良藥。又能清暑熱，用於暑熱外感，並能退虛熱，尤宜於無汗骨蒸，且可治瘧疾？

- (A)秦艽 (B)玄參 (C)藿香 (D)青蒿

57 下列何藥能清熱解毒，涼血止血、止利，故常用於濕熱泄利、下利膿血、崩漏下血、產後流血及熱淋、血淋？

- (A)玄參 (B)馬齒莧 (C)生地 (D)牡丹皮

- 58 關於蘆根的敘述，下列何者錯誤？  
(A)能養陰，生津止渴，治熱病傷津，身熱煩渴，及消渴病之要藥  
(B)瀉肺熱、祛痰排膿，治肺熱咳嗽、風熱咳嗽及肺癰，痰帶膿血  
(C)清胃熱，降逆止嘔，治胃熱惡心、嘔吐、反胃、呃逆、口臭  
(D)清肝熱、養肝潤燥，治肝熱、肝火上炎所致之目赤腫痛、羞明、多眵
- 59 下列何藥能清熱解毒，為治瘡瘍腫毒要藥，並善清心火及散上焦風熱，可用於溫熱病，心經熱毒熾盛？  
(A)石膏 (B)連翹 (C)梔子 (D)淡竹葉
- 60 關於藕節的應用論述，下列何者最不適當？  
(A)擅溫經止血 (B)能收斂止血 (C)可止血而不留瘀 (D)可用治衄血、吐血
- 61 下列何者非水蛭的主治病證？  
(A)跌打損傷 (B)血滯經閉 (C)癥瘕積聚 (D)瘡癰腫毒
- 62 有關莪朮的敘述，下列何者錯誤？  
(A)具行氣破血、消積止痛的功效 (B)破血作用比三稜強，而行氣止痛之力則較弱  
(C)可用於癥瘕積聚，肝脾腫大 (D)藥性峻猛，有耗氣傷血之弊，不宜過量久服
- 63 有關大薊大劑量使用的結果，下列敘述何者正確？  
(A)能破血下氣 (B)可行而帶補 (C)治吐、衄、腸癰 (D)致胃脹不適
- 64 下列何藥可用於腰膝痠痛，下肢無力等症。既能補肝腎，強筋骨，又能通血脈而利關節，性善下走，善治下半身腰膝關節痠痛？  
(A)獨活 (B)牛膝 (C)狗脊 (D)木瓜
- 65 治療因血熱妄行而致的便血症，選用下列何種止血藥物最合適？  
(A)艾葉 (B)三七 (C)地榆 (D)灶心土
- 66 下列何者用於氣滯血瘀所致的胸脇疼痛，經閉腹痛等證，理血中之氣，下氣破血，除風消腫，功力烈於鬱金？  
(A)薑黃 (B)山薑 (C)丹參 (D)木香
- 67 有關土茯苓的應用敘述，下列何者錯誤？  
(A)可用於梅毒 (B)治陰部搔癢帶下 (C)治銀屑病 (D)治肝腎陰虧
- 68 下列何者並非黃芩之功效？  
(A)善清腎火 (B)瀉火解毒 (C)涼血止血 (D)清熱安胎
- 69 下列何藥用於肺虛咳嗽、乾咳無痰、氣短作喘？  
(A)款冬花 (B)飴糖 (C)桑白皮 (D)白芥子

- 70 關於蛤蚧之敘述，下列何者最不適宜？  
(A)可益精血 (B)外感風寒或實熱喘咳忌服  
(C)可用於勞嗽 (D)用於腎陰不足
- 71 下列何者具補中益氣、生津養血之功效？  
(A)丹參 (B)黨參 (C)沙參 (D)太子參
- 72 關於山藥之敘述，下列何者錯誤？  
(A)用於肺虛喘咳 (B)治婦女白帶過多  
(C)生用，搗爛外敷治腫毒 (D)治濕勝中滿證
- 73 下列敘述，何者錯誤？  
(A)沙苑子為豆科植物扁莖黃耆的成熟種子  
(B)沙苑子，又名：潼蒺藜  
(C)沙苑蒺藜長於散風熱，故由風熱所致之頭痛，外眼翳膜用之  
(D)風家（皮膚病）用刺蒺藜
- 74 下列何藥不適用於陽亢有熱的高血壓患者？  
(A)蜈蚣 (B)石決明 (C)鉤藤 (D)地龍
- 75 下列藥物中，何者對頑固難治之風濕性關節炎、頭痛之止痛功效顯著，又可息風止癇？  
(A)刺蝟皮 (B)全蠍 (C)蟪蟲 (D)蟬蛻
- 76 關於石菖蒲的敘述，下列何者錯誤？  
(A)陰虛陽亢、煩躁汗多者慎服 (B)具開竅寧神、益智等功效  
(C)可瀉火解毒，安神定驚 (D)可用於濕濁中阻
- 77 用於癰疾能散結消癰，既能消痰軟堅，又能清熱解毒，治瘡瘍腫毒及腫瘤的藥物為下列何者？  
(A)海藻 (B)昆布 (C)海浮石 (D)黃藥子
- 78 下列何藥如服用過量會汞中毒？  
(A)硃砂 (B)雄黃 (C)皂礬 (D)代赭石
- 79 下列何種藥物既可收斂止血，又能制酸止痛？  
(A)五味子 (B)海螵蛸 (C)椿皮 (D)石榴皮
- 80 下列何種主治功效，不屬於檳榔？  
(A)殺蟲 (B)消食行痰 (C)皮膚瘙癢 (D)裏急後重