

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列何方的組成藥物含有該圖片藥物？①《蘭室秘藏》清胃散 ②《脾胃論》升陽益胃湯 ③《東垣試效方》普濟消毒飲 ④《蘭室秘藏》升陽散火湯



- (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 2 下列何方有「滋水涵木」之方義？
(A)逍遙散 (B)益胃散 (C)濟生腎氣丸 (D)一貫煎
- 3 依《傷寒論》大青龍湯之組成藥物，下列何者錯誤？
(A)桂枝 (B)麻黃 (C)細辛 (D)生薑
- 4 小青龍湯之藥物組成，下列何者具寓收於散、防止耗散過度之效？①炙甘草 ②乾薑 ③白芍 ④五味子 ⑤細辛
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- 5 關於《傷寒論》桂枝湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)以桂枝為君，解肌發表，散外感風寒 (B)以麻黃為臣，助桂枝溫經散寒，透營達衛
(C)本方有解肌和營衛，也有化氣和陰陽的作用 (D)對於表寒裏熱，不汗出而煩躁時不宜使用
- 6 關於《溫病條辨》新加黃龍湯與《傷寒六書》黃龍湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)兩者皆有瀉結泄熱，補氣益血之功
(B)《溫病條辨》新加黃龍湯以小承氣湯瀉下結熱
(C)《傷寒六書》黃龍湯則以大承氣湯瀉下結熱
(D)新加黃龍湯益氣扶正之力較強，黃龍湯攻下之力較猛

- 7 下列何者非《溫病條辨》銀翹散之組成藥物？
(A)射干 (B)荊芥穗 (C)淡豆豉 (D)牛蒡子
- 8 關於《太平惠民和劑局方》參蘇散之敘述，下列何者最適宜？
(A)用治誤汗後真陰大虧，有時時欲脫之勢 (B)升舉下陷元氣，用治氣虛所致之血崩
(C)溫而不燥，重在扶正解表 (D)解肌透疹，清熱解毒，為透疹良方
- 9 下列有幾項為《醫方集解》龍膽瀉肝湯組成之一？①龍膽草 ②柴胡 ③車前子 ④梔子 ⑤甘草 ⑥當歸 ⑦黃芩
(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4
- 10 25 歲患者主訴疲倦但難以入眠，活動多則心悸發，體倦食少，醫者診其舌淡，脈細弱，最宜下列何方治療？
(A)《內外傷辨惑論》當歸補血湯 (B)《濟生方》歸脾湯
(C)《攝生秘剖》天王補心丹 (D)《和劑局方》十全大補湯
- 11 有關《金匱要略》腎氣丸之敘述，下列有幾項正確？①本方即王冰所謂「益火之源，以消陰翳」之意 ②本方加上牛膝、車前子即為《濟生》腎氣丸 ③本方使用桂、附，意在微微生火 ④本方加上鹿茸、菟絲子即為《濟生》十補丸
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 12 《外科證治全生集》陽和湯的藥物組成，下列有幾項正確？①薑炭、肉桂 ②生地黃、荊芥 ③生甘草、麻黃 ④附子、黃耆
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 13 20 歲女性患者手足逆冷，頭暈氣短，汗出脈微，最宜使用下列何方藥？
(A)當歸、黃耆 (B)人參、附子
(C)附子、乾薑、甘草 (D)桂枝湯去生薑，倍大棗，加當歸、細辛、通草
- 14 30 歲男性主訴胃脘脹悶疼痛一週，伴隨噁心嘔吐、腸鳴下利，舌苔膩微黃，脈弦數，最適用下列何方治療？
(A)痛瀉要方 (B)逍遙散 (C)半夏瀉心湯 (D)小柴胡湯
- 15 有關《丹溪心法》左金丸的敘述，下列何者錯誤？
(A)黃連與吳茱萸的比例為 5:2 (B)吳茱萸引黃連入肝經
(C)吳茱萸防止黃連苦寒閉鬱肝氣為反佐藥 (D)本方可治療肝火犯胃之吞酸
- 16 85 歲男性白日倦怠思睡、精神差已數月，伴有四肢冰冷，舌淡苔白滑，脈沉細，醫者應投予以下何方最為適當？
(A)大建中湯 (B)小建中湯 (C)理中丸 (D)四逆湯

- 17 下列何者為瀉白散的功用？
(A)清瀉肺熱，平喘止咳 (B)清氣化痰，降氣平喘
(C)瀉肺利水，平喘止咳 (D)清熱宣肺，化痰平喘
- 18 某患者最近肌肉消瘦，盜汗，午後潮熱，經醫生望診唇紅頰赤，切診脈細數，最宜用下列何方？
(A)當歸六黃湯 (B)秦艽鱉甲散 (C)竹葉石膏湯 (D)玉女煎
- 19 下列敘述有幾項正確？①柴胡疏肝散方中，香附、枳實行氣止痛 ②暖肝煎方中，烏藥、沉香行氣止痛 ③一貫煎方中，川楝子、香附疏泄肝氣 ④天台烏藥散方中，烏藥、青皮疏肝行氣
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 20 下列何者為復元活血湯中的主藥？
(A)當歸 (B)枳實 (C)大黃 (D)紅花
- 21 治療胃氣上逆之呃逆證方劑，下列敘述有幾項正確？①《金匱要略》橘皮竹茹湯主治胃中虛寒 ②《傷寒論》旋覆代赭湯功用著重降逆化痰 ③《證因脈治》丁香柿蒂湯主治胃中虛熱 ④前述三方均用人參、生薑，補虛降逆
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 22 關於天王補心丹之敘述，下列何者錯誤？
(A)主治心腎不交的失眠
(B)方重用生地，一則滋腎水以補陰，一則入血分以養血
(C)柏子仁、遠志養心安神
(D)與歸脾湯同有滋陰養血，補心安神之作用
- 23 下列何者為溫經湯的組成之一？①當歸、川芎 ②白芍、丹皮 ③山茱萸、丹參
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 24 天王補心丹組成，下列有幾項正確？①人參、玄參 ②當歸、生地黃 ③桔梗、甘草 ④酸棗仁、石菖蒲 ⑤五味子、柏子仁 ⑥麥門冬、天門冬
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 25 柴胡疏肝散組成，下列有幾項正確？①柴胡、香附 ②延胡索、木香 ③川芎、芍藥 ④枳殼、陳皮
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 26 關於《和劑局方》小活絡丹的組成方解，下列有幾項正確？①地龍為入絡良品，通經活絡 ②天南星燥濕化痰，除經絡中痰濕 ③川烏、草烏祛風除濕，溫通經絡 ④桃仁、紅花活血化瘀，通絡止痛 ⑤乳香、沒藥行氣活血，化絡中瘀血
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
- 27 濕熱合邪易造成濕溫、黃疸、熱淋、痿痹等證，下列敘述有幾項正確？①三仁湯：濕重熱輕 ②茵陳蒿湯：濕輕熱重 ③甘露消毒丹：濕熱並重 ④八正散：濕熱入侵下焦 ⑤宣痹湯：濕熱蘊鬱肌表經絡 ⑥當歸拈痛湯：濕熱內蘊，外受風邪
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3

- 28 《素問病機氣宜保命集》大秦朮湯為「六經中風者之通劑也」，方中組成內含有八珍湯減去下列何藥？
(A)川芎 (B)白朮 (C)人參 (D)當歸
- 29 《溫病條辨》桑杏湯主治外感溫燥，下列何者為其組成藥物？
(A)西瓜翠衣 (B)綠豆皮 (C)白蜜 (D)梨皮
- 30 患者素體陰虧，證見便秘、口渴、舌乾紅、脈沉細數者，最宜下列何者治之？
(A)大黃、芒硝、甘草 (B)枳實、厚朴、大黃、芒硝
(C)麥冬、玄參、生地 (D)人參、麥冬、五味子
- 31 清燥救肺湯主治肺經氣分燥熱；沙參麥冬湯主治燥傷肺胃陰分，兩方共同的藥物有那些？①沙參 ②桑葉 ③麥冬 ④甘草
(A)①③ (B)②④ (C)①② (D)③④
- 32 《千金要方》獨活寄生湯的組成中有《正體類要》八珍湯減去何藥？
(A)地黃 (B)白朮 (C)川芎 (D)茯苓
- 33 《華氏中藏經》五皮散之敘述，下列有幾項正確？①本證係由於脾虛濕盛，泛溢肌膚所造成 ②以皮膚腫脹、小便不利、舌苔白膩、脈沉緩為主證及辨證關鍵 ③地骨皮為其藥物組成 ④生薑皮行水消腫而除脹滿
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 34 下列敘述何者錯誤？
(A)《外科全生集》陽和湯和《韓氏醫通》三子養親湯兩方中，共同的藥物有白芥子
(B)《醫方考》清氣化痰丸和《婦人良方》導痰湯兩方中，共同的藥物有南星
(C)《溫病條辨》三仁湯和《溫熱經緯》甘露消毒丹兩方中，共同的藥物有滑石
(D)《醫學衷中參西錄》鎮肝息風湯和《雜病證治新義》天麻鉤藤飲兩方中，共同的藥物有白芍
- 35 42 歲男性患者自述上腹脹痛，腹瀉，大便黏膩解不乾淨，舌苔黃膩質偏紅，脈沉有力；則用下列何方治之最適當？
(A)大安丸 (B)葛根芩連湯 (C)保和丸 (D)枳實導滯丸
- 36 20 歲男性，平時喜飲冰涼，情志正常，主訴咽喉常有異物感，痰白量多易咳，且自覺噁心感，苔白稍膩，脈滑。最宜下列何方治療？
(A)《醫方考》清氣化痰丸 (B)《太平惠民和劑局方》二陳湯
(C)《傷寒論》小青龍湯 (D)《金匱要略》半夏厚朴湯
- 37 30 歲男性，主訴胃部悶痛一年，胃痛發作與飲食無關，晨起痰黃，西醫診斷胃食道逆流，經醫師檢查見其舌紅苔黃膩，脈滑數，經醫師觸診發現心下部位有明顯按壓疼痛。最宜下列何方治療？
(A)半夏、黃連、瓜蒌實 (B)半夏、陳皮、枳實、竹茹、茯苓、甘草
(C)柴胡、枳實、芍藥、甘草 (D)半夏、陳皮、人參、茯苓、白朮、甘草

- 38 關於《醫學心悟》貝母瓜蒌散和《醫門法律》清燥救肺湯的敘述，下列有幾項正確？①貝母瓜蒌散治療肺燥有痰，咳痰不爽，澀而難出 ②清燥救肺湯治療溫燥傷肺，乾咳無痰，氣逆而喘 ③貝母瓜蒌散以貝母為君藥；清燥救肺湯以麥冬為君藥 ④兩方共同的藥物有杏仁
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1
- 39 關於《丹溪心法附餘》滾痰丸的敘述，下列何者正確？①以硝煅礞石為君，攻逐陳積伏匿之老痰；以黃連為臣，開痰火下行之路 ②佐以黃連苦寒瀉火，善清上焦氣分之熱；復以沉香速降下氣，此為治痰必先順氣之理 ③舌苔黃厚，大便秘結，脈滑數有力，為使用本方的舌脈辨證要點 ④此方與《濟生方》滌痰湯皆可以治療痰濁擾心造成的神智異常
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ③④
- 40 下列何者為《傷寒論》大陷胸湯之組成藥物？
(A) 甘遂 (B) 虻蟲 (C) 芫花 (D) 大戟
- 41 下列何種藥物具有溫中止嘔，應用於頭痛、鼻塞及解魚蟹、藥毒？
(A) 丁香 (B) 白芷 (C) 生薑 (D) 吳茱萸
- 42 有關附圖藥材之敘述，下列何者錯誤？



- (A) 為治鼻淵頭痛要藥 (B) 瘡瘍未潰者，能排毒
(C) 能祛風止癢 (D) 血熱者忌服
- 43 下列何種祛風濕藥最適合用於風濕痹痛，肢體不遂，濕疹搔癢，和胃化濕？
(A) 威靈仙 (B) 秦艽 (C) 桑枝 (D) 蠶砂
- 44 細辛具有溫肺化痰作用，適用於下列何種咳痰？
(A) 痰多清稀 (B) 痰白稠 (C) 痰中帶血 (D) 癰瘤痰核
- 45 下列何種祛風濕藥，治療風濕痹痛、止痛、魚骨哽喉？
(A) 五加皮 (B) 威靈仙 (C) 桑寄生 (D) 豨薟草
- 46 檳榔攤販賣之檳榔，常夾入性味熱性之果穗，為下列何物？
(A) 萆薢 (B) 萆澄茄 (C) 榧子 (D) 虎杖

- 47 治療寒凝濕鬱，脾虛久瀉宜用下列何藥？
(A)厚朴 (B)草豆蔻 (C)蒼朮 (D)藿香
- 48 患者面赤心煩，口舌生瘡，兼有小便短赤、淋瀝澀痛的症狀，最宜選用下列何藥治療？
(A)防己 (B)茯苓 (C)滑石 (D)木通
- 49 下列何藥可治小便不利，也可以用於扁平疣及濕疹的治療？
(A)薏苡仁 (B)澤瀉 (C)豬苓 (D)車前子
- 50 下列何藥具有通陽散結、行氣導滯的功效，能應用於胸痹證？
(A)薤白 (B)枳實 (C)川楝子 (D)佛手
- 51 砂仁與白豆蔻功效的共同點包括：①化濕 ②行氣 ③止嘔 ④安胎
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 52 凡用以調理氣分疾病，能疏暢氣機，可使氣行通順的藥物，其性味以下列何者為主？
(A)氣香性溫，其味苦辛 (B)氣厚性熱，其味辛甘
(C)氣薄性平，其味甘淡 (D)氣烈性燥，其味苦鹹
- 53 關於玄參的應用，下列敘述何者錯誤？
(A)溫熱病氣血兩燔，高熱煩渴或發斑疹 (B)熱毒瘀滯脈絡所致之脫疽
(C)脾胃虛寒，胸悶、食少便溏 (D)陰虛火旺或外感風熱所致之咽喉腫痛，口乾口渴
- 54 有關赤芍之敘述，下列何者不宜？
(A)血熱所致吐血、衄血、便血、崩漏 (B)血滯經閉、痛經、癥瘕
(C)跌打損傷、瘀腫疼痛 (D)肝血不足之月經不調
- 55 紫花地丁性味辛苦而寒，歸心、肝經，能清熱解毒，消癰散結，涼血消腫，清肝明目，治肝熱目赤腫痛，尤善於治療下列何者？
(A)疔毒癰腫 (B)黃疸酒毒 (C)下肢丹毒 (D)癰癤蟲毒
- 56 下列何藥不能用於治腸癰？
(A)川芎 (B)大黃 (C)蒲公英 (D)紫花地丁
- 57 有關白蘞的功效，下列何者正確？
(A)清熱解毒，斂瘡，消癰散結，生肌止痛 (B)散瘀消癰，癰腫瘡毒，為腸癰要藥
(C)治癰腫、丹毒、漆瘡、水火燙傷 (D)收斂止血，止痢，殺蟲
- 58 下列何藥具有解熱利尿功效？
(A)石膏 (B)青蒿 (C)馬勃 (D)苦參

- 59 關於黃芩之療效，最不適宜用於下列何者？
(A)痰氣壅結，胸膈痞滿 (B)濕溫暑濕，濕熱鬱阻
(C)口苦咽乾，濕熱下利 (D)肺熱咳嗽、痰稠胸悶
- 60 黃連配下列何藥，治心腎不交，失眠心悸？
(A)附子 (B)肉桂 (C)熟地 (D)當歸
- 61 下列何者非虻蟲的主治病證？
(A)跌打損傷 (B)血滯經閉 (C)癥瘕積聚 (D)瘡癰腫毒
- 62 有關蒲黃生用的功效，下列敘述何者錯誤？
(A)通經脈 (B)行血消瘀 (C)溫經止血 (D)祛心腹、膀胱寒熱
- 63 下列何者最不是莪朮之臨床應用？
(A)血瘀頭痛，風濕痹痛 (B)飲食積滯，脘腹脹痛
(C)癥瘕積聚，肝脾腫大 (D)經閉腹痛，產後腹痛
- 64 關於白芨的性味、功效及臨床應用論述，下列何者最不適合？
(A)可治吐血 (B)可治肺胃實熱出血
(C)可治咳血 (D)可用於瘡癰腫毒
- 65 用於血滯經閉、經行腹痛、月經不調、腹中包塊、產後瘀滯腹痛等證。何藥補而不滯，行而不峻為女科要藥？
(A)澤漆 (B)澤瀉 (C)澤蘭 (D)香附
- 66 下列敘述何者錯誤？
(A)肝功能不良患者不宜服用黃藥子 (B)製何首烏補力較強而兼收斂，忌用於便秘
(C)濕盛中滿、大便泄瀉忌服當歸 (D)外感未消、脾胃虛寒忌服熟地黃
- 67 有關龜板與鱉甲之敘述，下列何者錯誤？
(A)均應先煎，且砂炒醋淬後使用
(B)均能滋養肝腎之陰、平肝潛陽
(C)滋陰作用龜板較強；清熱作用鱉甲較強
(D)龜板另具軟堅散結之功效；鱉甲另具健骨、養血等功效
- 68 菟絲子治肝腎不足，於安胎方面，其原理與下列何種藥物同？
(A)續斷 (B)陽起石 (C)白朮 (D)黃芩
- 69 關於現代人參、西洋參、太子參的敘述，下列何者錯誤？
(A)益氣 (B)生津 (C)均屬同科植物 (D)使用部位為根
- 70 下列何者用於脾胃氣虛之胎動不安？
(A)白朮 (B)黃芩 (C)蘇梗 (D)益母草

- 71 肝陽上亢引起頭痛眩暈、心悸、耳鳴，並出現呃逆、嘔吐者，下列何藥最適宜選用？
(A)石決明 (B)赤石脂 (C)刺蒺藜 (D)代赭石
- 72 附圖藥材具有何種功能？



- (A)利氣寬胸散結 (B)溫化寒痰
(C)清熱化痰，軟堅通淋 (D)利尿祛痰
- 73 下列藥物中，何者常配伍全蠍、白附子治中風口眼喎斜？
(A)地龍 (B)白僵蠶 (C)羚羊角 (D)牡蠣
- 74 「禹白附」別名白附子，生品一般不作內服，宜炮製後用，下列來源敘述何者正確？
(A)別名「關白附」為毛茛科植物黃花烏頭的塊根
(B)天南星科植物獨角蓮的乾燥塊莖
(C)毛茛科植物烏頭的旁生側根
(D)毛茛科植物華烏頭旁生側根
- 75 關於麝香的敘述，下列何者錯誤？
(A)具有開竅醒神的作用
(B)與蘇合香、丁香等配伍成蘇合香丸，即屬涼開之劑
(C)能活血散結，開經絡之壅滯以止痛，用於跌打損傷及痹證諸痛
(D)與蘇木、沒藥等配伍成七厘散可用在傷科
- 76 下列那種藥物於水中能沉澱細菌及雜物，對混濁生水有淨化作用？
(A)明礬 (B)硼砂 (C)砒石 (D)雄黃
- 77 下列何藥能健脾和胃，消食化滯，用於飲食積滯，且常與麥芽、山楂等同用？
(A)佛手 (B)草果 (C)神麴 (D)槐花
- 78 下列何者味甘性涼，可益氣，除熱，止汗？
(A)五倍子 (B)山茱萸 (C)浮小麥 (D)麻黃根
- 79 下列何者內服可用於誤服毒物的救治，外用可治疥癬禿瘡？
(A)藜蘆 (B)蜀漆 (C)柿蒂 (D)遠志
- 80 辛夷的藥用部位為：
(A)幼芽 (B)花蕾 (C)果實 (D)根