

106 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關各種痰飲之敘述，下列何者正確？
(A)停留腸胃者，為懸飲 (B)水流脅下者，為支飲
(C)淫溢肢體者，為溢飲 (D)水停胸肺者，為痰飲
- 40 歲女性患者，2 天前開始感覺惡寒、發熱，今日來診，其症狀為發熱、惡寒、無汗、頭痛、鼻塞、咳嗽痰白、口乾不苦，脈浮、苔薄白，治以下列何方最適當？
(A)銀翹散 (B)華蓋散 (C)桂枝湯 (D)荊防敗毒散
- 45 歲支氣管擴張症患者，就診主訴 2 週前開始咳嗽並有大量膿血痰，身熱煩渴，胸滿痛不能臥，見其舌質紅、苔黃膩，脈滑數，胸部 X 光片顯示右下肺葉有浸潤，且有開洞與積液。下列治法何者最適合？
(A)清熱解表 (B)清熱化痰 (C)清肺養陰 (D)排膿解毒
- 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)銀翹散 (C)定喘湯 (D)加味桔梗湯
- 小明暑假第 1 天即約同學一起出去郊遊，傍晚回家後，開始出現咳嗽、痰白黏、頭昏重脹痛、身體痠重及噁心等症狀，診其苔薄白膩，脈濡數。處以下列何方最適合？
(A)新加香薷飲 (B)銀翹散 (C)九味羌活湯 (D)甘露消毒丹
- 37 歲張小姐，咳嗽常常氣急，緊張時加重，喉中有痰聲，痰白黏，胸脅痞悶，診其舌苔薄白，脈弦，治以下列何方最適合？
(A)小青龍湯 (B)杏蘇散 (C)沙參麥冬飲 (D)半夏厚朴湯
- 丹參和田三七最適合下列何種證型之冠心病？
(A)心陽不足 (B)痰濁閉阻 (C)陰寒內結 (D)心血瘀阻
- 35 歲女性患者，自訴胸悶痛近 1 月，無明顯誘發因子，持續時間約為 10 秒鐘後即自行緩解，曾作過心電圖檢查有偶發性的室早期收縮，輕微心室肥大，症見心悸氣短，畏寒肢冷，面色蒼白，唇甲淡白，眠差多夢，舌紫暗，苔白，脈沉細無力、偶不整脈。下列何種處方最適宜？
(A)生脈飲 (B)參附湯 (C)栝蒌薤白白酒湯 (D)血府逐瘀湯
- 52 歲女性患者，主訴血壓升高近 1 年，西藥不規則服用，門診時測量血壓為 160/100 mmHg，症狀並有手足心熱，臉有陣發性烘熱感，盜汗，難眠多夢，口乾渴等，舌紅、少苔，脈細數，治以下列何方最適宜？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)知柏地黃丸 (C)天麻鉤藤飲 (D)加味逍遙散

- 10 70 歲男性患者，主訴平素咳喘痰白量多 10 餘年，近 1 週呼吸困難加劇，且平臥時喘促加重，伴隨症狀有頭暈，心悸，胸悶，痰多清稀，身倦嗜臥，四肢冰冷無力等，無發燒，全血檢查（CBC）在正常範圍，望診面白無華，舌淡胖、齒痕、苔白膩，頸靜脈怒張，胸部 X 光檢查（CXR）發現有肋膜積水，聞診語音低微，聽診有肺底濕囉音（basal rale），切診脈沉弦滑無力，下列何者是最可能的診斷？
- (A)痰飲射肺，心肺兩虛 (B)風寒犯肺，痰飲內停
(C)心氣不足，心陰虧損 (D)心脾兩虛，血脈瘀阻
- 11 承上題，下列何者處置最適宜？
- (A)參附湯加細辛、乾薑、五味子、葶藶子、大棗
(B)小青龍湯加紫菀、款冬花、杏仁、百部
(C)生脈散加半夏、茯苓、甘草、陳皮
(D)歸脾湯加膈下逐瘀湯
- 12 56 歲女性患者，常覺胃部隱隱作痛，有時有灼熱感現象，西醫診斷為淺表性胃炎。症見口乾咽乾，大便乾結。診其苔薄少，質偏紅，脈弦細。以下列何方治之最適當？
- (A)清胃散 (B)一貫煎 (C)左金丸 (D)麻子仁丸
- 13 35 歲女性患者，近日工作壓力大，有胃炎病史，主述時胃脘脹痛，腹中覺有氣竄，痛連兩脅，口苦噁心，泛酸，苔白，脈弦，治以下列何方最適宜？
- (A)柴胡疏肝散 (B)安中散 (C)平胃散 (D)半夏瀉心湯
- 14 33 歲男性患者為公司職員，2 週來出現無明顯誘因之頻繁大便，日行 4 至 6 次，大便溏，無肛門不適感，便後緩解。下列診治之敘述，何者錯誤？
- (A)若有兩脅脹痛，腹悶腹脹之情況，此為肝鬱氣滯
(B)若腹軟，無兩脅脹痛，易疲倦，舌淡、苔薄、有齒痕，右關脈弱，此為脾胃氣虛
(C)若有大便下痢膿臭之情況，此為濕熱下注
(D)若大便稀軟，但無下痢膿血，以白頭翁、黃柏、黃連、秦皮主之
- 15 79 歲男性患者，臨廁排便努掙乏力，掙則氣短汗出，便後疲乏，大便不乾結。診其舌淡嫩，苔薄白，脈弱，下列治則何者最宜？
- (A)益氣潤腸 (B)溫陽益氣 (C)補腎助陽 (D)滋陰通便
- 16 25 歲男性患者，主訴皮膚病及長期腹瀉。體型偏瘦，口渴多冷飲，面部痤瘡，反覆口瘡咽痛，上腹嘈雜悶脹，消穀善飢，反胃噯氣，大便味臭黏糊 1 日 3 至 6 行，肛門灼熱不痛，解便前下腹攪動隱痛，腹脹多矢氣，小便黃，周身皮膚紅癢，鼠蹊部濕疹癢甚，脈沉數，舌紅苔黃膩。下列那個中醫診斷最不恰當？
- (A)痞滿 (B)狐惑 (C)臌脹 (D)痢疾
- 17 承上題，欲快速改善本例腹瀉及皮膚病症狀，下列處方何者最不適宜？
- (A)黃連解毒湯 (B)大承氣湯 (C)半夏瀉心湯 (D)葛根芩連湯
- 18 56 歲楊小姐，因口破，下午身熱，口咽乾就診。症見大便軟，口淡，少痰，身倦乏力，納差，苔白、質淡紅，脈弦細數而乏力。診斷以下列何者最適合？
- (A)脾胃濕熱 (B)脾虛濕盛 (C)氣血虧虛 (D)氣陰兩虛

- 19 下列何種症狀，若在肝硬化「臌脹」之晚期出現，並不代表病情危重，預後不良？
(A)腹大如甕，臍心突起 (B)昏迷
(C)大量便血 (D)服藥後腹瀉
- 20 65 歲男性患者，罹患慢性 B 型肝炎 16 年，生化檢查顯示 AST:52 U/L，ALT:65 U/L，Albumin:3.6 g/dL，Globulin:4.2 g/dL，血液檢查血小板 96000/ μ L。主訴神倦怯寒，脘悶納呆，望診發覺患者面色蒼黃，腹脹大不舒，下肢浮腫，小便短少，舌淡胖紫，脈沉弦無力。綜合以上資料，治以下列何方最適宜？
(A)茵陳五苓散 (B)逍遙散
(C)濟生腎氣丸合附子理中湯 (D)膈下逐瘀湯合六味地黃丸
- 21 62 歲林先生，罹患慢性 C 型肝炎 20 年，生化檢查顯示 AST:46 U/L，ALT:53 U/L，Albumin:3.2 g/dL，Globulin:3.9 g/dL，血液檢查血小板 86000/ μ L。主訴身不倦，胃納尚可，望診發覺患者面部赤縷明顯，舌青紫，脈澀。診斷以下列何者最適宜？
(A)肝腎陰虛 (B)脾腎陽虛 (C)肝氣鬱滯 (D)氣滯血瘀
- 22 43 歲女性患者，先天性左輸尿管狹窄病史，身高 163 公分，體重 42 公斤，BUN:22.6 mg/dL，Cr:1.6 mg/dL，Hb:9 g/dL，proteinuria (3+)，eGFR:38。面白，膚乾，性急，煩躁易怒，無水腫，手足心熱，偶覺下背脹痛伴隨小便不利，脈細數，舌紅、無苔、有裂紋。治以下列何方最適合？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)三妙散 (C)濟生腎氣丸 (D)知柏地黃丸
- 23 52 歲男性患者，腰以下水腫，按之凹陷不易恢復，脘腹脹悶，食慾差，便溏，神倦肢冷，小便短少，舌淡，苔白膩，脈沉。治以下列何方最適宜？
(A)實脾飲 (B)五皮飲 (C)疏鑿飲子 (D)濟生腎氣丸
- 24 癰閉與淋證的鑑別診斷，下列敘述何者正確？
(A)淋證，以小便頻數短澀，滴瀝刺痛，欲出未盡為特徵
(B)癰閉，尿頻而疼痛，且每天排出小便的總量多為正常
(C)癰閉，便數而莖痛
(D)淋證，則小便短澀而難通
- 25 42 歲男性，最近工作量大，常搬重物，下班後覺腰痠背痛，無精打采，且抱怨小便淋瀝不已，脈弱，舌淡。治以下列何方最適合？
(A)石葦散 (B)無比山藥丸 (C)大柴胡湯 (D)知柏地黃丸
- 26 63 歲男性患者，因小便不通，伴隨嘔吐現象，住院接受檢查，住院 2 天後，發生意識不清，躁動不安，胡言亂語，流鼻血，皮膚出現紫斑，舌紅，脈細數，治以下列何方最適合？
(A)蘇合香丸 (B)柴胡龍骨牡蠣湯 (C)半夏白朮天麻湯 (D)鎮肝熄風湯
- 27 23 歲男性患者，因被診斷為紅斑性狼瘡 (SLE) 就診，症見面色潮紅而有暗紫斑塊，無特殊氣味，語言略沙啞，主述患此病約 1 年，長期低熱，手足心熱，經常伴隨目赤，口乾咽痛，渴喜冷飲，膝痠腿軟，關節疼痛，煩躁不安，舌紅、少苔。治以下列何方最適合？
(A)清瘟敗毒飲 (B)知柏地黃丸 (C)半夏天麻白朮湯 (D)加味逍遙散

- 28 24 歲女性患者，有以下的抱怨：經常下背痛及兩側交替的臀部疼痛，同時伴隨眼部發炎，皮膚上有乾癬，近日又有尿道炎及白帶多，最有可能是下列何病？
(A)類風濕性關節炎 (B)僵直性脊椎炎 (C)乾燥症候群 (D)系統性紅斑狼瘡
- 29 退化性關節炎之病因病機以下列何者最少見？
(A)肝腎不足 (B)氣滯血瘀 (C)風邪襲表 (D)寒濕侵襲
- 30 53 歲女性類風濕性關節炎患者，手部關節疼痛反覆發作，晨僵每天發作 1 小時，合併有雙手末梢麻木感，日久不癒，肢體倦怠，面色少華，腰脊冷痛，肢體屈伸不利，舌淡，苔白，脈細弱，以下列何治法最適合？
(A)祛風除濕散寒，補益氣血肝腎 (B)祛風除濕，溫經散寒
(C)祛風除濕，通絡祛瘀 (D)祛風除濕，祛痰化瘀
- 31 承上題，若見下列兼症之加減用藥治療，何者最正確？
(A)腰膝痠軟乏力較甚，加附子、肉桂 (B)畏寒肢冷，關節冷痛，加乾薑、巴戟天
(C)肌膚麻木、肢體重著，加牛膝、黃耆 (D)關節腫大，強直變形，加防風、羌活
- 32 35 歲女性，身高 153 公分，體重 36 公斤。畏寒、乏力、浮腫，氣短時輕時重已 2 年多，經西醫新陳代謝科檢查確診為：原發性甲狀腺功能低下，經服用甲狀腺素效果不明顯。近半個月症狀又加重，來診時四診：消瘦，面色蒼白，面部及雙下肢浮腫，尤其以面部明顯，四肢不溫，畏寒，倦怠乏力，氣短懶言，納差食少，下利清穀，掉髮多，腰背痠痛，頻尿，月經延後，量少色淡，舌質淡胖，舌苔淡白，脈沉弱。治以下列何者最適宜？
(A)四物湯合左歸丸 (B)五皮飲合七寶美髯丹
(C)理中湯合右歸丸 (D)補中益氣湯合六味地黃丸
- 33 60 歲男性患者，症見腰膝痠軟，小便混濁如膏，口渴少飲，面色黧黑，浮腫或少尿，醫者診斷為消渴證損及陽氣，則其最適宜的治則為何？
(A)滋陰固腎，壯水制陽 (B)滋養肝腎，乙癸同治
(C)益氣攝精，補土生津 (D)引火歸元，蒸騰水氣
- 34 63 歲張男患糖尿病已 2 年，症見身體消瘦，口乾渴但飲水不多，小便黃，大便黏膩，胸脘痞悶，口臭，牙齦腫，舌苔白膩，脈數，治以下列何方最適宜？
(A)五苓散 (B)清心蓮子飲 (C)甘露飲 (D)甘露消毒丹
- 35 消渴證肺胃並熱，心煩，渴而引飲，舌苔黃燥，脈洪大，治以下列何方最適宜？
(A)白虎加人參湯 (B)麻子仁丸 (C)竹葉石膏湯 (D)生脈散
- 36 54 歲高血脂症男性患者，平時工作壓力大，就診時症見面紅目赤，口乾咽燥，煩躁易怒，脅肋悶脹，時頭暈頭痛，大便乾、每日 1 行，尿黃赤，色質紅，舌苔黃厚膩，脈弦稍滑數。治以下列何方最適宜？
(A)加味逍遙散 (B)薏苡仁湯 (C)五味消毒飲 (D)龍膽瀉肝湯
- 37 48 歲張女士，就診時主訴不易入睡，口乾苦，平時容易緊張，易怒，身有燥熱感，面部烘熱，胸悶，頸項僵硬，咽有異物感，月經週期不規則，經期淋瀝。望診可見患者形瘦，頸前稍腫但腫塊柔軟，舌紅、脈洪弦數，經抽血檢查女性荷爾蒙正常，甲狀腺素偏高。診斷以下列何證型最適宜？
(A)肝火亢盛 (B)心肝陰虛 (C)痰結血瘀 (D)肝陽上亢

- 38 20 歲男性業務員，因天氣炎熱於外面長時工作，突然昏倒，眩昏頭疼，胸悶體熱，面色潮紅，唇乾、舌紅，脈數，治以下列何方最適合？
(A)四味回陽飲 (B)導痰湯 (C)清暑益氣湯 (D)五磨飲子
- 39 依《內經》之觀點，「諸風掉眩」與下列何臟腑最有關？
(A)心 (B)肺 (C)脾 (D)肝
- 40 有關中風脫證特點之敘述，下列何者錯誤？
(A)手撒肢冷，肢體癱軟 (B)大小便不通
(C)多汗不止 (D)脈細欲絕
- 41 76 歲林老先生失眠已數年，近病情無特殊變化，其病因下列何者最少見？
(A)情志不遂，肝氣鬱結 (B)思慮勞倦太過
(C)六淫所傷 (D)年邁體虛
- 42 35 歲林先生，失眠已有 5 年，同時合併有耳鳴、心悸、健忘及腰痠夢遺等症狀，容易口乾舌燥，舌質紅，脈細數。診斷以下列何證型最適宜？
(A)痰熱內擾 (B)陰虛火旺 (C)心脾兩虛 (D)肝鬱化火
- 43 承上題，治以下列何方最宜？
(A)黃連阿膠湯 (B)龍膽瀉肝湯 (C)溫膽湯 (D)歸脾湯
- 44 65 歲男性患者已肝癌末期，腹部腫大肢體有水腫，醫師診斷為陰水之病，下列何種症狀不是主要特徵？
(A)遍身浮腫，小便短赤，皮膚繃急光亮 (B)身腫，腰以下腫多，按之凹陷不易恢復
(C)脘腹悶脹，納差，四肢冷，小便短少 (D)脈沉遲，面色灰滯
- 45 當癌症患者已出現了嚴重的疲倦無力，呼吸短促，不欲多言，易感外邪，大便軟，呼吸痰聲，身體有微熱持續。經由中醫診斷處方予以十全大補湯後發現，患者每次服藥後即會有大便質稀軟如水狀，1 日 3 至 4 次的情形，精神未見恢復。治法以下列何者最適宜？
(A)解表祛邪 (B)益氣養心 (C)甦脾健運 (D)滋補腎陰
- 46 依《醫宗金鑑》提及：上石疽係由肝經鬱結、氣血凝滯經絡所致。下列何種腫瘤最容易發生上石疽？
(A)肝癌 (B)卵巢癌 (C)胃癌 (D)鼻咽癌
- 47 有關「原發性肝癌」的敘述，下列何者錯誤？
(A)在臺灣肝癌患者以病毒性肝炎引起者居多
(B)黃麴毒素能增加 B 型肝炎患者罹患肝癌的機率
(C)可用半枝蓮、白花蛇舌草輔助治療
(D)晚期肝癌患者，症見腹大如鼓，青筋暴露，甚則嘔血、黑便等，是濕熱熾盛型
- 48 有關癌症化療造成白血球低下，下列何藥較少使用？
(A)白花蛇舌草、半支蓮、龍葵 (B)當歸、熟地、何首烏
(C)黃耆、人參、白朮 (D)山茱萸、補骨脂、肉蓯蓉
- 49 依《素問·上古天真論》的敘述，下列何者與婦女發育之生理無直接相關？
(A)肝氣 (B)腎氣 (C)天癸 (D)衝任脈

- 50 有關薛立齋之調經及婦科用藥的理念，下列何者錯誤？
(A)調經以滋其化源為主，即重視脾胃及腎之治
(B)對於腎之真陰不足，或命門火衰不能生脾土者，主張以滋補腎與命門著手
(C)臨床用藥重視甘溫而慎用寒涼
(D)治療婦人血枯經閉，若脾土虛寒而不能生血，宜先補脾土
- 51 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，下列有關痛經的證治何者錯誤？
(A)胞虛受寒，宜吳茱萸湯
(B)經前腹脹痛，脹過於痛，宜加味烏藥湯
(C)經前腹脹痛，痛過於脹，宜琥珀散
(D)經後腹痛，宜當歸建中湯
- 52 25 歲患者每逢經行第 1 天即吐血，吐血較多色紅，耳鳴頭暈，心煩易怒，經前乳脹痛，月經常提前 3 至 4 天且月經量少，舌紅苔黃，脈弦。最宜下列何方治療？
(A)生地、玄參、白芍、麥冬、阿膠、地骨皮
(B)當歸、白芍、生地、丹皮、梔子、黃芩、川棟子、茜草、白茅根、牛膝、甘草
(C)生地、當歸、白芍、川芎、牡丹皮、地骨皮、胡黃連
(D)柴胡、荊芥、當歸、白芍、山藥、茯苓、菟絲子、熟地
- 53 承上題，其致病機理為下列何者？
(A)氣陰兩虛
(B)肝經鬱火
(C)心火上炎
(D)腎精虧損
- 54 下列何者所致之經閉，不屬於生理性閉經？①流產後經閉 ②子宮內膜沾黏 ③多囊性卵巢疾病
(A)僅①②
(B)僅①③
(C)僅②③
(D)①②③
- 55 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》論治婦女崩漏，下列敘述何者錯誤？
(A)若漏血濇少，此屬血滯，宜用「四物和黑薑、荊芥穗」
(B)如純屬去血過多之血虛證，宜用「膠艾四物湯」
(C)若因思慮傷脾引起之崩漏證，宜用「歸脾湯」
(D)如屬熱多，宜用「知柏四物湯」
- 56 35 歲羅小姐，主訴婚久不孕，現病史：月經每 35 至 38 天來 1 次，行經 1 至 2 天，量少，月經色淡紅，無血塊，腰痠腿軟，小便清長，面色晦暗，舌淡苔白，脈沉遲，最宜處以下列何方治療？
(A)養精種玉湯
(B)開鬱種玉湯
(C)左歸丸
(D)毓麟珠
- 57 某女士發現近 1 年來常白帶很多，稀稀的，沒有腥臭味，且不想多說話，容易疲勞，四肢無力，小腹有下墜感，她自己觸摸陰部，發現陰道口有突出物，躺下來就會縮回去，勞累時突出次數增加，望其舌淡苔薄，診其脈虛細。下列何方治療最宜？
(A)八珍湯
(B)補中益氣湯
(C)大補元煎
(D)泰山盤石飲
- 58 《金匱要略》：「婦人中風七八日，續來寒熱，發作有時，經水適斷」，應以下列何方主之？
(A)小柴胡湯
(B)桂枝湯
(C)桂枝加桂湯
(D)桂枝加龍骨牡蠣湯
- 59 黃小姐懷孕初期嘔吐苦水，胸滿脅痛且噯氣，頭脹暈，煩渴口苦，下列敘述何者最不恰當？
(A)病機為脾胃虛弱，衝脈之氣上逆犯胃
(B)證屬肝胃不和，脈象弦滑
(C)可以蘇葉、陳皮、竹茹、黃連、半夏、烏梅等藥物組方治療
(D)嚴重時，易致氣陰兩虧

- 60 王小姐懷孕 8 週，陰道不時少量出血，或時下時止，或淋瀝不斷時，下列敘述何者最宜？
(A)若此病患先感胎動下墜，繼而有輕微的腰痠腹脹與陰道少許出血，可診為胎動不安
(B)胎漏應不至於發展為墮胎或小產
(C)胎動不安終將發展為墮胎或小產
(D)胎漏必須併有腰痠、腹痛、小腹脹墜等表現
- 61 產後病，古人有「三急」、「三衝」、「三病」之說。下列何者不是「三衝」之一？
(A)敗血衝心 (B)敗血衝肝 (C)敗血衝肺 (D)敗血衝胃
- 62 30 歲陳小姐，第 2 胎自然產，因產程過長失血較多，產後 10 天，小腹隱隱作痛，喜按，惡露量少，色淡，頭暈耳鳴，大便燥，舌淡紅，苔薄白，脈虛細。治以下列何方最宜？
(A)生化湯 (B)當歸建中湯 (C)當歸生薑羊肉湯 (D)腸寧湯
- 63 有關產後排尿異常，下列何者正確？
(A)發生的病機主要是因肺氣化失職
(B)《諸病源候論》因產用氣，傷於膀胱，而冷氣入胞囊，胞囊缺漏不禁，小便故遺尿，多因產難所致
(C)治療以補氣收澀為主
(D)若生產時接生不慎致產後排尿淋漓不斷，且偶挾有血絲，見脈緩，應給予桑螵蛸散
- 64 兩地湯是《傳青主女科》方，用以治療月經先期量少。其藥物組成為何？
(A)熟地、生地、當歸、麥門冬、山藥、玄參
(B)生地、白芍、麥冬、玄參、阿膠、地骨皮
(C)女貞子、旱蓮草、熟地、山茱萸、阿膠、生地
(D)地骨皮、山藥、黃柏、茯苓、丹皮、生地
- 65 有關小兒的病理特點，下列何者錯誤？
(A)發病容易 (B)臟腑嬌嫩 (C)臟氣清靈 (D)易趨康復
- 66 8 歲兒童 1 天前因為貪涼脫衣吹風，今日出現咳嗽，嚏噴流涕，鼻塞聲重，頻唾痰涎。依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列何方最不適宜？
(A)參蘇飲 (B)金沸草散 (C)加味瀉白散 (D)加味華蓋散
- 67 有關小兒肺炎喘嗽心陽虛衰證的臨床表現，下列何者錯誤？
(A)呼吸淺促 (B)口唇發紫 (C)四肢厥冷 (D)四肢抽搐
- 68 4 歲孩童，由祖母帶來門診，代訴最近該孩童食慾下降，經診察其形體未見消瘦，精神尚佳，無腹脹，無腹痛，無身熱，二便正常，眠可，舌質淡紅苔薄白，則該孩童最有可能的病證為何？
(A)厭食 (B)積滯 (C)疳證 (D)疳夏
- 69 有關嘔吐病因的敘述，下列何者錯誤？
(A)食入即吐，多為胃熱嘔吐
(B)睡臥不寧，哭鬧不安，面色忽青忽白，多屬乳食積滯
(C)食後方吐，常屬脾胃虛寒
(D)噯氣泛酸而吐者，多屬肝氣犯胃

- 70 癩證是小兒常見的一種發作性神志異常的疾病，有關其臨床發病特徵，下列何者正確？①目泪不止 ②口吐涎沫 ③四肢抽搐 ④全身癱軟
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①③
- 71 6歲王小弟，因在家量耳溫 38.8°C 故來求診，問診得知解小便尿道灼熱疼痛，約半小時即想解小便，溲短赤，小腹墜脹，煩躁口渴，噁心嘔吐，舌質紅，苔黃膩，脈有力，治以下列何方最適宜？
(A)小薊飲子 (B)葵子散 (C)八正散 (D)豬苓湯
- 72 6歲王小弟，上週鼻塞打噴嚏咳嗽後，皮膚出現明亮如露珠般水泡，疹色紅潤，根盤紅暈不明顯，以軀幹為多，苔薄白，脈浮數，經診斷為水痘，有關證型與治療方劑，下列何者正確？
(A)風熱輕症，銀翹散 (B)毒熱重症，黃連解毒湯
(C)疹後陰傷，沙參麥冬湯 (D)邪陷心肝，羚羊鉤藤湯
- 73 發病急驟，傳變迅速，是兒科病理特徵，下列那些疾病常須留意會突然發生發熱、神昏及抽風之內閉外脫危象？①疫毒痢 ②小兒暑溫 ③疔夏 ④麻疹
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 74 小兒肥甘過度，以致發熱蒸蒸，小便赤澀，面赤唇焦，舌燥而渴，脈實有力。依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，下列何方最不最適宜？
(A)調胃承氣湯 (B)白虎湯 (C)黃連解毒湯 (D)大聖浚川散
- 75 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》喘證門，「虛喘氣乏聲短澀，潔古黃耆湯效捷，百合固金化痰」，臨床肺虛作喘夾熱者，以下列何方治療最適宜？
(A)補肺阿膠散 (B)本事黃耆湯 (C)麥門冬湯 (D)沙參麥冬湯
- 76 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》麻疹主治大法，原則上疹沒後，以下列何種治法最適宜？
(A)透表 (B)清利 (C)養血 (D)溫陽
- 77 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》汗證門，心虛盜汗睡多驚，以下列何方治療？
(A)當歸六黃湯 (B)酸棗仁湯 (C)牡蠣散 (D)清心蓮子飲
- 78 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》五硬發病的治療，若肝木克脾，食少氣弱者，下列治療何者最適宜？
(A)柴胡疏肝散 (B)加味六君子湯 (C)加味六味地黃丸 (D)緩肝理脾湯
- 79 川崎氏症 (Kawasaki disease) 病童的急性期症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)持續發高燒 (39 至 40°C) 超過 5 天
(B)關節腫脹疼痛及多發性關節炎
(C)口腔黏膜變化，如草莓舌或嘴唇紅裂甚至出血
(D)兩眼結膜充血，且無分泌物
- 80 有關腸套疊 (Intussusception) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)常見於 3 個月至 6 歲之兒童，約 80% 病例發生於 1 歲內；男性的發生率約為女性的 3 倍
(B)發生位置 75% 是迴腸套迴腸 (ileo-ileo)，其次是迴腸套結腸 (ileocecal)
(C)症狀為痙攣性腹痛，常併有嘔吐。腹痛發作幾個小時後，可能會出現粉紅色果膠樣大便 (currant jelly stool)
(D)腹部超音波檢查於腸尾端發現一個圈餅 (doughnut-like) 之圖形