

106年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等 別：高等考試

類 科：臨床心理師

科 目：臨床心理學特論(二) (包括心智功能不全疾病之心理衡鑑與心理治療、精神病之心理衡鑑與心理治療、兒童與青少年發展障礙之心理衡鑑與心理治療)

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50 分)

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、關於青少年的飲食障礙症，一直是她們成長中的重要課題，請提出對青少年飲食障礙的心理病理模式，並進一步說明治療上有效的作法？(20 分)
- 二、試陳述譫妄與失智症在盛行率、病程、記憶功能、病因及治療上的差異？(15 分)
- 三、思覺失調症的治療中，藥物通常是第一線且不可或缺的治療方式，但也常需要搭配心理社會介入，才能相得益彰。目前有那些有實徵療效的心理社會介入方法？請簡要說明並提出你個人較偏好的組合式方法，並說明理由。(15 分)

乙、測驗題部分：(50 分)

代號：5104

- (一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 依據 DSM-5，neurocognitive disorders 評估的認知向度並未包括下列何者？
(A)決策能力 (decision making) (B)反芻思考 (rumination thinking)
(C)心智推理 (theory of mind) (D)情緒臉孔辨認 (recognition of emotion)
- 2 依據 DSM-5，neurocognitive disorders (NCDs) 與 depression 的關係，下列敘述何者最正確？
(A)超過 65 歲以上，只能有 NCDs 診斷，不可另有 depression 診斷
(B) mild NCDs 不可另有 depression 診斷，major NCDs 才可以另有 depression 診斷
(C) NCDs 發展早期容易有情緒問題，故不需要另立 depression 診斷
(D) NCDs 發展早期容易有情緒問題，若符合 depression 診斷準則，則應列為共病
- 3 下列何項 neurocognitive disorders 初期發病難以覺察 (insidious onset)，而功能逐漸退化 (gradual progression)？①with Lewy bodies ②due to HIV infection ③due to Huntington's disease ④due to Prion disease
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)③④
- 4 失智症家屬中的主要照顧者最易罹患：
(A)失智症 (B)憂鬱症 (C)精神病 (D)多重人格
- 5 許先生是唐氏症患者，於兩年前被診斷疑有 Alzheimer's disease，因父母捨不得送他到安養院，整天關在屋子裡照顧他。許先生目前有不語與冷漠症狀，臨床心理師應優先考慮的臨床心理工作為何？
(A)家族治療，協助改善其父母的情緒
(B)強調思辨的個別性認知行為治療，以改善其情緒狀態
(C)環境治療，協助其父母安排健全的療養院
(D)進行篩檢型認知功能檢測，確定其認知功能狀態
- 6 譫妄患者較少與下列何疾患共病？
(A)睡眠障礙 (B)記憶障礙 (C)發展學習障礙 (D)語言障礙

- 7 有關 Korsakoff 's amnesic syndrome 的臨床表現，下列何者錯誤？
(A)重複性立即記憶表現適當 (B)較無法學習新的字詞
(C)早期技能與習慣的保存變差 (D)出現 retrograde amnesia 現象
- 8 根據 DSM-IV-TR，有關失憶症鑑別診斷的敘述，下列何者錯誤？
(A)失憶症與裝病的重要差異是：一般而言，失憶症患者的近期記憶能力比裝病者較好，而遠期記憶較差
(B)良好的記憶力測驗常模，可以校正年齡造成的認知功能變化，用以有效區辨失憶症與正常老化的歷程
(C)失憶症患者相對於憂鬱症患者較少抱怨自己的記憶問題
(D)失憶症與解離性失憶 (dissociative amnesia) 的重要差異是前者是因為醫學上的其他疾病或物質使用所導致的
- 9 下列關於皮質下失語症 (subcortical aphasia) 的描述，何者正確？
(A)常與杏仁核的損傷有明顯關聯性 (B)在急性期常會完全無法發音 (mute)
(C)錯語 (paraphasias) 並不常見 (D)與典型失語症的表現相似
- 10 下列關於跨皮質運動型失語症 (transcortical motor aphasia) 與布氏型失語症 (Broca's aphasia) 的說明，何者錯誤？
(A)相較於布氏型失語症，跨皮質運動型失語症患者較無發音上的困難
(B)相較於布氏型失語症，跨皮質運動型失語症患者覆誦表現仍佳
(C)相較於布氏型失語症，跨皮質運動型失語症患者的命名能力較佳
(D)相較於其他語言功能，兩類患者之口語理解能力皆屬不錯，但仍未正常
- 11 陳先生在接受神經心理衡鑑的過程中，臨床心理師發現以右手為慣用手的他，如果請他以右手做一個再見的動作，他無法做到；請他用嘴巴假裝做一個吹蠟燭的動作，他同樣無法完成。陳先生並沒有明顯的語言理解障礙，他最有可能是屬於下列那一個類型的失用症？
(A)肢體動作型失用症 (limb-kinetic apraxia) (B)意念型失用症 (ideational apraxia)
(C)意動型失用症 (ideomotor apraxia) (D)概念型失用症 (conceptual apraxia)
- 12 「utilization behaviour」這個臨床現象，最早是由下列那位學者所提出？
(A) J. Babinski (B) A.R. Luria (C) F. Lhermitte (D) H. Liepmann
- 13 一般討論執行功能之內涵，不包括下列何者？
(A)額葉區之語言功能 (B)額葉區之動作順序與計畫功能
(C)眼眶額葉區之動機監控功能 (D)眼眶額葉區之情緒功能
- 14 下列關於 MMSE 之應用與解說，何者較為不恰當？
(A) MMSE 適用於檢測失智症患者，較不適用於檢測腦瘤患者
(B) MMSE 之切點會受到使用者之文化、生態、時代等因素影響
(C) MMSE 是全世界通用的標準篩檢測驗，大家使用的版本都是 1975 年由 Folstein 等人發展出來的
(D) MMSE 分數與魏氏成人版智力測驗之分數間並無很好的相關
- 15 一般最常見合併有前瞻性記憶受損的患者為何？
(A)左中大腦動脈受損，且合併有流暢型失語症之患者
(B)空間忽略症且合併有左側半癱之中風患者
(C)軀體感覺系統受損且合併有建構性失用症之患者
(D)注意力監控功能不足且合併有計畫能力受損之患者
- 16 有關 ADHD 兒童智商的描述，下列何者正確？
(A)超過一半的 ADHD 兒童智商是低於平均值
(B)超過一半的 ADHD 兒童智商是高於平均值
(C)智商分數越高的 ADHD 兒童，越會出現衝動控制與過動的症狀
(D)大部分 ADHD 兒童的智商是落在平均值，有些 ADHD 兒童還挺聰明的

- 17 如果利用青少年違犯 (juvenile delinquency) 的比率來推估品行疾患 (conduct disorder) 的盛行率，則可能會：
- (A) 低估 (B) 高估 (C) 一致 (D) 無從比較
- 18 下列何種依附關係與兒童與青少年的反社會行為關係密切？
- (A) 抵抗型依附關係 (resistant attachment) (B) 逃避型依附關係 (avoidant attachment)
(C) 混亂型依附關係 (disorganized attachment) (D) 失能型依附關係 (dysfunctional attachment)
- 19 治療 ADHD 常用的興奮劑藥物 (stimulant)，主要是透過下列何種機制產生效果？
- (A) 藥物可以讓病患動作變慢，進而改善症狀 (B) 透過減少病患對糖分的代謝，進而改善症狀
(C) 提升病患情緒，進而提升自信與行為控制能力 (D) 改變腦中神經傳導物質含量，進而刺激相關腦區
- 20 舒豪是一位 10 歲男孩，從 8 歲開始，他在家常亂發脾氣，在心情不好時會打弟弟及揍家裡的小狗出氣，且常偷父母的錢和說謊。當被父母處罰時，他常威脅要放火燒房子，他曾有過幾次用火燒床單和家中地墊，幸好是被舒豪的父母及時發現及阻止。上學期開始，舒豪常常翹課，且會欺負、威脅，甚至攻擊同學，還曾於上體育課時，因為要私自進教室休息，而教室反鎖，在進入教室時將教室窗戶都打破。若要給舒豪一個暫時性的初步診斷，下列何者最適當？
- (A) attention-deficit/hyperactivity disorder (B) antisocial personality disorder
(C) conduct disorder (D) oppositional defiant disorder
- 21 依據中心聚合 (central coherence) 假說，自閉症類群障礙症，在下列那一個分測驗表現會比較好？
- (A) 理解測驗 (B) 圖畫補充 (C) 圖形設計 (D) 物體拼湊
- 22 在流行病學中智能不足 (mental retardation) 患者的慢性健康問題，下列那一種最多？
- (A) 癲癇 (epilepsy) (B) 對立反抗疾患 (oppositional defiant disorder)
(C) 唐氏症 (Down syndrome) (D) 自閉性疾患 (autistic disorder)
- 23 下列染色體異常的疾患，何者盛行率 (prevalence) 最低？
- (A) Turner's syndrome (B) Down syndrome (C) Fragile-X syndrome (D) Prader-Willi syndrome
- 24 閱讀障礙 (dyslexic) 兒童三個腦區的活動量偏低，不包括下列那一個腦區？
- (A) inferior frontal gyri (B) parieto-temporal gyri
(C) occipito-temporal gyri (D) cerebellar-prefrontal-striatal gyri
- 25 智能不足 (mental retardation) 患者，診斷要求適應功能障礙，一般而言，不包含那一個領域？
- (A) 概念技能 (B) 社會技能 (C) 實用技能 (D) 動作技能
- 26 有關 DSM-5 情感思覺失調症 (schizoaffective disorder) 之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 典型發病年齡在成年早期
(B) 此障礙症終生盛行率比思覺失調症 (schizophrenia) 的終生盛行率低
(C) 若持續數年殘餘的精神病性症狀，期間未再發生情緒障礙症發作，可改診斷為思覺失調症
(D) 此障礙症的預後比思覺失調症的預後差
- 27 下列有關兒少雙相情緒障礙症 (bipolar disorder) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 大約有 60% 雙相情緒障礙症的病患，初發年齡在 19 歲之前
(B) 越早發病的雙相情緒障礙症，其預後越差
(C) 鋰鹽是治療兒少雙相情緒障礙症的第一線用藥
(D) 美國 FDA 同意鋰鹽最低使用年齡為 7 歲
- 28 「選擇性緘默症」在 DSM-IV-TR 歸屬於「通常發生於嬰兒、兒童期、青少年期診斷的疾患」，但在 DSM-5 則歸屬於下列那個診斷類別？
- (A) 神經發展障礙症 (B) 焦慮症
(C) 創傷及壓力相關障礙症 (D) 身體症狀及相關障礙症

- 29 關於正常發展的害怕 (fear)，一般認為從多大時開始出現陌生人的害怕？
(A) 0~6 個月 (B) 7~12 個月 (C) 1 歲 (D) 2 歲
- 30 有關思覺失調症多巴胺理論 (dopamine theory) 的觀點，下列何者錯誤？
(A) 硫代二苯胺 (phenothiazine) 類的藥物易有錐體外 (extrapyramidal) 副作用
(B) 抗精神病藥物均有抑制正性症狀的功效
(C) 前額葉功能低落與負性症狀有顯著的關聯
(D) 高劑量的神經興奮劑 (psychostimulants) 會引發幻覺
- 31 當患者有自閉症病史時，需同時出現下列那些症狀至少 1 個月以上，才可判斷其是否也罹患思覺失調症？
(A) 意志貧乏 (avolition) 或對答內容迂迴 (tangentiality)
(B) 語詞雜亂 (incoherence) 或詞語模仿 (echolalia)
(C) 對答內容迂迴或喜樂不能 (anhedonia)
(D) 妄想或幻覺
- 32 思覺失調症患者常有腦室 (ventricles) 擴大的現象，此現象與何者的關聯較為密切？
(A) 多巴胺代謝物過多 (B) 腦壓過高 (C) 腦部缺氧 (D) 腦皮質萎縮
- 33 下列何者是思覺失調類群及其他精神病症的負性症狀表徵之一？
(A) 對答時內容迂迴，無法切題 (B) 內容缺乏組織，不易使人理解
(C) 對任何提問均緘默不語 (D) 減少情緒表達
- 34 根據家族研究的結果 (Gottesman, 1991)，家族成員中罹患思覺失調症風險高低的順序為何？①同卵雙生子 ②異卵雙生子 ③手足 (父母均無罹病) ④父母均罹患思覺失調症者 ⑤手足 (父母中有 1 人罹病)
(A) ①>②>⑤>④>③ (B) ①>④>②>⑤>③ (C) ④>①>⑤>②>③ (D) ①>②>④>③>⑤
- 35 孕婦那個時期受到濾過性病毒的感染，與胎兒日後罹患思覺失調症較有關係？
(A) 1~3 個月 (B) 4~6 個月 (C) 7~9 個月 (D) 任何一個月份都有可能
- 36 根據 DSM-5，第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder) 最常與下列何者共病？
(A) 酒精使用障礙症 (alcohol use disorder)
(B) 妄想症 (delusional disorder)
(C) 注意力不足/過動症 (attention-deficit/hyperactivity disorder)
(D) 焦慮症 (anxiety disorder)
- 37 下列何者為雙相情緒障礙症 (bipolar disorder) 的心理教育取向療法的最主要目標？
(A) 增進病患與家人溝通 (B) 增加病患參與日常生活的正向活動
(C) 使病患了解疾病，遵從醫囑服藥 (D) 使病患改變不良適應的思考模式
- 38 根據 DSM-5，國際間 11 個國家的研究指出第一型雙相情緒障礙症 (bipolar I disorder) 之 12 個月盛行率為下列那個選項？
(A) 0.0%~0.6% (B) 1%~2% (C) 3%~4% (D) 5%~6%
- 39 根據 DSM-5，類思覺失調症 (schizophreniform disorder) 的病程所需時間最多為多少個月？
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12
- 40 類思覺失調症 (schizophreniform disorder) 與思覺失調症的鑑別診斷，除了發病時間長短的差異外，還有那一個因素也是區辨的重要指標？
(A) 類思覺失調症的妄想較輕微 (B) 類思覺失調症沒有情感平板的症狀
(C) 類思覺失調症的診斷準則不需要功能下降 (D) 類思覺失調症的家屬也很容易出現此診斷