

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 腫瘍之初的中醫外治方法中，下列何種治療方法最重要？
(A)消散 (B)提毒去腐 (C)生肌收口 (D)洗滌
- 2 下列有關中醫外科開刀法之敘述何者錯誤？
(A)腫瘍成膿之後，且膿腫中央也有透膿之點，此時切開最有利
(B)膿淺而深切，則內膿雖出，而好肉受傷
(C)一般瘡瘍，宜循經直開，刀頭向上，免傷血絡
(D)膿腫範圍大，肌肉豐厚而膿腔深者，切口宜小
- 3 可用紅棉散或虎耳草打汁滴入治之，下列何者最適當？
(A)耳癰 (B)耳門癰 (C)托腮癰 (D)牙癰
- 4 某患者右耳廓及耳後皮膚潰爛、流水、搔癢，月盈則盛，月虧則衰，反覆發作，此為下列何症？
(A)耳疔 (B)黑疔 (C)髮際瘡 (D)旋耳瘡
- 5 胃脘癰生於中脘穴，外癰名胃脘癰，內癰名為下列何者？
(A)噤癰 (B)幽癰 (C)賁癰 (D)膈癰
- 6 下列有關乳癰的成因，何者錯誤？
(A)肝氣鬱結，胃熱壅滯 (B)小兒鼻風吹之
(C)產後乳汁淤積 (D)風火凝結而成
- 7 下列何者不屬於少腹疽的範圍？
(A)氣海穴 (B)水道穴 (C)丹田穴 (D)關元穴
- 8 下列何者不是發背屬陽毒為病者的表現？
(A)腫勢橫大，堅腫頑如木石，附筋徹骨 (B)患處甚則紅熱，如火焰
(C)周身拘急，寒熱往來 (D)患處或癢或劇痛
- 9 某患者去爬山，行崎嶇之路，在足跟之旁，出現形如棗栗亮而色黃，腫如琉璃，最可能為下列何者？
(A)土票 (B)瘰癧 (C)黃疽 (D)腳攣根
- 10 患者自面及頸項肉色忽然變白，狀類斑點，並不癢痛，日久甚者延及偏身。下列診斷何者最適宜？
(A)面遊風 (B)白駁風 (C)白屑風 (D)赤白遊風
- 11 一名中年男性，近年來頭髮漸漸變少，額角處髮線往後移，日久頭皮部皮紅光亮，毛髮成片脫落，最可能的診斷為下列何者？
(A)禿瘡 (B)油風 (C)釘腦疔 (D)額疽
- 12 下列諸瘡何者不會傳染？
(A)疥瘡 (B)禿瘡 (C)黃水瘡 (D)燕窩瘡

- 13 某幼稚園大班學童，罹患慢性鼻竇炎反覆不癒，最近卻在鼻唇與臉頰附近長出許多紅疹與膿胞，還會流出黃稠的分泌物，甚至結成厚痂（如圖所示），則其最恰當的中醫臨床診斷為下列何者？



- (A)肥瘡 (B)燕窩瘡 (C)蜂窩疽 (D)黃水瘡
- 14 乳癌起因，由憂鬱思慮，積想在心，所慮不遂，何經氣逆以致經絡痞塞而成？
(A)肝心 (B)肝胃 (C)肝脾 (D)肝腎
- 15 若因久瀉久痢而生痔，時時脫肛者，最宜用下列何方？
(A)活血補中湯 (B)三神丸 (C)清涼飲 (D)補中槐筴湯
- 16 下列何者不是便毒之別名？
(A)橫痃 (B)血疔 (C)魚口 (D)蛀疳
- 17 下列有關附骨疽預後不佳的敘述，何者錯誤？
(A)初起往來寒熱，有紅暈 (B)日久潰腐，色白腥穢，膿勢不減
(C)元氣日衰，體形縮小 (D)唇乾舌焦，食少難眠，二便枯秘或失禁等
- 18 下列敘述何者正確？
(A)流痰發無定處，隨在可生 (B)流注其始為寒，其久為熱
(C)流注潰後流膿清稀，夾有敗絮樣物 (D)流痰好發於孩童時期，且常有結核病史
- 19 有關「蛇串瘡」的證治敘述，下列何者錯誤？
(A)相當於現代醫學的帶狀皰疹
(B)其病灶偏乾者，多因心肝二經風火
(C)其病灶偏濕者，多因脾肺二經濕熱
(D)若腰肋生之，係腎火妄動，宜以「知柏地黃湯」清之
- 20 有關「臁瘡」的證治敘述，下列何者錯誤？
(A)相當於現代醫學的慢性小腿皮膚潰瘍
(B)朝輕暮腫者，其證多屬氣虛下陷
(C)初起紅腫熱痛，滲流膿水者，即宜先投以「補中益氣湯」以防毒熱內陷
(D)生於腿肚者，又名為「鰓漏」
- 21 足部背屈肌（Dorsiflexors）若失去功能，病人會發生垂足（drop foot），下列何者不屬足部背屈肌？
(A)伸拇長肌（Extensor hallucis longus） (B)伸趾長肌（Extensor digitorum longus）
(C)脛骨前肌（Tibialis anterior） (D)骨間背側肌（Dorsal interossei）

- 22 56 歲女性，走路散步不慎向後跌倒，手部撐地並肩部著地損傷，肩部疼痛、腫脹，呈「方肩」畸形，肩外展活動受限，肩關節照 X 光片（如圖示），其診斷為下列何者？



- (A) 僅肩關節脫臼 (B) 僅肱骨外科頸骨折
(C) 肩關節脫臼合併肱骨大結節骨折 (D) 僅肩關節周圍炎
- 23 有關協助肩關節外展 90 度的肌肉群描述，下列何者錯誤？
(A) 三角肌支配神經為腋神經
(B) 棘上肌（Supraspinatus）終點為肱骨大結節
(C) 棘上肌（Supraspinatus）通過肩峰下端
(D) 背闊肌連結胸椎棘與頸椎棘
- 24 描述關節運動或肢體畸形的骨傷科術語，兩兩成對，例如 Active／Passive，下列成對何者正確？
①Calcaneus ②Cavus ③Eversion ④Equinus ⑤Inversion ⑥Planus ⑦Varus ⑧Valgus
(A) ①② (B) ③④ (C) ⑤⑥ (D) ⑦⑧
- 25 腕隧道症候群主要症狀，下列何者較少出現？
(A) 第 1、2、3、4 四個手指麻木、刺痛 (B) 手指關節呈鈕扣狀變形
(C) 寒冷季節患指可能產生發冷、紫紺 (D) 病程長者可有大魚際肌的萎縮
- 26 關於彈響髌之敘述，下列何者錯誤？
(A) 是指髌關節屈曲或伸展活動時髌關節外側作響
(B) 此病一般以年長者較多
(C) 是因為髌脛束在股骨大粗隆前後滑動所致
(D) 此類患者髌關節屈伸時有彈響，沒有明顯痛和不適感
- 27 腰部疼痛，有時夜間痛醒，伴消瘦，低熱，盜汗，最常見於下列何病症？
(A) 腰椎間盤突出症 (B) 腰椎結核 (C) 增生性脊柱炎 (D) 骨膿瘍
- 28 失枕的特效穴為「落枕穴」，其位置在下列何處？
(A) 第 1、2 掌骨間 (B) 第 2、3 掌骨間 (C) 第 3、4 掌骨間 (D) 第 4、5 掌骨間

- 29 有關橈骨莖突腱鞘炎（De Quervain disease）的診治，下列那些正確？①外展拇長肌和伸拇短肌的活動頻繁，又無腱膜保護，故容易引起共同腱鞘發炎 ②自覺腕部橈側疼痛乏力，橈骨莖突和第一掌骨基底間有壓痛 ③Phalen test 陽性反應 ④可以在腕骨穴找到明顯壓痛點 ⑤治療時按壓合谷、陽谿、外關、手三里等穴道，主要考量肌肉附著處與經脈循行有關 ⑥疼痛嚴重時，可以用膠布或塑料夾板等，與外敷膏藥並偏尺側固定以限制腕關節活動

(A)僅①②③⑤ (B)①②③④⑤⑥ (C)僅③④⑥ (D)僅①②⑤

- 30 患者王先生，2 小時前發生車禍，左脅遭撞擊，急救員施予膠帶固定（如圖所示）下列敘述何者錯誤？



- (A)王先生經此膠帶固定已感覺較不痛，應維持 8 週後再拆除
(B)膠帶固定是急救搬動王先生必要之措施
(C)膠帶固定會限制王先生的胸廓運動
(D)膠帶固定會讓王先生僅靠橫膈呼吸，時間太久可導致肺葉塌陷

- 31 膝關節理學檢查如圖，患者仰臥，術者左手握住患者左足部，右手放在左膝，先將小腿內旋內收後再外展伸直，然後將小腿外展外旋後內收伸直，過程中產生疼痛，最有可能是下列何處損傷？



- (A)半月板 (B)十字韌帶 (C)側副韌帶 (D)髕韌帶

- 32 關於膝關節半月板的敘述，下列何者正確？①半月板能加深脛骨髁的凹度，以適應股骨髁的凸度，使膝關節穩定 ②外側稍小，似“O”形，前後角距離較近，不與外側副韌帶相連，故外側半月板的活動度比內側小 ③具有緩衝作用和穩定膝關節的功能 ④當膝關節處於半屈曲位時，半月板向前方移位，此時半月板容易損傷 ⑤研磨性外力多發生在外側半月板，因正常膝關節有 3°~5°外翻，外側半月板負重較大 ⑥如半月板破裂者可引起疼痛，則為研磨試驗陽性

(A)①②③⑤ (B)①②④⑥ (C)①③⑤⑥ (D)②③④⑥

- 33 檢查髂脛束攣縮的鑑別診斷，下列何種測驗最適當？

(A)Thomas 測驗 (B)Trendelenburg 測驗 (C)Ober 測驗 (D)Telescoping 套疊測驗

- 34 關於上肢 Jerk test 的敘述，下列何者正確？

- (A)檢查肩關節前側穩定性 (B)受檢查者上臂要後伸 30 度
(C)術者施力於受檢者之腕部 (D)陽性反應時，肱骨頭會出現移位

35 如下圖，急性外踝扭傷，下列何種功能活動受限最大？




- (A)內翻 (Inversion) (B)外翻 (Eversion)
(C)背屈 (Dorsiflexion) (D)蹠屈 (Plantaflexion)
- 36 患者仰臥，患側髖關節、膝關節屈曲，一手按膝一手握踝使膝關節逐漸伸直，並作外展外旋或內收內旋動作。以上操作，臨床上屬下列何種測驗？
(A)阿普萊氏測驗 (Apley's test) (B)梯布瑞爾－費舍氏測驗 (Timbrill-Fischer test)
(C)麥克馬瑞氏測驗 (McMurray test) (D)愛來氏測驗 (Ely's test)
- 37 承上題，此測驗可檢查下列何種損傷？
(A)十字韌帶 (B)半月板 (C)內外側副韌帶 (D)髕韌帶
- 38 有關傷科常見的瘡瘍症，下列何者主要是因病毒感染？
(A)蛇串瘡 (B)糖尿病足 (C)褥瘡 (D)附骨疽
- 39 一位 35 歲男性患者因手腕疼痛酸麻，醫師做下列何項輔助理學檢查較不相關？
(A)艾森氏測驗 (Adson test) (B)法倫氏測驗 (Phalen's test)
(C)阿普萊氏測驗 (Apley's test) (D)芬克史坦氏測驗 (Finkelstein test)
- 40 依《正骨心法要旨》，亡血者，宜補而行之；但出血不多，亦無瘀血者，以外治之法治之。有瘀血者應如何治之？
(A)宜攻利之 (B)宜消之 (C)宜和之 (D)宜溫之
- 41 《和劑局方》中提到可治跌打損傷瘀阻經絡，肢體麻木，屈伸不利者，是下列何種臨床常用方劑？
(A)小活絡丹 (B)正骨紫金丹 (C)薏苡仁湯 (D)當歸芍藥散
- 42 凡跌打損傷，最墜墮之證，惡血留內，則不分何經，皆以下列何經為主？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 43 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損之證，若因大便秘結，裏實氣壯，腹痛硬者，宜治以下列何方？
(A)玉燭散 (B)小柴胡湯 (C)花蕊石散 (D)沒藥丸
- 44 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損腹痛，大便不通，按之痛甚，加味承氣湯下之，其煎服法，下列敘述何者正確？
(A)薑棗煎 (B)酒煎 (C)水煎 (D)水酒各半煎服
- 45 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損之證，頭目眩暈，有因服剋伐之劑太過，中氣受傷，以致眩暈者；有因亡血過多，以致眩暈者。如兼發熱作渴，不思飲食者，宜用下列何方？
(A)十全大補湯 (B)保和丸 (C)小柴胡湯 (D)加味逍遙散
- 46 臨床上常見損傷痹證，若患者肢體重著疼痛，陰雨更甚，痛有定處，甚至腰膝冷痛，舌白膩，脈沉緩。則其證治分行屬於下列何者？
(A)風痹 (B)寒痹 (C)濕痹 (D)熱痹

- 47 依《醫宗金鑑·正骨心法》，傷損之證，血虛作痛，其證發熱作渴，煩悶頭暈，日晡益甚，為下列何證？
(A)瘀血泛注 (B)陰虛內熱 (C)氣滯鬱熱 (D)肝脾鬱火
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法》下列何證是因打撲傷損，敗血流入胃脘所致？
(A)嘔吐黑血 (B)口甜泛酸 (C)噯腐吞酸 (D)嘈雜吞酸
- 49 依《靈樞·邪氣藏府病形》：「有所用力舉重，若入房過度，汗出浴水」，則傷下列何臟腑？
(A)肝 (B)脾 (C)肺 (D)腎
- 50 傷損脊痛腰痛之證，瘀血留於太陽經中，宜治以下列何方？
(A)當歸導滯散 (B)復元活血湯 (C)地龍散 (D)沒藥丸
- 51 肘關節後脫位，若伴有肱骨內髁骨折時，下列何者為最容易受傷的神經？
(A)橈神經 (B)正中神經 (C)尺神經 (D)肌皮神經
- 52 肱骨髁上骨折，若有神經損傷之併發症，最易傷及下列何神經？
(A)橈神經 (B)正中神經 (C)腋神經 (D)尺神經
- 53 肩關節脫位，以肩前脫位最常見，臨床上應用牽引迴旋法復位。其具體操作過程的手臂體位，下列



- (A)①②③④ (B)③④②① (C)①③②④ (D)③①②④

- 54 骨折基本復位手法中，操作時在持續有手力牽引下，術者兩手拇指壓住突出的遠端，其餘四指捏住近側骨折端，向上用力使「陷者復起，突者復平」，如圖所示為下列何種手法？



- (A)端提 (B)捺正 (C)分骨 (D)縱壓
- 55 關於掌骨頸骨折之敘述，下列何者正確？
(A)骨折後斷端受骨間肌與蚓狀肌的牽拉，而向掌側突起成角，遠端斷骨掌骨頭向背側屈轉
(B)若骨折向背側成角，則復位後將掌指關節固定於過伸位
(C)第五掌骨最多見，第二、第三掌骨次之
(D)掌指關節側副韌帶，在掌指關節過伸時緊張，屈曲 90 度時鬆弛
- 56 橈骨莖突狹窄性腱鞘炎的病灶最接近下列那個穴位？
(A)內關 (B)支溝 (C)陽谿 (D)外關
- 57 若懷疑右邊肋骨骨折進行胸部 X 光攝影，下列何者為一般臨床診斷最佳選擇？
(A)正面像 (PA view) (B)側面像 (Lateral view)
(C)右斜位像 (Right oblique) (D)左斜位像 (Left oblique)

- 58 發生於股骨自腓腸肌起始點上 2~4 公分範圍內的骨折稱為：
(A)股骨頸骨折 (B)股骨幹骨折 (C)股骨髁上骨折 (D)股骨髁間骨折
- 59 關節脫位常導致缺血性骨壞死，下列部位何者較少見？
(A)股骨頭 (B)頭狀骨 (C)腕舟狀骨 (D)距骨
- 60 20 歲男性患者主訴昨日車禍跌倒引起左側鎖骨位置劇烈疼痛，今日到中醫傷科門診求助，急診 X 光片如附圖所示，下列相關敘述何者錯誤？



- (A)X 光片顯示的骨折位置為鎖骨骨折的好發位置
(B)鎖骨內側段因有胸鎖乳突肌附著，常使鎖骨內側斷端往上位移
(C)常以折頂法進行整復
(D)整復後以八字繃帶固定法進行固定
- 61 依據八廓學說，下列何者錯誤？
(A)內眦為火廓，屬小腸 (B)外眦三焦，清淨澤廓
(C)抱陽廓即火廓屬心，位在內眦即大眦 (D)瞳人屬坤，地廓屬脾
- 62 關於眼科病機之敘述，下列何者錯誤？
(A)眼通五臟，眼與五輪、臟腑關係深，與氣的正常與否，較不相關
(B)血熱之症，有虛實之分，實證多由外感邪熱侵入血分所致
(C)血虛者為失血或化生不足，可表現眼瞼白睛血絡淡紅不鮮，目睛乾澀，不耐久視
(D)血瘀多為邪毒入營，或氣滯不能行血，眼部表現疼痛劇烈，胬肉紅赤
- 63 關於西醫解剖名稱的虹膜，相當於下列中醫解剖名稱？
(A)黃仁 (B)白仁 (C)黑仁 (D)瞳仁
- 64 「翳隼」為下列何者？
(A)放大鏡 (B)目繫 (C)眼鏡 (D)瞳孔
- 65 下列何病不具傳染性？
(A)椒瘡 (B)胞輪振跳 (C)天行赤眼 (D)粟瘡
- 66 患者突然胞瞼腫脹，白睛紅赤，癢痛兼作，羞明多淚，伴有頭痛鼻塞，惡風發熱，舌苔薄白，脈浮數，其最有可能之診斷及證候為何？
(A)胞腫如桃，緣於熱入營血 (B)暴風客熱，緣於風重於熱
(C)胞虛如球，緣於脾肺氣虛 (D)天行赤眼，緣於疫熱傷絡
- 67 關於胞虛如球之敘述，下列何者錯誤？
(A)胞瞼漫腫，皮色暗紅，灼熱疼痛，當清營涼血，瀉火解毒
(B)胞腫虛軟如球，全身可見神氣困頓，食少失眠，怔忡健忘，當健脾養心
(C)本病多見於雙瞼，且無潰膿現象
(D)本病多與脾虛有關，但肺虛，或腎陽虛，或心陽虛，皆可使水濕加重

- 68 有關白睛疾病，下列敘述何者錯誤？
(A)白睛上見鮮紅血色，不痛不癢，為血溢絡外，停於白睛表層為白睛溢血，輕者一般可自癒
(B)眼部赤腫不顯，但乾澀不適，藥物治療難取速效，為西醫之慢性結膜炎者為白澀症，如因肺陰不足者，可以養陰清肺湯加減
(C)白澀症，可以犀黃散點眼，或黃連西瓜霜配千里光眼藥水
(D)黑睛旁白睛，發生紫紅色結節樣隆起，反覆發作，為白睛青藍之症，多為血虛生風，宜當歸活血飲養血息風
- 69 關於化學性眼外傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)酸性傷創面大多邊界清楚，創面較淺
(B)鹼性傷造成的壞死組織較酸性傷造成的容易脫落
(C)化學物質進入眼內時，應取大量清水進行急救沖洗
(D)急救處理後，再進行中和沖洗
- 70 眼中何結構，位眼瞼上下各一，質堅韌而較厚，其內外端通過內外眦韌帶？
(A)提上瞼肌 (B)瞼板 (C)瞼睫膜 (D)眼輪肌
- 71 在使用耳鏡檢查鼓膜時，下列觀察現象之敘述，何者錯誤？
(A)檢查鼓膜顏色時，若鼓膜前下方反射光錐消失，則可能鼓室有發炎症狀
(B)黏連性中耳炎（*adhesive otitis media*）耳鏡檢查時常見鼓膜增厚且外凸
(C)鼓室若有積液，則鼓膜呈外凸樣貌
(D)鼓膜呈藍色表示鼓室內有深色液體或充血組織
- 72 下列何書首論「喉結核」？
(A)《紅爐點雪》 (B)《解圍元藪》 (C)《景岳全書》 (D)《外科正宗》
- 73 總結歷代醫家看法，耳眩暈病因主要與下列那三臟失調較為有關？
(A)心、肝、脾 (B)肺、脾、腎 (C)肝、脾、腎 (D)心、肺、腎
- 74 某男性患者耳鳴之聲晝夜不息，夜間更甚，虛煩失眠，聽力逐漸下降，常頭暈目暗，腰膝痠軟；舌質紅而少苔，脈細弱，此為何因所致？
(A)脾胃虛弱 (B)肝火上擾 (C)痰火壅結 (D)腎精虧損
- 75 鼻病，鼻內肌膜淡白腫脹，嗅覺遲鈍，下列辨證何者正確？
(A)多屬風熱邪毒壅盛之證 (B)多為邪滯脈絡，氣血凝滯引起
(C)肝腎虛損引起 (D)脾肺氣虛所致
- 76 鼻居面中為清陽交會之處，屬「清竅」，清陽之氣從鼻竅出入，故有何稱呼？
(A)太陽 (B)迎香 (C)百會 (D)明堂
- 77 下列何者為急喉瘡最常見之病因病機？
(A)熱壅氣滯 (B)痰涎濕濁凝聚 (C)陰津耗損 (D)風熱邪毒侵襲肺金
- 78 患者主訴咽內不適、微痛、異物感，常吭喀的症狀特點，檢查咽部喉核周圍有暗紅，但喉核無腫大，無膿點，按壓無膿液溢出，確診為下列何病？
(A)虛火乳蛾 (B)虛火喉痺 (C)風熱乳蛾 (D)風熱喉痺
- 79 口糜主要發病原因是脾胃濕熱引起，下列治則與治方何者正確？
(A)宜清熱解毒，祛風散火，可用清陽散火湯加蠶蠶
(B)宜清熱解毒，疏散風邪，可用雙解通聖散加金銀花
(C)宜清熱解毒，消腫止痛，可用涼膈散去大黃、芒硝
(D)宜清熱解毒，利濕除腐，可用加味導赤湯
- 80 患者因口腔肌膜潰爛前來求診，診之發現口腔肌膜潰爛成點，潰點數量少，潰面呈灰白色。周圍肌膜顏色淡紅或不紅；潰點不融合成片，微有疼痛，口不渴飲，舌質紅，無津少苔，脈細數。此時下列四種處置方式何者最不恰當？
(A)柳花散擦患處 (B)兒茶、柿霜末擦潰點
(C)吳茱萸粉加醋調成糊狀，敷於雙側湧泉穴 (D)內服薄荷連翹方或清胃散