

107年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專門職業及技術人員高等考試藥師考試代號：6304

類科名稱：牙醫師(二)

科目名稱：牙醫學(六)(包括齒顎矯正學、兒童牙科學、牙科公共衛生學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理)

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列關於頰(chin)生長發育之敘述何者錯誤?

- A.因年齡增長，頰愈漸突起(accentuation of the prominence)
- B.頰與齒槽骨基底(base of the alveolar process)之間為骨沉積
- C.頰的前後位置與顳骨關節窩(glenoid fossa)之發育亦有相關
- D.頰突起程度的變化源自下顎骨整體生長以及骨表面之修飾

2.下列關於唇裂(cleft lip)之敘述何者錯誤?

- A.由於側鼻突(lateral nasal process)、正中鼻突(median nasal process)與上顎突(maxillary process)之融合(fusion)失敗造成
- B.約60%的唇裂患者，同時伴隨腭裂(cleft palate)的發生
- C.約於人類胚胎發育第6週左右發生
- D.上唇裂只見於單側

3.青春期後顏面生長的敘述，下列何者正確?

- A.垂直方向的改變最大
- B.前後方向的改變最小
- C.寬度的改變次之
- D.沒有顎骨的旋轉(jaw rotation)

4.下列何者為下顎角肥大(enlargement of gonial angles)的可能原因?

- A.因咬肌(masseter muscle)之過度肥大
- B.因下顎開口肌之過度肥大
- C.因下顎頰肌(mentalis muscle)之過度肥大
- D.因下顎顏面表情肌(facial muscles)之過度肥大

5.正常乳齒列，最好應該具備下列那些特徵? ①近心型乳白齒終端面(mesial step terminal plane) ②略為尖形的齒列弓(V-shape arch) ③前齒空隙(anterior spacing) ④靈長空隙(primate space) ⑤較深的overbite及overjet

- A.①②
- B.②③
- C.③④
- D.④⑤

6.有關牙齒數目發育異常之敘述，下列何者錯誤？

- A.最常發生的多生牙為mesiodens
- B.最常發生ectopic eruption的牙齒是下顎第一大臼齒
- C.ectodermal dysplasia患者常會發生oligodontia
- D.cleidocranial dysplasia患者常會有supernumerary teeth

7.前牙開咬之異常咬合，最不會出現於下列何種病人？

- A.臉部肌群無力症候群（facial musculature dysfunction syndrome）
- B.咽腺體肥大（tonsillar hypertrophy）
- C.舌前推症（tongue thrusting）
- D.短臉型（short face）

8.有關乳齒列靈長空隙（primate space）之敘述，下列何者錯誤？

- A.是正常乳齒列的特徵
- B.位於上顎齒列犬齒遠心側
- C.位於下顎齒列犬齒遠心側
- D.可能在恆犬齒萌發時關閉

9.有關不規則指數（irregularity index）的量測，下列何者正確？

- A.下顎4顆門齒，每相鄰兩顆牙接觸點（contact point）的距離的總和
- B.上顎4顆門齒，每相鄰兩顆牙接觸點（contact point）的距離的總和
- C.下顎6顆前牙，每相鄰兩顆牙接觸點（contact point）的距離的總和
- D.上顎6顆前牙，每相鄰兩顆牙接觸點（contact point）的距離的總和

10.下列何者與異常咬合相關性最小？

- A.6歲時下顎乳門齒脫落
- B.牙齒異位萌發
- C.吸指癖
- D.乳臼齒空間喪失

11.在正中咬合（centric occlusion）關係時，下列門齒水平覆蓋（overjet）之數據，何者屬於前牙反咬（anterior crossbite）？


- A.3 mm
- B.1 mm
- C.0 mm
- D.-2 mm

12.如圖所示，下列那一個答案與此咬合狀態最有相關？




- A. dual bite
- B. scissor bite
- C. anterior open bite
- D. posterior open bite

13. 根據安格氏分類 (Angle Classification) 以下敘述何者正確？



- A. 圖A是第一級異常咬合 (Class I malocclusion)
- B. 圖B是第一級異常咬合 (Class I malocclusion)，診斷根據為上顎第一小白齒咬頭咬在下顎第一與第二小白齒之間
- C. 圖C是第二級異常咬合 (Class II malocclusion)，診斷根據為上顎第一大臼齒近心頰側咬頭咬在下顎第一大臼齒頰側溝的近心處
- D. 圖D齒列有代償性生長，可歸類為第一級異常咬合 (Class I malocclusion)

14. 有關側臉輪廓的敘述何者正確？



圖A

圖B

圖C


A.如圖A，一定是上顎骨太外暴所造成

B.如圖C，齒列咬合關係可能是安格氏第三級異常（Angle Class III malocclusion）

C.如圖A，原因可能是合併上顎太後縮、下顎太前凸所造成

D.如圖B，齒列咬合關係一定是標準安格氏第一級咬合（Angle Class I relationship）

15.在正面測顱X光描繪圖片中（如下圖），54號點為何解剖位置？



A.glabella

B.crista galli

C.tip of nasal bone

D.anterior nasal spine

16.成人的骨性前牙開咬（skeletal anterior open bite）的形態特徵為何？①mandibular plane angle較大

②lower anterior facial height較大 ③下顎枝（ramus）較長 ④上顎前牙萌發不足 ⑤gonial angle較大

A.①②③

B.①②⑤

C.①④⑤

D.②③④

17.有關青少年期齒顎矯正治療之需求，下列何者最常見？


A.改變咀嚼習慣

B.顏面牙齒美觀之改善

C.預防牙齒壞死

D.牙齒美白

18.下圖為成年男性的正面臉部相片及X光片，下列敘述何者錯誤？



A.此病例之可能診斷為下顎骨骼性不對稱

B.此張放射線片可能為posteroanterior (PA) cephalometric radiograph

C.當臨床上懷疑有臉部不對稱時，lateral cephalometric radiograph為最好的診斷根據

D.齒列矯正配合正顎手術可以是本病例治療計畫的選項之一

19.Skeletal Class III anterior open-bite的異常咬合，就其開咬與三級異常咬合而言，是指下列何種偏差的問題？

A.vertico-transverse deviation

B.trans-sagittal deviation

C.sagitto-vertical deviation

D.trans-sagitto-vertical deviation

20.上顎門齒矯正移動之最適當力量，何者所需之力量為最大？

A.傾斜 (tipping)

B.整體位移 (bodily movement)

C.旋轉 (rotation)

D.下壓內縮 (intrusion)

21.上顎門齒牙冠受力移動時，下列何者最易出現？


A.傾斜 (tipping)

B.整體移動 (bodily movement)

C.牙根扶正 (root uprighting)


D.下壓內縮 (intrusion)

22.一位安格氏一類咬合不正雙顎暴牙 (bimaxillary protrusion) 之成人女性，上顎正中門牙角度正常，將拔除第一小白齒改善暴牙外突之唇形，上顎門牙後退最佳移動方式為何？



- A. 圖A
- B. 圖B
- C. 圖C
- D. 圖D

23. 根據此力量—變形曲線圖（force-deflection curve），曲線上何標示點代表屈服點（yield point）？



- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

24. 下列那一種是屬於組織支持（tissue-borne）為主的功能性矯正裝置（functional appliance）？

- A. 咬合板（bite plate）
- B. 哈伯矯正裝置（Herbst appliance）
- C. 雙咬塊裝置（Twin block appliance）
- D. 法蘭克矯正裝置（Frankel appliance）

- 25.在直接黏著**bracket**的過程中，正確的操作步驟，依序為何？①貼合（**fitting**） ②轉移（**transfer**） ③移除過多部分（**removal of excess**） ④放置到恰當的位置（**positioning**）
- A.②③①④
B.②④③①
C.②④①③
D.③②④①
- 26.為避免組織的傷害，強逼萌出（**forced eruption**）時牙齒突出（**extrusion**），其速度最快以1週大約多少mm？
- A.0.5
B.1.0
C.2.0
D.3.0
- 27.下列何種手術最常用來治療長臉型的問題？
- A.下顎前移法（**advancement**）
B.下顎後移法（**setback**）
C.上顎上移法（**impaction**）
D.上顎後移法（**setback**）
- 28.12歲男孩因暴牙及齒列嚴重擁擠，需拔除四顆小白齒做全口齒列矯正，他的父母親也同意接受治療，但男孩完全拒絕接受拔牙矯正，對家屬或患者，下列何種處置最好？
- A.說明暴牙、齒列不整，嚴重影響心理發展，為男孩好，須開始執行齒列矯正治療
B.男孩仍未有行為能力，以其法定代理人或其父母親的意見為意見，須開始執行齒列矯正治療
C.與男孩解釋現在不治療，以後更難治療，無論如何，須現在開始執行齒列矯正治療
D.說明不治療之後果，尊重男孩意見，暫緩執行齒列矯正治療
- 29.根據Dr. A. Gesell（1949）研究，下列何者是2歲小朋友應該有的特徵？
- A.很黏父母（**very attached to parent**）
B.較少自我中心（**less egocentric**）
C.參與小社交圈（**participates in small social groups**）
D.樂於擁有（**takes pride in possessions**）
- 30.關於行為處理，下列敘述何者錯誤？
- A.對小病人誠實是建立信任關係的重要基石
B.治療途中，小病人開始躁動，為完成治療使用強制手段
C.醫療團隊的無效率容易造成小病人的憂慮與不安
D.牙醫師自信意志力將有助於行為誘導的成功
- 31.為了增長操作時間（**working time**），聚羧酸黏合劑（**polycarboxylate cement**）的粉劑（**powder**）應儲藏於下列何種環境？
- A.室溫
B.高溫

C.高濕度

D.低溫

32.孩子口腔疾病預防的責任不屬於下列何者？

A.牙醫師

B.父母與照顧者

C.孩子自己

D.兄弟姊妹

33. 下圖所示，左下第二乳臼齒之可能的治療選擇中，下列何者不合適？



A.拔除，做活動式空間維持器

B.拔除並做固定式空間維持器

C.冠髓切除術（pulpotomy）

D.牙髓切除術（pulpectomy）

34.下列恆牙中何者牙根完成的時間最晚？

A.下顎第一大臼齒

B.上顎正中門齒

C.下顎側門齒

D.上顎側門齒

35.齒外齒（dens evaginatus）不常發生於：

A.小白齒之中心溝（central groove）上

B.小白齒之嵴（ridge）上

C.前齒之舌面隆凸（cingulum）上

D.小白齒之咬頭（cusp）上

36.恆牙上顎萌牙之最常見的順序為何？

A.6-1-2-3-4-5-7-8

B.6-1-2-4-3-5-7-8

C.6-1-2-4-5-3-7-8

D.6-1-2-3-5-4-7-8

37.下列關於乳齒列及混合齒列期單純性後牙錯咬的敘述，何者錯誤？

- A.依據Kutin及Hawes的發現，其發生機率小於10%
- B.隨著生長發育，絕大多數的錯咬情形會自動恢復成正常咬合
- C.可使用焊接式W形牙弓裝置（soldered W-arch appliance）來矯治
- D.可使用跨弓橡皮圈（cross-arch elastic）來矯治

38.一位8歲女童由家長帶來門診，主訴下顎門齒長在舌側，經測量牙齒近遠心寬度結果分別是：11=7 mm，21=7 mm，12=5 mm，22=5 mm，31=5 mm，41=5 mm，32=5.5 mm，42=5.5 mm，根據Moyers預估表格比對75%可能性，此女童尚未萌出之上顎恆犬齒及第一、第二小白齒之近遠心寬度應該是多少mm？

測量值	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0
上顎	20.6	20.9	21.2	21.5	21.8	22.0	22.3	22.6	22.9	23.1
下顎	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8

- A.23.1 mm
- B.22.8 mm
- C.21.5 mm
- D.21.0 mm

39.持續的吸姆指（thumb sucking）容易造成下列那一種現象？

- A.前牙錯咬（anterior crossbite）
- B.前牙深咬（anterior deepbite）
- C.後牙開咬（posterior openbite）
- D.前牙開咬（anterior openbite）

40.關於新生嬰孩的臉部與頭顱的敘述，下列何者錯誤？

- A.每個嬰孩剛出生時的臉部均比頭部大
- B.新生兒幾乎沒有下巴，且具有小嘴巴跟大眼睛
- C.新生兒頭顱上有六個凶門（fontanel）尚未密合
- D.頭顱的生長比上顎的生長先完成

41.牙齒脫落（avulsion）之牙齒保存可以用下列那些溶液保存？①Hanks 緩衝液體 ②等張食鹽水 ③雙氧水 ④牛奶 ⑤次氯酸鈉溶液

- A.①②③
- B.①②④
- C.②③④
- D.③④⑤

42.一位7歲男童10分鐘前因為跌倒，馬上由老師帶到牙科治療，經檢查後發現21牙冠斷裂，牙髓暴露約0.1mm，X光檢查牙根無斷裂現象，21要進行覆髓及光聚合樹脂填補，下列何種處置較恰當？

- A.因暴露之牙髓已經受到口水污染，故不須上橡皮障
- B.以氫氧化鈣當覆髓材料，以刺激牙髓新生牙本質
- C.暴露之牙髓需持續保持乾燥，以免影響黏著劑功能

D.牙齒永久性牙冠恢復完整外觀，並恢復咀嚼功能

43.一位3歲男童第一次赴牙科治療牙齒，經檢查後發現61外觀完整且無齲齒，但牙齒呈現深黃褐色，根據家長主訴6個月前曾經跌倒碰撞到門牙，所以61較恰當之處置為何？

A.必須根管治療

B.藥物牙齒漂白

C.光聚合樹脂表面填補覆蓋黃褐色

D.照X光片，持續追蹤

44.下列何者為唐氏症候群病患常見的口腔症狀？

A.上唇繫帶異常

B.乳齒早期脫落

C.小舌症

D.開咬

45.針對腦性麻痺病童，下列敘述何者正確？

A.牙科治療時避免突然頭部左右轉向，以免引發緊張性迷路反射（tonic labyrinthine reflex）

B.牙科治療時避免突然頭部向後仰，以免引發非對稱性緊張性頸反射（asymmetric tonic neck reflex）

C.牙科治療時避免張口太大，以免引起驚愕反射（startle reflex）

D.使用橡皮障（rubber dam）可以避免或減輕嘔吐反射（gag reflex）

46.由嬰兒時期開始形成的親子共生關係（child-parent symbiosis）會使家長的焦慮導致孩童看牙的不良行為，這種關係的影響對幾歲以下的兒童影響最大？

A.4歲

B.5歲

C.6歲

D.7歲

47.在兒童牙科門診使用笑氣鎮靜時，笑氣最適當之濃度為多少？

A.15~25%

B.20~30%

C.30~45%

D.45~55%

48.齲齒之再礦化（remineralization）所需之時間取決於三個主要因素，下列何者錯誤？

A.牙菌斑存在之時間

B.攝取碳水化合物之性質

C.有沒有使用氟化物

D.牙刷之更換頻率

49.服用氟片的正確方法為何？

A.以水吞服

B.以牛奶吞服

C.在口中咀嚼慢慢溶解後吞下

D.放入果汁中溶解後，以奶瓶餵食

50.根據美國兒童牙科醫學會所建議之齲齒風險評估工具（caries risk assessment tool），下列何種狀況不屬於低風險（low risk）？

A.定期接受口腔檢查

B.來自高社經地位之家庭

C.在過去十二個月內曾治療過齲齒

D.沒有吃零食之習慣

51.關於人類生長發育概念，下列敘述何者錯誤？

A.所有健康的個體其生長型態類似

B.身體不同的部位其生長速率不同

C.生長的能力主要由基因決定

D.出生前母親的營養程度及疾病，不會改變小孩子的生長及發育

52.關於顱顏面部生長及型態，下列各項敘述何者錯誤？

A. 前顱區（anterior cranial base）的發育時間約在嬰兒期及孩童初期

B. 額骨及鼻骨的生長是透過沈積-吸收方式進行（appositional resorptive bone growth）

C. 當上顎骨往前下方生長，前方骨表面以骨沈積方式進行（appositional bone growth）

D. 後顏面部主要生長時間為青春期後期

53.使用機能矯正裝置（activator）治療下顎後縮的機制，下列敘述何者最不恰當？

A.促進下顎髁頭生長

B.顎關節窩之生長改變（glenoid fossa apposition-resorption bone growth）

C.阻擋上顎向下向前之生長

D.導致上顎側方齒列向上向前萌出

54.若上下顎第二乳臼齒末端平面關係為近心階末端平面（mesial step terminal plane），則恆牙第一大臼齒剛萌出時，較易形成下列何種咬合關係？

A.安格式一級咬合

B.安格式二級異常咬合第一分類

C.安格式二級異常咬合第二分類

D.安格式三級異常咬合

55.罹患鎌刀狀細胞貧血症（sickle cell anemia）小孩患者，若血中血紅素低於多少，即需先輸血再做全身麻醉下牙科治療？

A.20 g/dL

B.15 g/dL

C.10 g/dL

D.7 g/dL

56.下列病患何者在牙科治療時，應請病患備好氣霧器（nebulizer）？

A.氣喘（asthma）

B.肺氣管發育不良（brochopulmonary dysplasia）

C.囊腫性纖維變性（cystic fibrosis）

D.阻塞性睡眠中止症候群（obstructive sleep apnea syndrome）

57.關於HIV感染之口腔病變，下列敘述何者錯誤？

A.最常發生之口腔感染是*Candida albicans*

B.口腔念珠菌感染中，根據口腔徵候可分為4種類型

C.偽膜性病變（pseudomembranous lesion）之特徵呈現乳白或黃斑樣，不易從黏膜上移除，最常發生部位是頰黏膜

D.增生性病變（hyperplastic lesion）之徵候呈現白斑樣，不易移除，最常發生部位是頰黏膜

58.根據Ellis與Davey classification of crown fractures，牙冠的部位有延伸性的斷裂且涉及到dental pulp的暴露，屬於那一個分類？

A.Class I

B.Class II

C.Class III

D.Class IV

59.下列何種因素不是增加唐氏症患者死亡率的常見原因？

A.心臟缺陷

B.白血病

C.上呼吸道感染

D.肝功能異常

60.聽障之患者若聽力喪失達40分貝以上，則正常音量之交談在距離幾英尺便有困難？

A.1英尺

B.3英尺

C.5英尺

D.7英尺

61.某檢測牙周疾病工具之敏感度為60%，特異度為40%，若已知牙周疾病盛行率為每百人25例，則該工具的陽性預測值為何？

A.20%

B.25%

C.33%

D.50%

62.2000名60歲以上的男性在口腔健康檢查後，經診斷發現200人已罹患牙周炎；接下來10年的追蹤又有300人得到此病。若10年之間，這些男性均無人死亡且已罹患牙周炎者其牙周炎狀況依然存在，請問此族群中牙周炎平均每年的發生率是多少（average annual incidence rate）？

A.1.50%

B.2.50%

C.1.67%

D.15.00%

- 63.某牙醫師欲了解刷牙習慣不佳是否會增加罹患失智症的危險性，因此於某社區調查所有50歲以上居民的刷牙習慣，先排除已經罹患失智症者，並追蹤這群社區居民未來二十年內的失智症發生狀況。請問以上研究是何種流行病學研究設計？
- A.臨床隨機對照試驗（clinical randomized controlled trial）
 - B.世代追蹤研究（cohort study）
 - C.病例對照研究（case-control study）
 - D.病例報告（case report）
- 64.國小學童每天使用的0.05% NaF含氟漱口水，其含氟濃度約為多少ppm？
- A.226
 - B.452
 - C.678
 - D.904
- 65.根據預防醫學的三段五級架構，有關促進口腔健康，下列何者為根本之道？
- A.建立全民健康保險制度
 - B.推行公共衛生教育
 - C.提升醫療品質
 - D.疾病之治療
- 66.有關我國於2016年開始實施之食鹽加氟預防齲齒政策，下列敘述何者錯誤？
- A.食鹽加氟是屬於系統性（systemic）使用的氟化物
 - B.我國加氟鹽的氟離子濃度限定在200 ppm以下
 - C.由民眾自行選擇是否使用加氟鹽
 - D.目前添加氟化鉀或氟化鈉之食鹽不僅限於家庭使用
- 67.於社區中推行一項口腔癌防治之計畫，下列何者是第一個步驟？
- A.決定教學方法
 - B.成立口腔癌篩檢站
 - C.鼓勵社區民眾參與
 - D.評估社區民眾之需要
- 68.在健康教育診斷模式（PRECEDE-PROCEDE model）中，關於知識、態度的敘述，下列何者錯誤？
- A.屬於素質因素
 - B.歸類在教育與組織診斷中
 - C.與信念屬於同一類因素
 - D.歸類在行為與環境診斷中
- 69.某位牙周病患認為餐後與睡前使用牙間刷的行為，可以改善牙周健康，這是應用社會認知理論（social cognitive theory）中那種重要概念？
- A.效能期望
 - B.結果期望
 - C.觀察性學習

D.自我控制

70.依我國口腔健康法規定，下列何者屬於應加強推展口腔保健措施之對象？①老人 ②孕婦 ③兒童

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

71.一項全國調查的結果顯示：我國12歲兒童的平均DMFT index為2.50顆。依據世界衛生組織於2013年發行之第五版口腔健康調查的基本方法（Oral Health Surveys, Basic Methods, 5th ed., WHO, 2013），其齲齒嚴重程度分級是屬於：

A.非常低

B.低

C.中等

D.非常高

72.世界衛生組織於2013年發行之第五版口腔健康調查的基本方法（Oral Health Surveys, Basic Methods, 5th ed., WHO, 2013），未記錄下列何者？

A.牙齒腐蝕（dental erosion）

B.牙齒外傷（dental trauma）

C.氟斑齒（dental fluorosis）

D.牙結石（dental calculus）

73.依現行環保法令，生物醫療廢棄物之廢尖銳器具及感染性廢棄物之貯存容器及塑膠袋，應於最外層明顯處標示數項內容，下列何者是感染性廢棄物需要標示，而廢尖銳器具免標示的項目？

A.貯存日期

B.重量

C.區別有害事業廢棄物特性之標誌

D.貯存溫度

74.依據世界衛生組織於2015年訂定之成人和兒童糖類攝取指南，下列敘述何者錯誤？

A.會造成齲齒的糖類主要是游離糖（free sugars）

B.針對所有年齡層的研究，皆發現齲齒和游離糖（free sugars）的攝取有正相關

C.若使用氟化物預防齲齒，則不須限制游離糖（free sugars）的攝取量

D.建議將成人和兒童的游離糖（free sugars）攝取量降低至攝取總熱量的10%以下

75.下列何項口腔癌防治策略是屬於公共衛生三段五級預防架構中之初段預防？

A.甲基藍（toluidine blue）口腔黏膜檢查

B.菸檳習慣調查

C.戒檳衛生教育

D.口腔癌標靶治療

76.下列有關唐氏症（Down syndrome）患者的敘述，何者錯誤？

A.病因主要是第21號染色體發生問題

- B.女性患者比男性患者多
- C.患者體型通常較胖，個性也較和順
- D.患者舌頭較大，容易伸出口腔外

77.下列有關為特殊需求者進行補綴治療時的注意事項，何者錯誤？

- A.假牙復以活動式為宜
- B.若需製作活動假牙，要考慮特殊需求者的合作程度
- C.預測特殊需求者是否能適應活動假牙，可給予病患拋棄式牙托來測試
- D.用特殊需求者舊有的活動假牙加以修補襯底，是優於重新製作的選擇

78.某牙醫師受邀到老人福利機構提供牙醫醫療服務。請問此牙醫師到下列何處碰到可以生活自理的老人所占百分比最高？

- A.長期照護機構
- B.養護機構
- C.失智照顧機構
- D.安養機構

79.下列何種病毒性肝炎目前不能透過免疫而進行預防？

- A.A型肝炎
- B.B型肝炎
- C.C型肝炎
- D.D型肝炎

80.關於牙周病與系統性疾病關係，下列何者錯誤？

- A.嚴重糖尿病會加重牙周病病情
- B.嚴重牙周病會加重腎病變的機率
- C.牙周病不會加重心血管疾病
- D.牙周病會增加呼吸系統的感染風險