

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 22 歲男性患者，住院會診中醫，其症狀為寒顫、高熱、體溫 39℃、呈稽留熱型、頭痛、全身肌肉疼痛、咳嗽、咯黃痰、右下胸痛放射至肩部、口乾苦、脈洪數、苔黃、質紅，此階段治以下列何方最適宜？
(A)銀翹散加浙貝、白茅根、瓜蒌實、重用銀花
(B)麻杏石甘湯加魚腥草、蒲公英、鬱金、重用石膏
(C)大青龍湯加瓜蒌皮、炒白芍、銀花、重用麻黃
(D)清營湯加天竺黃、黃連、石菖蒲、重用水牛角
- 2 患者因呼吸衰竭經氣管插管而住進加護病房，現病情改善已無感染而要脫離呼吸器，若要增加呼吸肌的功能，最宜用下列何藥治療？
(A)麻黃、杏仁 (B)人參、黃耆 (C)麥冬、五味子 (D)當歸、熟地
- 3 20 歲女性患者，無慢性疾病史，主訴於 3 日前登山後，覺得惡寒，頭痛肢酸，鼻塞流清涕。見其舌苔薄白，脈浮緊。依中醫辨證，下列何者最宜？
(A)風寒證 (B)風熱證 (C)暑濕證 (D)風燥證
- 4 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)荊防敗毒散 (B)新加香薷散 (C)辛夷清肺飲 (D)銀翹散
- 5 45 歲女性患者，喘鳴已一星期了，就診時患者呼吸氣急，訴說喘鳴，痰白泡沫狀，胸緊悶，舌診苔薄白，有津，脈診浮數，處以下列何方最適宜？
(A)小青龍湯 (B)三子養親湯 (C)蘇子降氣湯 (D)參蘇散
- 6 下列何者不是癲癇的主要病因、病機？
(A)母孕受驚胎氣受損 (B)先天稟賦不足 (C)外傷腦脈血瘀 (D)激烈運動
- 7 40 歲男性患者近日氣喘發作，其症狀表現為咳嗽喘鳴，耳鳴眩暈，口苦，目赤流淚，舌診舌質紅、苔黃，脈診弦數，下列藥物組合何種處方最適宜？
(A)柴胡、黃芩、桑白皮、地骨皮、麻黃、杏仁、甘草
(B)麻黃、石膏、杏仁、生甘草
(C)白果、麻黃、蘇子、款冬花、杏仁、桑皮、黃芩、法半夏、生甘草
(D)麻黃、杏仁、石膏、桂枝、生甘草
- 8 65 歲男性患者，西醫診斷為開放性肺結核，近半年來症見咳喘氣急，痰黃質黏，時時咯血色鮮紅，身熱、面紅，舌質紅，苔黃，脈滑數。此證型以下列何者最宜？
(A)痰熱鬱肺 (B)痰濁壅肺 (C)陰虛火旺 (D)風熱襲肺
- 9 54 歲男性主訴近 2 週常覺陣發性頭暈，心跳過快（自測心律超過 100beats/min），多於開會期間發作，嚴重時會有快暈倒的感覺持續數分鐘後緩解；休息後症狀舒緩較快，運動心電圖檢查無異常發現，自覺神疲無力，易汗懶言，頭昏、頭暈。診其舌淡紅、苔白，脈乏力。診以下列證型何者最適宜？
(A)心悸，氣滯血瘀 (B)心悸，心血不足 (C)心悸，心氣不足 (D)心悸，氣鬱不暢
- 10 承上題，本病證的臨床最佳處方為下列何者？
(A)桃仁紅花煎 (B)四物湯 (C)加味逍遙散 (D)四君子湯

- 11 52 歲高血壓女性患者，平日喜食厚膩且不常運動，身體肥胖，面白時潮紅。某日寒流後突發偏身麻木，頭暈目眩，胸悶納呆，腦部斷層掃描發現有缺血性腦中風。下列證型何者最適合？
(A)肝陽上擾 (B)痰濕阻絡 (C)氣虛血瘀 (D)肝腎虧損
- 12 承上題，治以下列何方最適合？
(A)鎮肝熄風湯 (B)滌痰湯 (C)地黃飲子 (D)補陽還五湯
- 13 患者胃脘灼熱，痛勢急迫，煩躁易怒，泛酸嘈雜，口乾苦，舌紅苔黃，脈弦數。下列處方何者最宜？
(A)保和丸 (B)柴胡疏肝散 (C)化肝煎 (D)一貫煎
- 14 患者胃脘疼痛，或有熱感，口黏口苦，口乾不欲飲，小便色黃，大便不暢，舌苔黃膩，脈滑數，辨證以下列何者最宜？
(A)濕熱中阻 (B)飲食傷胃 (C)胃陰虛 (D)肝氣犯胃
- 15 46 歲女性患者自訴胃痛已久，食後胃痛不舒，噯氣後則舒，每次發作總是先從左上腹開始後到右上腹，口不渴，二便可。診其苔薄白淡紅，脈弦。下列何處方最適當？
(A)加味逍遙散合活絡效靈丹 (B)柴胡疏肝散合失笑散
(C)一貫煎合活絡效靈丹 (D)痛瀉要方合失笑散
- 16 62 歲男性患者進食梗阻，脘膈痞滿，甚則疼痛，情志舒暢則減輕，精神抑鬱則加重，嘔吐痰涎，大便艱澀，舌紅苔膩，脈滑。治以下列何方最適宜？
(A)右歸丸 (B)沙參麥冬湯 (C)啟膈散 (D)通幽湯
- 17 下列何方最適合用於脾虛型之泄瀉？
(A)胃苓湯 (B)加味逍遙散 (C)參苓白朮散 (D)保和丸
- 18 42 歲陳小姐大便日二三行，食後脘痞悶，噯氣有食腐味，大便臭如敗卵，苔黃膩，舌紅，脈滑數。治以下列何方最適合？
(A)參苓白朮散 (B)溫膽湯 (C)保和丸 (D)藿香正氣散
- 19 36 歲男性有慢性 B 型肝炎、肝硬化病史，其平日經常應酬飲酒生活作息不正常而導致肝指數上升，病情反覆波動。近 3 個月黃疸不退，面色身目俱黃，頭重身困，胸脘痞滿，食欲減退，噁心嘔吐，腹脹便溏，診其舌苔白厚膩，脈弦滑或濡緩。以下列何方治之最適宜？
(A)茵陳朮附湯 (B)茵陳五苓散 (C)龍膽瀉肝湯 (D)茵陳蒿湯
- 20 關於「臌脹」的敘述，下列何者錯誤？
(A)本病病位主要在肝、脾、腎三臟 (B)治療原則晚期以攻邪去實為主
(C)屬中醫四大頑證之一 (D)病機關鍵為氣、血、水互結於腹中
- 21 關於黃疸病的鑑別診斷，下列敘述何者錯誤？
(A)陽黃起病快，病程短 (B)黃疸之病勢，以急黃最嚴重
(C)黃疸病以目睛黃赤最早出現而最晚消失 (D)陽黃黃色鮮明，屬虛證、寒濕證
- 22 有關五臟水辨證，其身腫，小便難，時時鴨溏者，屬下列何者？
(A)心水 (B)肺水 (C)肝水 (D)腎水
- 23 54 歲女性患者，慢性腎炎病史。主訴常覺煩熱口渴，胸脘痞悶，大便乾結，小便短赤，遍體浮腫嚴重，皮膚繃緊光亮，脈滑數，舌紅、苔黃膩。治以下列何方最適合？
(A)五皮飲 (B)豬苓湯 (C)導水茯苓湯 (D)疏鑿飲子
- 24 患者患有慢性腎炎多年，近 3 日眼瞼浮腫，繼則下肢水腫，伴有惡風，發熱，肢節痠痛，小便不利等症。舌質偏紅，舌苔薄白，脈浮緊。治以下列何方最宜？
(A)真武湯 (B)胃苓湯 (C)越婢湯 (D)疏鑿飲子
- 25 37 歲男性，從事業務工作，最近發現血尿，小便時有灼熱感，心煩不安，口乾嘴破，而且常失眠，診其脈象為數脈，且舌尖紅苔黃，治以下列何方最適合？
(A)八正散 (B)小蓳飲子 (C)桑螵蛸散 (D)濟生腎氣丸
- 26 50 歲患者 1 週前來看感冒，咳嗽有黃痰，咽乾欲飲。回診時，抱怨近幾天，小便不暢，呼吸略喘，苔黃，脈數，治以下列何法最適合？
(A)溫陽益氣 (B)疏肝利膽 (C)清瀉肺熱 (D)清利膀胱濕熱

- 27 35 歲女性患者，有過敏家族史，常發哮喘氣，尤其在清掃房間與灰塵接觸後發病。就診時症見舌質紅、苔黃膩、面赤、唇紅、目赤、大便硬、喜冷飲等。此為下列何證？
(A)實熱證 (B)寒實證 (C)虛寒證 (D)虛熱證
- 28 多發性關節炎患者，症見肢節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者，用下列何方加減最宜？
(A)獨活寄生湯 (B)桂枝芍藥知母湯 (C)蠲痺湯 (D)防己黃耆湯
- 29 有關系統性紅斑性狼瘡（SLE）的中醫治療原則，下列何者錯誤？
(A)急則可採用清熱解毒涼血藥 (B)堅持祛邪重於扶正的要旨
(C)慢性期則久病多虛，虛則補之，調和陰陽 (D)治療本病時亦需遵循涼血活血，清熱解毒
- 30 45 歲女性患者罹患類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）多年，症見晨起關節僵硬，最近關節炎急性發作，關節紅腫熱痛，診斷下列何者最宜？
(A)痛痹 (B)著痹 (C)熱痹 (D)行痹
- 31 45 歲女性罹患進行性全身性硬皮症（Progressive systemic scleroderma）多年，主訴胸悶，氣息喘促已久，伴隨吞嚥不順，皮膚僵硬，身體瘦，手足冰冷，腰痛痠軟，神疲乏力，舌質紅，苔少，脈細，則下列診斷何者最適宜？
(A)肝陽上亢 (B)表寒裏熱 (C)肺虛 (D)腎虛
- 32 承上題，以下列何方加減治療最適宜？
(A)生脈散 (B)金匱腎氣丸 (C)麻杏石甘湯 (D)天麻鉤藤飲
- 33 25 歲女性罹患甲狀腺亢進 5 年多，易心悸，手抖，不易入睡，月經常淋漓不淨，食多腹瀉，口不乾，亦身倦，脈沉弱，治以下列何方適宜？
(A)七味白朮散 (B)加味逍遙散 (C)歸脾湯 (D)柴胡桂枝乾薑湯
- 34 消渴病的主要病理為何？
(A)氣滯血瘀 (B)肝陽上亢 (C)痰瘀互結 (D)陰虛燥熱
- 35 62 歲患者糖尿病已 10 年多，服西藥控制但血糖仍不穩，症見口乾多飲，消瘦，知飢少食，鼻乾唇焦裂，胸悶氣短，舌質紅，苔薄白，脈數，治以下列何方最適宜？
(A)竹葉石膏湯 (B)白虎加參湯 (C)甘露飲 (D)生脈飲
- 36 消渴證，下消氣不攝精，精虛氣耗，治當補精益氣，治以下列何方最適宜？
(A)補中益氣湯 (B)大補元煎 (C)一貫煎 (D)濟生腎氣丸
- 37 29 歲患者急性痛風發作，左足踝紅腫熱痛已一天，口乾口苦，小便黃，怕熱。有關治療的敘述，下列何者錯誤？
(A)可用三妙散加味 (B)需加補肝腎之品 (C)需加強清熱之品 (D)可配合活血化瘀藥使用
- 38 45 歲男性高血壓患者，主訴昨晚飲酒後，因身熱吹冷氣後半夜覺身惡寒發熱、左耳後疼痛，今晨發現漱口時，水向病側流出且左眼瞼無法閉合、伴隨左肩與左項冷痛麻木，鼻流清涕，二便及食慾尚可。理學檢查：血壓 110/70 毫米汞柱、體溫：37.5℃、四肢神經反射正常、活動自如，診其舌淡苔薄白，脈浮緊。治以下列何方最適宜？
(A)牽正散 (B)大秦朮湯 (C)小續命湯 (D)鎮肝熄風湯
- 39 患者罹患缺鐵性貧血，有胃、十二指腸潰瘍病史，常納差，脘痞悶，大便溏，右關脈弱，舌嫩淡胖。治以下列何方最宜？
(A)四物湯 (B)當歸補血湯 (C)平胃散 (D)香砂六君子湯
- 40 下列關於「瘀血頭痛」證治之敘述何者錯誤？
(A)痛多如針刺，且經久不癒 (B)其痛暴發，痛勢甚劇，或左或右，或連及眼、齒
(C)頭部外傷病史是其病因之一 (D)可用通竅活血湯隨證加減
- 41 50 歲患者早晨起床後不久突然發生頭部劇烈疼痛、意識喪失，立即被送至醫院治療。神經學檢查發現頸部僵硬，到了傍晚醫師發現心跳、呼吸停止，經急救後宣布死亡。此為下列何種頭痛？
(A)真頭痛 (B)厥頭痛 (C)頭風 (D)偏頭痛

- 42 55 歲女性患者，近七、八年常常被家屬發現無故哭泣，同時有精神恍惚，心神不寧的現象。四診可見舌質淡、苔薄白，脈弦細。診斷以下列何者最適合？
(A)肝氣鬱結 (B)氣鬱化火 (C)心神失養 (D)心脾兩虛
- 43 60 歲陳女士因腎功能衰竭致下肢水腫甚後，飲食宜忌下列何者最適合？
(A)慎鹽 (B)慎食魚肉 (C)多用靈芝 (D)多飲用楊桃汁
- 44 癌症患者接受放射治療後所造成的後遺症，下列何者較少作為針對放療後遺症的主要處理方法？
(A)清熱涼血 (B)涼補氣血 (C)滋陰潤燥 (D)芳香化濁
- 45 有關大秦艽湯主治中風之證候，下列何者錯誤？
(A)肌膚不仁，手足麻木 (B)言語不利，口角流涎
(C)口眼喎斜 (D)突然昏倒，不省人事
- 46 45 歲男性患者因血尿、體重減輕就診，經檢驗尿中白血球 2-5/HPF，紅血球 100/HPF，無蛋白尿，無腰痠，小便無灼熱感。診斷上最需要排除下列何種疾病？
(A)急性腎盂腎炎 (B)急性泌尿道感染 (C)腎結石 (D)泌尿道腫瘤
- 47 40 歲晚期肝癌並肝外轉移患者，開始服用蕾莎瓦 (Sorafenib) 後，出現一連串的副作用，像是手掌、腳部起了嚴重的水泡，麻木、刺痛、皮膚紅斑、紅腫疼痛、手指皮膚過度角質化，日常生活行動都受到影響，舌質紫，舌苔黃，脈弦數。診以下列何證型最適合？
(A)濕熱瘀毒 (B)氣滯血瘀 (C)濕熱交結 (D)氣陰兩虛
- 48 承上題，蕾莎瓦 (Sorafenib) 所產生的上述症狀，治以下列何方最適合？
(A)清營湯 (B)身痛逐瘀湯 (C)補中益氣湯 (D)六味地黃湯
- 49 關於《傳青主女科》之學術思想，下列何者正確？
(A)經原非血，乃天一之水，出於腎中 (B)月經先期、月經過多是脾不制水所致
(C)五臟獨立，調經惟有求諸於腎才能治之 (D)五色帶下，皆須升提益氣
- 50 《景岳全書》關於固陰煎的敘述，下列何者正確？
(A)即景岳所謂「疏肝之鬱，所以開腎之鬱」 (B)用以治療月經先後不定期之肝血虧虛證
(C)月經不定期而小腹熱痛的患者適用此方 (D)方中藥物含遠志、五味子
- 51 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，過期飲最適合應用於下列何類月經後期？
(A)血虛 (B)血寒 (C)氣滯脹痛 (D)血瘀刺痛
- 52 下列關於痛經的敘述何者錯誤？
(A)原發性痛經多於月經初潮後不久開始發作，往往伴有明顯的骨盆腔器質性病變
(B)痛經主要是由於氣血運行不暢所致
(C)經前痛者多屬實；經後仍綿綿作痛者多屬虛
(D)痛偏於一側或兩側少腹者，可見於骨盆腔發炎患者
- 53 30 歲患者，每逢月經來潮前或經行時，均現吐血或衄血，下列敘述何者最不恰當？
(A)可稱倒經
(B)發病機理主為血熱氣逆，常見肝經鬱火與氣不攝血
(C)切不可過用苦寒攻下之品
(D)若患者平素情志抑鬱，日久則相火內盛，易迫血上溢
- 54 40 歲患者於經期或經後，時發潮熱與五心煩熱，煩躁眠差，舌紅少苔，脈細數，下列敘述何者最恰當？
(A)月經可能量少且色紅，其病機為營陰不足，而現陰不斂陽之象
(B)其為陽盛之體，經期氣火偏盛，容易月經提前或量多
(C)屬熱瘀於內且營衛失和，經行瘀阻不通，導致經行發熱
(D)治宜清經散《傳青主女科》加益母草
- 55 停經婦女時而畏寒、時而烘熱汗出、頭暈、耳鳴、腰痠、陰道乾澀、夜尿多、舌質淡、脈沉細無力，以下列何處方治療最適當？
(A)左歸飲合二至丸 (B)右歸丸合理中丸
(C)天王補心丹合六味丸 (D)二仙湯合二至丸

- 56 33 歲患者，婚後 5 年未懷孕，經行不暢，經色紫黑有血塊，經來腹痛拒按，舌質紫暗舌邊有瘀點，脈細弦，下列處方何者最適宜？
(A)溫經湯 (B)少腹逐瘀湯 (C)八珍湯 (D)逍遙散
- 57 王小姐第二胎產後若仰臥起身則陰道有氣體排出，平常容易疲倦、四肢乏力、小腹重墜，其證型及治方下列何者最適宜？
(A)中氣下陷，補中益氣湯 (B)腸胃氣滯，香砂六君子湯
(C)脾腎陽虛，四逆湯 (D)穀氣下泄，訶黎勒丸
- 58 30 歲患者懷孕 30 週，因不慎跌倒，尾椎著地，宮縮頻繁，腰痠痛，腹墜，陰道少量出血，脈滑無力。下列何處置最宜？
(A)有故無殞，宜盡散其瘀血 (B)宜養血安胎，清血分之熱
(C)宜養血活血，化瘀安胎 (D)宜益氣養血，固攝安胎
- 59 35 歲孕婦懷孕 8 週，噁心嘔吐，頭暈厭食，困倦嗜臥，脈緩滑無力。下列病機何者正確？
(A)陰血不足而肝氣橫逆 (B)脾胃虛弱而胃氣上逆
(C)中陽虛衰而清氣不升 (D)中焦濕熱而濁氣不降
- 60 患者懷孕 8 個多月後，常感頭暈目眩，心悸氣短，甚至下肢還微有浮腫。望其面色潮紅，舌紅，脈弦勁而數。下列何者最宜治療此患者？
(A)陳皮、香附、烏藥、天仙藤、茯苓、豬苓、甘草、澤瀉、白朮、紫蘇葉、生薑、木瓜
(B)生地、白芍、竹茹、鉤藤、茯神、貝母、桑葉、菊花、羚羊角、甘草
(C)白朮、茯苓皮、陳皮、大腹皮、生薑皮、白蒺藜、丹參
(D)熟地、山茱萸、山藥、茯苓、牡丹皮、澤瀉、枸杞子、菊花
- 61 患者產後小腹隱隱作痛，惡露量少色淡，頭暈耳鳴，大便較乾燥。望其苔薄白質淡紅，按其小腹軟而患者覺較舒緩，脈虛細。下列何者最宜治療此患者？
(A)當歸、川芎、桃仁、炮薑、炙甘草
(B)當歸、熟地、人參、阿膠、山藥、甘草、續斷、麥冬、肉桂
(C)生地、熟地、白芍、山藥、續斷、黃芩、甘草
(D)當歸、白芍、川芎、茯苓、白朮、澤瀉
- 62 暴崩多因勞損引起，肝脾藏統失職，累及衝任二脈，氣虛血脫，氣無依附，即將休克昏厥，應如何施治最適宜？
(A)清熱止血 (B)補氣回陽 (C)補腎固衝 (D)溫經攝血
- 63 患者自然生產後，小便不通，伴隨小腹脹滿而痛，腰痠無力，面色晦黯，舌淡紅，苔白，脈沉細而遲。處以下列何方最適宜？
(A)五苓散 (B)豬苓湯 (C)濟生腎氣丸 (D)黃耆當歸散
- 64 《景岳全書》所載之毓麟珠的組成藥物中不包括下列何者？
(A)菟絲子 (B)川椒 (C)鹿角霜 (D)山藥
- 65 首創兒科五臟證治法則，作為辨證的依據，為下列何醫家？
(A)陳文中 (B)錢乙 (C)萬全 (D)陳飛霞
- 66 2 歲孩童出現咳嗽已有 5 天，問診無法得知痰色，聽其咳嗽聲音痰音甚重，但見唇色偏淡、活動力減退，媽媽告知胃口減退，舌質淡紅，苔白厚膩，脈滑而濡，下列治療何者最適宜？
(A)金沸草、前胡、荊芥、細辛、半夏、茯苓、甘草、生薑、大棗
(B)桑葉、菊花、杏仁、連翹、薄荷、甘草、桔梗、蘆根
(C)陳皮、半夏、甘草、茯苓
(D)桑白皮、甜葶藶、茯苓、車前子、炙甘草、生薑、大棗
- 67 2 歲孩童因為肺炎剛出院 2 天，已經停用西藥，午後略有低溫 38℃，夜間盜汗，口唇略紅，乾咳無痰，胃口稍差，舌質紅剝苔少津，脈診因在門診躁動不安哭鬧無法配合。下列何種證型最適宜？
(A)脾肺氣虛 (B)風熱閉肺 (C)痰熱閉肺 (D)陰虛肺熱

- 68 郭小弟 6 歲，近半個月來，食慾不振，經診察平時很少抱怨腹痛腹脹，精神尚佳，但其口乾多飲，皮膚略乾燥，缺乏潤澤，大便多乾結，舌苔光剝，少津，舌質偏紅，脈細數。下列敘述何者錯誤？
(A)此屬小兒厭食 (B)係胃陰不足所致 (C)治法用養胃育陰 (D)方宜參苓白朮散
- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》：「瀉證門，過食生冷中寒瀉，腸鳴腹痛泄澄清，面白肢冷懶飲食」，治以下列選項何者最適當？①理中湯溫中 ②養脾丸溫中 ③訶子散止瀉 ④四神丸止瀉
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 70 有關夏季熱之臨床表現，下列選項何者正確？①多汗 ②長期發熱 ③口渴多飲 ④少尿
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①④
- 71 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》：「陰水便利不煩熱，須服實脾腎氣丸」。實脾散的組成，不含下列何者？
(A)草果仁 (B)大腹皮 (C)木瓜 (D)生薑
- 72 吳小妹，剛滿 2 歲，半年前得到小兒麻痺症，現在肢體麻痺、痿軟無力癱瘓、面色萎黃容易出汗，關於證型與治療方劑，下列何者正確？
(A)邪鬱肺胃，葛根黃芩黃連湯 (B)邪注經絡，羌活勝濕湯
(C)肝腎虧損，虎潛丸 (D)氣虛血滯，補陽還五湯
- 73 關於風痧敘述，下列選項何者正確？①一般皮疹消失，會有色素沉澱 ②亦稱奶麻 ③本病多由外感風熱所致 ④病理傳變多在衛分
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- 74 下列何種疾病會出現楊梅舌之臨床特殊體徵？
(A)蛤蟆瘟 (B)風痧 (C)野痧 (D)疫喉
- 75 依《醫宗金鑑·痘疹心法》，毒熱內盛火上炎，心胃擾亂煩渴添，若疹未出而煩渴者，治以下列何方？
(A)竹葉石膏湯加天門冬 (B)黃連解毒湯加玄參、麥冬
(C)升葛湯加麥冬、天花粉 (D)白虎湯加天花粉
- 76 症見咳嗽氣促、喉間有哮鳴聲、咳痰清稀色白呈泡沫狀、形寒無汗、面色晦滯帶青、四肢不溫、口中不渴或喜熱飲、舌苔薄白或白膩、脈象浮緊，應以下列何方治療最適宜？
(A)小青龍湯合三子養親湯 (B)麻黃湯
(C)苓甘薑味辛夏仁湯 (D)蘇子降氣湯
- 77 5 歲男童因頭項強硬就診，症見體質虛弱，全身冰冷，僵臥少動，昏昏多睡，氣息微弱，哭聲低怯無力，仰頭取氣，關節不利，頭身難以動搖，局部皮膚板硬如木，蒼白腫亮，按之凹陷，硬腫範圍較廣，唇舌淡白，下列何方治療最適宜？
(A)《世醫得效方》參附湯 (B)《傷寒論》當歸四逆湯
(C)《脾胃論》補中益氣湯 (D)《和劑局方》附子理中湯
- 78 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，胃熱頭痛，病在陽明，發時鼻乾、目痛，上至頭，下至齒，頰痛無定時，治療以下列何方最適宜？
(A)清空膏 (B)加味茶調散 (C)清胃散 (D)雙解通聖湯
- 79 有關猩紅熱 (Scarlet fever) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要是由金黃色葡萄球菌所分泌的外毒素所引起
(B)開始會突然發燒、咽喉發炎
(C)發燒後的 12~48 小時內全身會出現紅色的丘疹，主要位於軀幹、頸部、四肢、及身體皺摺處
(D)扁桃體發炎紅腫，舌頭發紅腫脹，帶有紅色小斑點，類似草莓狀
- 80 兒童急性會厭炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要症狀為喉痛、吞嚥痛、發燒、聲音低沉及流口水
(B)作喉頭細菌培養時以壓舌板壓住患者舌根部，以利檢體採集
(C)症狀一出現，往往在 2 至 6 小時內會有呼吸困難，甚至死亡的可能
(D)病原大多是 B 型流行性感胃嗜血桿菌 (*Haemophilus influenzae*, type B)