

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 風、瘡、疥、癬等皮膚之癢，下列何症屬濕勝者？
(A)走竄無定，遍體作癢 (B)浸淫四竄，黃水淋漓，沿皮蝕爛
(C)皮膚癢疹，焮紅灼熱 (D)皮膚乾燥、變厚、脫屑
- 2 有關中醫外科之辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)疔起如豆粟，頭白根紅，癢痛相兼者屬虛
(B)疔頃刻而起、腫勢甚速、根盤堅硬、疼痛難忍者屬實
(C)首辨虛實，再辨陰陽；然後定其法，施以治療
(D)陰症者，根盤散漫，來勢緩慢，未成難消，既成難潰
- 3 中醫外科之辨腫中，若患部漫腫，腫勢平坦，根盤散漫，此屬下列何者？
(A)痰腫 (B)寒腫 (C)虛腫 (D)氣腫
- 4 18 歲患者咽喉腫痛，妨及嚥飲，疼痛難忍，經檢查如圖，惡寒發熱，口燥舌乾，脈數有力，治宜何方加減？



- (A)託裏透膿湯 (B)甘露飲 (C)清咽利膈散 (D)桂附八味丸
- 5 34 歲女性患者，反覆發作上下嘴唇皸裂脫皮、滲液糜爛 3 年，現代醫學診斷為剝脫性唇炎，中西醫多方診治乏效，常呈破裂流水，吃飯喝水疼痛異常，唇部灼痛如燎。此證起因為何？
(A)肺經風濕熱鬱，凝滯而成 (B)風熱客於肺經
(C)心經火盛血壅 (D)由陽明經風火凝結而成
- 6 紅絲疔最好發於下列何處？
(A)頭面 (B)腹部 (C)脅肋 (D)手部
- 7 40 歲男性喜好生食，突然出現高燒寒顫右上腹疼痛、噁心和食慾不振，右上腹部疼痛持續擴大至背部，並有輕微黃疸症狀，此人最可能為下列何病？
(A)肝癰 (B)胃癰 (C)腎癰 (D)小腸癰

- 8 發於皮肉之間的急性化膿性疾患，局部光軟無頭，紅腫熱痛，範圍約為3~4寸，發病迅速、易腫、易潰、易膿，此病最可能為下列何者？
(A)癬 (B)有頭疽 (C)疔 (D)癰
- 9 下列皆發生於督脈經，何者除外？
(A)百會疽 (B)透腦疽 (C)腦鑱 (D)勇疽
- 10 下列病症的發生部位，何者正確？
(A)穿骨疽發生於肘尖上寸餘，屬三焦經天井穴
(B)骨蠹疽發生於掌後橫紋上三寸兩筋陷中，屬包絡經間使穴
(C)調疽生於手大指
(D)石榴疽生於臂外側前廉，大骨之後，屬手陽明大腸經
- 11 風寒濕合而為病，若其痛重著不移，或腫痛，或痠麻，或麻木不仁者。下列何方劑治療最不適宜？
(A)雙解通聖散 (B)蠲痺湯
(C)補中益氣湯加附子、羌活、黃柏、蒼朮 (D)黃耆五物湯
- 12 女性患者面部、頸部皮膚出現肉色忽然變白，狀類斑點並不癢痛，患者的妹妹也有類似病灶，經抽血檢查顯示抗微小體抗體 (antimicrosomal Ab)、抗甲狀腺球蛋白抗體 (antithyroglobulin Ab) 皆呈陽性反應。則此患者最可能的診斷為下列何者？
(A)紫白癜風 (B)油風 (C)白駁風 (D)鈕扣風
- 13 有關癩疹的敘述，下列何者正確？
(A)只會發作在頭部耳竅 (B)可因飲食不潔，毒邪內侵而發
(C)通常白天的皮膚症狀較明顯 (D)病情消退後，通常會留下疤痕
- 14 翻花下疳，最似下列現代醫學的何種疾病？
(A)陰莖癌 (B)梅毒 (C)單純疱疹 (D)淋病
- 15 五淋散，可通治五淋，下列何者錯誤？
(A)氣淋加香附、麥芽 (B)血淋加牛七、桃仁、紅花、生地
(C)石淋加滑石、金沙 (D)膏淋合補中益氣湯
- 16 深達真皮層的燙傷，屬於燒傷深度的第幾度？
(A)零度 (B)I度 (C)II度 (D)III度
- 17 關於凍瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)大多成塊，結腫軟綿，遇熱則癢，搔壓覺痛，或肌肉硬腫，麻木不知痛癢
(B)多生於前陰毛際內
(C)外用可以「陽和解凝膏」蓋貼
(D)若凍瘡潰爛經年不癒者，用「獨勝膏」敷之甚效
- 18 關於粉刺的敘述，下列何者錯誤？
(A)別名狐水刺
(B)生於兩顴鼻旁及額角等處，亦有整個面甚至項頸胸背皆有
(C)治宜清熱降火為主。梔子丸、承氣湯、枇杷葉丸可酌量服用
(D)忌食煎炒油脂刺激等物
- 19 患者初起皮膚作癢，周身遍發扁疙瘩，形如豆瓣，堆累成片，忽隱忽現，其最可能的診斷為何？
(A)痘風瘡 (B)血風瘡 (C)四彎風 (D)癩疹

- 20 患者遍身皆出現皮膚病灶，初生如疥，搔癢無時，蔓延不止，抓破津黃水，浸淫成片，最可能的診斷為何？
(A)乾癬 (B)浸淫瘡 (C)天皰瘡 (D)蛇串瘡
- 21 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，關於指骨之敘述，下列何者錯誤？
(A)五指骨即各指本節
(B)五指骨，跌打損傷，洗以散瘀和傷湯
(C)竹節骨，跌打損傷，洗以散瘀和傷湯，貼萬靈膏
(D)如指甲縫蓄積毒血，必正其骨節，貼萬靈膏，則甲不落
- 22 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，尾骶骨即：
(A)腰骨 (B)背骨 (C)尻骨 (D)鳩尾骨
- 23 有關肱骨內上髁炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)急性期症狀以疼痛為主 (B)慢性期症狀以無力為主
(C)可以彈撥手法進行治療 (D)局部腫脹時易刺激正中神經
- 24 引起扁平足的可能原因，下列何者錯誤？
(A)足部骨折畸形癒合 (B)脛前肌麻痺 (C)鞋跟過低 (D)脛後肌麻痺
- 25 關於膝關節側副韌帶之敘述，下列何者錯誤？
(A)內側副韌帶損傷多發生在膝關節輕度屈曲，股骨向內旋轉運動
(B)內側副韌帶損傷可發生於脛骨突然向外旋轉和外翻位運動損傷
(C)內側副韌帶損傷嚴重者，常合併半月板和十字韌帶損傷
(D)內側副韌帶損傷機會比外側副韌帶低
- 26 有關腰椎間盤突出症的診斷要點，下列何者錯誤？
(A)多有不同程度的腰部外傷史，主要症狀是腰部疼痛及下肢放射性疼痛
(B)腰痛常在腰骶部附近，並沿患側大腿後側向下放射至小腿外側，多為單側下肢痛。若椎間盤突出較大或位於椎管中央時，可為雙側疼痛
(C)咳嗽、噴嚏、用力排便時，均可使神經根更加緊張而加重症狀。步行、彎腰、伸膝坐起等牽拉神經根的動作也加劇疼痛
(D)檢查時有不同程度的脊柱側彎，多數突向健側，腰生理前突減少或消失，這是一種保護性反應，可緩解神經根壓迫
- 27 40 歲患者運動後造成膝關節疼痛，檢查發現側副韌帶有部分斷裂，除作股四頭肌鍛鍊外，關於膝關節的處置，下列何者最適當？
(A)屈曲 20°~30°的功能位 3~4 週 (B)屈曲 80°~90°的功能位 3~4 週
(C)屈曲 20°~30°的功能位 8~9 週 (D)屈曲 80°~90°的功能位 8~9 週
- 28 依《傷科大成》，背脊軀幹部損傷之引經藥，下列何藥物不合適？
(A)青皮、柴胡 (B)白芷、藁本 (C)杜仲、羌活 (D)木瓜、黃柏
- 29 75 歲患者因膝關節疼痛前來就醫，經 X 光檢查發現，膝關節內有游離體、軟骨下囊腫、邊緣骨贅物等變化。下列何種活動應避免？
(A)慢跑 (B)四頭肌訓練 (C)減重 (D)持拐杖

- 30 關於股骨頭骨髁炎的敘述，下列選項何者正確？①股骨頭骨髁炎又稱股骨頭無菌性壞死、股骨頭軟骨炎 ②後期易形成扁平髖 ③大多發生於 12~18 歲的族群 ④女多於男 ⑤多數為單側，少數為雙側
(A)②③④ (B)①②③ (C)①③⑤ (D)①②⑤
- 31 關於膝關節半月板的敘述，下列選項何者正確？①後十字韌帶起於股骨髁間窩的內前部，向後外止於脛骨髁間隆突的後部，能限制脛骨向後移位 ②當暴力撞擊小腿上端的後方時，可使脛骨向前移位，造成後十字韌帶損傷，有時伴有脛骨隆突撕脫骨折、內側副韌帶和內側半月板損傷 ③Lachman 試驗是診斷後十字韌帶損傷的重要方法 ④當後十字韌帶斷裂或鬆弛時，患膝向後移動度明顯增大 ⑤對有移位的十字韌帶損傷和伴有側副韌帶、半月板損傷，可考慮手術治療
(A)①②③ (B)①②⑤ (C)①④⑤ (D)③④⑤
- 32 下列何者不是參與膝關節屈曲運動之主要肌肉？
(A)股薄肌 (B)膕肌 (C)腓腸肌 (D)比目魚肌
- 33 關於貝克氏囊腫 (Baker's cyst) 的敘述，下列何者正確？
(A)位置在肘窩，內容物為膠狀黏液 (B)位置很深，與關節不相連
(C)與其他部位的囊腫一樣，像結節性腫物 (D)診斷以觸診為主，壓痛明顯
- 34 關於踝關節韌帶損傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)有明顯的扭傷史及壓痛點
(B)踝關節的軟組織較少，損傷後可引起血管破裂出血
(C)韌帶部分斷裂時活動度會明顯增加
(D)外側韌帶比內側韌帶較易扭傷
- 35 下列何者屬小腿後面深層肌群？
(A)蹠肌 (B)脛骨後肌 (C)比目魚肌 (D)腓腸肌
- 36 關於上肢軟組織損傷，下列敘述何者正確？
(A)籃球運動接球時，手指指尖碰撞損傷，造成指骨基部撕脫性骨折時，呈現「鵝頸」畸形外觀
(B)橈骨莖突狹窄性腱鞘炎與扳機指，兩者的病理機轉類似，皆為腱鞘與肌腱的炎症反應導致
(C)羽球運動的揮拍動作，造成上臂伸展肌腱損傷，容易形成 popeye's sign
(D)長期拇指用力按壓動作，造成指屈曲不利有彈響聲，原因在掌面的掌指關節有結節形成，名為 Heberden's node
- 37 梨狀肌症候群 (Piriformis syndrome) 為髂部扭閃時，髖關節急劇外旋，梨狀肌猛烈收縮，或髖關節突然內收、內旋，使梨狀肌受牽拉，均可使梨狀肌受傷。對於梨狀肌症候群的理學檢查法，下列選項何者正確？①Lasegue Sign ②SLRT (Straight Leg Raising Test) ③Freiberg Sign ④Pace sign ⑤FAIR test
(A)僅①②③④ (B)僅②④⑤ (C)僅②③④⑤ (D)①②③④⑤
- 38 有關肱二頭肌肌腱斷裂之敘述，下列何者錯誤？
(A)通常有勞損史或明顯外傷史 (B)屈肘抗阻力時表現為無力或疼痛加劇
(C)上臂屈肘時可見腫物隆起 (D)長頭因堅韌之故，罕見斷裂
- 39 21 歲士兵在丟擲完手榴彈之後，發現右臂劇烈疼痛，檢查後發現右肱骨幹骨折；同時發現右腕不能背伸。則其損傷的結構應為下列何者？
(A)正中神經損傷 (B)腋神經損傷 (C)尺神經損傷 (D)橈神經損傷
- 40 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，那一洗方能疏筋和血，定痛消瘀？
(A)定痛散 (B)五加皮湯 (C)疏血丸 (D)散瘀和傷湯
- 41 依《外科正宗》，如意金黃散的組成不包括下列何者？
(A)黃柏 (B)黃芩 (C)厚朴 (D)天花粉

- 42 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損出血之證，若元氣內脫，不能攝血，治宜下列何方？
(A)四物湯加柴胡、黃芩 (B)四君子湯加薑、棗
(C)補中益氣湯加附子 (D)獨參湯加炮薑
- 43 關於內傷的病機敘述，下列何者正確？
(A)《素問·至真要大論》指出：「諸風掉眩，皆屬於肝；諸寒收引，皆屬於脾；諸氣臏鬱，皆屬於肺；諸濕腫滿，皆屬於腎...」。這說明傷後出現的各種證候與臟腑的病變有密切聯繫
(B)內傷後氣血凝滯，營衛運行機能受阻，可因而鬱熱化火，甚則釀而成膿，《靈樞·癰疽》說：「營衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從之而不通，壅遏而不得行，故熱。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則為膿」
(C)人體四肢的肘、腋、髀、臑，是氣血循行的重要部位，若臟腑受傷或犯邪，可涉及相應的關節部位，此即所謂「八虛」。《靈樞·邪客》說：「肺心有邪，其氣留於兩腋；肝有邪，其氣留於兩肘；脾有邪，其氣留於兩臑；腎有邪，其氣留於兩髀」
(D)痛與腫是內傷氣血兩種重要的病理反應，《素問·陰陽應象大論》即說：「氣傷腫，形傷痛」
- 44 60 歲男性由高處墜下，腳先著地，隨後足跟部腫脹、疼痛難忍，不良於行，X 光攝影如圖，最有可能的診斷為下列何者？



- (A)距骨骨折 (B)蹠骨骨折 (C)跟骨骨折 (D)舟狀骨骨折
- 45 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關傷損之證治，下列選項何者正確？①傷損肌肉作痛，用復元通氣散 ②瘀在下部，用大黃、桃仁、虻蟲、水蛭 ③瘀血泛注，用寒涼剋伐 ④傷損腰痛，脊痛瘀血留太陽經，宜地黃湯 ⑤傷損腹痛大便不通，既下而痛不止，按之仍痛用加味四物湯
(A)①③④ (B)①②⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- 46 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損之證，頭目眩暈，如兼腹脹嘔吐者治以下列何方？
(A)六君子湯 (B)柴胡四物湯 (C)聖愈湯 (D)十全大補湯
- 47 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，胸腹痛悶之證，若胸脇悶痛，發熱晡熱，此為肝經血傷也，宜治以下列何方？
(A)加味逍遙散 (B)六味地黃丸 (C)柴胡疏肝湯 (D)抵當湯
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關傷損瘀血泛注證之敘述，下列選項何者正確？①傷陽絡及陰絡者，急補肝、脾二臟 ②瘀血泛注，應補氣血 ③血虛發熱，用四物湯 ④日久潰破而氣血虛者，宜十全大補湯 ⑤用寒涼克伐，不治
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②④⑤ (D)②③④
- 49 有關損傷後喘咳的原因，下列何者錯誤？
(A)胸脅損傷，肋骨骨折或嚴重壓擠傷後，經脈破損，氣血瘀阻，氣道不通，肺失清肅，氣上逆為咳，不順為喘
(B)胸部損傷，瘀積生熱，加之傷後損傷腎氣，風、痰、瘀三者壅滯化火，發為喘咳
(C)胸脅損傷，瘀積脅下，致肝失條達，反侮肺金，發為喘咳
(D)傷後出血過多，血虛氣無所附，則氣短氣逆，發為喘咳，出血愈多，喘咳愈重

- 50 練功療法的作用不包括下列何者？
(A)活血化瘀、消腫定痛 (B)造成骨折延遲癒合
(C)避免骨質疏鬆和關節黏連 (D)減輕肌肉萎縮程度
- 51 王姓患者車禍因出血過多而發熱，其脈沉微，按之軟弱，若依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，其證屬陰盛發熱，宜用下列何方治之？
(A)當歸補血湯 (B)六君子湯加炮薑、附子
(C)四物湯 (D)四君子湯加炮薑、附子
- 52 王小弟玩騎馬打仗，不小心被踢傷生殖器，少腹引陰莖作痛，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》內傷證治，下列選項何者正確？①此乃瘀血不行兼肝鬱火所致 ②此乃瘀血不行兼肝脾氣傷所致 ③治宜小柴胡湯加大黃、黃連、山梔 ④治宜四君子湯加柴胡、山梔、當歸、川芎、牡丹皮
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 53 10 歲患者主訴於玩吊單槓跌倒落地，右肘、右前臂腫脹疼痛異常就診，X 光顯示如圖，下列敘述何者錯誤？



- (A)診斷為孟氏骨折 (Monteggia's Fracture)，尺骨上 1/3 骨折合併橈骨頭脫位
(B)分類為伸直型
(C)其復位手法為先整復尺骨骨折，後整復橈骨頭脫位
(D)骨折脫位復位後，應先將肘關節固定於屈肘位
- 54 脊柱骨折根據骨折、脫位後脊柱的穩定性程度分為穩定性與不穩定性骨折，下列何者為不穩定骨折？
(A)椎體壓縮骨折，椎體壓縮不超過 1/2 (B)椎體壓縮骨折伴有附件骨折
(C)橫突骨折 (D)椎板骨折
- 55 關於陳舊性關節脫位之敘述，下列何者正確？
(A)新鮮脫位未得到即時治療，延遲至 2 週以上者，稱之
(B)陳舊性腕關節脫位復位前，可外洗活血舒筋中藥，復位後以皮膚牽引固定，維持 1~2 週
(C)為將關節黏連分離，可採用牽拉、搖擺手法，不可使用旋轉、端撬手法，以免破壞關節
(D)復位後必須適當的固定，一般以 1~2 週為限
- 56 患者仰臥，雙腿平伸，檢查者拇指抵住髌骨內緣，向外施壓，患者出現恐慌和苦惱的表情，下列診斷何者最適宜？
(A)髌骨軟化症 (B)髌骨脫位 (C)半月板損傷 (D)內側副韌帶損傷
- 57 下列何者不屬於肩臂功？
(A)雙手舉鼎 (B)左右開弓 (C)風擺荷葉 (D)輪轉轆轤

- 58 9 歲兒童跌倒時手掌著地，肘關節處於伸直、過度外展位，同時前臂屈肌群急驟收縮造成肘部撕脫骨折，最常見發生骨折之部位為何？
(A) 肱骨髁上 (B) 肱骨外髁 (C) 肱骨內上髁 (D) 尺骨鷹嘴
- 59 下列敘述何者為折頂手法之使用時機？
(A) 主要是矯正患肢的側方移位
(B) 肢體有旋轉畸形時
(C) 橫斷或鋸齒形骨折，單靠手力牽引不易完全矯正重疊移位時
(D) 有背向移位的斜形骨折，單用拔伸手法難於復位時
- 60 「由兩助手拔伸牽引，術者可用兩手拇指由掌側將遠段骨折片向背側推擠，同時用食、中、環三指將近段由背側向掌側壓擠，然後術者捏住骨折部，牽引手指的助手徐徐將腕關節背伸，使屈肌腱緊張，防止復位的骨折片移位。」上述方法用於整復下列何種骨折？
(A) 橈骨下端伸直型骨折 (B) 第一掌骨基底部骨折
(C) 腕舟骨骨折 (D) 橈骨下端屈曲型骨折
- 61 足少陰腎經病，可導致下列何種目疾？
(A) 目脫 (B) 目瞏瞏如無所見 (C) 目銳眦痛 (D) 紅眼
- 62 關於眼病的表現，下列病機何者不歸屬於氣虛氣陷？
(A) 眼睛疼痛劇烈，持續不解，痛有定處，喜冷敷，舌紫暗，脈細澀
(B) 眼瞼下垂，無力抬起
(C) 冷淚常流，少氣懶言，自汗倦怠
(D) 黑睛陷翳久不平復，視力疲勞不能久視，語音低微，舌淡胖，脈弱無力
- 63 關於流淚症之敘述，下列何者錯誤？
(A) 可因肝血不足，淚竅不密，遇風則邪引淚出所致
(B) 類似西醫學之淚溢症，多見於老年人
(C) 冷淚多屬虛證，治宜補虛為主
(D) 本病是以大眦頭上有涎水或膿汁自淚竅外漏為臨床特徵的眼病
- 64 關於暴風客熱之敘述，下列何者錯誤？
(A) 本病為猝然發病，且有白睛明顯紅腫熱痛的眼病
(B) 本病傳染快，易造成流行
(C) 若是風重於熱者，治宜羌活勝風湯加減
(D) 若是風熱並重者，治宜防風通聖散加減
- 65 關於天行赤眼的敘述，下列何者錯誤？
(A) 四時流行風熱之毒，傳染而成 (B) 赤腫澀淚，羞明疼痛
(C) 可用驅風散熱飲子 (D) 宜用防風散結湯
- 66 患者因胞瞼腫脹就診，見其胞腫虛軟如球，皮色如常，喜按，伴有神疲乏力，咳嗽氣短，食少便溏，舌淡苔白，脈弱等症，其證治之敘述，下列何者錯誤？
(A) 證屬脾肺氣虛 (B) 此病診斷為胞腫如桃
(C) 此病治宜參苓白朮散 (D) 本病類似西醫學之眼瞼非炎性水腫
- 67 下列何種中醫眼病類似於西醫學的角膜潰瘍？
(A) 聚星障 (B) 花翳白陷 (C) 凝脂翳 (D) 混睛障
- 68 有關視瞻昏渺的敘述，下列何者錯誤？
(A) 外眼無異常 (B) 發作較緩慢 (C) 外眼無赤痛 (D) 視物無變形

- 69 耳鼻咽喉口齒科中，對於瘤症內治，診斷病機為脾失健運，濕濁流注，治宜健脾燥濕，化痰散結，兼以清熱，選用下列何方治療最適宜？
(A)丹梔逍遙散 (B)益氣清金湯 (C)消癥丸 (D)加味二陳湯加黨參
- 70 任內試驗（Rinne test）用於下列何者之檢查？
(A)聽力 (B)視力 (C)嗅覺 (D)味覺
- 71 耳瘡與耳癬係因風熱邪毒外侵時，下列治法何者錯誤？
(A)用黃連膏、紫金錠塗敷 (B)癰腫成膿者，可切開排膿
(C)選用梔子清肝湯 (D)五味消毒飲合銀翹散
- 72 膿耳之證係肝膽火盛，邪熱外侵，但初起較輕，風熱在表，宜用下列何方治之？
(A)消風散加減 (B)托裏消毒散加減 (C)知柏八味丸加減 (D)蔓荊子散加減
- 73 臨床上診斷鼻病患者，生理機轉都要掌握住的特點，下列敘述何者錯誤？
(A)鼻居面中，為諸陽之所聚，乃陽中之陽 (B)鼻司嗅覺，助發音
(C)鼻為濁氣出入之門戶，為脾系之所屬 (D)鼻屬清竅，有明堂之稱
- 74 慢性鼻病，見鼻內肌膜微紅或乾燥萎縮，涕痂成塊或涕稀、嗅覺減退、頭暈、腰痠、耳鳴、耳聾或鼻衄等，常用下列何方加減治療？
(A)補中益氣湯 (B)六味地黃湯 (C)當歸芍藥湯 (D)還少丹
- 75 《外科正宗》卷四曰：「鼻內瘻肉如榴子，漸大下垂，閉塞孔竅，使氣不宜通。」在外治摘除瘻肉法中，可先用下列那二種藥物曬乾為末，局部吹撒？
(A)細辛、冰片 (B)薄荷、白芷 (C)辛夷、蒼耳子 (D)茴香草、高良薑
- 76 因房勞過度，耗傷腎經，或久病傷陰，肝腎陰虛，水不涵木，肝不藏血，虛火上炎，血液升騰，溢於清竅，而為鼻衄。內治宜滋養肝腎，涼血止血，倘若耗血多宜用何方？
(A)知柏地黃丸 (B)丹梔逍遙散 (C)杞菊地黃丸 (D)膠艾四物湯
- 77 「急喉瘖」屬風寒外襲之主要治則及所用方藥為何？
(A)宜辛溫散寒、疏風解表，宣肺開音；六味湯加味
(B)宜疏風清熱、利喉開音；疏風清熱湯加味
(C)宜辛溫散寒、解毒消腫；五味消毒飲加味
(D)宜瀉熱解毒、利咽消腫；普濟消毒飲
- 78 慢喉瘖與慢性喉炎頗為相似。若因肺腎陰虛所致，內治宜滋養肺腎、降火利喉開音，宜下列何方加減治療？
(A)百合固金湯 (B)補中益氣湯 (C)會厭逐瘀湯 (D)清咽利膈湯
- 79 患者因口腔疾病求診，診之發現口內肌膜腫脹發紅，滿口糜爛疼痛，食呆、口臭，發熱，小便黃赤，苔黃膩脈濡數，此時處方以下列何者最適宜？
(A)黃連解毒湯、丹皮、生地、紫草、淡竹葉、蓮子心
(B)六味地黃湯、女貞子、旱蓮草、龜板、五味子
(C)仙方活命飲、菊花、桑葉、連翹、金銀花、薄荷
(D)導赤散、澤瀉、車前子、茵陳、冬瓜仁
- 80 有關心與舌的敘述，下列何者錯誤？
(A)心脈濡而散者，當病舌卷不能言
(B)舌主心，藏熱即應舌生瘡裂破，唇揭赤
(C)心主神明，心經健旺，則舌能辨五味
(D)「舌者心之官也」是記載於《靈樞·五閱五使篇》