

107年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專技高考助產師考試

代 號：6304

類科名稱：牙醫師(二)

科目名稱：牙醫學(六) (包括齒顎矯正學、兒童牙科學、牙科公共衛生學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理)

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 根據Enlow研究，關於鼻上顎複合體 (nasomaxillary complex) 的生長發育，下列敘述何者錯誤？

- A. 顴骨 (zygomatic bone) 前緣以骨頭沉積為主
- B. 腭穹窿 (palatal vault) 的口腔側 (oral roof) 以骨頭沉積為主
- C. 上顎骨前緣以骨頭吸收為主
- D. 腭穹窿 (palatal vault) 的寬度逐漸增加

2. 關於出生後顱顏骨生長發育之敘述，以下何者錯誤？

- A. 顱頂大部分經由膜內骨生長而成
- B. 顱底仍可經由軟骨聯合 (synchondrosis) 骨化轉變成骨頭
- C. 上顎骨完全經由膜內骨化而發育
- D. 下顎骨完全經由膜內骨化而發育

3. 評估骨年齡 (skeletal age) 的諸多方法中，下列何者可靠性最差？

- A. 手腕骨的發育
- B. 牙齒的發育
- C. 身體的發育
- D. 頸椎的發育

4. 有關30歲以後嘴唇厚度的正常變化，下列敘述何者正確？

- A. 逐漸增加
- B. 逐漸減少
- C. 先增後減
- D. 先減後增

5. 關於門齒空間負債 (incisor liability) 的敘述，何者正確？

- A. 是由於乳門齒的尺寸比恆門齒大所造成的差異
- B. 主要是因靈長空間 (primate space) 提供額外空間，有助於下顎恆門齒排列
- C. 主要是因餘裕空間 (leeway space) 提供額外空間，有助於上顎恆門齒排列
- D. incisor liability 上顎大於下顎

6. 關於人類齒顎顏面的敘述，下列何者最適當？

- A. 根據Behrents對齒顎顏面的長期研究，發現成人完全沒有生長發育
- B. 下齒列的後期門牙擁擠 (late incisor crowding) 主因是智齒的存在


- C. 口腔顎面的主要生理功能包括呼吸、吞嚥、咀嚼和說話
- D. 嬰兒出生以後開始了呼吸和吞嚥等活動
7. 通常牙根發育完成多少時，牙齒才會開始萌出牙齦？
- A. 1/4
- B. 2/4
- C. 3/4
- D. 4/4
8. 對於第二乳臼齒終端平面（terminal plane）的敘述，下列何者錯誤？
- A. 用於乳牙咬合關係分類
- B. mesial step 為下顎第二乳臼齒遠心面位於上顎第二乳臼齒遠心面之近心側
- C. distal step 為下顎第二乳臼齒遠心面位於上顎第二乳臼齒遠心面之遠心側
- D. 恆牙第一大臼齒長出後仍可使用終端平面做咬合分類
9. 下列何者較不可能是引起facial asymmetry的致病因？
- A. 唇繫帶肥厚
- B. 單側咀嚼肌過度肥大
- C. 單側下顎骨髁狀突（condyle）吸收
- D. 斜頸（torticollis）
10. 有關安格氏第二級異常咬合（Angle Class II malocclusion）的定義，下列何者正確？
- A. 上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）上
- B. 上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的近心端
- C. 上顎第一大臼齒的近心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的遠心端
- D. 上顎第一大臼齒的遠心頰側咬頭（mesiobuccal cusp）咬在下顎第一大臼齒的頰側溝（buccal groove）的遠心端
11. 有關咬合線（line of occlusion）的描述，下列何者正確？
- A. 上下顎的咬合線都是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的舌面隆突（cingulum）
- B. 上下顎的咬合線都是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的切緣（incisal edge）
- C. 上顎的咬合線是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的舌面隆突（cingulum），下顎的咬合線是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的切緣（incisal edge）
- D. 上顎的咬合線是經過後牙的中心窩（central fossa）及前牙的舌面隆突（cingulum），下顎的咬合線是經過後牙的頰側咬頭（buccal cusp）及前牙的切緣（incisal edge）
12. 在正中咬合（centric occlusion）關係時，下列門齒垂直覆蓋（overbite）之數據，何者屬於前牙開咬（anterior open bite）？
- A. -2 mm
- B. 0 mm
- C. 2 mm

D.4 mm

13.如果要檢查顫顎關節，取得關節盤（articular disk）的影像資訊，以下何種醫療影像最適合？

- A.斷層掃描（computed tomograph）
- B.環景放射片（panoramic radiograph）
- C.磁共振造影（magnetic resonance image）
- D.結構光（structured light）

14.根據Proffit所提出的"envelope of discrepancy"圖示，下列敘述何者正確？



- A.上顎門牙經過單純齒列矯正治療，至多可向前改善7mm的距離
- B.上顎門牙經過矯正治療合併絕對錨定輔助，至多可向下改善5mm的距離
- C.上顎門牙經過矯正治療合併正顎手術，至多可向下改善15mm的距離
- D.在生長階段施以功能性矯正治療，其改善效果可能大於單純齒列矯正治療

15.有關測顫分析中Frankfort plane的敘述，下列何者錯誤？

- A.是porion與orbitale連線
- B.其缺點之一是界標（landmark）的定位困難
- C.與SN plane的夾角正常值為15度
- D.可作為水平參考線

16.微笑曲線（smile arc）的定義是在社交微笑（social smile）時，下列何者具有和諧關係？

- A.上顎前牙的切端連線形態和上唇曲線
- B.下顎前牙的切端連線形態和下唇曲線
- C.上顎前牙的切端連線形態和下唇曲線
- D.下顎前牙的切端連線形態和上唇曲線

17.7歲小男生，前牙呈開咬狀態，有吸手指習慣，下列敘述何者錯誤？

- A.持續的吸手指習慣，是引起開咬的原因
- B.不必理會持續吸手指習慣，長大後開咬自然會消失變正常
- C.治療計畫的重要考量是先解決不良口腔習慣

D.舌柵欄矯正器是常用來解決習慣造成牙齒開咬的方法之一


18.對於安格氏二類短臉型（骨性深咬）混合齒列期孩童患者，若希望能增加顏面高度改善深咬，並解決安格氏二類咬合，最佳的矯正治療裝置是

- A.功能性矯正裝置（functional appliance）
- B.頸拉頭套（cervical pull headgear）
- C.第二類橡皮筋（Class II elastics）
- D.高拉式頭套（high-pull headgear）

19.動物實驗中，當施於牙齒輕而持續的力量，一段時間後局部環腺苷酸（cAMP）增加，牙周膜開始有分化的能力。此關鍵步驟在施力多久以後會發生？


- A.4小時
- B.4分鐘
- C.4秒鐘
- D.即時

20.如圖所示為下顎齒列移動關閉第一小白齒拔牙的空間，白色為移動前，紅色為移動中。下列何者最適合描述後牙錨定控制？



- A.不動錨定（stationary anchorage）
- B.相互錨定（reciprocal anchorage）
- C.中等錨定（moderate anchorage）
- D.皮質骨錨定（cortical anchorage）

21.如下圖所示，矯正線所作的彎折屬於：



- A. first order bend
- B. second order bend
- C. third order bend
- D. fourth order bend

22.理想的齒顎矯正用矯正線性質須具備的特性，下列何者錯誤？

- A.高強度
- B.低硬度
- C.很大之彈性彎曲範圍
- D.低成形性

23.下列那一項裝置較適合治療10歲小孩的骨性開咬（skeletal open bite）？

- A.高拉式頭套（high-pull headgear）
- B.面罩（facemask）
- C.哈伯氏裝置（Herbst appliance）
- D.前牙咬合板（anterior bite plate）

24.關於自鎖式矯正托架（self-ligating brackets）的研究，下列何者正確？

- A.比較容易將矯正弓線（archwire）拿除（removal）與放入（ligation），可以減少每次治療時間（chair time）
- B.因為自鎖式矯正托架與矯正弓線的摩擦力（friction）大，所以減少整體治療時間（total treatment time）
- C.自鎖矯正托架僅適合成人矯正治療
- D.因為自鎖式矯正托架可以撐寬牙弓，所以可以免除拔牙矯正

25.下列何者是固定式功能性矯正裝置（fixed functional appliance）？

- A.bionator
- B.activator
- C.Herbst appliance
- D.Fränkell appliance

26.針對安格氏II類1級異常咬合且門齒深咬的患者，使用功能性矯正裝置（functional appliance）治療，通常希望引導下顎生長往那個方向改變？

- A.往上往後

- B. 往上往前
- C. 往下往前
- D. 往下往後

27. 請依下列口內照片判斷最可能之顱顏疾病：



- A. 單側唇腭裂
 - B. 雙側唇腭裂
 - C. 皮爾氏症 (Pierre Robin sequence)
 - D. 亞伯氏症 (Apert's syndrome)
28. 有一患者於甲醫師處裝置全口矯正器2天，因口內疼痛不已，但又沒空去甲醫師診所而就近前來乙醫師處求診，何者為乙醫師合宜處理方式？
- A. 告訴患者只有回甲醫師處處理才能解決
 - B. 拆除矯正線與矯正器，以解除患者疼痛
 - C. 痛斥甲醫師只顧賺錢不自己照顧患者
 - D. 先看口內疼痛來源，找出可能原因，與甲醫師聯絡後，對患者說明可能之解決方式與甲醫師之建議，取得患者同意後做適當口內處理，或開給患者止痛藥，請患者儘速回甲醫師診所
29. 下列何種藥物適合用於兒童牙科之黏膜下鎮靜 (submucosal sedation) ？
- A. Fentanyl
 - B. Propofol
 - C. Midazolam
 - D. Benadryl
30. 關於牙齒白斑病灶 (white spot lesion) 的敘述，下列何者錯誤？
- A. 脫鈣最嚴重的部分位於牙釉表層下方
 - B. 已經是一個表層下病灶 (subsurface carious lesion)
 - C. 無法被再礦化 (remineralization)
 - D. 若無適當處理，會進展成窩洞
31. 牙本質發育不良 (dentinogenesis imperfecta) 為一遺傳性缺陷，其原因來自那一時期的牙齒發育異常？
- A. 初生期 (initiation)
 - B. 增殖期 (proliferation)
 - C. 組織分化期 (histodifferentiation)
 - D. 形態分化期 (morphodifferentiation)
32. 下列何者不是造成上顎側門牙的前牙錯咬 (anterior crossbite) 最常見的原因？
- A. 贅生齒
 - B. 乳牙之外傷

C.空間不足

D.吐舌 (tongue thrust)

33. 臨床上運用W形牙弓裝置 (W-arch appliance) 來矯正後牙錯咬 (posterior crossbite) 時，下列敘述何者錯誤？

A. 用直徑0.036或0.040英吋鋼線，彎成W形且與所有錯咬牙接觸

B. 鋼線應緊密貼住腭面組織 (palatal tissue)

C. 調整時，W形裝置需撐開2~3毫米，再黏合 (cementation)

D. 每3~4週調整一次

34. 下列何者是引起正常人具高度危險性之急性細菌性心內膜炎 (acute bacterial endocarditis, ABE) 最常見之病原菌？

A. 表皮葡萄球菌 (*Staphylococcus epidermidis*)

B. 草綠色鏈球菌 (*Streptococcus viridans*)

C. 金黃葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)

D. 腐生葡萄球菌 (*Staphylococcus saprophyticus*)

35. 有位3歲女孩，患有齲齒及上顎門牙牙冠折斷 (crown fracture) 伴隨牙髓暴露，臨床並無其他症狀，其X光如圖，就左側正中門牙而言，下列何者不是合理的處理？



A. 拔除

B. 冠髓切除術 (pulpotomy)

C. 追蹤觀察即可

D. 根管治療 (root canal therapy)

36. 上顎恆正中門牙發生下面何種斷裂時不需積極治療？

A. 1/3牙冠斷裂

B. 齒頸部斷裂

C. 上1/3牙根斷裂 (coronal 1/3 root fracture)

D. 下1/3牙根斷裂 (apical 1/3 root fracture)

37. 含有1:100,000腎上腺素 (epinephrine) 之2%利度卡因 (lidocaine) 用於浸潤麻醉時，注射後，其開始作用時間為：

A. 2分鐘以內

- B.2~5分鐘
- C.5~8分鐘
- D.8~10分鐘

38. 母親在懷孕初期，若罹患下列那一種疾病，較容易產下智能障礙（mental retardation）的小孩？

- A. 德國麻疹
- B. 充血性心臟病
- C. 糖尿病
- D. 風濕熱

39. 門診初診時，一位孩童病患由母親帶她來看診。孩子有明顯智能障礙，口中有許多齲齒。你的對策應先做什麼？

- A. 先處理簡單的齲齒，以建立孩子與家長的信任
- B. 強調預防的重要性
- C. 立即轉診到教學醫院
- D. 諮詢過去病史與就醫狀況

40. 下列何者不是醫療團隊執行行為誘導時應具備的基本原則（fundamentals of behavior guidance）？

- A. 威嚴
- B. 耐心
- C. 誠實
- D. 彈性

41. 使用以手摀嘴法（hand-over-mouth exercise）主要的目的為何？

- A. 讓小朋友心生恐懼而產生配合行為
- B. 可降低小朋友哭聲以抑制不良行為
- C. 用以引起小朋友的注意得以進行溝通
- D. 建立醫師威嚴的肢體語言

42. 兒童行為處理時，下列何者錯誤？

- A. 做行為處理前，要事先與父母做良好的溝通
- B. 3歲以前，父母在旁邊陪伴治療對兒童之行為表現是有幫助的
- C. 兒童表現良好時，應該給予適當的鼓勵
- D. 對於害怕恐懼的兒童，應立即請父母離開診間

43. 下列那一項並非影響孩子容易齲齒的因子？

- A. 唾液的酸鹼值及流量
- B. 牙齒排列的整齊度
- C. 齲齒已經填補
- D. 口中是否有矯正裝置

44. 有關齲齒的敘述，下列何者錯誤？

- A. 遺傳因素相對大於環境影響因素
- B. 只要牙釉質表面未受破壞，齲齒窩洞未形成，初期齲齒（incipient subsurface lesions）的再礦化

- (remineralization) 就有可能發生
- C.在幼兒早發性齲齒 (early childhood caries)，下顎門牙較晚受影響
- D.牙釉質表面對抗酸蝕的能力較深部強
- 45.嬰幼兒奶瓶性齲齒，最不容易侵犯下列何部位之牙齒？
- A.下顎乳門牙
- B.上顎乳門牙
- C.上顎第一乳白齒
- D.下顎第一乳白齒
- 46.關於美國兒童牙科醫學會所建議之齲齒風險評估工具 (caries risk assessment tool)，下列敘述何者正確？
- A.不需要定期做齲齒風險之評估
- B.只能由牙醫師來執行
- C.X光片及細菌之檢測結果須為評估項目之一
- D.齲齒風險評估之結果無法視為診斷報告
- 47.下列那些物質是兒童牙科常用之牙菌斑顯示劑 (disclosing agent) 的成分之一？①紅螢素 (erythrosin)
②碘 (iodine) ③龍膽紫 (gentian violet)
- A.僅①②
- B.僅①③
- C.僅②③
- D.①②③
- 48.下列何者，出生時之尺寸在成人水平50%以下？
- A.臉部寬度
- B.臉部高度
- C.頭顱高度
- D.頭顱寬度
- 49.對於孩童整體自然生長，下列敘述何者錯誤？
- A.生長 (growth) 是解剖大小 (anatomic size) 的增加
- B.評估顏面部生長發育需涵蓋大小、速度、方向等三項
- C.生長速率於出生前速度較慢，出生後前 2~3 年速度較快
- D.青春期生長速率較快
- 50.有關於乳牙型態的敘述，下列何者正確？
- A.上顎第一乳白齒的牙冠型態與上顎恆牙第一大白齒相似
- B.下顎第一乳白齒的牙冠型態與下顎恆牙第一大白齒相似
- C.在外型上，上顎第二乳白齒比上顎第一乳白齒稍小
- D.下顎第二乳白齒有三個差不多大小的頰側咬頭
- 51.下列乳齒的末端平面 (terminal plane)，何者容易造成將來第一大白齒的二級不正咬合？
- A.垂直型末端平面 (straight terminal plane)
- B.近心階末端平面 (mesial step)

- C.遠心階末端平面 (distal step)
- D.對齊式末端平面 (flush terminal plane)
- 52.關於生長發育時，牙齒牙弓關係的敘述，下列何者錯誤？
- A.決定恆牙牙弓狀態主要因素為牙齒大小及齒槽大小的差異
- B.牙齒大小主要決定於基因
- C.Moorrees認為乳牙大小可精確預測恆牙大小
- D.混合齒列空間分析 (mixed dentition space analysis) 主要是預測恆牙犬齒及第一、二小白齒近遠心距離總和
- 53.常見骨骼性後牙錯咬的原因為何？
- A.上顎牙弓狹窄
- B.下顎牙齒向外傾斜
- C.下顎發育不良
- D.口呼吸
- 54.關於上顎前牙間隙 (anterior diastema)，下列敘述何者錯誤？
- A.治療時間應延遲至恆牙犬齒長出時再行評估
- B.常見造成原因為較厚的唇繫帶 (heavy labial frenum)
- C.如果需進行繫帶切除術，應於矯正治療前實施
- D.正中贅齒 (mesiodens) 可造成前牙間隙
- 55.對罹患法洛氏症 (Tetralogy of Fallot) 青少年，下列何項牙科處置必須做endocarditis prophylaxis的處置？
- A.牙齦切除術 (gingivectomy)
- B.上橡皮布 (rubber dam)
- C.拆線 (remove sutures)
- D.印齒模 (taking of oral impression)
- 56.關於鐮刀狀細胞貧血症患者之口腔特徵，下列何者錯誤？
- A.骨骼生長會受影響，因此下顎常有內縮 (retrusion) 之情形
- B.牙齒常有礦物質化不足 (hypomineralization) 之情形
- C.牙齒常會延遲萌發
- D.X光片常會誤判為骨髓炎 (osteomyelitis)
- 57.關於血友病患者之根管治療，下列何者錯誤？
- A.血友病患者之治療原則是盡量選擇根管治療，避免拔牙之風險
- B.大部分之情況使用浸潤麻醉便足夠完成根管治療
- C.可使用笑氣去除不適及焦慮
- D.若牙髓神經已壞死，必須使用阻斷麻醉
- 58.對於年輕恆門齒脫出 (avulsion) 的處理方式，何者錯誤？
- A.避免以緊抓牙根部位方式撿拾脫出的牙齒
- B.牛乳比生理食鹽水適宜作為脫出牙暫存的液體
- C.應儘速植回原位

- D.應以堅硬不易彎曲之金屬線固定其位置
- 59.腦性麻痺病人接受牙科診療時，需特別注意不可讓病人的頭突然後仰是因為下列那一個原始反射（primitive reflex）仍然存在的關係？
- A.驚嚇反射（startle reflex）
 - B.強直性迷路反射（tonic labyrinthine reflex）
 - C.非對稱性強直頸部反射（asymmetric tonic neck reflex）
 - D.頭回縮反射（head-withdrawal reflex）
- 60.下列關於腦性麻痺的敘述，何者正確？
- A.早產兒發生率較高
 - B.隨著年齡，腦損傷情形會改善
 - C.嬰兒反射太早消失
 - D.唇顎裂發生率較高
- 61.一位五歲、體重20公斤的兒童，每日使用含0.243% NaF的牙膏，但他卻習慣性地每天吞食牙膏2 g，若依據「形成氟斑齒的劑量為0.1 mg F／每公斤體重／每天」，此兒童因吞食牙膏而發生氟斑齒的可能性為何？
- A.不可能發生氟斑齒
 - B.可能發生在乳牙門牙
 - C.可能發生在乳牙臼齒
 - D.可能發生在恆牙
- 62.在三段五級的疾病預防層級（level of prevention）中，牙科臨床上的「早期診斷、立即治療」是屬於：
- A.第一段預防
 - B.第二段預防
 - C.第三段預防
 - D.第五級預防
- 63.依公共衛生、社區牙醫學的概念，兒童第一次牙科檢查應於幾歲實行？
- A.6歲長恆齒時
 - B.12歲恆齒換好時
 - C.3歲前
 - D.剛出生時
- 64.下列那一項目是社區口腔健康發展工作首先要做的項目？
- A.社區分析
 - B.社區診斷
 - C.社區計畫
 - D.社區評價
- 65.齲齒檢查時若發現有一顆牙先前已做過填補處理，但填補物旁有明顯蛀洞，則應登錄為：
- A.Sound
 - B.Decayed
 - C.Missing

D.Filled

- 66.世界衛生組織於2013年發行之第五版口腔健康調查的基本方法（Oral Health Surveys, Basic Methods, 5th ed., WHO, 2013）中，較適合用來比較不同國家間之齲齒狀況的指標年齡為何？
- A.3歲
 - B.12歲
 - C.15歲
 - D.20歲
- 67.下列有關身心障礙者之敘述，何者錯誤？
- A.智能遲緩的患者，智商近70，屬可教育的一類，故易接受正常牙科治療
 - B.失聰者的看診，在操作前示範給患者看，並慢慢的解說，較可使患者接受正常的牙科治療
 - C.眼盲者接受牙醫治療時，均應慢慢與患者及家屬詳細說明，較可使患者接受正常的牙科治療
 - D.唇腭裂患者的醫療工作中，牙醫師亦有參與治療
- 68.下列對身心障礙者的口腔疾病預防項目中，以何者最重要？
- A.訓練其刷牙行為
 - B.回歸正常飲食習慣
 - C.潔牙和健牙輔助用品的使用
 - D.定期口腔檢查
- 69.我國政府每年會針對特定年齡層的國人進行大型的口腔健康調查，以瞭解國人的齲齒盛行率、牙周健康情形與治療需求等。此類調查使用之研究方法屬於下列何者？
- A.病例對照研究（case-control study）
 - B.臨床試驗（clinical trial）
 - C.世代研究（cohort study）
 - D.橫斷式研究（cross-sectional study）
- 70.某研究針對國小學童進行含氟漱口水防齲試驗，受邀參加的學童，其家長需填寫知情同意書（informed consent）。下列有關知情同意書之敘述何者錯誤？
- A.同意書內容需說明此試驗進行的期間與方法
 - B.同意書內容不需說明使用含氟漱口水可能造成的風險
 - C.同意書內容需說明使用含氟漱口水可能的好處
 - D.填寫同意書之後仍可隨時無條件退出此試驗
- 71.有關含氟牙膏內的氟化物之敘述，下列何者正確？①可被去礦質化（demineralization）的牙釉質所擷取 ②能增加牙菌斑內的含氟濃度 ③當口腔內酸鹼度下降時，存放在牙菌斑內的氟化物無法被用於再礦質化（remineralization） ④不可以合併使用其他氟化物
- A.①④
 - B.③④
 - C.②③
 - D.①②
- 72.國小學童是否會因為使用含氟漱口水而造成門牙的氟斑齒？

- A. 會造成門牙的氟斑齒，因為氟化物的濃度很高
- B. 會造成門牙的氟斑齒，因為學童可能吞食過量的含氟漱口水
- C. 會造成門牙的氟斑齒，因為國小學童的門牙牙冠尚未完成鈣化
- D. 不會造成門牙的氟斑齒，因為國小學童的門牙牙冠已經鈣化完成
73. 「相信睡前刷牙有益健康」屬於班迪拉（Bandura）社會學習理論中之何項定義？
- A. 結果期望
- B. 自我效能
- C. 行為能力
- D. 同儕影響
74. 多數醫療人員常用的口腔衛生教育方法為何？
- A. 參觀法
- B. 小組討論法
- C. 講述法
- D. 戲劇法
75. 下列何者不能診斷為裂溝齲齒？
- A. 探針探到裂溝底部鬆軟
- B. 裂溝附近出現脫鈣之窩洞
- C. 裂溝顏色深染但底部堅硬
- D. 裂溝周圍有牙釉質剝落現象
76. B型肝炎病毒（HBV）屬耐熱型病毒，一般可在工作檯面上存活至少多久的時間？
- A. 1天
- B. 3天
- C. 5天
- D. 7天
77. 世界衛生組織（WHO）推動的「健康促進學校」（health promoting school）所涵蓋的參與對象除了學生以外，還包括：①學生家長 ②學校的教、職員 ③社區牙醫師 ④企業人士
- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③
78. 在牙醫診療時，「圓形頭顱、鼻樑塌下、手掌有單一貫通紋」比較可能是下列那一種特殊需求（special needs）者的特徵？
- A. 腦性麻痺（cerebral palsy）
- B. 癲癇（epilepsy）
- C. 唐氏症（Down syndrome）
- D. 自閉症（autism）
79. 下列那一項不是全民健保實施總額預算制度之目的？

- A.控制醫療費用成長於合理範圍內
- B.提供民眾最佳的醫療服務
- C.透過集體協商平衡付費者、供給者之權益
- D.平衡各地區醫療資源之分布

80.假設你正針對中學生進行菸品對成癮及致病的認知評估，若要呈現的是拒菸的利多於弊及討論他們的想法及決定，上述作法屬於下列那一種健康促進理論或模式之應用？

- A.階段改變理論
- B.社會學習理論
- C.擴散理論
- D.健康信念模式