

107年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專技高考助產師考試

代 號：4308

類科名稱：醫事檢驗師

科目名稱：微生物學與臨床微生物學（包括細菌與黴菌）

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 傳統革蘭氏染色試劑中，下列何者是複染液（counterstain）？

- A.safranin O
- B.carbolfuchsin
- C.iodine
- D.crystal violet

2. 有關細菌 penicillin-binding proteins 之敘述，下列何者錯誤？

- A.具有peptidoglycan endopeptidase
- B.參與最後階段的peptidoglycan合成
- C.具有L-alanine carboxylase
- D.具有peptidoglycan transpeptidase

3. 下列何者不適合用於區別 *Listeria monocytogenes* 與 *Streptococcus agalactiae*？

- A.BAP上之菌落特徵
- B.catalase test
- C.esculin hydrolysis
- D.室溫motility test

4. 有關 *Listeria monocytogenes* 特性之敘述，下列何者錯誤？

- A.兼性厭氧Gram-positive小桿菌
- B.廣泛存在自然界中，可能污染肉品、乳製品、蔬菜等
- C.無法在pH 5.5及4°C的環境中生存
- D.可在含10~12% NaCl的環境中存活

5. 下列何者為 *Streptococcus agalactiae* 主要菌株分型的依據？

- A.CAMP factor
- B.capsular polysaccharide
- C.DNase
- D.lipoteichoic acid

6. 若試管法凝固酶試驗在35°C培養隔夜才作判讀，*Staphylococcus aureus* 可能因產生下列何種物質而引起偽陰性反應？

- A.thermostable DNase
- B.alkaline phosphatase
- C.lipase
- D.fibrinolysin

7. 有關 *Pseudomonas aeruginosa* 之敘述，下列何者正確？

A. oxidase (-)

B. pyocyanin (+)

C. glucose oxidation (-)

D. 42°C不生長

8. 下列 *Haemophilus* spp. 何者會導致性病？

A. *H. haemolyticus*

B. *H. aphrophilus*

C. *H. ducreyi*

D. *H. segnis*

9. *Aeromonas hydrophila* 與 *Escherichia coli* 可用下列何種試驗區分？

A. TSIA

B. motility

C. lysine decarboxylase

D. cytochrome oxidase

10. 有關 *Chlamydophila psittaci* 之敘述，下列何者錯誤？

A. 感染和鳥接觸有關

B. serology 是主要診斷依據

C. 建議用細胞培養法診斷

D. 可造成呼吸道感染

11. Lockjaw 病症是由下列何菌所引起？

A. *Veillonella parvula*

B. *Actinomyces viscosus*

C. *Clostridium tetani*

D. *Fusobacterium nucleatum*

12. 下列何者不是細菌對 aminoglycosides 類抗生素產生抗藥性的原因？

A. 30S 核糖體次單元產生突變

B. DNA-dependent RNA polymerase 產生突變

C. 對 aminoglycosides 之吸收減少

D. 對 aminoglycosides 之分解增加

13. 下列何種抗菌劑不屬於 aminoglycosides 類？

A. vancomycin

B. gentamicin

C. streptomycin

D. amikacin

14. 關於細菌所產生的 biofilm，下列敘述何者錯誤？

A. 可抵抗抗生素的攻擊

B. 可由單一或多種微生物所形成

C. 基質主要為 peptidoglycan、protein 及 DNA 所組成

D. 可加強細菌對環境或宿主的附著力

15. 下列何者不是用於細菌基因特性之分析？

- A.antigenicity
- B.rRNA sequences
- C.DNA sequences of conserved genes
- D.G+C content

16.關於potassium hydroxide直接鏡檢法，下列敘述何者錯誤？

- A.使用10% KOH
- B.常用於檢查皮屑與毛髮等檢體
- C.檢體需於火焰上持續加熱至完全乾燥
- D.可用於檢查黴菌的菌絲體

17.關於細菌的pili，下列敘述何者錯誤？

- A.常存在於革蘭氏陰性細菌
- B.為中空管狀結構
- C.為細菌主要的運動小器官
- D.在細菌接合生殖時，扮演重要角色

18.微生物可分為四種危險等級（risk group），受感染病人會造成嚴重疾病，但能有效治療的致病菌，屬於下列那一個危險等級？

- A.risk group 1
- B.risk group 2
- C.risk group 3
- D.risk group 4

19.關於實驗室的滅菌（sterilization），下列敘述何者正確？

- A.dry heat比moist heat有效率
- B.incineration可去除prions
- C.glutaraldehyde具腐蝕性，不可用於醫療儀器的滅菌
- D.gamma radiation只對物體表面的微生物有效

20.關於細菌毒素的敘述，下列何者錯誤？

- A.endotoxin的成分裡有lipopolysaccharide
- B.革蘭氏陽性菌死時都會釋放endotoxin
- C.部分革蘭氏陽性菌會產生exotoxin
- D.不同種類的革蘭氏陽性菌所產生之exotoxin通常不一樣

21.MacConkey agar含那些成分可抑制革蘭氏陽性菌的生長？①crystal violet ②eosin Y ③methylene blue

④bile salts

- A.①④
- B.②④
- C.②③
- D.①②

22.下列嗜氣、親脂性之*Corynebacterium* spp.中，何者通常具有urease，可與其他三種菌區分？

- A.*C. jeikeium*
- B.*C. lipophiloflavum*
- C.*C. urealyticum*

D.C. afermentens subsp. *lipophilum*

23. 對於 *enterococcus* 之敘述，下列何者錯誤？

- A. oxidase(+)
- B. 屬於 group D streptococcus
- C. 可耐受 6.5% NaCl
- D. 可耐受 4% bile salts

24. 有關 group D streptococcus 之敘述，下列何者錯誤？

- A. 腸道正常菌叢
- B. 可造成菌血症、心內膜炎等
- C. 在台灣很少有抗藥株
- D. 可依 mannitol、trehalose 等生化反應再做分型

25. 感染 *Streptococcus pyogenes* 後，可能會造成下列何種自體免疫疾病？

- A. 急性腎絲球炎 (acute glomerulonephritis)
- B. 咽喉炎 (pharyngitis)
- C. 猩紅熱 (scarlet fever)
- D. streptococcal toxic shock syndrome

26. 下列何種細菌較少造成皮膚感染？

- A. *Streptococcus pyogenes*
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. *Staphylococcus aureus*
- D. *Streptococcus agalactiae*

27. 下列何者不是 group A streptococcus 的毒力因子？

- A. protein A
- B. capsule
- C. streptococcal pyrogenic exotoxins
- D. erythrogenic toxin

28. 下列何種紙錠，可用以偵測葡萄球菌對 oxacillin 之感受性？

- A. cefoxitin
- B. cefazolin
- C. cefepime
- D. ceftriaxone

29. 下列何種細菌可在 cefsulodin-irgasan-novobiocin agar (CIN agar) 生長出 bull's-eye (靶心) 粉紅色菌落？

- A. 沙雷氏黏質桿菌 (*Serratia marcescens*)
- B. 克雷伯氏肺炎桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*)
- C. 耶爾森結腸炎桿菌 (*Yersinia enterocolitica*)
- D. 綠膿桿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)

30. 下列何種細菌於 Hektoen enteric (HE) agar 上，為綠色菌落且具有 ornithine decarboxylase 陽性反應？

- A. 宋內志賀氏桿菌 (*Shigella sonnei*)
- B. 傷寒桿菌 (*Salmonella Typhi*)
- C. 耶爾森結腸炎桿菌 (*Yersinia enterocolitica*)

D.產氣腸桿菌（*Enterobacter aerogenes*）

31.有關*Neisseria gonorrhoeae*之敘述，下列何者正確？

- A.男性患者之無症狀感染較女性患者常見
- B.具有lipopolysaccharide，為主要毒素之一
- C.人類是唯一的自然宿主
- D.感染過後即可終身免疫

32.培養*Neisseria gonorrhoeae*之選擇性培養基Modified Thayer-Martin (MTM) agar不含下列何種抗生素？

- A.vancomycin
- B.colistin
- C.nystatin
- D.cephalosporins

33.耶爾森結腸炎桿菌（*Yersinia enterocolitica*）在TSI上呈A/A，KIA上呈K/A，乃是因為此菌能發酵下列何種糖產酸？

- A.只能發酵glucose
- B.glucose及lactose
- C.glucose及sucrose
- D.glucose、lactose及sucrose

34.下列何種微生物無動物宿主，造成人類感染疾病？

- A.耶爾森結腸炎桿菌（*Yersinia enterocolitica*）
- B.空腸曲狀桿菌（*Campylobacter jejuni*）
- C.痢疾志賀氏桿菌（*Shigella dysenteriae*）
- D.腸炎沙門氏桿菌（*Salmonella enteritidis*）

35.下列何種生化特性可以區別克雷伯氏肺炎桿菌（*Klebsiella pneumoniae*）及奇異變形桿菌（*Proteus mirabilis*）？

- A.在TSI培養基中產生硫化氫（hydrogen sulfide）
- B.具有精氨酸去氫酶（arginine dehydrolase）
- C.分解尿素（urea）
- D.具有去氧核糖核酸酶（DNase）

36.泌尿道感染的細菌常因會表現下列何者而與結石的形成有關？

- A.莢膜多醣（capsular polysaccharides）
- B.觸酶（catalase）
- C.溶血素（hemolysin）
- D.尿素酶（urease）

37.下列各培養基與其所含酸鹼指示劑的組合何者錯誤？

- A.Christensen's urea agar—neutral red
- B.Moeller decarboxylase test medium—bromcresol purple
- C.Simmon's citrate agar—bromthymol blue
- D.triple sugar iron agar—phenol red

38.下列何種細菌在36°C不具運動性，在22°C卻具運動性？

- A.鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii*）

B. 克雷伯氏肺炎桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*)

C. 宋內志賀氏桿菌 (*Shigella sonnei*)

D. 耶爾森結腸炎桿菌 (*Yersinia enterocolitica*)

39. 下列何種微生物過氧化氫酶 (catalase) 及氧化酶 (oxidase) 兩者皆為陰性反應？

A. 綠膿桿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)

B. 空腸曲狀桿菌 (*Campylobacter jejuni*)

C. 流行性嗜血桿菌 (*Haemophilus influenzae*)

D. 鮑氏不動桿菌 (*Acinetobacter baumannii*)

40. 下列何種微生物是引起龐蒂亞克熱 (Pontiac fever) 的主要致病菌？

A. 肺炎黴漿菌 (*Mycoplasma pneumoniae*)

B. 退伍軍人肺炎桿菌 (*Legionella pneumophila*)

C. 流行性嗜血桿菌 (*Haemophilus influenzae*)

D. 單核球增生李斯特菌 (*Listeria monocytogenes*)

41. 關於 *Neisseria lactamica* 之敘述，下列何者正確？

A. 在巧克力培養基上可以長成有車輪形狀 (wagon-wheel appearance) 之特殊菌落

B. o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside (ONPG) 反應陽性

C. 無法在 sheep blood agar 上生長

D. DNase 為陽性

42. 下列何種細菌不能利用葡萄糖產生酸？

A. *Moraxella catarrhalis*

B. *Neisseria meningitidis*

C. *Neisseria gonorrhoeae*

D. *Neisseria lactamica*

43. 某衛生所通報疑似有群體感染大腸桿菌 O157:H7，O 是指：

A. 荚膜多醣 (capsular polysaccharides)

B. 鞭毛 (flagella)

C. 菌體 (somatic) 抗原

D. 台口酸 (teichoic acid)

44. 下列厭氧菌株，何者絕大多數均具 β-lactamase？

A. *Clostridium difficile*

B. *Bacteroides fragilis* group

C. *Prevotella* spp.

D. *Veillonella* spp.

45. 下列厭氧菌與其螢光菌落的配對，何者錯誤？

A. *Fusobacterium* spp. — 黃綠色螢光

B. *Porphyromonas asaccharolytica* — 磚紅色螢光

C. *Porphyromonas gingivalis* — 磚紅色螢光

D. *Veillonella* spp. — 紅色螢光

46. 下列何種厭氧菌可使用 reverse CAMP test 進行確認？

A. *Clostridium perfringens*

A. *Bacteroides fragilis* group

B. *Prophyromonas* spp.

C. *Peptostreptococcus anaerobius*

47. 下列何者不是 *Clostridium perfringens* 的特性？

A. 在 CDC blood agar 上有 double zone hemolysis

B. Nagler reaction positive

C. 具 lecithinase

D. 具 lipase

48. 革蘭氏陰性厭氧菌可依 kanamycin (k)、vancomycin (v)、colistin (c) 紙錠的感受性 (R/S) 區分的配對，何者錯誤？

A. kR-vR-cR : *Bacteroides fragilis* group

B. kR-vS-cR : *Porphyromonas* spp.

C. kS-vR-cS : *Prevotella* spp.

D. kS-vR-cS : *Fusobacterium* spp.

49. 厌氧菌的藥物感受性試驗，應選用下列何者最恰當？

A. disk diffusion

B. Brucella blood agar based agar dilution

C. Broth disk elution

D. Mueller-Hinton agar based agar dilution

50. 有關黴漿菌的敘述，下列何者錯誤？

A. *Mycoplasma pneumoniae* 可引起社區性非典型肺炎

B. *Mycoplasma hominis* 可引起生殖泌尿道感染

C. *Ureaplasma urealyticum* 可引起新生兒肺炎

D. *Ureaplasma parvum* 造成社區性非典型腸炎

51. *Cryptococcus neoformans* 在分類上屬於下列何門 (phylum) ？

A. Glomeromycota

B. Ascomycota

C. Basidiomycota

D. Deuteromycota

52. 下列何者不屬於細菌對 aminoglycosides 產生抗藥的機制？

A. 將 aminoglycoside 磷酸化 (phosphorylation)

B. 將 aminoglycoside 腺苷酸化 (adenylation)

C. 將 aminoglycoside 乙醯化 (acetylation)

D. 將 aminoglycoside 甲基化 (methylation)

53. 下列那一種雙形性真菌 (dimorphic fungi) 在組織檢體中是形成雪茄形 (cigar-shaped) 酵母菌細胞，在 22°C 培養則可形成菌絲及玫瑰花形 (rosettes) 排列的 conidia ？

A. *Coccidioides immitis*

B. *Sporothrix schenckii*

C. *Penicillium marneffei*

D. *Histoplasma capsulatum*

54.下列何種真菌不屬於thermally dimorphic fungi ?

- A.*Exophiala (Wangiella) dermatitidis*
- B.*Sporothrix schenckii*
- C.*Penicillium marneffei*
- D.*Histoplasma capsulatum*

55.臨床上最常以何種抗生素治療化膿性鏈球菌 (*Streptococcus pyogenes*) 之感染 ?

- A.penicillin
- B.kanamycin
- C.rifampin
- D.ciprofloxacin

56.由於砂眼披衣菌 (*Chlamydia trachomatis*) 屬於細胞內生長菌，下列何者不是治療此細菌感染常用的抗生素？

- A.ceftazidime
- B.erythromycin
- C.tetracycline
- D.ciprofloxacin

57.抗微生物製劑感受性試驗所配製的細菌濁度0.5 McFarland standard，其濃度為何？

- A. 1.5×10^7 CFU/mL
- B. 1.5×10^8 CFU/mL
- C. 1.5×10^9 CFU/mL
- D. 1.5×10^{10} CFU/mL

58.在厭氧菌的抗生素藥敏試驗中，瓊脂稀釋法 (agar dilution method) 至少需要培養多少時間？

- A.24 小時
- B.36 小時
- C.48 小時
- D.60 小時

59.下列何種細菌在瓊脂稀釋法 (agar dilution method) 中，採用GC agar作為培養基？

- A.*Vibrio cholerae*
- B.*Streptococcus pneumoniae*
- C.*Klebsiella pneumoniae*
- D.*Neisseria gonorrhoeae*

60.一般需氧菌以瓊脂稀釋法 (agar dilution method) 進行抗微生物製劑感受性試驗時，每個spot會接種的菌量為何？

- A. 1×10^3 CFU
- B. 1×10^4 CFU
- C. 1×10^5 CFU
- D. 1×10^6 CFU

61.下列關於白喉棒狀桿菌 (*Corynebacterium diphtheriae*) 之敘述，何者正確？

- A.革蘭氏陰性球桿菌
- B.有許多無症狀之帶原者

C.易造成全身性感染

D.所有菌株皆產生白喉毒素

62.下列何菌非泌尿道感染之病原菌？

- A.*Escherichia coli*
- B.*enterococci*
- C.*Chlamydia trachomatis*
- D.*Clostridium difficile*

63.下列何菌可引起急性咽喉炎（acute pharyngitis）與急性風濕熱（acute rheumatic fever）？

- A.*Pseudomonas aeruginosa*
- B.*Haemophilus influenzae*
- C.*Streptococcus pyogenes*
- D.*Bordetella pertussis*

64.下列何菌為引起成人牙周炎（periodontitis）的主要病原菌？

- A.*Porphyromonas gingivalis*
- B.*Pseudomonas aeruginosa*
- C.*Pasteurella multocida*
- D.*Propionibacterium acnes*

65.下列何者不是生殖道感染之常見病原菌？

- A.*Haemophilus parainfluenzae*
- B.*Neisseria gonorrhoeae*
- C.*Chlamydia trachomatis*
- D.*Ureaplasma urealyticum*

66.下列何種抗表皮黴菌藥物在服用時可能影響人類肝臟的cytochrome p450酵素系統？

- A.terbinafine
- B.itraconazole
- C.griseofulvin
- D.flucytosine

67.下列何種抗黴菌藥物之作用機制是抑制真菌細胞壁glucan之合成？

- A.5-fluorocytosine
- B.voriconazole
- C.caspofungin
- D.nikkomycin Z

68.下列何種黴菌染色法會將組織切片中的黴菌染成黑色，而背景呈現綠色？

- A.Gomori-methenamine-silver (GMS) stain
- B.calcofluor white
- C.periodic acid-schiff (PAS) stain
- D.Giemsa stain

69.有關potato dextrose agar (PDA) 培養基之敘述，下列何者錯誤？

- A.dextrose濃度為2%
- B.使用sterile tartaric acid抑制細菌的生長

C.含有pH indicator用來鑑定糖類是否代謝產酸

D.final pH為5.6

70.下列關於應用飛行質譜儀（MALDI-TOF MS）鑑定細菌之敘述，何者正確？

A.目前還在實驗階段尚無臨床應用

B.對於糞便檢體中之致病菌可以不經培養直接鑑定

C.主要原理是測定微生物各種分子之質量／電價比（m/z）

D.對於細菌細胞質內低含量之蛋白質有較好的分析效果

71.下列何種機制是*Salmonella enterica* 對quinolones抗生素造成抗藥性的原因之一？

A.porin通道改變

B.efflux幫浦活化

C. β -lactamase酵素活化

D.蛋白質合成速率增加

72.血液培養瓶中通常含有sodium polyanethol sulfonate當抗凝劑，較可能不利於下列何菌之分離？

A.*Arcanobacterium haemolyticum*

B.*Gardnerella vaginalis*

C.*Lactobacillus* spp.

D.*Erysipelothrix rhusiopathiae*

73.下列何種生化反應無法區別沙雷氏黏質桿菌（*Serratia marcescens*）及卡他性莫拉克氏球菌（*Moraxella catarrhalis*）？

A.氧化酶

B.去氧核糖核酸酶

C.發酵蔗糖

D.利用葡萄糖產生酸

74.下列病原菌與其媒介的配對，何者錯誤？

A.*Borrelia recurrentis*—蟲

B.*Borrelia burgdorferi*—壁蝨

C.*Rickettsia tsutsugamushi*—恙蟲

D.*Legionella pneumophila*—蟲

75.下列何種病原菌與其毒素的配對錯誤？

A.*Streptococcus pyogenes*—SPE B

B.*Clostridium difficile*—Toxin B

C.*E. coli* O157—Shiga-like toxin

D.*Enterococcus faecalis*—SEB

76.下列那一種培養基使用之酸鹼指示劑與其它三種培養基不同？

A.triple sugar iron agar

B.Christensen's urea agar

C.xylose-lysine-desoxycholate agar

D.thiosulfate-citrate-bile-salts agar

77.下列何種特性無法區別*Listeria monocytogenes*及*Streptococcus agalactiae*？

A.CAMP test陽性反應

B. 具有過氧化氫酶能力

C. 在25°C環境下具有運動性

D. 具有水解esculin能力

78. 下列何種微生物與引起貓抓病 (cat-scratch disease) 較有關？

A. *Coxiella burnetii*

B. *Leptospira interrogans*

C. *Bartonella henselae*

D. *Campylobacter lari*

79. Enteric fever常會出現高燒、無力、頭痛和腹痛，其可能致病菌為下列何者？

A. 傷寒桿菌 (*Salmonella Typhi*)

B. 宋內志賀氏桿菌 (*Shigella sonnei*)

C. 霍亂弧菌 (*Vibrio cholerae*)

D. 耶爾森結腸炎桿菌 (*Yersinia enterocolitica*)

80. 承上題，關於此致病菌，下列敘述何者正確？

A. indole試驗陰性

B. 可發酵lactose

C. 可生長於potassium cyanide

D. urease試驗陽性