

107年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專技高考助產師考試

代 號：4310

類科名稱：助產師

科目名稱：助產學（一）（包括助產學緒論、生殖系統的解剖與生理、產前護理、分娩期護理、產後護理、新生兒護理）

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

- 有關「以家庭為中心」的護理，下列何者錯誤？
 - 協助低危險生育家庭，有能力選擇醫療照護方式
 - 提供充分的學習機會，延長住院天數
 - 鼓勵大小孩探訪新生兒
 - 強調親子同室，增進親子關係
- 若我國在官方的生命統計資料中顯示：孕產婦死亡率為40.0，其意思為何？
 - 每十萬個活產中，有40個孕產婦死亡
 - 每一萬個活產中，有40個孕產婦死亡
 - 每一千個活產中，有40個孕產婦死亡
 - 每十萬個生產中，有40個產婦死亡
- 月經期的衛生用品中，下列何者最容易引起毒性休克症候群（toxic shock syndrome）？
 - 陰道灌洗劑
 - 會陰噴霧劑
 - 陰道凝膠
 - 衛生棉條
- 下列何種荷爾蒙，並非由腦下垂體前葉所分泌？
 - 濾泡刺激素（FSH）
 - 黃體生成素（LH）
 - 催產素（oxytocin）
 - 泌乳素（prolactin）
- 有關骨盆狹窄的敘述，下列何者正確？
 - 只發生於骨盆入口與出口
 - 骨盆入口狹窄是指骨盆入口之最短前後徑小於13 cm
 - 骨盆出口狹窄多半發生於類人猿型骨盆
 - 中骨盆狹窄多會合併骨盆出口狹窄
- 有關子宮肌肉層之環狀肌的敘述，下列何者正確？
 - 生產時的收縮作用幫助胎兒娩出
 - 繞著大血管有助月經來潮時經血量不過多
 - 在輸卵管與子宮相接處形成括約肌讓經血不逆流
 - 位於子宮中層
- 女性骨盆結構如果後矢徑明顯較短，坐骨棘明顯突出，恥骨弓狹窄，依據考德威爾莫洛伊（Caldwell-Moloy）

的分類法，應分類為那一型骨盆？

- A. 女子型
- B. 男子型
- C. 類人猿型
- D. 扁平型

8. 下列何者不是支持及維持子宮位置的韌帶？

- A. 闊韌帶 (broad ligament)
- B. 圓韌帶 (round ligament)
- C. 主韌帶 (cardinal ligament)
- D. 骨盆腔懸韌帶 (infundibulopelvic ligament)

9. 有關月經週期中分泌期 (secretory phase) 的敘述，下列何者錯誤？

- A. 黃體素分泌量大於動情素
- B. 子宮內膜層變厚、準備受精卵著床之用
- C. 子宮頸黏液變得黏稠
- D. 濾泡刺激素 (follicle stimulating hormone) 大量分泌

10. 有關催產素挑釁試驗 (oxytocin challenge test) 檢查結果「陽性」之敘述，下列何者正確？

- A. 10分鐘內有3次宮縮，每次收縮持續40秒，且宮縮時並無伴隨胎心率晚期減速 (late deceleration)
- B. 10分鐘內有3次宮縮，每次收縮持續40秒，且宮縮時並無伴隨胎心率變異性減速 (variable deceleration)
- C. 宮縮時，有50%以上伴隨有胎心率晚期減速
- D. 宮縮時，有50%以上伴隨有胎心率變異性減速

11. 下列何者是懷孕的客觀徵候 (objective sign) ？

- A. 噁心及晨吐
- B. 胎動初覺
- C. 陽性反應的妊娠試驗
- D. 頻尿

12. 婦女在懷孕前及懷孕初期補充葉酸是為了預防：

- A. 胎兒之神經管缺損
- B. 缺鐵性貧血
- C. 生理性水腫
- D. 妊娠糖尿病

13. 卵磷脂/抱合髓卵磷脂 (L/S) 比值小於多少時，可確知胎兒肺部未成熟？

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 3.5

14. 下列何者不是胎兒生理活動 (biophysical profile) 的檢查項目？

- A. 胎動
- B. 胎兒呼吸運動
- C. 無壓力性試驗
- D. 子宮收縮加壓試驗

15. 身體質量指數（BMI）為27的女性經歷正常單胞胎懷孕時，體重平均總增加不宜超過多少以上？
- A. 10公斤
 - B. 12公斤
 - C. 17公斤
 - D. 20公斤
16. 李太太是第1次懷孕，懷孕前BMI為21，目前已懷孕三個多月了，她很擔心產後體重恢復情形，所以想在懷孕時少吃一些，應如何勸告她？
- A. 最好節食，好讓生產順利些
 - B. 懷孕時飲食攝取不足易發生早產
 - C. 最好節食以減少死產的發生率
 - D. 懷孕時飲食攝取不足會造成子癇前症
17. 有一懷孕10週的孕婦，主訴沒有小便困難，但是想知道如何改善小便頻繁的情形，比較恰當的處置是：
- A. 減少日間液體攝入量
 - B. 立刻與產科醫師聯絡
 - C. 睡前減少喝水
 - D. 試著減少解尿次數
18. 下列何種措施可以減輕懷孕早期的妊娠嘔吐（morning sickness）症狀？
- A. 服用抗組織胺及止吐藥物
 - B. 每日增加牛奶量
 - C. 醒來未下床前吃些餅乾
 - D. 三餐間與用餐時飲多量液體
19. 田女士懷孕22週，為改善其腰酸及下背痛之不適情形，建議執行何種運動？
- A. 肩膀運動和足踝運動
 - B. 骨盆搖擺運動和腰背伸展運動
 - C. 頭頸部運動和抬腿運動
 - D. 骨盆底肌運動和盤腿壓膝運動
20. 妊娠第三期孕婦，常發生下肢水腫的現象，下列指導何者不適宜？
- A. 避免久坐或久站
 - B. 宜多穿及膝的短襪
 - C. 避免高鹽分的食物
 - D. 休息時，宜抬高足部
21. 有關懷孕第二期易發生妊娠紋的部位，下列何者正確？
- A. 乳房、大腿、腹部皮膚
 - B. 脖子、大腿、腹部皮膚
 - C. 乳房、手臂、大腿皮膚
 - D. 脖子、手臂、大腿皮膚
22. 鄭女士懷孕34週經腹部觸診，胎兒胎位為LSA，胎心音在何部位聽診最清楚？
- A. 左肚臍和髂骨前上棘連線中間
 - B. 右肚臍和髂骨前上棘連線中間
 - C. 左髂骨前上棘和肚臍的延長線上

- D.右髂骨前上棘和肚臍的延長線上
- 23.孕婦關注自己懷孕的事實與孩子的關係，對於社交活動較往日不感興趣，情緒是喜悅與驕傲，這是下列那一妊娠期的表現？
- A.第一妊娠期
 - B.第二妊娠期
 - C.第三妊娠期
 - D.第四妊娠期
- 24.懷孕提供的生產準備課程的基本理念，下列敘述何者最適宜？
- A.生產一定要有醫療處置
 - B.生產是正常的生理過程
 - C.生產時不應該使用任何藥物
 - D.生產是危險之事不可輕忽
- 25.孕婦產兆現象，包含那些？①現血 ②呼吸不順暢 ③血壓上升 ④不易入眠 ⑤破水 ⑥子宮收縮每15分鐘一次
- A.②③⑤
 - B.①②④
 - C.③④⑥
 - D.①⑤⑥
- 26.有關待產婦的照護，下列敘述何者錯誤？
- A.鼓勵下床走動，促進胎兒迴轉
 - B.親善的待產生產措施，有利於哺乳的早期開始
 - C.第二產程在分娩衝動尚未開始時，鼓勵持續用力，以縮短產程
 - D.每兩小時鼓勵排尿，以利胎兒下降
- 27.有關第二產程生產姿勢之敘述，下列何者錯誤？
- A.跪臥姿勢有助緩解背痛
 - B.坐姿可促進胎兒下降
 - C.蹲踞姿勢可增加骨盆外口徑線
 - D.抬高床頭 30 度可緩解胎兒衝出之速度
- 28.左枕前位（LOA）之分娩機轉順序為：
- A.固定→下降→內迴轉→屈曲→伸展→外迴轉→娩出
 - B.固定→下降→屈曲→內迴轉→伸展→外迴轉→娩出
 - C.固定→下降→內迴轉→伸展→屈曲→外迴轉→娩出
 - D.固定→下降→內迴轉→屈曲→外迴轉→伸展→娩出
- 29.頭產式中，胎頭於分娩初期以長軸進入骨盆內口，當胎頭的那一條徑線進入骨盆內口時，稱之為固定？
- A.雙頂徑
 - B.枕額徑
 - C.雙顳徑
 - D.枕下前凶徑
- 30.當胎頭自陰道娩出完成仰伸後，胎頭枕骨向母體右方轉45°，以左肩胛為前肩娩出時，助產人員可判斷其胎方位為：

- A.LOA
- B.ROA
- C.LOP
- D.ROP

31.下列何者為胎心搏過速（tachycardia）的定義？

- A.基準胎心率超過140 bpm，且持續5分鐘以上
- B.基準胎心率超過140 bpm，且持續10分鐘以上
- C.基準胎心率超過160 bpm，且持續5分鐘以上
- D.基準胎心率超過160 bpm，且持續10分鐘以上

32.張太太待產時感腰酸不適，想下床走動，下列護理指導何者不適宜？

- A.可請張先生陪同張太太活動，並給予適當支持
- B.請張先生務必讓張太太在床上躺著，避免監視器移位
- C.教導張太太可更換不同姿勢，並請張先生注意安全
- D.告知張先生除協助下床走動外，亦可給予腰部按摩

33.婦女於待產及分娩時皆會經歷產程疼痛，下列對疼痛刺激來源之敘述，何者錯誤？

- A.子宮肌肉細胞缺氧
- B.子宮及陰道周圍神經節受壓
- C.膀胱及尿道受壓
- D.胸腔、橫膈受子宮脹大壓迫

34.助產人員以Nitrazine試紙測試林女士是否破水，是根據正常陰道分泌物與羊水的pH值不同，兩者的pH值分別為：

- A.4.5~5.5；7.0~7.5
- B.7.0~7.5；4.5~5.5
- C.5.5~6.5；4.5~5.5
- D.4.5~5.5；5.5~6.5

35.紀女士主訴有水濺分泌物由陰道流出，助產人員以Nitrazine試紙測試呈黃色，下列判讀何者正確？

- A.試紙黃色呈鹼性，表示已破水
- B.試紙黃色呈酸性，表示未破水
- C.試紙黃色呈鹼性，表示未破水
- D.試紙黃色呈酸性，表示已破水

36.有關胎盤剝離徵象的敘述，下列何者錯誤？

- A.子宮形狀不明顯，摸不到
- B.子宮底突然升高
- C.露在陰道外的臍帶變長
- D.從陰道流出來的血液突然增多

37.就下列Bishop score分數而言，何者最容易引產成功？

- A.0分
- B.3分
- C.5分
- D.7分

- 38.下列何者最不能減緩硬膜外麻醉（epidural anesthesia）引起的頭痛不適？
- A.平躺休息
 - B.使用束腹帶
 - C.增加液體攝入
 - D.採左側臥姿勢
- 39.待產婦女的焦慮、害怕所造成的影響，包括：
- A.增加血中腎上腺素（epinephrine）的分泌，干擾子宮收縮的節律性，延長分娩時間
 - B.增加血中催產素（oxytocin）的分泌，增加子宮收縮的節律性，縮短分娩時間
 - C.增加血中前列腺素（prostaglandins）的分泌，干擾子宮收縮的節律性，延長分娩時間
 - D.降低血中腎上腺素（epinephrine）的分泌，干擾子宮收縮的節律性，延長分娩時間
- 40.有關陪產員（doula）的角色，下列敘述何者正確？
- A.必要的情況下，可以干涉醫護人員給予產婦的醫療措施
 - B.可以協助護理人員評估待產婦的生命徵象
 - C.以非藥物的疼痛處理策略、運用放鬆技巧及心理支持的方式來協助產婦度過生產的過程
 - D.可以從事給藥、注射
- 41.助產人員協助分娩開始保護會陰的最佳時機為：
- A.胎頭伸展後
 - B.胎頭外迴轉時
 - C.胎頭著冠時
 - D.肩部娩出時
- 42.有關胎頭娩出後有臍繞頸的敘述，下列何者錯誤？
- A.臍繞頸不是太緊時，則將臍帶繞過頭部後，將胎兒娩出
 - B.臍繞頸太緊可能造成胎兒缺氧
 - C.胎兒肺部尚未擴張，所以不會有影響
 - D.臍繞頸不是太緊時，可以把臍帶由肩膀往下滑，將胎兒娩出
- 43.王女士現處於第一產程活動期，胎膜完整，子宮頸口開7 cm，子宮收縮頻率少且持續時間短，醫師為她執行人工破水，此時最合宜的解釋為：
- A.減輕對子宮頸的壓力
 - B.有效監測胎心音
 - C.減輕宮縮疼痛
 - D.促進有效宮縮
- 44.有關檢查胎盤、胎膜和臍帶的敘述，下列何者錯誤？
- A.檢查胎盤的胎兒面臍帶插入的部位，如有帆狀附著，表示可能胎兒異常機率增加
 - B.檢查胎盤周邊的血管，如有撕裂，表示靜脈曲張
 - C.檢查胎盤子葉，如有白點，表示可能有梗塞
 - D.檢查臍帶，如各有一條動脈與靜脈，表示可能胎兒異常機率增加
- 45.有關保險套的使用，下列何者錯誤？
- A.保險套由乳膠製成，使用完須經清潔後，才可重覆使用
 - B.保險套拆封時應由邊線拆開，以免損及保險套
 - C.應將保險套前方的乳突壓扁，排出空氣後再戴上

- D.保險套宜保存在乾燥、涼爽處
- 46.有關緩解產婦產後痔瘡疼痛的護理措施，下列何者不適當？
- A.溫水坐浴
 - B.定期排便
 - C.預防便秘
 - D.定期使用輕瀉劑以利排便
- 47.江太太，剖腹產後第1天，仍有導尿管留置，但尿量少、顏色深，助產人員應如何評估其排尿是否正常？
- A.拔除導尿管，看是否能自行解出小便
 - B.考慮可能是尿路堵塞的影響，所以重新插留置尿管，再評估尿排出量
 - C.觀察蓄尿袋中是否每小時有30~60 c.c.以上小便排出
 - D.只要沒有出現血尿，就沒有問題
- 48.有關母乳與配方奶營養的敘述，下列何者正確？
- A.母乳中維生素D、K含量往往較配方奶高
 - B.母乳中的鈣質含量往往較配方奶低
 - C.母乳中鐵質含量往往較配方奶高
 - D.配方奶中的乳糖含量比母乳含量高
- 49.有關正常排卵之體溫變化的敘述，下列何者正確？
- A.排卵前後體溫均較平時體溫低
 - B.排卵前後體溫均較平時體溫高
 - C.排卵前體溫下降，排卵後體溫上升
 - D.排卵前體溫上升，排卵後體溫下降
- 50.助產人員在觀察母嬰互動時，聽到下列何項母親的敘述表示為適應良好的母性行為？
- A.我真希望有個兒子，但更重要的是我的女兒很健康
 - B.又是女兒，我只好再試著生兒子
 - C.她看起來好可怕，像個猴仔
 - D.我不希望再看到這嬰兒
- 51.產後給予子宮按摩時，先以一手支托子宮的主要目的為：
- A.避免子宮外翻
 - B.避免子宮內翻
 - C.避免子宮移位
 - D.避免子宮脫垂
- 52.有關性交後避孕丸之敘述，下列何者錯誤？
- A.會有噁心、嘔吐副作用
 - B.以高劑量的泌乳激素（prolactin）來抑制排卵的功能
 - C.性交後立刻服用第1次，12小時後服用第2次，之後再服用5天，每天2次
 - D.服用性交後避孕丸後5天，會有月經來潮的現象
- 53.李太太G₂P₂，陰道產後第1天，想要去嬰兒室看寶寶，但因痔瘡疼痛而必須扶牆緩慢前往，且頻頻皺眉、拭汗。此時助產人員最適當的回應是：
- A.李太太，妳不用急，明天寶寶就會推來餵奶了啊
 - B.立即推輪椅，墊上坐圈，協助她坐下並推她至嬰兒室

- C.李太太，妳這樣不舒服，應該要等妳先生回來再扶妳過去，這樣比較好
- D.唉！做媽媽就是如此偉大
- 54.產後第2天，助產人員發現產婦對新生兒不感興趣時，下列何項護理措施應優先執行？
- A.教導產婦如何照顧新生兒
- B.增加產婦和新生兒相處時間和接觸
- C.給予產婦充分的休息和睡眠
- D.產婦有憂鬱症，給予心理支持與關懷
- 55.有關預防產後便秘的護理措施，下列何者錯誤？
- A.鼓勵每天攝入2,500~3,000 c.c.的水份
- B.鼓勵攝取足夠的纖維質
- C.鼓勵經常下床活動
- D.鼓勵定期使用輕瀉劑，以養成定時排便習慣
- 56.黃女士G₂P₂，主訴：「每次餵母乳時，子宮收縮都很痛。」此時助產人員的處理，下列何者最適當？
- A.測量生命徵象
- B.檢查子宮底高度及收縮情形
- C.檢查醫師是否有開止痛藥的醫囑
- D.觀察哺餵母乳的姿勢及寶寶的含乳情形
- 57.王女士生產後6小時第一次下床，主訴：「頭好暈！」，評估王女士此時最可能發生下列何種問題？
- A.妊娠引起的高血壓
- B.脊髓麻醉後的頭痛
- C.姿位性低血壓
- D.子宮內膜炎
- 58.有關陰道分娩後腸胃道的變化，下列敘述何者正確？
- A.腸蠕動緩慢，是因為腹壓減低所致
- B.腸蠕動緩慢，是因為心輸出量減少
- C.腸蠕動正常，是因為分娩對腸道作用影響少
- D.腸蠕動正常，是因為正常進食無異常現象
- 59.下列避孕方法中，何者既可避孕，亦可達到預防性病的功能？
- A.子宮內避孕器
- B.諾普蘭
- C.男用保險套
- D.子宮隔膜
- 60.有關複合型口服避孕藥（含動情素及黃體素）除了避孕以外的附加效果，下列敘述何者錯誤？
- A.可以降低子宮內膜癌及卵巢癌發生率
- B.可以減輕子宮內膜異位症所引起的經痛
- C.可以降低乳癌或其他乳房疾病發生率
- D.可以改善青春痘
- 61.有關口服避孕藥的敘述，下列何者正確？
- A.服用28粒裝的口服避孕藥，每一粒藥皆含動情素或黃體素
- B.服用21粒裝的口服避孕藥，於停藥後約6~7天，月經就會來潮

- C.產後婦女必須在產後第一次月經來潮乾淨後的第五天，開始服用口服避孕藥
- D.若一連二天忘記服用，則於發現時立即補用二顆，隔天也服用二顆，之後按平常時間服用
- 62.李女士產後七個月，仍餵母乳，下列何者為此時最不適用的避孕方法？
- A.注射狄波拉（Depo-provera）
 - B.裝置子宮內避孕器
 - C.使用保險套
 - D.計算安全期
- 63.張女士剛流產，表示想用子宮內避孕器，最適合張女士裝置子宮內避孕器的時間為何時？
- A.下次月經來潮後一週內
 - B.流產後42天回診時
 - C.流產後2~3天內
 - D.流產後立刻裝置
- 64.婦女乳腺細胞何時開始分化增生，以備哺乳？
- A.懷孕4週
 - B.懷孕16週
 - C.懷孕末期
 - D.胎盤娩出後
- 65.王女士產後第三天，一直在擔心自己的乳汁分泌不足以提供寶寶所需的奶量，此時她表示：「聽說豬腳花生可以促進乳汁分泌」此時助產人員的反應，下列何者最合適？
- A.可以試試，只要是蛋白質食物都可以促進乳汁的分泌
 - B.可以試試，但是多讓寶寶吸吮，更能促進乳汁的分泌
 - C.影響乳汁分泌的因素很多，此方法不一定有效
 - D.有聽過，好像蠻有效
- 66.有關乳頭破皮的照護，下列何者最正確？
- A.先暫停患側的餵食
 - B.每天三次使用香皂清洗乳頭
 - C.每次哺乳時間勿超過10分鐘
 - D.在兩次哺乳間，儘量讓乳頭暴露，保持乾燥
- 67.助產人員應鼓勵產婦，至少每幾小時解尿一次？
- A.1~2
 - B.3~4
 - C.5~6
 - D.7~8
- 68.產婦家屬用臉盆在接飲水機的熱水，助產人員此時的處理，下列何者最合適？
- A.很有禮貌的告訴家屬，用臉盆在接飲水機的熱水是不合適的
 - B.告知塑膠臉盆接熱水是不適合的，應先裝冷水再加熱水
 - C.試著了解原因，並協助至熱水間拿熱水
 - D.這是一般狀況，不需特別處理
- 69.王小弟採母乳哺育，出生第3天，膽紅素值為10 mg/dL，此情況較合宜的處置為：
- A.確保王小弟吃到足夠的母乳

- B.將王小弟的小床放置在窗邊
- C.讓王小弟接受照光治療
- D.在王小弟床頭置一日光檯燈

70.有關新生兒臍帶內的血管數目，正常為：

- A.兩條動脈和兩條靜脈
- B.兩條動脈和一條靜脈
- C.一條動脈和一條靜脈
- D.兩條靜脈和一條動脈

71.有關新生兒臍帶之敘述，下列何者錯誤？

- A.換尿布時，需觀察臍斷面及臍根有無發紅、分泌物
- B.一般可用棉籤沾優碘消毒
- C.為促進臍帶乾燥，可以棉籤沾95%酒精，作環狀擦拭
- D.一般新生兒臍帶約在7~14天脫落

72.給予新生兒30秒的有效正壓換氣（positive-pressure ventilation），以及30秒的有效正壓換氣協同胸外按摩之後，心跳仍低於60次/分，則考慮經由臍靜脈給予腎上腺素（epinephrine），此時藥物的正確劑量及濃度為：

- A.1：1,000；1~3 mL/kg
- B.1：1,000；0.1~0.3 mL/kg
- C.1：10,000；1~3 mL/kg
- D.1：10,000；0.1~0.3 mL/kg

73.以貝拉德量表（Ballard score）來評估新生兒，40週足月兒的手腕方形窗角度最接近下列何者？

- A.0°
- B.30°
- C.45°
- D.90°

74.王女士詢問寶寶所發生的頭血腫（cephalohematoma），助產人員最適當的解釋為：

- A.陰道生產有頭血腫是常見的
- B.約3~6週會自然吸收消失
- C.此腫脹會跨越縫合線
- D.嬰兒哭時頭血腫部位會膨出

75.有關新生兒之頭頸部評估，下列何者正確？

- A.耳朵上緣高於內外眼眥連線
- B.生產損傷導致的面神經麻痺，會造成新生兒永久的臉部不對稱
- C.前凶門呈三角形，12~18個月關閉
- D.出生時頭部的比例占其身長的1/8

76.關於第5分鐘的阿帕嘉計分（Apgar Score）的敘述，下列何者錯誤？

- A.用以決定是否需要進行新生兒復甦術
- B.用以瞭解新生兒對復甦術的反應
- C.記錄新生兒出生後立即的情況
- D.若是得分小於7，則需要每隔5分鐘再評估一次，直到20分鐘

77. 新生兒肝功能因腸胃道缺乏製造維生素K的菌叢，而無法活化凝血因子，為預防新生兒出血，臨床常規性的處置措施為何？

- A. 鼓勵孕婦進食含豐富維生素K的食物
- B. 孕婦於產前注射維生素K
- C. 新生兒於出生後，立即給予注射維生素K
- D. 新生兒於出生後，立即給予口服活性乳酸菌

78. 林太太待產時因為疼痛、焦慮，呼吸深度及速率皆增加，無法配合子宮收縮而調整深呼吸速度。請依此回答下列3題。

一段時間後她可能出現下列那些症狀？①嘴唇有麻刺感 ②暈眩 ③低血壓 ④眼前出現黑點 ⑤蛋白尿

- A. ①③④
- B. ①②④
- C. ①②⑤
- D. ②③⑤

79. 承上題，造成林太太這些症狀的可能原因是：

- A. 呼出過多的二氧化碳，體內存留太多的氧氣，造成呼吸性鹼中毒
- B. 呼出過多的氧氣，體內存留太多的二氧化碳，造成呼吸性酸中毒
- C. 呼出過多的二氧化碳，體內存留太多的氧氣，造成呼吸性酸中毒
- D. 呼出過多的氧氣，體內存留太多的二氧化碳，造成呼吸性鹼中毒

80. 承上題，助產師如何處理林太太改善上述症狀？①教導她減慢呼吸的方法 ②協助她用紙袋罩住口鼻呼吸 ③協助她採淺式呼吸 ④教導她張口哈氣 ⑤陪伴及支持產婦

- A. ①③⑤
- B. ①②④
- C. ①②⑤
- D. ②③⑤