

107 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、107 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 關於《傷寒論》小青龍湯之敘述，下列何者正確？
(A)本方主治外受風寒，內有痰熱之證候
(B)屬於扶正解表劑
(C)方中之生薑、大棗有調和營衛之效
(D)方中之五味子、白芍可斂氣養血，為佐制之用
- 78 歲老人，大便六至七日一行，大便乾結難解。另見腰膝痠軟、小便清長、頭暈目眩等症。無腹脹，無噁心感，納可，眠可。舌淡苔白，脈沉遲。下列處方何者最適宜？
(A)大承氣湯 (B)溫脾湯 (C)麻子仁丸 (D)濟川煎
- 下列各方的功用，何者錯誤？
(A)荊防敗毒散：發汗解表，祛風止痛 (B)九味羌活湯：解表祛濕，兼清裏熱
(C)桂枝加附子湯：解肌發表，調和營衛 (D)小青龍湯：解表化飲，止咳平喘
- 有關《備急千金要方》溫脾湯之功用，下列何者最適宜？
(A)理氣化痰，行氣開鬱 (B)溫中祛寒，補氣健脾
(C)溫中補虛，和裏緩急 (D)溫補脾陽，攻下冷積
- 下列那些方均含麻黃、杏仁、甘草之組成藥物？①定喘湯 ②華蓋散 ③小青龍湯 ④大青龍湯
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 下利初起，腹中脹痛，或脘腹脹滿、裏急後重者，治宜以下列何方？
(A)大黃牡丹皮湯 (B)調胃承氣湯 (C)大承氣湯 (D)小承氣湯
- 有關各方之主治，下列敘述共幾項正確？①麻杏石甘湯治惡寒發熱，無汗，咳喘，痰多而稀或痰飲咳喘，不得平臥，或身體疼重，頭面四肢浮腫，舌苔白滑，脈浮者 ②麻黃湯治發熱，頭痛，身痛，腰痛，骨節痛，項背強，惡寒惡風，無汗而喘，舌苔薄白脈浮緊 ③小青龍湯治身熱不解，咳喘氣急，口渴，有汗或無汗，舌苔薄白或黃，脈滑而數者 ④桑菊飲治風溫，但咳嗽，身不熱，口不渴，少苔，脈虛數
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 45 歲女性，近 2 年兒女相繼考大學，常焦慮難眠，伴有胸悶心悸，倦怠無力，食量減少，盜汗虛熱，月經先期，經來量多色淡且淋漓不止，來院求診，理學檢查發現患者面色萎黃，舌質淡，苔薄白，脈細弱，下列何方治療最適宜？
(A)《濟生方》歸脾湯 (B)《內外傷辨惑論》當歸補血湯
(C)《蘭室秘藏》當歸六黃湯 (D)《金匱要略》溫經湯
- 下列各項敘述何者正確？
(A)玉屏風散主治外感風寒，營衛不和所致之自汗
(B)乾咳少痰，短氣自汗，口乾舌燥，苔薄少津，脈虛細，宜當歸六黃湯治之
(C)《和劑局方》牡蠣散主治之汗證，以白天動則汗出為主
(D)證見發熱自汗出，氣虛乏力，舌淡，脈虛大無力，宜補中益氣湯治之

- 10 有關《傷寒論》竹葉石膏湯，下列敘述共幾項正確？①治療大病差後，喜唾，久不了了 ②本方清熱與益氣養陰併用，並配伍和胃降逆，是為清而不寒，補而不滯的虛實兼顧之方 ③正盛邪實，大熱未衰者忌用本方 ④濕阻身熱，胸悶乾嘔，苔黃膩者亦適合本方使用
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 11 下列藥物中有幾項為《溫病條辨》清營湯之組成？①生地、黃連 ②竹葉心、石膏 ③玄參、丹參 ④菊花、連翹
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 12 28 歲女性電腦工程師平時工作繁重早出晚歸，近 3 月發現月經量多色淡，納差身倦，已失眠數週。觀其舌質色淡，苔薄白，脈細弱。下列何方治療最宜？
(A) 溫膽湯 (B) 逍遙散 (C) 天王補心丹 (D) 歸脾湯
- 13 下列藥物中有幾項為《東垣試效方》普濟消毒飲之組成？①黃連、黃芩 ②升麻、柴胡 ③牛膝、馬勃 ④連翹、葛根
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 14 有關「當歸補血湯」的敘述，下列共幾項正確？①其主治為勞倦內傷，氣弱血虛，陽浮外越 ②此方出自《醫方集解》 ③黃耆：當歸用量為 1：5 ④主證可見肌熱面赤，煩渴欲飲，脈洪大而虛
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 15 芡實健脾益腎，常被用於收斂固瀉，治療人體精氣滑脫之病證。下列何項方劑不含此藥？
(A) 《太平惠民和劑局方》真人養臟湯 (B) 《洪氏集驗方》水陸二仙丹
(C) 《傅青主女科》易黃湯 (D) 《醫方集解》金鎖固精丸
- 16 46 歲張小姐，2 天前開始咽喉疼痛，發燒 38°C，輕微鼻塞流鼻水。先至診所診療服藥控制，但咽痛卻逐漸加重，至今已發展至吞嚥困難，呼吸不暢，來診時症見高燒 38.8°C，輕微惡寒，顏面紅脹，咽喉望診見兩側扁桃體腫脹化膿，後咽壁濾泡紅腫密集，吞口水與進食時均感嚴重咽痛，無鼻塞，無鼻黏膜腫脹，聽呼吸音無 Wheezing sound，排便尚暢，因咽痛難安睡，臨床診斷為扁桃體膿瘍，舌苔黃，舌質紅，脈數有力，依中醫辨證論治原則選擇本案例處方，下列方劑何者最適當？
(A) 銀翹散 (B) 五味消毒飲 (C) 普濟消毒飲 (D) 仙方活命飲
- 17 有關陽和湯的證治與方義的敘述，下列何者錯誤？
(A) 原方出自《外科證治全生集》，主治陰疽，或貼骨疽，流注，痰核，鶴膝風
(B) 方中以肉桂與炮薑以溫陽散寒，宣通氣血
(C) 以鹿角膠補腎助陽，強筋壯骨
(D) 以白芥子宣通經絡，引陽氣，開寒結
- 18 主治脾胃虛寒，兼有外感表證，泄利不止，心下痞鞭，發熱惡寒，表裏不解，協熱下利者，宜以理中丸加下列何藥？
(A) 附子 (B) 茯苓 (C) 桂枝 (D) 半夏
- 19 有關四逆散與逍遙散的比較，下列何者正確？
(A) 四逆散主治肝旺脾虛 (B) 逍遙散主治肝脾氣鬱
(C) 兩者皆含調肝基本結構藥物柴胡與白芍 (D) 陽虛厥逆宜用四逆散
- 20 某 15 歲女性，未婚。經行 8 天未止，血色深紅，少腹脹痛，心胸煩熱，口苦，溲赤，舌紅，脈弦數。最宜使用下列何方？
(A) 歸脾湯 (B) 固經丸 (C) 槐花散 (D) 固衝湯
- 21 寒熱如瘧，寒輕熱重，口苦胸悶，吐酸苦水，舌紅苔白，脈數，最宜使用下列何方？
(A) 小柴胡湯 (B) 大柴胡湯 (C) 蒿芩清膽湯 (D) 溫膽湯

- 22 有關《攝生眾妙方》定喘湯的敘述，下列何者錯誤？
(A)以桑白皮甘寒、黃芩苦寒，清泄肺熱、止咳平喘
(B)麻黃辛溫，宣肺平喘；杏仁苦溫，降氣平喘。二藥配伍一散一收，共為此方的主要藥物
(C)臨床上可用於慢性氣管炎
(D)若屬外感風寒，內有寒飲之喘證，則不宜使用
- 23 有關《醫林改錯》補陽還五湯，下列敘述何者錯誤？
(A)重用黃耆，使氣旺血行，瘀去絡通，為方中主要藥物
(B)地黃用於補益精血
(C)當歸尾能活血化瘀而不傷血
(D)桃仁、紅花活血祛瘀
- 24 《濟生方》歸脾湯與《攝生秘剖》天王補心丹中，相同組成的藥物，下列何者正確？
(A)遠志、炙甘草 (B)酸棗仁、柏子仁 (C)人參、當歸 (D)黃耆、丹參
- 25 《太平惠民和劑局方》蘇子降氣湯與《金匱要略》半夏厚朴湯，這兩個方劑製作（包含製服法）使用相同的藥物有幾個？
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 26 有關治療疝氣方劑之敘述，下列選項何者正確？①暖肝煎治寒凝氣滯肝虛之疝氣 ②天台烏藥散治寒凝氣滯肝脈之疝氣 ③橘核丸治濕熱瘀阻肝脈之疝氣
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 27 有關溫經湯之敘述，下列何者錯誤？
(A)可溫經散寒，兼可祛瘀養血
(B)乃肝經受寒，故用乾薑大熱之性溫散寒邪
(C)以阿膠養肝血潤腎陰
(D)以當歸、川芎、白芍入肝經活血祛瘀，養血調經
- 28 下列藥物中有幾項為《金匱要略》溫經湯之組成？①莪朮、牛膝 ②地黃、肉桂 ③牡丹皮、半夏 ④山茱萸、乾薑
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 29 有關《外科正宗》消風散和《證治準繩》當歸飲子的敘述，下列何者錯誤？
(A)關於地黃選擇，前者為生地；後者為熟地
(B)兩方皆有荊芥、防風
(C)前者清熱除濕力道較後者強；後者養血潤燥力道較前者強
(D)後者使用的蒺藜為白蒺藜
- 30 有關《太平惠民和劑局方》藿香正氣散的敘述，下列何者錯誤？
(A)起到上、中、下三焦分消濕邪，使三焦氣機通暢
(B)以蒼朮、茯苓和炙甘草健脾益氣除濕，體現標本同治
(C)透過化濕藥和行氣藥相互配合，恢復脾胃的正常升降
(D)外散風寒，內化濕濁，為治霍亂吐瀉之常用方
- 31 有關《傷寒論》五苓散的敘述，下列何者錯誤？
(A)用量最大的藥是茯苓
(B)主治渴欲飲水，水入則吐之水逆證
(C)主治太陽表邪未解，內傳導致膀胱氣化不利的蓄水證
(D)本方去桂枝即為《明醫指掌》四苓散的組成藥物
- 32 33 歲孕婦懷孕 18 週，主訴皮膚腫脹，小便不利，肢體沉重，心腹脹滿，喘急上氣不接下氣，查舌苔白膩，脈沉緩，治宜下列何方？
(A)都氣丸 (B)羌活勝濕湯 (C)五皮飲 (D)雞鳴散

- 33 劉先生來院門診，證見小便不利，發熱，口渴欲飲，伴有心煩不寐，經醫師診察舌紅苔白，脈細數，下列何方最適宜？
(A)五苓散 (B)五淋散 (C)胃苓湯 (D)豬苓湯
- 34 《溫病條辨》杏蘇散之敘述，下列共幾項正確？①功用可宣肺化痰 ②主治溫燥外襲之證 ③桔梗、枳殼為本方與止嗽散共同組成 ④以生薑、大棗調和營衛，通行津液
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 35 下列何者為《蘭室秘藏》枳實消痞丸和《內外傷辨惑論》枳實導滯丸之相同組成的藥物？
(A)枳實、大黃、萊菔子 (B)枳實、白朮、茯苓 (C)枳實、黃連、神麴 (D)枳實、黃連、甘草
- 36 下列那一方劑屬於臨床常用消食導滯的方劑？
(A)《儒門事親》木香檳榔丸 (B)《傷寒論》旋覆代赭湯
(C)《丹溪心法》越鞠丸 (D)《傷寒論》大承氣湯
- 37 下列敘述何者正確？
(A)《傷寒論》竹葉石膏湯，主治傷暑，陽為陰遏，有表證無汗者
(B)《溫熱經緯》清暑益氣湯，主治暑熱傷氣，汗多煩渴，體倦少氣，脈虛數者
(C)《脾胃論》補中益氣湯，主治傷暑，發熱、汗出，口渴，脈虛大者
(D)《內外傷辨惑論》生脈散，主治暑病，感受暑濕，脾濕不化，身熱，頭痛，口渴自汗，苔膩，脈虛者
- 38 50 歲男性，平時喜喝冰飲，長期咳嗽痰多，清稀色白，胸悶不暢，怕冷，最近無外感症狀，胃納平，二便正常，舌淡紅，齒痕，苔白滑，脈弦滑。最宜下列何方治療？
(A)《傷寒論》小青龍湯 (B)《太平惠民和劑局方》二陳湯
(C)《韓氏醫通》三子養親湯 (D)《金匱要略》苓甘五味薑辛湯
- 39 下列那些藥材是「左歸丸」和「右歸丸」的共同組成？
(A)熟地、山藥、鹿角膠、當歸 (B)熟地、山藥、龜板、肉桂
(C)熟地、山茱萸、枸杞子、菟絲子 (D)熟地、枸杞子、菟絲子、當歸
- 40 不考慮藥物的劑量與炮製方式，下列何方不包含調胃承氣湯（大黃、芒硝、甘草）？
(A)《宣明論方》防風通聖散 (B)《溫病條辨》新加黃龍湯
(C)《金匱要略》大黃牡丹湯 (D)《傷寒論》桃核承氣湯
- 41 有關麻黃之敘述，下列何者正確？
(A)治脾胃虛弱泄瀉之聖藥 (B)足陽明、太陰之引經藥
(C)風病、血病、瘡家聖藥 (D)太陽經藥，專入肺經
- 42 下列何藥物誤食過量會造成肢體麻木、顫動、驚厥等症狀？
(A)蟾酥 (B)馬錢子 (C)大風子 (D)樟腦
- 43 有關防己（粉防己、廣防己）之功能敘述，下列何者最不宜？
(A)鎮痛，消炎，利尿 (B)通腠理，利九竅
(C)為療風水之要藥 (D)瀉上焦氣分濕熱
- 44 下列藥物之敘述，何者錯誤？
(A)桑寄生用於妊娠血虛，胎動不安，胎漏下血，以其補腎養血
(B)桑枝用於風濕痺痛，關節酸痛，四肢拘急，以其祛風通絡
(C)松節用於婦女經痛，陰虛血燥，歷節風痛，以其祛風燥濕
(D)豨薟草用於疔瘡癰腫，濕熱瘡毒，風疹濕癢，以其清熱解毒
- 45 有關桂皮主治，下列敘述何者最宜？
(A)產後血熱，陰虛火旺 (B)痰嗽咽痛，血虛內燥
(C)嘔吐噁心，腸鳴腹瀉 (D)精虧血少，肝盛火起

- 46 下列藥物之敘述，何者錯誤？
(A)公丁香為丁香樹的乾燥果實 (B)母丁香效用與公丁香相近，但氣味較淡，作用較弱
(C)丁香可治牙痛 (D)丁香為溫中降逆之要藥
- 47 下列何藥具有利濕濁，祛風濕，可用於尿道炎、膀胱炎、風濕腰膝痠痛？
(A)威靈仙 (B)草薢 (C)秦艽 (D)海金沙
- 48 有關赤小豆的敘述，下列何者最適當？
(A)即一般食用紅豆 (B)為豆科植物相思子的種子
(C)可治產婦缺乳 (D)可治小兒蟲積
- 49 佩蘭最適當的功效為何？
(A)芳香健胃、發汗藥 (B)芳香健胃、鎮痛藥 (C)芳香健胃、行氣止痛 (D)芳香健胃、安胎藥
- 50 下列何藥具有溫中散寒，順氣止痛的功效？
(A)細辛 (B)烏藥 (C)附子 (D)香附
- 51 有關地膚子的功效，下列何者錯誤？
(A)清熱利水 (B)除濕止癢 (C)燥濕健脾 (D)益精強陰
- 52 有關茵陳蒿的敘述，下列何者最不適宜？
(A)可用於風濕瘙癢 (B)可用於濕熱薰蒸的陽黃
(C)可用於寒濕鬱滯的陰黃 (D)可用於脾虛食滯的虛黃
- 53 下列何藥具清熱利濕，利膽退黃，涼血解毒？
(A)蘆薈 (B)北柴胡 (C)茵陳蒿 (D)山梔子
- 54 下列何種組合中，兩藥物基原之科別不同？
(A)人參、西洋參 (B)黃花地丁、紫花地丁 (C)赤芍、白芍 (D)白朮、蒼朮
- 55 下列何藥屬清熱燥濕藥，性味苦寒澀？
(A)白鮮皮 (B)秦皮 (C)地骨皮 (D)黃柏
- 56 下列何藥具清熱涼血，調經安胎？
(A)赤芍 (B)茜草 (C)牡丹皮 (D)生地黃
- 57 石膏與知母為用，增強清裏熱為下列何種之配伍？
(A)相須 (B)相使 (C)相惡 (D)相畏
- 58 下列何藥為芳香健胃、驅風藥？
(A)薄荷 (B)秦艽 (C)荊芥 (D)白豆蔻
- 59 有關三稜的敘述，下列何者錯誤？
(A)為莎草科荊三稜的乾燥塊莖 (B)切片生用或醋制後用
(C)醋制能加強祛瘀止痛之功 (D)能破血行氣，化痰止咳
- 60 有關側柏葉的功能，下列何者正確？
(A)喉痛 (B)目翳 (C)一切血證 (D)一切風證
- 61 長於促進骨折愈合，傷科續接筋骨要藥為何？
(A)自然銅 (B)牛膝 (C)乳香 (D)沒藥
- 62 下列何者不屬於雞血藤的主治？
(A)痛經經閉 (B)手足麻木 (C)風濕痺痛 (D)水腫淋症
- 63 關於止血藥物的臨證應用，下列何者錯誤？
(A)治療血熱妄行而致出血者，使用止血藥物時可以配伍清熱涼血藥
(B)治療陰虛陽亢而致出血者，使用止血藥物時可以配伍滋陰潛陽藥
(C)治療出血病證，不論有無瘀血，使用止血藥物時絕不可配伍行氣活血藥物
(D)治療出血病證，應根據出血原因和臨床證候，選用相應止血藥物並適當配伍藥物

- 64 下列何藥用於痛經、血滯經閉、產後瘀滯腹痛、癥瘕、跌打損傷等證，為血熱瘀滯時，具有潤降之功？
(A)桃仁 (B)丹參 (C)牛膝 (D)紅花
- 65 有關白朮的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)安神增智 (B)補氣健脾 (C)燥濕利水 (D)止汗、安胎
- 66 有關狗脊的功效敘述，下列何者錯誤？
(A)補肝腎 (B)強筋骨 (C)安胎 (D)祛風寒濕痺
- 67 有關黃精的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)脾虛有濕 (B)咳嗽痰多 (C)肺虛燥咳 (D)中寒泄瀉
- 68 下列何藥具有補益精血，截瘡，解毒，潤腸通便之功效？
(A)何首烏 (B)肉蓯蓉 (C)蜂蜜 (D)阿膠
- 69 下列何種補陰藥具有養陰清肺，化痰之功效？
(A)桑椹 (B)女貞子 (C)沙參 (D)墨旱蓮
- 70 山藥用治下消，配伍下列那組藥物最適宜？
(A)天花粉、麥門冬及知母 (B)生地黃、熟地黃、五味子及山萸肉
(C)白朮、蒼朮、茯苓及烏藥 (D)生石膏、葛根及知母
- 71 下列何藥用治血淋，係取其散瘀止血之功效？
(A)白茅根 (B)石韋 (C)燈心草 (D)琥珀
- 72 下列何藥取其開胃進食功效同黃連、茯苓等配伍用治噤口痢？
(A)石菖蒲 (B)遠志 (C)蘇合香 (D)冰片
- 73 有關平肝息風藥物，下列何者具有化痰散結之功效？
(A)天麻 (B)地龍 (C)僵蠶 (D)全蠍
- 74 石決明為治目疾之要藥，可與龍膽草、決明子、菊花等藥用於因何引起的目赤腫痛？
(A)肝虛血少 (B)風熱 (C)肝火上炎 (D)肝腎陰虛
- 75 蜈蚣除了熄風止痙、解毒散結之外還具有下列何種作用？
(A)通絡止痛 (B)化痰開竅 (C)定驚平喘 (D)清肝明目
- 76 下列藥物何者可治驚悸失眠，收斂生肌，創面久不癒？
(A)兒茶 (B)紫草 (C)珍珠 (D)白及
- 77 下列何者單品炒焦研末，頻服，可治盜汗及虛汗不止？
(A)麻黃根 (B)浮小麥 (C)山茱萸 (D)五味子
- 78 下列何者最不常用於婦女崩漏下血的應用？
(A)茜草炭 (B)白及粉 (C)側柏葉 (D)棕櫚炭
- 79 下列敘述何者錯誤？
(A)治療濕熱瀉痢，肉豆蔻要煨熟去油使用
(B)山茱萸腎陰虛和腎陽虛皆可用
(C)金櫻子單用或與芡實合用可治下焦不固的證候
(D)訶子澀腸止瀉，還能下氣消脹
- 80 有關蓮子及相關藥材的敘述，下列何者錯誤？
(A)蓮子為睡蓮科植物蓮的乾燥成熟種仁
(B)蓮子配伍沙苑子、龍骨、牡蠣、蓮鬚等同用，可治遺精滑精等證
(C)荷葉能清暑利濕，升陽止血
(D)蓮鬚為蓮藕的鬚根