

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2101
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(一)

科 目：中醫基礎醫學(二) (包括中醫方劑學、中醫藥物學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 38 歲女性，證見腹痛，大便秘結，脇下偏痛，發熱，手足厥逆，舌苔白膩，脈弦緊。下列方劑何者最適宜？
(A)《傷寒論》大承氣湯 (B)《金匱要略》大黃附子湯
(C)《景岳全書》濟川煎 (D)《溫病條辨》新加黃龍湯
- 2 有關《傷寒論》麻黃湯及《此事難知》九味羌活湯之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩方皆為辛溫發汗劑
(B)對於外感風寒所造成之身疼痛，兩方均有效果
(C)九味羌活湯去濕效果較麻黃湯為強
(D)因九味羌活湯中有生地，故亦可適用於陰虛外感；而麻黃湯僅能用於風寒外感
- 3 下列何者非《傷寒論》小青龍湯與大青龍湯共同之組成藥物？
(A)麻黃 (B)桂枝 (C)杏仁 (D)甘草
- 4 下列何者為《溫病條辨》桑菊飲與銀翹散共同之組成藥物？
(A)甘草、桔梗 (B)連翹、竹葉 (C)荊芥穗、蘆根 (D)薄荷、杏仁
- 5 患者大便多日不解，曾給麻子仁丸無效，今證見脘腹脹滿，口乾唇燥，舌紅苔黃，脈細數。治以下列何者最適宜？
(A)大承氣湯 (B)小承氣湯 (C)增液承氣湯 (D)調胃承氣湯
- 6 有關方劑之敘述，下列選項何者正確？①大黃牡丹皮湯與桃核承氣湯之組成藥物均含大黃、芒硝、桃仁 ②大黃牡丹皮湯之功用為瀉熱破瘀，散結消腫 ③桃核承氣湯之功用為破血下瘀
(A)僅① (B)僅①② (C)僅②③ (D)①②③
- 7 有關方劑之敘述，下列選項何者正確？①麻子仁丸之功用為潤腸瀉熱，行氣通便；調胃承氣湯之功用為緩下熱結 ②麻子仁丸之方劑辨證為腸胃燥熱，津液不足；調胃承氣湯之方劑辨證為陽明病腸胃燥熱 ③麻子仁丸之組成含調胃承氣湯
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 8 有關《脾胃論》升陽益胃湯，下列敘述共幾項正確？①本方須加酒煎服，以助益氣升陽之力 ②本方所治之證，係由於脾胃虛弱，濕熱滯留中焦所造成 ③本方組成藥物以黃耆劑量最大 ④方中升麻、柴胡助黃耆升提下陷中氣
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 9 有關《校註婦人良方》仙方活命飲，下列敘述共幾項正確？①本方治療瘡瘍腫毒既可內服亦可外敷 ②前人譽本方為「瘍門開手攻毒之第一方」 ③本方以活血潰堅，消腫止痛，清熱解毒為主 ④癰疽已潰者，使用本方可加速傷口收斂
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 10 有關《景岳全書》左歸丸，下列敘述共幾項正確？①本方由六味地黃丸去澤瀉、茯苓、丹皮加入龜板膠、鹿角膠、枸杞子、菟絲子、牛膝而成 ②此方為「純甘壯水」之劑，有補無瀉 ③本方以陰柔滋潤之品為主組成，久服易滯脾礙胃 ④本方是「陰中求陽」之劑
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- 11 下列敘述有幾項忌用《傷寒論》白虎湯？①表證未解，無汗，發熱，口渴者 ②脈浮弦而細者 ③血虛發熱，脈洪不勝重按者 ④陰盛格陽者
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 12 76 歲男性支氣管擴張症患者，證見咳嗽，痰中帶血，咽喉燥痛，手足心熱，骨蒸盜汗，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最適宜？
(A)《小兒藥證直訣》瀉白散 (B)《丹溪心法》咳血方
(C)《慎齋遺書》百合固金湯 (D)《蘭室秘藏》當歸六黃湯
- 13 有關藥物劑量比例，下列敘述共幾項正確？①《內外傷辨惑論》當歸補血湯中黃耆與當歸的比例為 5：1 ②《丹溪心法》左金丸中黃連與吳茱萸的比例為 6：1 ③《傷寒直格》天水散中滑石與甘草的比例為 6：1 ④《內外傷辨惑論》枳朮丸中枳實與白朮比例為 1：2
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 14 有關炙甘草湯中桂枝、生薑配伍炙甘草的作用，下列選項何者正確？①辛甘化陽 ②溫心陽 ③調和衛氣 ④溫通血脈
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 15 54 歲方先生來診時，主訴罹患潰瘍性結腸炎已多年，近年來多次因腹痛腹瀉血便住院，大腸鏡檢顯示在升結腸處有大範圍發炎性潰瘍，最近一次住院在三個月前，因腹痛腹瀉，伴血液黏液便一日 20 多行而住院。經類固醇治療後，病情改善出院，但仍腹瀉日 8~9 行，雖已無膿血便，但整天都覺疲倦無力，稍微進食則腹絞解出溏水便，偶爾肛門會滲便。出院後至今體重已持續下降 10 公斤。望之面容憔悴，聞之語音低而無力，按之腹軟無壓痛。食慾不振，每餐只吃半碗稀飯，連步行也覺氣短促，血壓：100/56 mmHg，舌苔白，舌質淡，脈沉緩無力。依中醫辨證論治原則選擇處方，下列方劑何者最適當？
(A)半夏瀉心湯 (B)補脾胃瀉陰火升陽湯
(C)胃苓湯 (D)真人養臟湯
- 16 有關《蘭室秘藏》清胃散的方義與臨床應用，下列敘述何者錯誤？
(A)主治胃火牙痛，牙痛牽引頭痛，牙齦潰爛或出血，或唇口腮頰腫痛，口乾口臭
(B)方中以黃連清瀉胃火為君藥
(C)以葛根升陽明胃中津液；配黃連，則熱降而清升
(D)以當歸養血和血；以牡丹皮、生地養陰涼血，除血中伏火
- 17 下列何方劑的組成含有碧玉散？
(A)蒿芩清膽湯 (B)甘露消毒丹 (C)藿朴夏苓湯 (D)黃芩滑石湯
- 18 下列何方劑主治衛陽不固，導致津液外泄，夜臥尤甚的汗症？
(A)桂枝湯 (B)玉屏風散 (C)牡蠣散 (D)當歸六黃湯
- 19 48 歲女性更年期患者，出現潮熱，盜汗嚴重，伴有面赤心煩、口乾舌紅，脈數。治以下列何方最適宜？
(A)逍遙散 (B)牡蠣散 (C)白虎湯 (D)當歸六黃湯
- 20 陽虛血脫，證見惡寒脈微而復利，利止、亡血者。治以下列何方最適宜？
(A)乾薑附子湯 (B)當歸四逆湯 (C)陽和湯 (D)四逆加人參湯
- 21 下列何方之治法以邪正兼顧，清、滋、透等三法兼施？
(A)滋燥養榮湯 (B)秦艽鱉甲散 (C)大補陰丸 (D)清燥救肺湯
- 22 有關《丹溪心法》越鞠丸，下列敘述何者錯誤？
(A)製服法：為末，水泛為丸如綠豆大，溫開水配服
(B)此方可運用治療婦女痛經、肝炎、消化性潰瘍疾病
(C)其組成的六味藥物分別對氣、血、痰、火、濕、食此經常引起鬱病的六因作治療
(D)原方組成藥物的劑量等分，可針對病因偏重加減

- 23 43 歲婦女，月經點滴不淨已 6 週，其血色黯淡，伴隨納少倦怠，四肢不溫。面色萎黃，舌淡苔白，脈沉細無力。治以下列何方最適宜？
(A)《濟生方》歸脾湯 (B)《脾胃論》補中益氣湯
(C)《金匱要略》黃土湯 (D)《傷寒論》芎歸膠艾湯
- 24 下列何藥是《十藥神書》十灰散及《普濟本事方》槐花散共有的組成？
(A)牡丹皮 (B)棕櫚皮 (C)側柏葉 (D)荊芥穗
- 25 有關《傷寒論》桃核承氣湯，下列敘述何者正確？
(A)本方由大承氣湯加桃仁、桂枝而組成
(B)可以治療邪在太陽不解，循經入腑化熱，結於下焦之太陽蓄水證
(C)芒硝軟堅散結，需後下，與桂枝共為方中次藥
(D)大黃酒制以加強其化瘀之力，與炙甘草同用，可緩其峻烈之性
- 26 治胸痹之方劑有枳實薤白桂枝湯、瓜蒌薤白白酒湯、瓜蒌薤白半夏湯，下列敘述共幾項正確？①三方皆有通陽散結，行氣祛痰之效 ②瓜蒌薤白半夏湯，主治下氣祛寒，消痞除滿 ③瓜蒌薤白白酒湯，專以理氣活血 ④枳實薤白桂枝湯，祛痰散結降逆力較大
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 27 有關定喘湯，下列敘述何者錯誤？
(A)治表寒裏熱之咳喘證 (B)桑白皮清肺熱
(C)蘇子降肺氣 (D)與小青龍湯皆治風寒外束、痰壅於肺之咳喘證
- 28 下列藥物中有幾項為《傅青主女科》生化湯之組成？①當歸 ②川芎 ③炮薑 ④桃仁 ⑤炙甘草 ⑥赤芍
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
- 29 有關《素問病機氣宜保命集》大秦朮湯，下列敘述何者錯誤？
(A)主治風邪初中經絡，舌強不能言語，手足不能運動
(B)方中劑量最大者為藥性辛溫的秦朮
(C)方中搭配當歸、白芍和熟地養血柔筋
(D)方中使用白朮、茯苓益氣健脾，以助氣血生化之源
- 30 有關《溫病條辨》三仁湯與《溫熱經緯》甘露消毒丹，下列敘述何者錯誤？
(A)兩者皆為處理濕熱在氣分的處方
(B)前者主治濕重於熱之證；後者主治濕熱並重之證
(C)兩方組成皆有白豆蔻和滑石
(D)後者組成以用量最大的三味藥：滑石、茵陳、連翹為君藥
- 31 有關《金匱要略》苓桂朮甘湯，下列敘述何者錯誤？
(A)原文主治「心下有痰飲，胸脇支滿，目眩」
(B)與《金匱要略》腎着湯原方所用茯苓劑量相同
(C)本方溫而不熱，利而不峻，符合「病痰飲者，當以溫藥和之」原則
(D)與《金匱要略》茯苓桂枝甘草大棗湯原方所用茯苓劑量相同
- 32 14 歲男國中生，因連續幾天吃太多冷飲甜品，導致脘腹脹滿，吃不下飯，噁心想吐，頻頻打嗝嘔酸水，自覺四肢沉重，倦怠嗜睡，診其舌苔白厚膩，脈濡。治以下列何方較適宜？
(A)香薷、扁豆、厚朴 (B)陳皮、半夏、茯苓、甘草
(C)厚朴、甘草、陳皮、蒼朮 (D)陳皮、白朮、芍藥、防風
- 33 《丹溪心法》二妙散主治濕熱走注，筋骨疼痛，加入下列何者而成《醫學正傳》三妙散？
(A)薏仁 (B)滑石 (C)茵陳 (D)牛膝

- 34 有關五苓散，下列敘述何者錯誤？
(A)腎虧脾損而小便已利者，不宜使用 (B)溫病高熱傷津者，慎用
(C)濕熱者，忌用 (D)宜長期服用
- 35 臨床上常以《傷寒論》苓桂朮甘湯與《醫學心悟》半夏白朮天麻湯治療眩暈，下列敘述何者正確？
(A)苓桂朮甘湯所治之證為腎陽不足、飲停心下 (B)半夏白朮天麻湯所治之證為寒痰上擾清竅
(C)苓桂朮甘湯長於溫補腎陽、化飲利水 (D)半夏白朮天麻湯長於化痰熄風、健脾燥濕
- 36 臨床上常用消食化滯的方劑，下列敘述何者正確？
(A)《儒門事親》木香檳榔丸主治胸脘痞滿、不思飲食之證
(B)《內外傷辨惑論》枳實導滯丸是從《傷寒論》半夏瀉心湯和《內外傷辨惑論》枳朮丸化裁而成
(C)《太平惠民和劑局方》肥兒丸組成中含有使君子一味有下氣驅蟲之功
(D)《證治準繩》健脾丸和《內外傷辨惑論》枳朮丸均是消補兼施之劑。但前者健脾消食之力小於後者
- 37 有關王孟英之清暑益氣湯與李東垣之清暑益氣湯的比較，下列敘述何者正確？
(A)王孟英之清暑益氣湯主治夏月感暑、濕困傷脾之證
(B)李東垣之清暑益氣湯主治夏月感暑、濕困脾傷之證
(C)兩者皆以人參、黃耆來益氣固表
(D)兩者皆以石斛、麥冬來養陰生津
- 38 有關方中的主藥，下列敘述何者錯誤？
(A)消瘰丸—牡蠣 (B)新加香薷飲—香薷
(C)清氣化痰丸—膽星 (D)五積散—麻黃、白芷、乾薑、肉桂
- 39 30 歲女性，平素健康，主訴咳嗽三日，無發熱惡寒，痰黃黏稠，胸悶氣促，口燥咽乾，但無咽痛，二便尚可，舌苔黃膩，脈滑數。治以下列何者最適宜？
(A)白果、麻黃、蘇子、甘草、款冬花、杏仁、桑白皮、黃芩、半夏
(B)冬桑葉、石膏、人參、甘草、胡麻仁、阿膠、麥門冬、杏仁、枇杷葉
(C)瓜蒌仁、陳皮、黃芩、半夏、杏仁、枳實、茯苓、膽南星、半夏
(D)貝母、瓜蒌、花粉、茯苓、陳皮、桔梗
- 40 下列何者為溫膽湯之運用主證？
(A)咳嗽痰稠色黃，不易咯出，苔黃膩，脈滑數
(B)膽胃不和，痰熱內擾，虛煩不眠，驚悸不寧，舌苔白膩微黃，脈弦滑
(C)眩暈嘔噁，舌苔白膩，脈弱
(D)胸痛，喘息短氣，舌苔白膩，脈弦緊
- 41 麻黃用於外感風寒初起表實證，下列何者最不宜？
(A)發熱汗出 (B)惡寒發熱 (C)頭身疼痛 (D)脈浮緊
- 42 服用生薑，下列敘述何者最不宜？
(A)食薑日久，積熱患目
(B)風寒表證重者，最宜單用
(C)病瘥人多食兼酒，立發甚速；癰瘡人多食，則生惡肉
(D)搗汁和黃明膠煎，貼治風濕痺痛
- 43 有關獨活的主治，下列敘述何者最宜？
(A)風寒濕痺，腰膝酸痛，四肢拘攣 (B)風寒夾濕，頭痛身痛，陰虛內熱
(C)產後腹痛，氣血兩虛，引及腰背 (D)腰腿疼痛，兩足痿痺，陰虛血燥
- 44 有關海桐皮的主治，下列敘述何者最不宜？
(A)跌打損傷，血虛腫痛 (B)風濕痺痛，四肢拘攣
(C)痺痛日久，肝腎不足 (D)風蹶頑痺，目赤牙蟲

- 45 有關葶藶散的主治，下列敘述何者最不宜？
(A)寒鬱中焦，心腹刺痛，呃逆嘔吐 (B)久瀉不止，臍腹遇寒，冷痛劇烈
(C)反胃嘔吐，腸鳴泄瀉，寒疝腹痛 (D)食滯不化，飽脹不納，肺熱咳嗽
- 46 用於風寒濕邪侵襲所致的肢節疼痛、肩背酸痛，腰以上風濕痺證能祛風勝濕，散寒止痛的藥物為下列何者？
(A)薑黃 (B)羌活 (C)蔓荊子 (D)防風
- 47 下列何藥配伍蘇梗、白朮，可用於氣滯之胎動不安？
(A)砂仁 (B)陳皮 (C)佩蘭 (D)艾葉
- 48 下列何藥最適合用於風寒濕痺，腳膝腫痛，痿軟無力？
(A)白豆蔻 (B)砂仁 (C)蒼朮 (D)厚朴
- 49 有關茯苓的功效，下列敘述何者正確？
(A)利水滲濕，寧心安神 (B)清肝明目，清肺化痰
(C)利尿通淋，殺蟲止癢 (D)利尿通淋，祛濕斂瘡
- 50 下列何藥最宜用於濕熱困脾，濁氣上犯所致口中甜膩、口臭多涎之「脾瘴」證？
(A)連翹 (B)佩蘭 (C)澤瀉 (D)燈心草
- 51 下列何藥為蕨類孢子，具有清熱利水，通淋排石作用？
(A)狗脊 (B)石韋 (C)海金沙 (D)茯苓
- 52 下列何藥常與延胡索配伍，用於肝氣鬱滯或肝胃不和所致的脇肋作痛？
(A)川楝子 (B)白芍 (C)五靈脂 (D)荔枝核
- 53 下列何藥用於肺胃氣分實熱之證？
(A)馬齒莧 (B)龍膽草 (C)蘆根 (D)地黃
- 54 下列何藥具清熱解毒，涼血，消斑，且善清肝肺胃鬱火？
(A)青黛 (B)紫草 (C)茜草 (D)黃連
- 55 下列何藥用於實熱證外，也可用於陰虛火旺證？
(A)黃芩 (B)黃連 (C)黃柏 (D)龍膽草
- 56 下列何藥甘淡性寒，能清心降火，滲濕利尿，除煩止渴，用於口舌生瘡，熱淋澀痛及熱病津傷，心煩口渴？
(A)淡竹葉 (B)澤瀉 (C)茯苓 (D)黃連
- 57 下列何者為生地黃之功效？
(A)清熱涼血，活血散瘀 (B)清熱涼血，養陰生津
(C)清熱涼血，化斑解毒 (D)清熱解毒，涼血止痢
- 58 關於夏枯草之療效，下列敘述何者錯誤？
(A)治療癰和癭瘤之常用藥 (B)治肝火上炎所致的頭痛、頭暈要藥
(C)治肝虛眼珠疼痛，夜間尤劇 (D)用於血熱妄行的吐血、衄血
- 59 白茅根除能去伏熱、消瘀血，又能利小便外，另一特殊功用為何？
(A)安胎 (B)補腎 (C)消癭瘤 (D)清肺胃熱
- 60 用於血瘀之心腹諸痛，跌打損傷，瘀腫疼痛，風濕痺痛，以及癰疽疔瘡，外用有消腫生肌之功，常與乳香相須為用的藥物為下列何者？
(A)五靈脂 (B)穿山甲 (C)三七 (D)沒藥
- 61 有關艾葉的主治，下列敘述何者正確？①治目痛，頭風 ②治吐、衄、崩帶 ③治霍亂轉筋 ④治癰 ⑤治產後瘀血未盡
(A)①②③ (B)①②⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- 62 下列何藥主治風熱目赤，赤白泄痢，五痔腸風，吐崩諸血？
(A)槐花 (B)槐實 (C)蔓荊子 (D)茜草

- 63 下列何藥具有瀉下、逐水、去積、殺蟲、墮胎的功效？
(A)番瀉葉 (B)芒硝 (C)牽牛子 (D)商陸
- 64 有關薑科藥材，下列敘述何者錯誤？
(A)鬱金有利膽退黃之效
(B)薑黃能外散風寒，內行氣血，長於行肢臂而活血利痹止痛
(C)莪朮能破血行氣，行氣消積之力較三稜強
(D)鬱金、薑黃、莪朮三者非為同科植物
- 65 有關補骨脂的功效，下列敘述何者錯誤？
(A)安胎 (B)溫補腎陽 (C)固精縮尿 (D)溫脾止瀉
- 66 下列何藥具有滋陰潤燥潤肺、補血安胎、止血之功效？
(A)當歸 (B)何首烏 (C)阿膠 (D)黃芩
- 67 下列何藥具有溫脾開胃、暖腎固精、縮尿之功效？
(A)骨碎補 (B)益智仁 (C)杜仲 (D)續斷
- 68 下列何藥具有補中益氣、養血安神、緩和藥性之功效？
(A)甘草 (B)山藥 (C)大棗 (D)扁豆
- 69 下列何藥具有補腎強骨、生肌、活血止痛、續筋骨、止血之功效？
(A)肉蓯蓉 (B)益智仁 (C)補骨脂 (D)骨碎補
- 70 下列何藥最適用於滋陰潛陽、益腎強骨、養血補心？
(A)龜甲 (B)牡蠣 (C)杜仲 (D)鹿茸
- 71 下列何藥外用，可收濕斂瘡？①龍骨 ②烏賊骨 ③赤石脂
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 72 下列何藥用於癥瘕經閉，係取其軟堅散結之功？
(A)麝香 (B)乳香 (C)鱉甲 (D)琥珀
- 73 下列何藥可用於心腹疼痛、跌打損傷及痹證諸痛？
(A)續斷 (B)麝香 (C)骨碎補 (D)王不留行
- 74 有關化痰止咳平喘藥，下列敘述何者錯誤？
(A)用於內傷、外感所引起的咳嗽和喘息
(B)用於痰多咳嗽或痰飲氣喘，咯痰不爽之證
(C)癲癇驚厥、癰瘤瘰癧、陰疽流注等證不用化痰藥治之
(D)麻疹初期的咳嗽，不宜用溫性或帶有收斂性質的化痰止咳藥止咳
- 75 下列何藥配地骨皮可入氣分瀉肺中實熱，入血分清肺中伏火；配大腹皮可瀉肺下氣行水？
(A)石榴皮 (B)青皮 (C)桑白皮 (D)茯苓皮
- 76 下列何藥能宣肺、祛痰、利咽、排膿？
(A)桔梗 (B)杏仁 (C)百合 (D)麥門冬
- 77 關於雞內金與穀芽的比較，下列敘述何者正確？
(A)皆可回乳消脹 (B)皆具活血散瘀之功 (C)皆可用於小兒疳積 (D)皆可澀精止遺
- 78 有關蛇床子的臨床應用，下列何者不適宜？
(A)腎陰不足，下焦濕熱 (B)男子腎虛陽痿
(C)寒濕帶下、白帶 (D)女子陰部濕癢、濕疹
- 79 有關訶子，下列敘述何者錯誤？
(A)用於久瀉、久痢 (B)能斂肺利咽 (C)澀腸止瀉，宜煨用 (D)止咳開音，宜蜜炙
- 80 有關桑科藥材，下列敘述何者錯誤？
(A)桑白皮能利尿消腫
(B)桑椹酸甘能斂，可用於大便溏泄
(C)桑枝能祛風濕、利關節，行水氣，治腳氣浮腫
(D)桑葉能疏散風熱，清肺潤燥，清肝明目