

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 肺膿瘍，桔梗杏仁煎比較適用於下列那一期之治療？
(A)初期 (B)成癰期 (C)潰膿期 (D)恢復期
- 2 感冒是感受觸冒風邪所導致的外感疾病，下列診治原則何者錯誤？
(A)感冒偏寒偏熱俱不明顯時，可與辛平輕劑
(B)感冒無論虛實之人，禁用補益之品，以免留邪
(C)時行感冒傳染力強，以風熱為多見，治療時除應去風之外，當重用清熱解毒之品
(D)風溫之為病，以風熱感冒見證為主
- 3 65 歲男性患者，罹患支氣管擴張症，平日咳嗽痰少，痰中帶血，晚上睡眠時盜汗，手足心煩熱，脈細數，舌紅、苔少、津少。治以下列何方最適宜？
(A)百合固金湯 (B)清氣化痰湯 (C)補肺湯 (D)六味地黃丸
- 4 65 歲患者有多年抽菸史合併支氣管擴張病史，主訴咳嗽、痰多、黏稠、色黃已多月，伴隨胸中脹痛煩熱，口渴、喜冷飲，望其面紅有汗，呼吸喘咳氣湧，舌質紅苔黃，脈滑數。下列證型何者最適合？
(A)痰熱鬱肺 (B)痰濕壅肺 (C)風熱犯肺 (D)表寒裏熱
- 5 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)麻杏石甘湯 (B)桑菊飲 (C)桑白皮湯 (D)二陳湯合三子養親湯
- 6 55 歲男性患者，來診時主訴乾咳、咽喉癢已一月，其痰黏，常有血絲，此時胸脇牽引疼痛，同時出現腹部有灼熱感，大便泄瀉、味道臭穢，肛門灼熱感。治以下列何方最適宜？
(A)阿膠黃芩湯 (B)麻杏石甘湯 (C)半夏瀉心湯 (D)芎芷石膏湯
- 7 75 歲江先生因缺血性心臟病致左心充血性衰竭就診，症見心悸喘甚，肢厥冷汗，神智淡漠，面色唇甲青紫，脈沉微欲絕。治以下列何方最適合？
(A)人參黃耆湯 (B)栝蔞薤白白酒湯 (C)血府逐瘀湯 (D)參附湯
- 8 有關喘證歷史沿革，下列敘述何者錯誤？
(A)《黃帝內經》一書最早記載喘的名稱，症狀表現及病因病機
(B)漢代張仲景《傷寒論》、《金匱要略》提及喘在肺屬實，在腎屬虛的概念
(C)朱丹溪《脈因證治》謂喘有虛實，「實喘氣實肺盛」，「虛喘由腎虛」
(D)張景岳及清代葉天士提出喘證的證治綱領結論為在肺為實，在腎為虛
- 9 50 歲男性患者，主訴高血壓病史近 5 年，西藥不規則服用，血壓：160/100 mmHg，其症狀有頭痛頭重，胸脘痞滿，嘔噦痰涎等，舌淡紅苔白膩，脈弦滑。治以下列何方最適宜？
(A)濟生腎氣丸 (B)天麻鉤藤飲 (C)半夏天麻白朮湯 (D)知柏八味丸
- 10 65 歲男性患者，平素患有慢性阻塞性肺病已 10 年，近 1 週來胸脘痞滿漸作，並有形寒肢冷，小便短少，下肢浮腫，噁心吐涎，心悸，喘促難以平臥，眩暈，渴不欲飲等症狀，視其舌苔白滑，切其脈弦滑。下列診斷何者最適宜？
(A)痰濕壅肺 (B)水飲凌心 (C)脾肺氣虛 (D)心陽不振
- 11 45 歲女性患者，主訴心悸已 1 月餘，並有月經量過少的情形，兼見手足心熱，少寐多夢，頭暈耳鳴，腰痠，脈細數，舌紅，苔薄黃。下列診斷何者最適宜？
(A)心陽不振 (B)陰虛火旺 (C)氣陰兩虛 (D)心虛膽怯
- 12 承上題，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝甘草龍骨牡蠣湯 (B)炙甘草湯
(C)黃連阿膠湯 (D)安神定志丸

- 13 52 歲王女士，主訴近數月來大便乾硬，如羊屎狀，頭暈耳鳴，心煩失眠，潮熱盜汗，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最適當？
(A)增液承氣湯 (B)濟川煎 (C)六磨湯 (D)大黃附子湯
- 14 50 歲李先生職業為業務員，數日前感冒，出現頭痛、鼻塞、惡寒發熱，醫師投以涼膈散治療後，出現腹滿時痛，改以下列何方治療最適當？
(A)桂枝湯 (B)桂枝加芍藥湯 (C)附子理中湯 (D)理中湯
- 15 45 歲男性患者之前喜食燒烤及烈酒，近來體重明顯減輕，進食時覺吞嚥困難，在食道內有阻塞感，大便如常。下列病證何者最適當？
(A)鎖喉風 (B)梅核氣 (C)反胃 (D)噎膈
- 16 58 歲蘇先生，平日經常跑銀行及應酬，主訴近日壓力大，食多就覺胸脘滿悶，甚則疼痛，情志舒暢則減輕，易噯氣呃逆，口乾，心煩，大便可，舌紅，苔薄白膩，脈弦。治以下列何方最適當？
(A)越鞠丸 (B)左金丸 (C)平胃散 (D)半夏瀉心湯
- 17 關於霍亂，下列敘述何者錯誤？
(A)以起病急驟，上吐下瀉，腹痛或不痛為特徵 (B)其吐瀉物如米泔樣
(C)乾霍亂是霍亂中之輕度證候 (D)因病變起於頃刻之間，揮霍撩亂，故名霍亂
- 18 35 歲陳先生主訴腹瀉已久，日行三、四次，初次解便多在清晨時，解時小腹疼痛，腰酸者。下列證型何者最適當？
(A)肝氣侮脾 (B)寒濕困脾 (C)脾腎陽虛 (D)飲食積滯
- 19 肝病造成的黃疸，多因時氣疫毒、濕熱、寒濕之侵襲、或酒食不節、勞倦內傷等，而引起面黃、目黃、全身皮膚熏黃以及小便黃赤為病徵，其病徵以下列何者最早出現且最晚消失？
(A)面黃 (B)目黃 (C)全身皮膚熏黃 (D)小便黃赤
- 20 54 歲李先生為無黃疸性肝炎患者，主訴症見右脅脹痛，噁心嘔吐，納差，寒熱往來，口苦，大便成形，舌偏紅，苔白，脈弦。以下列何方治之最適當？
(A)小柴胡湯 (B)大柴胡湯 (C)茵陳蒿湯 (D)柴胡疏肝散
- 21 32 歲陳女士懷孕 30 週，妊娠期間解尿灼熱感，小便頻少，澀痛，口乾，大便乾結，手足心熱，腰痠乏力，舌紅、苔薄少，脈細數。治以下列何處方最適當？
(A)扁蓄、瞿麥、木通、滑石、梔子、大黃、金銀花、連翹、車前子、燈心草、甘草梢、烏藥
(B)生地黃、通草、淡竹葉、燈心草、蓮子心、茯神、玄參、五味子、生甘草
(C)知母、黃柏、熟地黃、澤瀉、茯苓、山藥、山茱萸、牡丹皮、玄參、麥冬
(D)仙茅、仙靈脾、巴戟天、黃柏、知母、當歸、蒲公英、地丁草
- 22 某慢性腎衰竭患者，症見面四肢水腫、小便不利、夜尿頻多、色萎黃無華、畏寒、頭暈、倦怠、腰膝痠軟等症狀，脈沉弱，舌淡紅、苔白滑。診斷以下列何者最適合？
(A)脾濕水泛 (B)脾腎陽虛 (C)濕熱下注 (D)風水氾濫
- 23 24 歲洪小姐因小便不暢就診，主訴症狀有小便灼熱感，溲黃赤，有嘴破，心悸，失眠，口乾喜飲，舌尖紅，苔黃，脈數。治則以下列何者最適當？
(A)祛濕通淋 (B)滋陰降火 (C)清心瀉火 (D)健脾益氣
- 24 慢性腎病（CKD）患者，若見神疲乏力，四肢困重，面色無華，噁心嘔吐，厭食腹脹，口膩而甜，舌淡體胖有齒痕、苔厚膩，脈沉細。治以下列何方最適當？
(A)大半夏湯 (B)實脾飲 (C)小建中湯 (D)五苓散
- 25 54 歲蔡女士罹患全身性紅斑性狼瘡（SLE）反覆發作已幾十年，近就診時主訴氣息喘促，語音乏力，動則易喘，心悸，全身乏力，關節疼痛，無法上下樓梯，雙足水腫，苔白滑，質嫩，舌淡紫。急則治其標，治以下列何方最適當？
(A)生脈散 (B)真武湯 (C)定喘湯 (D)養心湯
- 26 60 歲女性長期就診風濕免疫科，口乾、目澀反覆已多年，面色深黑，身倦，眠不安，易緊張焦慮，手部小關節疼痛變天時加重，偶口破，大便秘，舌紅暗，少苔，脈弦細數。下列敘述何者錯誤？
(A)可能的診斷為乾燥症，但無法排除是否合併紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎
(B)加味逍遙散合甘露飲是可以考慮的處方組合
(C)皮膚色深黑有可能是免疫調節劑 plaquenil 之副作用
(D)此屬肝膽濕熱夾瘀

- 27 有關痺證與痿證鑑別，下列敘述何者錯誤？
 (A)四肢均易罹患痺證，痿證多位於下肢
 (B)關節疼痛為痺證主要臨床表現，痿證則是肢體疼痛
 (C)痺證活動正常或有屈伸不利，痿證日久則肌肉萎縮
 (D)痺證辨證首先應辨風寒濕痺與熱痺的不同，痿證主要為肝腎陰虛生內熱和脾胃氣虛及血
- 28 28 歲男性左膝近 2 個月腫脹疼痛甚，合併出現下背痛，腰膝痠痛，左膝疼痛遇冷加重，頻尿，脈沉緊，苔白，舌淡暗紅，抽血可見 ESR：36；RF：<20；Anti-CCP：-；HLA-B27：+。下列敘述何者錯誤？
 (A)必須考慮僵直性關節炎的可能
 (B)此為著痺證
 (C)如果身上出現紅疹脫屑，不能排除有乾癬性關節炎的可能
 (D)治以烏頭湯主之
- 29 下列敘述何者不是過敏反應？
 (A)漆有毒，人有稟性畏漆
 (B)食生蔥令人面生游風
 (C)有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物，才食則丹隨發
 (D)時毒發頤，高腫焮紅疼痛
- 30 24 歲女性患者，有僵直性脊椎炎病史，主訴腰骶部酸楚疼痛，僵硬不適，腰部、胸廓活動受限，晨起明顯，偶有出現下肢關節腫痛，有重滯感，遇陰雨天加重，肢體沉重僵麻，小便不利，舌質淡胖，苔白膩，脈濡緩。治以下列何方最適宜？
 (A)當歸拈痛湯 (B)左歸飲 (C)補陽還五湯 (D)薏苡仁湯
- 31 45 歲張小姐近日發現頸部有腫塊，光滑柔軟，急躁易怒，口苦口乾，舌紅，脈弦數。下列何者診斷最適當？
 (A)氣鬱痰阻 (B)肝火亢盛 (C)心肝陰虛 (D)痰結血瘀
- 32 承上題，下列處方何者最適當？
 (A)一貫煎 (B)四海舒鬱丸 (C)梔子清肝湯 (D)海藻玉壺湯
- 33 38 歲林小姐罹患甲狀腺亢進已多年，就診時症見頸前腫塊經久不消，觸診質硬有結塊，胸悶，納差，腹痞悶，舌有瘀點，苔白膩，脈澀等。辨證以下列何證型最適當？
 (A)氣鬱痰阻 (B)痰結血瘀 (C)肝火亢盛 (D)心肝陰虛
- 34 55 歲陳先生，高血壓病史已 10 年，血壓控制不佳，收縮壓約 150~170 mmHg，舒張壓約 80~95 mmHg，血壓偏高常伴隨高頻耳鳴，近易眠差，頭暈眩，太陽穴不適感，心煩、口乾，胸脅悶脹，腰痠，膝乏力，舌紅、少苔，脈弦。下列診斷何者最適當？
 (A)肝鬱氣滯 (B)肝陽上亢 (C)肝鬱化火 (D)肝腎陰虛
- 35 承上題，下列處方何者最適當？
 (A)柴胡疏肝散 (B)龍膽瀉肝湯 (C)知柏地黃丸 (D)天麻鉤藤飲
- 36 消渴，消中日久，陰津傷耗，腸中液燥，出現大便秘結，下之不通，或是屢下屢結者。治以下列何方最適合？
 (A)大承氣湯 (B)調胃承氣湯 (C)增液承氣湯 (D)麻子仁丸
- 37 52 歲蕭女士近因失眠而就診，主訴近因飲食時間不定時，晚餐延遲，眠時因脘腹痞悶而致眠淺易醒，口乾，呃逆，大便微溏，脈濡滑數，苔白膩，舌紅。治以下列何方最適宜？
 (A)溫膽湯 (B)酸棗仁湯 (C)加味逍遙散 (D)黃連阿膠湯
- 38 失眠，對於厥氣客於五藏六府，則衛氣獨衛其外，不得入於陰所致之目不瞑，《靈樞·邪客》以下列何方劑補其不足，瀉其有餘，進而使陰陽已通，其臥立至？
 (A)半夏湯 (B)雞矢醴 (C)小金丹 (D)生鐵洛飲
- 39 陳先生患有高血壓多年，沒有積極治療，平均血壓都在 160/95 mmHg，有一天突然中風，右半側肢體麻木、乏力，口眼歪斜，但無頭暈頭痛和眩暈耳鳴，而意識清楚。下列診斷何者最適當？
 (A)中經絡，風邪入中證 (B)中經絡，風陽上擾證
 (C)中臟腑，閉證 (D)中臟腑，脫證

- 40 眩暈病證，依《黃帝內經》，「諸風掉眩」，多為下列何臟腑功能失調所致？
(A)肝 (B)心 (C)脾 (D)腎
- 41 地黃飲子最適用於何種證型的中風？
(A)氣虛血瘀之半身不遂 (B)風痰阻絡之言語不利
(C)肝腎虧損之口眼歪斜 (D)肝腎陰虛之風陽上擾
- 42 關於「中風」理論發展史，下列敘述何者錯誤？
(A)唐宋以前以外風學說為主，唐宋以後則以內風立論
(B)王履從病因角度提出「真中」、「類中」
(C)李中梓將中風明確分為「閉、脫」二證
(D)《血證論》首立「補陽還五湯」，至今仍為臨床常用方
- 43 肝癌常見腹水的症狀，像是心下堅滿或痛，自利，利後反快，雖利心下續堅滿；或水走腸間，瀝瀝有聲，腹滿。下列病機何者最適當？
(A)飲留胸脅 (B)邪鬱少陽 (C)寒飲伏肺 (D)飲留腸胃
- 44 62 歲孫先生罹患胃癌，主訴近來突然發作胃痛，惡寒喜暖，脘腹得溫則痛減，遇寒則痛增，喜熱飲。食療衛教以下列何者最適當？
(A)薄荷、蓮藕、橘子 (B)辣椒、花豆、綠豆 (C)生薑、紅糖、胡椒 (D)山楂、蘿蔔、麥芽
- 45 48 歲魏女士罹患肺癌，喘咳不得臥，痰多白沫，遇冷咳痰加重，胸悶，口不渴，體疼痛而沉重，惡寒，脈弦緊，苔白滑。治以下列何方最適當？
(A)苓桂朮甘湯 (B)己椒藶黃丸 (C)小青龍湯 (D)金匱腎氣丸
- 46 因化學藥物治療造成骨髓血液系統的抑制作用，臨床上出現身倦乏力，面唇色白，舌嫩色淡白，脈濡細者。此為下列何證？
(A)肝陽上亢 (B)肝火上炎 (C)氣血兩虛 (D)下焦濕熱
- 47 65 歲何先生主訴小便少，點滴而出，而且平時不痛不灼熱，排尿無力，夜尿頻多。下列診斷何者最適宜？
(A)下焦濕熱 (B)脾氣不升 (C)腎虛命門火衰 (D)肝鬱氣滯
- 48 有關食道癌，下列敘述何者錯誤？
(A)90%以上屬鱗狀細胞癌
(B)臨床常見進行性吞嚥困難、胸骨後疼痛、消瘦等症狀
(C)腫瘤所造成的食道狹窄，中醫稱之為「噎膈」
(D)食道癌病人經放射治療後，臨床最容易表現痰氣交阻型
- 49 下列何病證以《醫宗金鑑》芩連四物湯治療最適當？
(A)更年期—陰虛型 (B)崩漏—血瘀型 (C)月經後期—虛熱型 (D)月經先期—血熱型
- 50 18 歲患者於去年 10 月 8 日來診，自訴平時容易疲倦，食慾不佳，近三次月經來潮日期依序為：8 月 18 日、9 月 8 日、9 月 26 日。月經量穩定，經色淡紅，質清稀，舌質淡紅，舌體胖大有齒痕，苔薄白，脈緩。最宜以下列何者治療？
(A)茯苓、澤瀉、山藥、山茱萸、丹皮、熟地
(B)薄荷、柴胡、白朮、茯苓、當歸、白芍、生薑、炙甘草
(C)阿膠、生地、沙參、麥冬、旱蓮草、女貞子、桑寄生
(D)當歸、升麻、柴胡、黃耆、黨參、白朮、陳皮、大棗、生薑、甘草
- 51 42 歲患者經來量多，色深紅或紫而稠黏，間有小血塊，面紅，口乾，小便黃，舌質紅，苔黃，脈滑數。最宜以下列何者治療？
(A)五靈脂、蒲黃、丹皮
(B)黃耆、白朮、人參、升麻、炙甘草、丹皮
(C)生地、赤芍、黃耆、山藥、茯苓、當歸、川芎
(D)熟地、白芍、阿膠、川芎、黃芩、黃柏、知母、生地、黃連、艾葉、炙甘草
- 52 28 歲王女士，經來前一至二天少腹脹痛，量少不暢，經色黯紫有塊，塊出痛減，拒按，伴胸脇乳脹，舌紫黯，脈弦。最宜以下列何方治療？
(A)溫經湯 (B)丹梔逍遙散 (C)膈下逐瘀湯 (D)艾附暖宮丸

- 53 有關血瘀證型的經行頭痛，下列敘述何者最為恰當？
(A)經後痛增 (B)常痛於巔頂
(C)多伴有經行小腹疼痛喜按 (D)可以《醫林改錯》通竅活血湯治療
- 54 關於崩漏與經閉，下列敘述何者錯誤？
(A)虛者補之，瘀者消之，熱者清之
(B)血虧經閉可進一步發展為血風勞，血枯經閉可進一步發展為風消證
(C)崩漏，若血色紫黑成塊，腹脅脹痛者，屬熱瘀
(D)崩漏：有因憂思傷脾，脾虛不能攝血者；有因中氣下陷，不能固血者；有因暴怒傷肝，肝不藏血而血妄行者
- 55 有關絕經前後諸證的辨證論治原則，下列敘述何者錯誤？
(A)以腎虛為本，治療以補腎溫陽為主 (B)若清熱不宜過於苦寒
(C)若祛寒不宜過於辛熱 (D)不可妄用剋伐，以免犯虛虛之戒
- 56 一育齡期婦人不孕，經來腹痛，量少色黯，經前乳房脹痛，精神抑鬱，煩躁易怒，舌質黯紅，苔薄白，脈弦。下列辨證診斷何者正確？
(A)血瘀不孕 (B)肝鬱不孕 (C)痰濕不孕 (D)腎虛不孕
- 57 患者在泡溫泉後出現帶下量多黃綠質黏，伴隨陰部搔癢的症狀。依中醫辨證，治以下列何方最適宜？
(A)清白散 (B)加味逍遙散 (C)知柏地黃丸 (D)龍膽瀉肝湯
- 58 依《金匱要略》，大黃蟪蟲丸之服法，下列何者正確？
(A)空心服 (B)酒飲服 (C)和茶服 (D)麵湯服
- 59 有關妊娠惡阻發病機理，下列敘述何者正確？
(A)衝脈之氣上逆 (B)任脈之氣虛損 (C)督脈之氣不固 (D)帶脈之氣失攝
- 60 依《醫宗金鑑》，妊娠後，頭面遍身浮腫、小水短少者，屬水氣為病，下列敘述何者正確？
(A)子氣 (B)子腫 (C)子滿 (D)皺腳
- 61 轉胞與子淋的鑑別，最主要在下列何者？
(A)小便熱痛與否 (B)小便頻數與否 (C)小便量之多寡 (D)小便顏色之深淺
- 62 乳房的發育和生理功能與臟腑、經絡、氣血有密切相關。下列何者與乳房的相關性最低？
(A)肝經 (B)心包經 (C)腎經 (D)胃經
- 63 患者產後發生「兒枕痛」之情形，於小腹按壓後會較舒服，惡露量目前偏少，顏色淡紅，排便乾硬。治以下列何方較適合？
(A)腸寧湯 (B)生化湯 (C)四物湯 (D)少腹逐瘀湯
- 64 有關《傳青主女科》兩地湯的組成，下列敘述何者錯誤？
(A)生地 (B)牡丹皮 (C)阿膠 (D)麥門冬
- 65 有關小兒的病理特點，下列敘述何者正確？
(A)形氣未充 (B)臟腑嬌嫩 (C)生機蓬勃 (D)易趨康復
- 66 10 歲兒童感冒咳嗽，出現頻頻咳嗽，痰黃黏稠，面赤咽乾，大便偏軟。依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，治以下列何方最為適宜？
(A)蘇葉、乾葛、前胡、陳皮、半夏、甘草、枳殼、桔梗、赤茯苓
(B)金沸草、前胡、荊芥、細辛、半夏、茯苓、甘草、生薑、大棗
(C)黃芩、大黃、連翹、芒硝、甘草、梔子、薄荷
(D)桑皮、地骨皮、甘草、川貝母、麥冬、知母、桔梗、黃芩、薄荷
- 67 1 歲嬰兒自昨天開始出現體溫 39℃，咳嗽痰多，呼吸急促，鼻翼煽動，口渴煩躁，面色紅赤，咽部紅赤，舌苔薄白微黃，脈浮數。治以下列何方最為適宜？
(A)三拗湯 (B)葱豉湯 (C)麻杏甘石湯 (D)竹葉石膏湯
- 68 兒科四大要證，下列何者正確？①痧 ②疳 ③驚 ④癆
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④

- 69 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》吐證門，腹脹滿，二便不利痞硬疼，發渴思涼吐酸臭，則下列診斷處方何者最適宜？
(A)此屬虛吐，方用丁沉四君子湯 (B)此屬實吐，方用三一承氣湯
(C)此屬寒吐，方用薑橘散 (D)此屬熱吐，方用加味溫膽湯
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，下列何者為兒科痢症之分類？①陰痢 ②痰痢 ③濕痢 ④風痢
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 71 6歲林小妹，自幼兒開始常夜間尿床，少氣懶言，食慾不振，大便溏泄，自汗出，舌質淡，脈無力。治以下列何方最適宜？
(A)菟絲子散 (B)補中益氣湯合縮泉丸
(C)龍膽瀉肝湯 (D)麻黃連翹赤小豆湯
- 72 4歲蔡小妹，據媽媽描述近半年來頻尿反覆發作，經問診小便淋瀝不盡，尿液不清，精神倦怠，眼瞼微浮，面色蒼黃，食慾不振，大便稀薄，手足不溫，舌質淡紅，脈細無力。治以下列何方最適宜？
(A)滑石、生甘草梢 (B)山藥、烏藥、益智仁
(C)黃耆、白朮、防風 (D)白朮、桂枝、豬苓、澤瀉、茯苓
- 73 關於水痘病情有輕重之分，下列敘述有幾項正確？①皮疹稀疏為輕，皮疹密為重 ②瘡頂厚為輕症，瘡頂薄為重症 ③水痘漿液清澈晶亮為輕症，漿液混濁為重症 ④根盤紅暈不明顯為輕症，根盤紅暈明顯為重症
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 74 關於丹痧、麻疹、風痧、奶麻，下列敘述何者正確？①丹痧又名喉痧、爛喉痧；奶麻又名癰疹；風痧又名假麻、風疹 ②奶麻多在發熱高燒3~4天後，皮疹才出現，治療以疏散風熱為主 ③丹痧若痧點外達，痧色紅潤，多為順證 ④丹痧可見楊莓舌，麻疹可見口腔黏膜斑，風痧可見耳後或枕部有櫻核腫大
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- 75 關於鵝口瘡，下列敘述何者錯誤？
(A)本病可因先天胎熱內蘊，或口腔不潔，感受穢毒之邪所致
(B)《外科正宗·鵝口瘡》描述鵝口瘡皆心脾二經胎熱上攻
(C)白膜多起於扁桃體，漸次蔓延於咽、軟顎或鼻腔等處，其色灰白，不易擦去，若強行擦除，每致出血
(D)白色奶塊易以溫開水或棉籤輕拭，而鵝口瘡則不易把白屑擦去
- 76 小兒外感寒邪，脈浮發熱，惡風惡寒，頭疼身痛無汗，若兼內熱者。依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》，治以下列何方最為適宜？
(A)十神湯 (B)雙解通聖湯 (C)竹葉石膏湯 (D)加味茶調散
- 77 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》喘證門，臨床幼兒症狀呈現喘急煩渴引飲、大便閉結不通等胃熱症狀，屬火熱喘急，應兩清肺胃之熱。治以下列何方最為適宜？
(A)宣白承氣湯 (B)大柴胡湯 (C)涼膈白虎湯 (D)大承氣湯
- 78 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法》汗證門，心火傷陰必煩熱。治以下列何方最適宜？
(A)黃連阿膠湯 (B)當歸六黃湯
(C)生脈散加龍骨牡蠣湯 (D)清心蓮子飲
- 79 新生兒出現五硬證，症見失溫，肢涼、心腹硬急之處置，下列敘述何者錯誤？
(A)可採 Apgar score 中衡量體溫的分級來評估急救
(B)若未及送醫，可先外用熱水袋使包被溫暖
(C)新生兒生下體溫很快下降，但於八小時內回升正常
(D)使用保溫箱可以上升1度/小時的速度，逐漸升溫至30~32℃
- 80 關於氣喘（asthma）病童使用尖峰吐氣流量計，監測氣喘控制的程度，下列敘述何者錯誤？
(A)此數值的高低與氣道的寬窄密切有關
(B)原則上每日早晚各記錄一次，可算出尖峰呼氣流速的每日變異度
(C)尖峰呼氣流速的每日變異度，兒童若大於10%即可診斷為氣喘
(D)尖峰吐氣流量計監測所得值介於個人最佳值的50~80%時，表示在黃燈區