

108年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(三) (包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。


- 1 有關中醫外治，下列敘述何者正確？
(A)初潰之瘡用藥腐或割去法 (B)惡肉侵蝕，需用生肌收斂藥
(C)陰寒之腫，須用溫敷 (D)久腐之瘍，用提毒去腐藥
- 2 下列何者不是明代的外科著作？
(A)王肯堂《外科準繩》 (B)汪機《外科理例》
(C)齊德之《外科精義》 (D)竇漢卿《瘡瘍經驗全書》
- 3 有關辨別經絡之氣血多少和治療之相關，下列敘述何者正確？
(A)外瘍發於多氣多血之經，治療時須注重行氣滋養
(B)外瘍發於多血少氣之經，治療時須注重行氣活血
(C)乳癰之患位屬足陽明胃經，治宜清胃行氣通乳
(D)生於多血少氣之經及多氣少血之經者，則易癒
- 4 外瘍發於多氣少血之經者較難癒，治療時須注重行氣和滋養，下列何者不是多氣少血之經？
(A)足厥陰肝 (B)手少陽三焦 (C)足少陽膽 (D)足少陰腎
- 5 下列何疔初起一粒，形如粟米，俱用針尖挑破，以見血為度者？
(A)牙疔 (B)手丫疔 (C)反唇疔 (D)人中疔
- 6 下列何者不是疔的特點？
(A)病勢急劇 (B)易損筋骨
(C)不會走黃 (D)易發病在面、手、足處
- 7 肺癰出現下列何症狀時，最宜服用葶藶大棗瀉肺湯瀉之？
(A)初起尚未膿成風邪鬱於表者 (B)氣壅喘滿不能安臥者
(C)咳嗽微熱煩滿胸中甲錯者 (D)咯唾膿血兼午後身熱煩躁者
- 8 6 歲男童，平日喜歡和貓玩，近日頭皮部出現覆蓋灰白色鱗屑的脫髮斑片，自覺搔癢。下列何者為最可能的診斷？
(A)風癬 (B)鬼剃頭 (C)油風 (D)禿瘡
- 9 下列何者不是鬚疽的特點？
(A)由於相火妄動，外受風熱，更因性情急怒，慾念火生，凝結而成
(B)發於鬚角，屬手少陽三焦、足少陽膽二經，最難腐潰
(C)不宜鍼灸，且潰後不宜多見膿，膿多者過耗血液難斂
(D)若身發熱，或熱多汗少，頭眩或痛，口燥舌乾，根盤不開大而聚縮者，乃屬真氣虛而邪氣實
- 10 下列何者不是發生於局部或局周圍的疾患？
(A)乾疽 (B)樂疽 (C)膠疽 (D)兌疽
- 11 一名患者起初牙關腫痛，憎寒壯熱，腫及腮頰，數日後，於盤牙盡處出膿，外腫漸消而頰車穴處腫硬不退，日久又在外腮頰處腐潰流膿，發出臭穢味。下列何者為最可能的診斷？
(A)托腮癰 (B)腮疔 (C)骨槽風 (D)燕窩瘡
- 12 一名工人，平日喜飲酒及嗜食油炸燒烤之品，初起足掌皮堅腫突隱隱作痛，1 個多月後，漸漸潰破，滲流腐臭滋水而無膿血，久則皮爛日大，瘡口凹陷，色如雞肝。下列何者為最可能的診斷？
(A)破傷風 (B)大麻風 (C)掌心風 (D)漏底風

- 13 承上題，以下列何者治療最適當？
(A)可使用「玉真散」加以治療 (B)初宜服「萬靈丹」汗之，次宜服「追風散」
(C)宜以「潤燥」為主 (D)可內服「萆薢滲濕湯」兼服「知柏八味丸」
- 14 疥瘡（Scabies）的主要治法以下列何者為主？
(A)殺蟲 (B)去風清熱 (C)利濕清瀉 (D)解毒宣導
- 15 浸淫瘡生發於下列何處？
(A)遍身皆可生 (B)局限於頭部 (C)好發於胸部 (D)僅見於四肢
- 16 患者臍腹隱痛、小便艱難、痛不可忍、溲如砂石、色黃赤。下列何者為最可能的診斷？
(A)石淋 (B)勞淋 (C)氣淋 (D)膏淋
- 17 有關瘰癧的起因，下列敘述何者錯誤？
(A)痰濕風熱氣毒結聚 (B)恚怒忿鬱謀慮不遂
(C)火鬱於孫絡之血分，風邪外搏而發 (D)如：花柳、遺毒等能併發
- 18 關於臁瘡，下列敘述何者錯誤？
(A)別名為爛腿、裙風，生於腿肚者，又名鰓漏
(B)由外傷或外瘍成潰不癒，內積濕熱而成
(C)色紅而烘烘然者都屬於熱，朝輕暮腫者，屬濕毒下陷
(D)初宜內服五神湯加減，二妙丸或四妙丸、黃耆丸等均可隨用
- 19 25 歲男性病人因趾甲疼痛就醫，如附圖。下列敘述何者正確？




- (A)相當於中醫「敦疽」
(B)造成的原因可能是鞋子的壓迫或趾甲修剪不當引起
(C)又名「土票」
(D)因極易迅速蔓延，侵腐至筋斷，應及早行局部切除手術
- 20 下列何者為「雀斑」之病因？
(A)由上焦熱甚而發斑 (B)由憂思抑鬱，血虛不華，火燥結滯而生於面上
(C)由火鬱於孫絡之血分，風邪外搏而發 (D)肺經風熱蘊結於上而為斑
- 21 有關旋轉袖套（rotator cuff），下列敘述何者正確？
(A)由棘上肌、棘下肌、肩胛下肌及大圓肌組成 (B)棘上肌有協助三角肌做肩外展的功能
(C)棘下肌收縮會使肩內旋 (D)肩胛下肌收縮會使肩外旋
- 22 有關伸指肌腱斷裂的治療，下列敘述何者最適宜？
(A)治療手法為折頂法
(B)固定時手指末節應呈過伸位
(C)受傷後應待患部消腫後再進行復位，不可過早介入
(D)由於恢復不易，最後仍有相當比例需要手術治療

- 23 有關附著於肱骨內上髁之肌肉，下列何者錯誤？
(A)旋前圓肌 (pronator teres) (B)掌長肌 (palmaris longus)
(C)橈側屈腕肌 (flexor carpi radialis) (D)肱橈肌 (brachioradialis)
- 24 26 歲男性，因摔倒時手掌著地，導致手腕疼痛。症狀已持續 3 個多月仍未痊癒，且有握力差導致持物容易掉落，故來求診。醫師診察發現其手腕之疼痛尺側較明顯，按壓尺骨莖突遠側與關節間隙處痛明顯，腕部背伸支撐及尺偏旋前時疼痛加重。下列何者為最可能之診斷？
(A)舟狀骨骨折 (B)腕尺側副韌帶損傷
(C)掌長肌腱損傷 (D)腕三角纖維軟骨損傷
- 25 有關腱鞘囊腫之治療，下列選項何者正確？①手法可考慮使用扣擠法，患者腕背朝上，醫師雙手分握患腕兩側，以拇指探明囊腫的相對固定方向，屈曲拇指深壓於囊腫之一側扣緊，不使滑動並同時搖腕片刻，若施術成功可感覺指下腫物迅速變小 ②無論是三稜針還是火針，無菌操作皆是非常重要的治療環節 ③腱鞘囊腫治癒後一般不易復發，可告知患者不需擔心 ④治療後若加壓包紮，可能會加重患者之不適甚至增加復發機率，故不建議如此操作
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅③④ (D)①②③
- 26 膝關節理學檢查如圖，患者仰臥位，屈髖 45 度，屈膝 90 度，小腿呈中立位，足平放在床上，下肢肌肉放鬆。檢查者用臀部壓住患者足背以固定之，雙手抱住患者小腿上端做向前拉或向後推的動作，主要為檢查何部位損傷？



- (A)髕韌帶 (B)側副韌帶 (C)十字韌帶 (D)膝關節滑膜
- 27 如圖所示之測驗，主要是評估下列何肌肉的肌力？




- (A)臀大肌 (B)臀中肌 (C)臀小肌 (D)闊筋膜張肌

28 如圖，X 光脊椎 L-Spine Dynamic View 的診斷，下列何者正確？



- (A) L4-5 一級後滑脫 (Retrolisthesis of L4 on L5 and in grade I)
(B) L4-5 一級滑脫 (Spondylolisthesis of L4 on L5 and in grade I)
(C) L5S1 一級後滑脫 (Retrolisthesis of L5 on S1 and in grade I)
(D) L5S1 一級滑脫 (Spondylolisthesis of L5 on S1 and in grade I)
- 29 50 歲患者因運動後，左腰臀痛伴有放射性疼痛至腳，理學檢查發現左腿的直腿抬高試驗 (SLRT) 45 度誘發疼痛，且隨度數增加疼痛加劇，右腿 SLRT 則正常。下列何者為最可能的診斷？
(A) 腰部扭挫傷 (B) 腰椎退化性關節炎椎間孔狹窄
(C) 梨狀肌綜合症 (D) 腰椎間盤突出症
- 30 理學檢查發現患者的食指、中指感覺減退，提示下列何部位有病變？
(A) 頸 4、5 椎間 (B) 頸 5、6 椎間 (C) 頸 6、7 椎間 (D) 頸 7、胸 1 椎間
- 31 關於足跟痛，下列敘述何者錯誤？
(A) 跟後滑囊炎多發生在青壯年女性，因穿高跟鞋，鞋的後面及跟骨結節之間反覆摩擦所致
(B) 依《醫宗金鑑·婦科心法要旨》，婦女足跟痛多因三陽實熱所致
(C) 跟骨骨骺炎發生在 6~14 歲生長期的兒童
(D) 跟骨骨刺不一定引起足跟痛
- 32 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，下列敘述何者錯誤？
(A) 臂骨，肱骨也
(B) 五指骨，若被打傷折，五指皆同，株連腫痛
(C) 腕骨，俗名虎骨，其外側之骨，名高骨，能宛屈上下
(D) 上肢挫傷多以正骨紫金丹或萬靈膏處置
- 33 關於膝關節損傷，下列敘述何者錯誤？
(A) 膝關節創傷性滑膜炎是以膝關節積血、積液為主症的疾病
(B) 慢性膝關節滑膜炎治療的同時，應避免進行股四頭肌訓練，以免受傷
(C) 損傷膝關節血腫在觸診時，皮膚腫脹處會有緊張感，浮髌試驗陽性
(D) 膝部前十字韌帶斷裂，常可見前抽屈試驗陽性
- 34 檢測顳頷關節 (Temporomandibular Joint) 的顎骨反射 (Jaw reflex) 其目的是要測試下列那一對腦神經？
(A) 第二對 (B) 第五對 (C) 第八對 (D) 第十一對

- 35 有關橈骨莖突狹窄性腱鞘炎之診斷治療，下列敘述何者錯誤？
 (A)外展拇長肌及伸拇短肌的肌腱在共同的腱鞘中反覆磨動，造成損傷性炎症
 (B)患側橈骨莖突處有隆起，或可有結節，在橈骨莖突及第一掌骨基部之間有壓痛
 (C)檢查時將拇指儘量屈曲握於掌心，同時將腕關節橈傾，可引起患處疼痛
 (D)疼痛嚴重時，可將拇指固定在伸展位，以限制活動，可緩解症狀
- 36 有關肋骨骨折，下列那一區段的肋骨因其解剖位置，最容易發生骨折？
 (A)第 1~3 肋 (B)第 4~7 肋 (C)第 8~10 肋 (D)第 11~12 肋
- 37 有關喙突的重要性，在於它和周邊建立許多韌帶聯繫，以圖為例，下列敘述何者錯誤？



- (A)韌帶 3 為喙鎖韌帶 (B)韌帶 2 的兩端連結同一塊骨頭
 (C)韌帶 2 為肩峰喙突韌帶 (D)韌帶 1 為孟肱韌帶
- 38 腓腸肌 (Gastrocnemius) 的兩肌腹分開的下端凹陷處是下列何穴位？
 (A)承扶 (B)承山 (C)光明 (D)飛揚
- 39 40 歲家庭主婦自訴經常臀痛和大腿後側放射性疼痛，下肢外展疼痛加重，且臀部有刀割樣疼痛感，不能入睡。下列診斷何者最可能？
 (A)椎管狹窄症 (B)更年期症候群 (C)梨狀肌症候群 (D)腎盂炎
- 40 下列何種原因不易造成外傷後健忘？
 (A)血虛陰虧 (B)腎精虧損 (C)脾虛氣弱 (D)肝經火旺
- 41 有關損傷喘咳之血虛發喘，治以下列何方劑較適合？
 (A)二味參蘇飲加味 (B)三稜和傷湯 (C)定喘湯加半夏 (D)蘇子降氣湯
- 42 針對損傷內證，常利用大黃等藥以助瘀血的排除，下列何方劑組成沒有大黃？
 (A)正骨紫金丹 (B)桃仁承氣湯 (C)抵當湯 (D)復元通氣散
- 43 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關胸腹痛悶，下列敘述何者錯誤？
 (A)傷損之證，胸腹痛悶者，多因……過用風熱之藥，致肝血受傷，肝火益甚
 (B)傷損之證，胸腹痛悶者，多因……。或飲糖酒，則腎水益虛，脾火益熾
 (C)若用大黃、芍藥，內傷陰絡，反致下血，少壯者必成痼疾，老弱者多致不起
 (D)多以柴胡、梔子、丹皮、芍藥、大黃配合其他方藥來處理傷後胸腹痛悶
- 44 有關損傷血證，下列敘述何者錯誤？
 (A)一切外傷引起內出血者，血液滯留於臟腑、腔道、筋膜、肌腠等組織之間未能外出者稱為瘀血
 (B)胸脅瘀血可有呼吸困難、不能平臥、咳嗽、胸部疼痛、呼吸震痛等症狀
 (C)依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，「凡傷損而犯勞碌，或怒氣肚腹脹悶，或過服寒涼等藥物致傷陽絡者，則為血積、血塊、肌肉青黑……」
 (D)依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，「傷損瘀血泛注之證，乃跌仆血滯所致。……或留於胸腹腰腎，或漫腫，或結塊，初起皆屬肝、脾鬱火。急用蔥熨法，內服小柴胡湯以清肝火……」

- 45 70 歲患者平素服用抗凝血藥物。1 個月前發生車禍，頭部撞擊到汽車引擎蓋，其後持續出現頭昏頭痛情況。下列敘述何者錯誤？
(A)患者後續的頭昏頭痛可能是頸源性因素
(B)患者受傷已經是一個月前的事，不會再有顱內出血可能性
(C)顱內血瘀患者，可能會有噁心、嘔吐、煩躁不安、睡臥不寧、頭暈、頭痛、目睛發脹等症狀
(D)應當先排除顱內出血的可能性
- 46 有關癱閉，下列敘述何者錯誤？
(A)健康成人每 24 小時排尿量約在 1000~1800 毫升之間。每 24 小時少於 1000 毫升稱為寡尿 (Oliguria)
(B)癱閉是一個嚴重徵候，脹、腫、嘔、喘為癱閉重證的常見表現
(C)嚴重骨盆骨折可能會導致癱閉情況
(D)傷後敗血歸肝，肝因瘀阻而失條達，也有可能造成排尿困難
- 47 有關傷後痿軟麻木的原因，下列敘述何者錯誤？
(A)損傷後患肢固定時間過長，或臥床過久，久之，肌肉萎縮，關節強直，產生痿軟麻木
(B)脊柱骨折脫位而脊椎斷裂時，損傷平面上下的肢體，痿軟麻木
(C)周圍神經斷裂後，其所支配的肢體範圍可發生感覺及運動障礙，不仁、不用，痿軟麻木
(D)損傷出血過多，耗血損氣；或長期臥床傷氣，可造成麻木，甚則兼見肢體痿軟無力
- 48 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，患者騎車受傷出血，或患處，或諸竅出血，血熱錯經而妄行，治以下列何方最適宜？
(A)加味逍遙散 (B)四物湯加柴胡、黃芩
(C)補中益氣湯 (D)獨參湯加炮薑
- 49 有關傷後發熱之證，若見局部焮紅，化膿，煩躁不安，舌苔黃燥，脈洪數，下列治則何者正確？
(A)養血散風 (B)清熱解毒 (C)壯水制火 (D)滋腎填髓
- 50 有關肱骨髁上骨折，下列敘述何者錯誤？
(A)陳舊性肱骨髁上骨折，關節內翻畸形達 15 度以上，可考慮手術治療，但應待骨痂線消失後再行手術為宜
(B)神經損傷以橈、尺神經損傷為多見，其次為正中神經損傷
(C)肱骨髁上骨折，一般以伸直型較常見
(D)夾板包紮後，密切觀察患肢血液循環
- 51 有關肩胛骨骨折，下列敘述何者錯誤？
(A)肩胛頸骨折，因胸大肌的牽拉，骨折遠段向下向前移位，並向內側旋轉移位
(B)肩胛盂骨折多為肱骨頭的撞擊所致
(C)喙突骨折併發於肩關節前脫位時，喙突受肱橈肌和肱二頭肌短頭牽拉而造成喙突撕脫骨折，此時骨折塊大多向上移位
(D)肩胛棘骨折多與肩胛體粉碎骨折同時發生，骨折片移位甚少
- 52 有關骨折處置，下列敘述何者錯誤？
(A)開放性骨折，骨折端外露或畸形，斷端無壓迫主要血管神經，應立即整復，後再進行清創
(B)股骨髁上骨折，復位時膝關節擺位屈曲 90~135 度，以放鬆肌肉，減少肌群的牽拉力
(C)對傷肢腫脹嚴重者，可暫時不整復，待腫脹減輕後儘早整復
(D)兒童骨折癒合快，應強調早期整復，不應等待腫脹全消
- 53 有關下肢骨折，下列敘述何者正確？
(A)髌骨骨折應以抱膝套住膝窩，再以副木將膝關節固定於微屈角度
(B)股骨頸骨折，如自高處墜下，兩足著地，則常見內收型骨折
(C)腓骨遠端骨折易損傷神經，造成垂足症
(D)馬拉松選手可見脛骨平台的疲勞性骨折

- 54 清·胡廷光《傷科匯纂·髑骨》的肩關節拔伸托入法，操作過程依序排列為何？①患者躺在床上，手臂懸空外展下垂 ②醫者站在肩外側以兩手指壓住肩峰，其餘四指插入腋窩抓住肱骨上端內側 ③第二助手握住患肢做外展外旋動作，向肩前外方牽拉拔伸 ④醫者四指將肱骨頭向外上方托提 ⑤第一助手站在健側，兩手自健側肩後上方斜向環抱住患者在腋下 ⑥患者正坐，手臂自然垂下 ⑦第二助手逐漸將患肢做內收內旋動作將肱骨頭旋回入關節盂內 ⑧醫者雙手拇指將肱骨頭向內下方按壓
- (A)⑥②⑤③④⑦ (B)①②⑤④③⑧ (C)⑥②⑤⑧③⑦ (D)①⑤②③④⑧
- 55 下列何種表現不是關節脫位的特有體徵？
- (A)與健側對比，出現關節畸形不對稱表現
(B)關節固定在某種角度，僅能做些微活動，甚至不能活動
(C)出現血腫產生局部血液循環障礙
(D)關節盂出現空虛狀態，可容易摸清表淺關節
- 56 蹠骨與趾骨發生脫位表現多為足趾過伸的暴力所致，最常發生蹠趾關節脫位的是那一個蹠趾關節？
- (A)第一蹠趾關節 (B)第二蹠趾關節 (C)第四蹠趾關節 (D)第五蹠趾關節
- 57 有關顳頷關節脫位，下列敘述何者正確？①可能在拔牙時或打呵欠後發生 ②以後脫位為常見 ③唐代孫思邈在《備急千金要方》中曾描述過口腔外復位法 ④復位後可用繃帶固定下巴並限制張口動作
- (A)①③ (B)②③ (C)②④ (D)①④
- 58 有關尺骨近端 1/3 骨折合併橈骨頭脫位，下列敘述何者正確？
- (A)骨折脫位復位後，應先將肘關節固定於伸直位 2~3 週，再改為肘關節屈曲 90 度
(B)橈骨頭同時自肱橈關節、上橈尺關節脫位，而肱尺關節無脫位
(C)若合併神經損傷，以尺神經損傷最常見
(D)又名 Galeazzi fracture dislocation
- 59 最適合作為橈尺骨骨折之練功療法為下列何者？
- (A)轉腰推碑 (B)前伸探海 (C)大小雲手 (D)風擺荷葉
- 60 鎖骨骨折的中年以上患者，易併發肩關節周圍炎的原因，下列何者正確？
- (A)脾氣虛，生化不足 (B)肺氣虛，營衛不固
(C)氣血虛弱，血不榮筋 (D)心氣虛，心血不足
- 61 下列何者為直接與目系相連的經脈？
- (A)足太陰脾經 (B)手太陰肺經 (C)手厥陰心包經 (D)足厥陰肝經
- 62 中醫五輪學說，以下列何書的記載最早？
- (A)《內經》 (B)《傷寒雜病論》 (C)《太平聖惠方》 (D)《聖濟總錄》
- 63 下列何者為全面論述眼科臟腑主病及全身兼症，內治所列方劑多屬內科常用方，外治除主張用藥外，不贊成手術療法？
- (A)傅仁宇《審視瑤函》 (B)黃庭鏡《目經大成》
(C)顧錫《銀海指南》 (D)孫思邈《銀海精微》
- 64 關於目筋，下列敘述何者錯誤？
- (A)可因飲食不節，脾胃損傷，脾虛肝旺所致
(B)胞瞼振跳不休，或與眉、額、面、口角相引，不能自控，當健脾消積清熱
(C)雙眼胞瞼頻頻眨動，眼乾澀，常喜揉拭，內治宜肥兒丸加減治之
(D)因肺陰虛，虛火上炎而發者，當養陰清熱潤燥
- 65 患者大眦頭微紅潮濕，膿液浸漬，拭之又生，小便黃赤，舌苔黃膩。下列何者為最可能的診斷？
- (A)漏睛瘡 (B)目筋 (C)胞虛如球 (D)瞼弦赤爛

- 66 關於白澀症證治，下列敘述何者錯誤？
(A)證見眼部赤腫明顯，眼內乾澀不舒
(B)緣於脾胃濕熱者，內治宜三仁湯加減
(C)緣於肝腎虧損，陰血不足者，內治宜杞菊地黃丸加減治之
(D)本症類似於西醫學之慢性結膜炎，或淺層點狀角膜炎
- 67 關於白睛青藍，下列敘述何者錯誤？
(A)火疳經久不癒，或反覆發作而成
(B)為火熱之邪從內蒸逼，不得宣泄而致
(C)嚴重者可造成患眼失明
(D)眼珠脹硬，瞳神散大
- 68 關於小兒通睛，下列敘述何者正確？
(A)或因驚恐，視左反右，看東反西
(B)宜用四味肥兒丸，久服即效
(C)淚多隱澀難開
(D)日久生雲翳，宜用酒調藥物治之
- 69 組織學上，視網膜可分為十層，下列何層為視細胞的核組成？
(A)視細胞層 (B)外顆粒層 (C)內界膜層 (D)外界膜層
- 70 下列何書為耳鼻喉口齒學科的發展奠定了理論基礎？
(A)《黃帝內經》 (B)《傷寒論》 (C)《金匱要略》 (D)《難經》
- 71 下列何者較不可能是鼻咽癌遠處轉移出現的位置？
(A)骨頭（包含骨髓） (B)肺 (C)肝 (D)膀胱
- 72 有關旋耳瘡，下列敘述何者錯誤？
(A)風寒濕邪浸漬 (B)血虛生風化燥
(C)血虛而枯槁者，護理宜用油膏類 (D)亦稱黃水瘡、月蝕瘡
- 73 患者多年來耳鳴耳聾，蹲下站起來時較甚，耳內突然空虛或發涼感覺，倦怠乏力，食後腹脹，大便溏面色黃，舌淡紅，苔薄白，脈虛弱。為下列何種證型？
(A)腎精虧損 (B)脾胃虛弱 (C)肝火上擾 (D)風熱侵襲
- 74 鼻疔病程日久，氣陰耗傷，脈象虛弱者，宜補益氣陰，宜用下列何方？
(A)紫雪丹 (B)生脈散 (C)五味消毒飲 (D)安宮牛黃丸
- 75 鼻傷衄血，外治以止血為先，內治以斂血止血為主，如因出血量多，宜加下列何藥，以和血養血？
(A)丹皮、蒲黃 (B)藕節、白茅根 (C)乾地黃、當歸 (D)仙鶴草、側柏葉
- 76 依《外臺祕要》卷二十二，肺藏為風冷所乘，則鼻氣不和，津液雍塞，而生何病？
(A)鼻鼽 (B)鼻淵 (C)鼻塞 (D)鼻衄
- 77 咽喉病火熱上炎，煉津成痰，痰涎結聚於咽喉。治以下列何者最適宜？
(A)瓜蒌、貝母、射干、前胡 (B)天南星、半夏、枳殼
(C)枳殼、蒲公英、青蒿 (D)玄參、訶子、枇杷葉
- 78 咽喉是經脈循行交會之處，下列何經脈間接通於咽喉？
(A)足厥陰肝經、足少陰腎經 (B)足少陽三焦經、手厥陰心包經
(C)足太陰脾經、足太陽膀胱經 (D)手厥陰心包經、足太陽膀胱經
- 79 牙宣是因齦肉萎縮，滲血滲膿，牙根宣露，牙齒鬆動，若不及早治療，日久牙齒失去氣血濡養，以致造成脫落。在臨床辨證上，下列何種證型較少見？
(A)胃火上蒸 (B)腎陰虧損 (C)心脾積熱 (D)氣血不足
- 80 有關牙齦癰的治療，下列敘述何者正確？①可用茶或醋調如意金黃散外敷，達涼血解毒、清熱消腫之效 ②可用黃芩、金銀花、竹葉、白芷煎水漱口，以清熱解毒，消腫止痛 ③可用黃芩煎液沖洗局部，達清潔局部的作用 ④已成膿者，不可行膿腫切開術，以免感染
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④