

108年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、108年專技高考助產師考試

代 號：6304

類科名稱：牙醫師(二)

科目名稱：牙醫學(六)(包括齒顎矯正學、兒童牙科學、牙科公共衛生學等科目及其相關臨床實例與醫學倫理)

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列關於唇齒發育之敘述，何者錯誤？

- A.上門齒露出程度隨年齡增長而增加
- B.混合齒列期常見唇閉合不全(lip incompetence)
- C.在青春期，嘴唇發育達最大厚度
- D.青春期過後隨著年齡增長，嘴唇厚度逐漸減小

2.以生理年齡觀察生長發育，下列何種組織之發育最晚停止？

- A.上顎骨
- B.下顎骨
- C.顱頂骨
- D.顴骨

3.上顎骨的生長發育包括長度、寬度、高度三方面的變化，比較三者生長發育完成的時間，先後順序為何？

- A.長度，高度，寬度
- B.高度，寬度，長度
- C.寬度，高度，長度
- D.寬度，長度，高度

4.一般而言，生長發育出現「青春期生長高峰」(pubertal growth spurt)的時間，男女約相差幾年？

- A.男比女早一年
- B.男比女早二年
- C.男比女晚一年
- D.男比女晚二年

5.下列何種方法對保留餘裕空間(leeway space)沒有幫助？

- A.計畫性循序拔牙法
- B.儘量維持乳臼齒之完整性，防止其齲齒發生
- C.使用舌側齒弓空間維持器，至第二小臼齒萌發為止
- D.在混合齒列晚期，第二乳臼齒脫落前，即開始固定矯正器治療

6.關於恆齒列門齒負債量(incisor liability)現象，下列敘述何者錯誤？

- A.常因下顎門牙先天性缺少所造成
- B.一般而言，incisor liability在上顎的量多於下顎

- C.可以靠恆門齒長軸向唇側傾斜（**proclination**）來舒解空間不足的情形
- D.可以靠逐漸變寬的犬齒間寬度（**intercanine width**）來舒解空間不足的情形
- 7.上顎正中恆門齒萌發至牙根發育完成，大約需時多久？
- A.半年
- B.1年
- C.3年
- D.5年
- 8.作用於齒槽區的肌肉力量是診斷異常咬合時不可忽視的因素（**muscular factor**），下列敘述何者錯誤？
- A.**muscular factor**影響齒槽發育形態
- B.**muscular factor**影響矯正治療成果穩定性
- C.舌前推（**tongue thrusting**）是不當的**muscular factor**
- D.成年病人去除不良**muscular factor**後，異常咬合通常會自動改善
- 9.有關肢端肥大症成年患者（**acromegaly**）的敘述，下列何者錯誤？
- A.易有前牙錯咬
- B.可能有下顎過度生長的表現
- C.與腦下垂體腫瘤有關
- D.從其側面測顱X光片可以見到縮小的蝶鞍（**sella turcica**）
- 10.測顱分析（**cephalometric analysis**）的Wits analysis，主要是將上顎的A點及下顎的B點投影在下列那一平面上的線性距離？
- A.**SN plane**
- B.**FH plane**
- C.**occlusal plane**
- D.**mandibular plane**
- 11.過度活動之頰肌（**hyperactive mentalis muscle**）較容易出現在具有下列何種特徵之患者？
- A.前牙深咬
- B.前牙開咬
- C.前齒錯咬
- D.後齒錯咬
- 12.根據第二乳白齒終端平面（**terminal plane**）的分類法，那一種咬合狀態最容易引導恆牙第一大臼齒發展成為安格氏第三類咬合異常？
- A.**flush terminal plane**
- B.**mesial step**
- C.**distal step**
- D.**end to end**
- 13.有關自然頭位（**natural head position, NHP**）的敘述，下列何者錯誤？
- A.NHP決定於受試者之法蘭克福平面（**Frankfort horizontal plane**）
- B.NHP決定於受試者之視軸（**visual axis**）與內耳

- C.NHP相當於受試者站立或行走時，眼看遠處的頭位
- D.受試者直視3呎外鏡中自己的眼睛，為重覆性最佳的頭位

14.在粹德－梅律弗德（Tweed-Merrifield）分析中，下列何種測量屬於軟組織分析？

- A.FMIA
- B.FMA
- C.IMPA
- D.Z angle


15.Bolton分析中的anterior tooth ratio偏大，在臨床上較易出現：

- A.overjet偏大
- B.overjet偏小
- C.下顎前牙有空隙
- D.上顎前牙擁擠

16.下列何種矯正測顱分析，不是以族群之正常平均值，作為矯正患者之診斷參考？

- A.Harvold analysis
- B.McNamara analysis
- C.Wits analysis
- D.Sassouni analysis

17.在側面測顱X光片分析中，Steiner's S line是指下列何線？



- A.第1條線，soft tissue pogonion與upper lip前緣之連線
- B.第2條線，soft tissue pogonion與鼻尖至鼻下點（subnasale）輪廓中點之連線
- C.第3條線，nasion與soft tissue pogonion之連線
- D.第4條線，nasion與A point之連線

18.有關史比曲線（curve of Spee）之敘述，下列何者正確？

- A.大部分的齒顎矯正治療會將此曲線打平

- B.計算方式是將下顎第一大臼齒與第二小臼齒連線後，測量下顎門齒切緣距此連線之垂直距離
- C.若以齒顎矯正治療打平史比曲線，將會產生多餘的空間
- D.若以齒顎矯正治療打平史比曲線，下顎門齒切緣將會往舌側傾倒
- 19.牙齒移動過程中，需形成破骨細胞（osteoclast）以便移除牙周韌帶受壓處的骨質。若牙齒承受適當力量，產生的骨吸收型態為何？
- A.正面吸收（frontal resorption）
- B.下蝕性吸收（undermining resorption）
- C.外吸收（external resorption）
- D.內吸收（internal resorption）
- 20.單顆門牙內縮移動（intrusion）所需力量至少為何？
- A.10~20gm
- B.35~60gm
- C.60~100gm
- D.100~150gm
- 21.下列相同直徑的矯正圓線，其彈性（springiness）由大而小的排序為何？
- SS：不銹鋼矯正線
- TMA：β-鈦矯正線
- NiTi：鎳鈦合金矯正線
- A.SS>TMA>NiTi
- B.NiTi>SS>TMA
- C.TMA>SS>NiTi
- D.NiTi>TMA>SS
- 22.有關安裝環套（band）前將牙齒間隙撐開的相關敘述，下列何者錯誤？
- A.易造成牙齒疼痛
- B.可以利用分離用的彈簧
- C.可以利用彈性橡皮分離器
- D.可以利用橡皮筋套於齒頸部
- 23.牙齒矯正平齊化（leveling）過程中，下列何種牙齒移動最容易增加下顎平面角度？
- A.門齒完全下壓內縮（absolute intrusion）
- B.門齒相對下壓內縮（relative intrusion）
- C.臼齒下壓內縮（intrusion）
- D.臼齒突出（extrusion）
- 24.在混合齒列期施行牙弓擴張（arch expansion），下列何者錯誤？
- A.使用FR-2（Frankel）裝置，所得到的牙弓擴張為被動式擴張（passive expansion）
- B.使用唇側檔板（lip-bumper）治療時，所得到的前牙牙弓擴張為主動式擴張（active expansion）
- C.使用快速上顎擴大器（rapid maxillary expander）治療時，常見上顎正中門齒出現縫隙
- D.使用傳統固定式矯正器可進行齒列擴張（orthodontic expansion）

25.下顎門齒在下述何種矯正移動之後，最容易復發（relapse）？

- A.壓入（intrusion）
- B.突出（extrusion）
- C.旋轉（rotation）
- D.齒體位移（translation）

26.穩定性是正顎手術最重要的課題之一，下列何者不是造成下顎術後復發的因素？

- A.下顎前後移動量大
- B.術前矯正時間的長短
- C.術中顫顎關節髁狀突的前移
- D.術後顎骨繼續生長

27.下列何者為唇腭裂患者進行次級（secondary）齒槽骨修補的適當時機？

- A.出生時
- B.2~3個月大唇部修補時
- C.12~18個月大腭部修補時
- D.7~9歲大犬齒萌發前

28.臨床常規醫療上執行知情同意（informed consent）原則之目的，不包括下列那一項？

- A.尊重患者自主性
- B.增進患者福利
- C.強化醫病關係
- D.促進醫學發展

29.3歲兒童，其心理發展的敘述，下列何者錯誤？

- A.可以離開父母（seperation）
- B.懂得獨立自助（self help）
- C.可以遵守規則（agree with rules）
- D.模仿成人及朋友（copy adults and friends）

30.對於激動不合作的兒童欲施與以手摀嘴法（hand-over-mouth exercise），下列敘述何者錯誤？

- A.目的是獲得高度反抗兒童的注意，建立溝通管道
- B.屬於行為塑造中的反感控制法（aversive conditioning）
- C.兒童合作後，接續需給予讚美或鼓勵
- D.適用於身心障礙的小病人

31.關於Frankl行為評估量表（Frankl behavioral rating scale）的敘述，分類與臨床運用下列何者正確？①簡單分類 ②對不合作之行為具敘述性 ③可作為研究的工具 ④"++"代表definitely positive ⑤"-"代表 less negative

- A.①②③
- B.①③④
- C.①④⑤
- D.②③④

- 32.關於牙釉質形成不良（amelogenesis imperfecta）及牙本質形成不良（dentinogenesis imperfecta）之敘述，下列何者錯誤？
- A.牙釉質形成不良多於局部數顆牙齒發生，牙本質形成不良則為全部牙齒均受影響
 - B.牙釉質形成不良有各類遺傳模式，牙本質形成不良則多為體染色體顯性（autosomal dominant）遺傳
 - C.牙本質形成不良之乳齒列受損嚴重程度較恆齒列明顯
 - D.牙釉質形成不良之發育不全型（hypoplastic type）齒質較硬；鈣化不全型（hypocalcification type）則齒質較軟
- 33.兒童發生唇繫帶過長的沾黏（high attached labial frenum）會造成那些情況？①可能造成相關牙齒的牙齦發炎 ②可能造成相關牙齒的牙齦萎縮 ③造成牙齒疼痛或不適 ④造成相關牙齒的齲齒
- A.③④
 - B.②④
 - C.①②
 - D.①③
- 34.關於蟻醛甲酚合劑（formocresol）斷髓治療之敘述，下列何者正確？①可以促進根管内牙髓組織之癒合（healing） ②具有殺菌及固定組織之效果 ③可以促進牙髓組織產生牙本質橋梁（dentin bridge） ④治療成功率比氫氧化鈣斷髓治療好
- A.①②
 - B.②④
 - C.①④
 - D.③④
- 35.關於造成齲齒的臨界酸鹼值（critical pH）的敘述，下列何者正確？①造成牙釉質開始去礦化的臨界酸鹼值為pH6.5 ②造成牙本質開始去礦化的臨界酸鹼值比牙釉質低 ③吃過含糖食物後，牙齒鄰接面的酸鹼值低於臨界酸鹼值的時間較頰側面長 ④吃過甜食後一般只要經過短短幾分鐘，口腔內的酸鹼值就會下降到臨界酸鹼值以下
- A.②③
 - B.①②
 - C.③④
 - D.①④
- 36.根據美國兒童牙科醫學會所提出的6歲以下幼兒之齲齒風險評估表中，下列何者屬於齲齒高風險？
- A.每天吃一次含糖的零食
 - B.有一個以上的鄰接面齲齒
 - C.牙齒的補綴物有部分脫落現象
 - D.配戴有口內矯正裝置
- 37.對健康兒童施予牙科局部麻醉（dental local anesthesia）時，在一般情況下，下列何者錯誤？
- A.在黏膜上可先給予表面麻醉（topical anesthesia）
 - B.可使用2% lidocaine麻醉藥
 - C.可使用3% mepivacaine麻醉藥

D.不可使用含有epinephrine的麻醉藥

38.關於恆齒發生之爪形咬頭（talon cusp）的敘述，下列何者錯誤？

- A.是一種牙中牙（dens in dente）
- B.好發於上顎門齒
- C.多具有牙釉質、牙本質及牙髓
- D.逕行磨除常造成敏感或牙髓暴露

39.根據Baume的研究，關於牙弓發育過程中，犬齒間距（intercanine distance）成長情形的敘述，下列何者錯誤？

- A.上顎增加3~4 mm，下顎增加2~3 mm
- B.下顎最大增加量是在恆牙側門齒萌發時
- C.上顎最大增加量是在恆牙正中門齒萌發時
- D.有間隙齒弓（spaced arch）的增加量多於無間隙齒弓（nonspaced arch）

40.關於恆牙第一大臼齒萌發達到安格氏I級咬合狀況，下列敘述何者錯誤？

- A.由乳齒列近心階（mesial step）關係的情形萌出達成
- B.由乳齒列齊平式（flush）關係下，合併早期近心位移（mesial shift）來達成
- C.由乳齒列近心階（mesial step）關係下，合併早期近心位移（mesial shift）來達成
- D.由乳齒列遠心階（distal step）關係的情形萌出，較不易達到

41.8歲男童上顎正中門齒間有3 mm的齒間隙，下列處理方式何者錯誤？

- A.可進行放射線檢查
- B.檢查上唇繫帶情形
- C.先進行矯正治療，關閉齒間隙
- D.等犬齒萌發再決定

42.關於兒童口腔異常功能習慣（parafunctional habit）的敘述，下列何者正確？

- A.咬指甲習慣容易造成前牙開咬和後牙錯咬
- B.孩童不會因為壓力而有夜間磨牙的情形
- C.肌功能治療（myofunctional therapy）或是裝置可以用在任何年齡的小孩，特別是無法合作的小朋友
- D.吐舌癖（tongue-thrust swallowing）會造成門牙外突和發音的問題

43.關於空間喪失和空間維持器的敘述，下列何者錯誤？

- A.空間喪失通常是在乳牙脫落後的前6個月最明顯
- B.要考量小朋友的齒齡
- C.要考量未萌出的恆牙上面有多少的骨頭覆蓋量
- D.做了空間維持器就無需矯正治療

44.關於繼生恆齒萌出時機的敘述，下列何者錯誤？

- A.根據Grøn的研究，當恆齒牙根發育到 1/2，牙齒就會萌出
- B.當乳臼齒在4歲就脫落，可能會導致繼生齒延遲1年萌出
- C.當乳臼齒在6歲就脫落，可能會導致繼生齒延遲半年萌出
- D.若在咬翼放射攝影片上發現恆小白齒上覆蓋有1 mm厚的骨頭，則牙齒約需等4至6個月才能穿出

45.關於乳門齒提早脫落，下列敘述何者錯誤？

- A.下顎乳門齒若在乳犬齒長好前就脫落，可能會造成前面空間喪失（space loss）
- B.上顎乳門齒若在乳犬齒長好後才脫落，通常不會導致犬齒內距離（intracanine dimensions）減少
- C.上顎乳門齒提早於3歲時脫落，不會導致繼生齒延遲萌出
- D.乳門齒提早脫落後製作帶有人工（artificial）乳前齒的裝置，其主要目的是為了美觀及功能

46.關於乳牙與恆牙的發育敘述，下列何者錯誤？

- A.乳牙的牙釉質和牙本質都較恆牙薄
- B.乳牙牙根短且細長（shorter and slender roots）
- C.恆牙形成通常開始於胚胎時期第2個月
- D.乳牙萌發順序，上顎乳犬齒萌發通常晚於上顎第一乳臼齒

47.關於乳牙與乳齒列的敘述，下列何者正確？

- A.乳牙齒列的末端平面（terminal plane）最常見為齊平型（flush）
- B.無論男女生犬齒間寬度（intercanine width）會先減少再增加，而男生增加的量比較大
- C.乳牙發生crown-root fracture，通常建議拔除該牙齒
- D.乳牙開始形成大約在胎兒時期的第6個月

48.關於贅生齒（supernumerary teeth）的敘述，下列何者錯誤？

- A.上顎的發生率是下顎的八倍
- B.最常發生於上顎前牙區
- C.約80%的正中贅齒（mesiodens）只有一顆
- D.約1/4的正中贅齒需要手術拔除

49.關於血友病患者牙科治療需注意事項的敘述，下列何者錯誤？

- A.在凝血因子適當補充後，可執行下顎齒槽神經阻斷麻醉
- B.每次約診不要治療太多項目，應分多次約診為宜
- C.儘量用冠髓切除術（pulpotomy）或牙髓切除術（pulpectomy）取代拔牙
- D.簡單拔牙前1小時內，要將相關凝血因子補充到30%到40%的水準

50.關於愛滋病患者口腔真菌感染病灶分類的敘述，下列何者錯誤？

- A.偽膜（pseudomembranous）型，常見於腭黏膜、頰及唇黏膜、舌背，容易移除
- B.增生（hyperplastic）型，常見於頰黏膜，容易移除
- C.紅斑（erythematous）型，常見於腭黏膜及舌背，呈現紅色
- D.口角炎（angular cheilitis），發生於嘴角，常伴有小白斑（plaque）

51.依據2007年美國心臟學會之建議，先天性心臟病患者在牙科治療前，下列何者不需使用預防性抗生素？

- A.接受心臟移植患者有心瓣膜病變
- B.先前有心內膜炎病史
- C.未矯治的發紺性（cyanotic）心臟病
- D.心房中隔缺損

52.關於白血病患者的牙科治療敘述，下列何者正確？

- A.有白血病病史的患者，牙科治療前皆須先驗血來掌握身體狀況

- B.白血病緩解患者（remission patient）之根管治療是禁忌症
- C.浸潤麻醉及齲齒牙體復形時，血小板需有 $50,000/\text{mm}^3$ 以上
- D.絕對嗜中性白血球數（absolute neutrophil count; ANC）在 $2,000/\text{mm}^3$ 時，應延後所有的牙科治療
- 53.下列何者不是組織工程（tissue engineering）的三個關鍵成分？
- A.幹細胞（stem cells）
- B.生長因子（growth factors）
- C.營養（nutrition）
- D.支架（scaffolds）
- 54.關於外傷後牙冠顏色變化的原因，下列配對何者正確？
- A.粉紅色／外吸收
- B.黃色／內吸收
- C.深灰色／齒髓壞死
- D.深棕色／根管阻塞
- 55.關於牙齒外傷的敘述，下列何者錯誤？
- A.乳齒列最常發生意外為上顎門齒
- B.乳齒列發生鬆脫情形較恆牙齒列高
- C.乳臼齒受傷多為直接外力撞擊所致
- D.前牙水平咬覆（overjet）過大，意外發生機會較高
- 56.當兒童受傷發生恆牙脫落（avulsion），對脫出的牙齒處理的方式會決定植回牙齒的成功率，下列何項處理方式最易造成牙齒傷害，降低植回成功率？
- A.將牙齒放在口水中
- B.將牙齒存放在冰牛奶中
- C.刷洗髒汙牙冠牙根
- D.將牙齒含在頰囊（buccal pouch）
- 57.心智發展遲緩症候群中與性染色體最相關者為下列何者？
- A.autism
- B.learning disability
- C.Prader-Willi syndrome
- D.fragile X syndrome
- 58.胎兒酒精症候群（fetal alcohol spectrum disorder）是酒精影響到胎兒的那一細胞之正常發育？
- A.神經嵴細胞（neural crest cells）
- B.視神經細胞（optic nerve cells）
- C.顏面神經細胞（facial nerve cells）
- D.三叉神經細胞（trigeminal nerve cells）
- 59.下列何種方式較能減輕腦性麻痺運動不良型或痙攣型患者在看診時之緊張？
- A.用墊子使膝蓋成彎曲狀
- B.把頭側向一邊

C.用毛巾約束

D.手抱枕頭

60.在身心障礙病患身上使用剪刀型張口器時，為避免張口器造成口角撕裂，下列措施何者不適當？

A.醫護人員用手固定好張口器

B.張口器用紗布包紮

C.張口器打開到最大

D.張口器放在上下有穩定對咬的位置

61.使用變異數分析（Analysis of Variance, ANOVA）探討不同潔牙方式對牙菌斑指數的影響，下列何者正確？

A.探討不同組別個案的牙菌斑指數之變異數（variance）是否不同

B.探討不同組別個案的牙菌斑指數之平均值（mean）是否不同

C.探討不同組別個案的牙菌斑指數之變異係數（coefficient of variance）是否不同

D.探討不同組別個案的牙菌斑指數資料是否獨立

62.依據實證牙醫學文獻，每天應至少使用含氟牙膏刷牙幾次，才能有效預防齲齒？

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

63.美國醫學研究所（Institute of Medicine）指出，公共衛生的核心功能包含：評估（assessment）、發展政策（policy development）、確保（assurance）。美國各州及特區牙醫主管學會（Association of State and Territorial Dental Directors, ASTDD）依此3類核心功能，列出10項牙科公共衛生應有之對應策略，下列何者屬於「發展政策」？

A.建立並維持口腔健康監測系統

B.研擬並維持口腔保健改善計畫

C.開發健康體系之介入措施，以提供一般民眾及弱勢族群優質口腔照護服務

D.整合、協調及執行以族群為對象的介入措施

64.一項全國性調查的結果顯示，我國6歲以下兒童的早發性幼兒齲齒（early childhood caries）盛行率為44%，應如何預防？①父母和小孩分享咀嚼過的食物，以增強小孩對蛀牙菌的抵抗力 ②不要含著奶瓶睡覺 ③鼓勵兒童多漱口、少刷牙 ④每半年接受牙醫師口腔健康檢查及塗氟

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

65.有關在社區提供的預防齲齒服務和其所屬之預防層級，下列敘述那些正確？①實施口腔健康教育計畫屬於「健康促進」 ②實施食鹽加氟計畫屬於「健康促進」 ③實施兒童含氟漱口水計畫屬於「特殊保護」 ④倡導民眾養成良好的飲食習慣屬於「特殊保護」

A.①③

B.①④

C. ②③

D. ②④

66. 依多倫多大學研發的Caries Risk and Preventive Needs Assessment，下列何者未正式列入評分（rating）項目？

A. 總菌落數（total bacteria count）

B. DMFS

C. 每天暴露於氟化物之次數

D. 唾液流率

67. 下列那項社區口腔健康促進步驟，可幫助計畫人員了解相關活動是否有效及調整計畫內容？

A. 社區動員與支持

B. 評估需要與現有資源

C. 確定優先順位

D. 成效評價

68. 有關社區口腔疾病篩檢的主要目的或特性，下列敘述何者錯誤？

A. 提供自覺有口腔疾病症狀的社區民眾現場治療

B. 篩檢方法需考慮民眾的可接受性

C. 一般而言社區篩檢不如臨床診斷準確

D. 篩檢的疾病須為經早期發現且治療後有較佳效益者

69. 在班杜拉（Albert Bandura）社會認知理論（social cognitive theory）中，認為行為是由那些因素所決定的，也是一場口腔衛教成功的重要因素？①預期（expectancy） ②情境（situation） ③環境（environment）

④誘因（incentive）

A. 僅①②

B. 僅②③

C. 僅③④

D. 僅①④

70. 衛生教育指導青少年生活規律、口腔保健習慣的重要性，是屬於三段五級那一層級預防？

A. 健康促進

B. 特殊保護

C. 早期診斷立即治療

D. 復健

71. 下列何者是以個人口腔衛生訓練為目的而設計的評估指數？

A. Russell

B. Loe and Silness

C. O'Leary

D. Ramfjord

72. 世界衛生組織於2013年發行之第五版口腔健康調查的基本方法（Oral Health Surveys, Basic Methods, 5th ed.,

WHO, 2013）中，與齲齒相關之檢查標準，下列何者不記錄為已填補（Filled）？①門牙因外傷缺損後，為了美觀而製作的填補物 ②因為乳牙齲齒而製作的不鏽鋼牙套（Stainless Steel Crown, SSC） ③因牙根齲齒所

做的填補物 ④齲齒之臨時填補物

- A. ①③
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

73. 牙科常用的器械如：口鏡、探針、鑷子，依滅菌消毒原理應使用那一分類的滅菌消毒法？

- A. 絕對滅菌（critical）
- B. 應該滅菌（semi-critical）
- C. 消毒（non-critical）
- D. 浸泡（soaking）

74. 依據世界衛生組織近幾年的報告，下列何者正確？①全球60~90%的兒童有齲齒 ②口腔疾病在貧窮弱勢的族群比較少 ③全球幾乎100%的成年人有齲齒 ④在許多中低收入國家，民眾的口腔疾病快速地減少中

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ②④

75. 在臺灣中等收入家庭中，4歲的兒童可以獲得政府提供的何種口腔預防保健補助？

- A. 臼齒窩溝封填（pit and fissure sealant）
- B. 含氟漱口水防齲計畫
- C. 牙齒塗氟
- D. 加氟鹽

76. 下列有關特殊需求者的敘述，何者錯誤？

- A. 不全（impairment）是指當個體喪失身體應有之構造或功能異常
- B. 失能（disability）指個體因喪失身體某部分構造而無法參與社會活動
- C. 特殊需求者包括身心障礙者
- D. 特殊需求者依嚴重程度可分為輕度、中度、重度及極重度

77. 對於正處於復原期的酒癮及藥癮病人，在牙科治療時，不可使用下列那一種意識鎮靜的方式來搭配治療，因其可能會引起酒癮及藥癮的復發？

- A. Nitrous Oxide吸入性鎮靜
- B. 靜脈鎮靜注射法
- C. 口服藥物鎮靜法
- D. 肛門塞劑鎮靜法

78. 治療自閉症患者時，傳統tell、show、do可能不足而要再加上feel。此時feel加在下列何處最適宜？

- A. tell之前
- B. tell與show之間
- C. show與do之間
- D. do之後

79.牙醫師欲申請執業執照，應向下列那個機關辦理？

- A.所在地衛生所
- B.所在地衛生局
- C.所在地牙醫師公會
- D.衛生福利部

80.愛滋病患者於高效能抗病毒療法後，其口腔病徵有很大的變化，以下何者錯誤？

- A.口腔念珠菌病機會增加
- B.口乾症機會增加
- C.毛舌白斑（hairy leukoplakia）機會減低
- D.小型復發型口瘡性口炎（minor aphthae）機會增加