

108年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、108年專技高考助產師考試

代 號：2310

類科名稱：助產師

科目名稱：基本護理學（包括護理原理、護理技術）與護理行政

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1. 護病關係中有關非語言溝通之方式，下列何者錯誤？

- A. 觸摸
- B. 衛教單張
- C. 表情動作
- D. 眼光接觸

2. 有關注射胰島素之注意事項，下列何者正確？

- A. 注射部位通常在上臂三角肌
- B. 每次注射時都應更換注射部位
- C. 注射後要按摩，以促進藥物吸收
- D. 胰島素必須保存於30～35℃

3. 有關熱水袋使用的敘述，下列何者錯誤？

- A. 成人使用熱水袋的溫度為46～52℃
- B. 使用時間20～30分鐘可發揮熱最大的效果
- C. 倒入熱水於袋內，約為1/2～2/3滿為佳
- D. 熱水袋是一種方便又經濟的濕熱療法

4. 下列何種灌腸為保留灌腸？

- A. 診斷性灌腸
- B. 生理食鹽水灌腸
- C. 肥皂水灌腸
- D. 清水灌腸

5. 為成人心臟病人測量心尖脈，下列測量方式何者不適當？

- A. 病人可採坐姿測量心尖脈
- B. 測量部位在第五肋間與左鎖骨中線交會處
- C. 心尖脈速率應計算第一心音與第二心音次數總和
- D. 雖病人心尖脈搏動呈規則性，仍需測量60秒

6. 林小弟，因發燒入院檢查及治療，下列那些是發燒的正確護理措施？①多增加被蓋，以避免發冷 ②多攝取高碳水化合物及高脂肪食物 ③給與口腔護理 ④鼓勵病童增加水分的攝入量 ⑤宜臥床休息

- A. ①②③
- B. ②③④

C.③④⑤

D.①④⑤

- 7.病人接受開心手術後住入加護病房，主訴燈光的亮度及機器的噪音而無法入睡，下列護理措施何者錯誤？
- A.傾聽病人的主訴
 - B.請病人忍耐
 - C.協助病人戴上耳塞及眼罩
 - D.夜間將燈光亮度調暗
- 8.依照行政院衛生福利部2012年公告之「腦死判定準則」，下列何者不屬於判定性腦幹功能測試範圍？
- A.咳嗽反射
 - B.吞嚥反射
 - C.眼角膜反射
 - D.疼痛反射
- 9.下列何種病人之紅血球沉降速率（E.S.R.）會變慢？
- A.肺癌病人
 - B.壓瘡傷口感染病人
 - C.充血性心衰竭病人
 - D.懷孕30週婦女
- 10.有關火災發生時，滅火的措施下列處理何者錯誤？
- A.電及電路類的火源：二氧化碳或乾粉滅火器
 - B.紙類及木材類的火源：蘇打及酸劑滅火器
 - C.油類及易燃氣體的火源：二氧化碳滅火器
 - D.活性金屬（鎂、鉀、鋰）的火源：生理食鹽水滅火器
- 11.有關醫院單位之溫度或溼度調整，下列敘述何者錯誤？
- A.老人室內之溫度以20～24℃為佳
 - B.手術室之室內溫度以20～27℃為佳
 - C.氣喘病人之室內溼度以10～20%為佳
 - D.支氣管炎病人之室內溼度以80%為佳
- 12.依護理功能分類，有關護理師的行為，下列敘述何者正確？
- A.依醫囑給與含鎂制酸劑前，評估個案昨日發生輕瀉副作用的原因，是協同性護理功能
 - B.依復健師之指導，評估追蹤中風個案恢復期之復健執行情況，是獨立性護理功能
 - C.依醫囑執行傷口評估及濕敷換藥促進個案舒適，是獨立性護理功能
 - D.評估個案睡眠欠佳的原因後，建議減少訪客或睡前喝杯溫牛奶，是獨立性護理功能
- 13.下列何項是急性醫療機構中，護理師必須記錄並交班報告的事項：①特殊檢查 ②意外事件 ③發燒 ④例行服藥 ⑤病患訪客
- A.①②③
 - B.②③④
 - C.③④⑤

D.①②⑤

14.有關專業性人際關係建立的開始期（orientation phase），下列那一個會談技巧不適當？

- A.傾聽（listening）
- B.澄清（clarification）
- C.反問（confrontation）
- D.提供訊息（giving information）

15.護理過程中的「護理措施執行」相當於科學方法中的那一個步驟？

- A.從觀察及實驗中收集資料
- B.選擇合理方案進行實驗
- C.分析資料，並確認問題
- D.檢視驗證結果及合理解釋

16.有關護理問題的書寫，下列何者是較適合的護理問題之敘述？

- A.高血壓誘發之子癲前症
- B.術前情緒不穩需要支持
- C.頭痛／因病人血壓偏高
- D.焦慮／對治療的不了解

17.影響藥物劑量的因素，下列敘述何者正確？

- A.心臟病藥物的排泄速度快，不易產生成癮作用
- B.女性的代謝力較低，所以用藥劑量較男性小
- C.不同年齡之敏感性有差異，所以老年人需要高劑量才能見效
- D.Penicillin由腎臟代謝速度快，需密集給藥才能達到有效治療濃度

18.80歲，女性，醫囑為給與Gentamycin 30 mg iv Q6H，藥局提供的Gentamycin為每瓶2毫升含60 mg的劑型，則護理師應抽取多少mL的藥量？

- A.0.50
- B.0.75
- C.1.00
- D.1.25

19.有關脂溶性藥物的溶解速度，影響藥物動力學中那一項的作用時間？

- A.吸收
- B.分布
- C.游離
- D.排泄

20.護理師給藥必須三讀五對，美國護理協會（ANA，2004）的建議給藥安全還要再加第「六」對，請問是下列那一項？

- A.床號對
- B.性別對
- C.給藥紀錄對

D.病人出生年月日對

21.王先生，因為車禍造成頭部外傷入院，若病人發生中樞性尿崩症（抗利尿激素分泌過少），病人會出現下列何種現象？

A.總尿量：1200 c.c.

B.尿比重：1.008

C.尿滲透壓：550 mOSM/L

D.尿液呈黃褐色

22.有關長期靜脈灌注注射部位的選擇，下列何者應儘量避免？

A.肱靜脈

B.頭靜脈

C.大隱靜脈

D.貴要靜脈

23.李太太因車禍造成腦損傷、意識喪失、顱內壓過高，以下何者輸液最不適當？

A.5%葡萄糖水溶液（5% glucose water）

B.乳酸林格氏液（Lactated Ringer Solution）

C.林格氏液（Ringer Solution）

D.0.9%食鹽水溶液（0.9% NaCl）

24.王先生，大量腹瀉3天、全身無力，由急診入院，護理師照護時應注意下列何者情形的發生？

A.代謝性酸中毒

B.代謝性鹼中毒

C.呼吸性酸中毒

D.呼吸性鹼中毒

25.有關便秘的衛教，下列何者正確？

A.多吃能增加腸道容積的蛋糕、蛋捲等食物，促進腸蠕動

B.蔓越莓汁或蘋果汁具軟便、刺激腸胃道的功能，有助排便

C.解便時以雙手加壓腹部，依結腸走向做腹部環狀按摩，促進排便

D.每天使用瀉劑以養成規律排便，預防便秘

26.人體的排尿反射中樞位在哪處？

A.頸椎C5～C6

B.胸椎T6～T12

C.腰椎L4～L5

D.薦椎S2～S4

27.指導個案會陰收縮運動以改善尿失禁，下列敘述何者不適當？

A.重複收縮、放鬆會陰肌肉，可強化會陰肌肉張力

B.女性尿失禁個案適用會陰收縮運動，男性尿失禁個案並不適合

C.協助個案了解會陰收縮運動的肌肉，可利用排尿時突然終止小便的方式體會

D.教導個案自主咳嗽或大笑前，主動而有力的收縮骨盆底肌肉，以預防尿失禁的發生

28.關於成人女性病人留置導尿管的護理，下列敘述何者正確？

- A.留置導尿管時，水球應注入3 mL蒸餾水
- B.導尿管大小應選用10～12 Fr
- C.宜採取屈膝仰臥式
- D.導尿管插入的深度應為15～20公分

29.林女士，58歲，診斷為膽囊炎，目前測量血壓數值為148/90 mmHg，高於其平時血壓值，下列護理措施何者適當？

- A.告訴林女士目前血壓值偏高，並通知醫師處理
- B.囑咐林女士先臥床休息15分鐘後再測量
- C.給與林女士高血壓疾病飲食衛教
- D.告訴林女士血壓正常

30.王小姐，45歲，因咳嗽入院治療，今天發現病人全身皮膚發紅，體溫39.2°C、呼吸30次／分、心跳速率120次／分、主訴全身倦怠無力，目前正處於發燒過程的那一期？

- A.退燒期
- B.極熱期
- C.開始期
- D.弛張期

31.病人行右拇指微創手術，術後須以彈性繃帶進行包紮至腕部，下列何者為最適當的包紮法？

- A.環形包紮法
- B.螺旋包紮法
- C.螺旋回反包紮法
- D.人字形包紮法

32.有關長期臥床病人易發生血栓的發生機轉，下列何者錯誤？

- A.血小板活性增加
- B.紅血球數目增加
- C.血管壁受傷或發炎
- D.血液流速減緩

33.護理師要將一位右側肢體偏癱中風病人，由床上移到輪椅，下列何者是輪椅放置最適當的方式？

- A.將輪椅與病床呈45°，輪椅靠近病人右側肢體
- B.將輪椅與病床呈45°，輪椅靠近病人左側肢體
- C.將輪椅與病床呈90°，輪椅靠近病人右側肢體
- D.將輪椅與病床呈90°，輪椅靠近病人左側肢體

34.高蛋白飲食的適用對象，下列何者除外？

- A.發燒病人
- B.燒傷病人
- C.腎功能不全者
- D.肝炎急性期者

35.有關自動出院（against advice discharge, A.A.D.）的描述，下列敘述何者正確？

- A.A.A.D.是指病人仍需住院治療，但病人或家屬堅持出院
- B.醫師不需開立自動出院醫囑，因病人有醫療自主權
- C.病人未具備醫護知能，離院後的病情應由醫師負責
- D.自動出院的病人已有離院準備，不需提供出院計畫

36.下列何者為季麗絲（Gillies）護理管理過程理論中轉化過程的首要步驟？

- A.資料收集
- B.規劃與組織
- C.人事管理
- D.領導與控制

37.護理公會全聯會於平面及電子媒體報導護理專業對社會的貢獻，下列目的何者正確？①能引發民眾關注及共鳴 ②調整對護理專業的刻板印象 ③行銷護理專業形象 ④爭取護理師權益及福利 ⑤改善機構的護理執業環境

- A.①②③
- B.②③④
- C.③④⑤
- D.①②⑤

38.某機構規定產後病房護理工作滿2年須調至產房工作，是屬於下列何種工作設計類型？

- A.工作擴大化
- B.工作輪替化
- C.工作簡單化
- D.工作豐富化

39.某產後護理之家，每位產婦每月收費為35萬，毛利率為六成，每月的固定支出為650萬元，為達損益平衡，平均每月至少應收多少位產婦？

- A.29
- B.31
- C.34
- D.36

40.某財團法人將成立一家婦產專科醫院，下列何種決策工具最適合對新成立的機構進行深入、全面地分析？

- A.決策方格分析法（Decisional Grid）
- B.強弱危機綜合分析法（SWOT Analysis）
- C.根本原因分析法（Root Cause Analysis）
- D.特性要因圖分析法（Fish Bone Chart）

41.將50張病床之病人分組成6個單元，每一個單元的8~10位病人由固定的護理人員提供護理照護，此照護模式稱為：

- A.成組護理（Team Nursing）
- B.全責護理（Primary Nursing）

C.綜合性護理（Modular Nursing）

D.技術混合照護（Skill-mixed Nursing）

42.有效溝通之目的，不包含下列何者？

A.加強工作協調合作

B.提高主管意見的採用度

C.增強工作動機及滿意度

D.增進組織有效改變

43.某區域醫院之急性一般病房有40床，占床率70%，休假係數為1.5，依據醫院評鑑標準所訂之全日平均護病比不得高於12，該病房所需之護理人員配置至少幾人？

A.9

B.10

C.11

D.12

44.有關評估臨床護理工作量之依據，下列何者錯誤？

A.護理活動

B.護理時數

C.病人分類

D.人員異動

45.關於護理教育訓練之敘述，下列何者正確？

A.課程設計首要步驟為訂定教學目標

B.教學策略應依學習結果彈性調整

C.雙向回饋屬於教學策略的一部分

D.教學評量是重視教學者的反應

46.某單位兩位護理師因農曆過年排班發生衝突，護理長當下立即與兩位護理師共同討論，並找出最佳方案，讓兩位護理師都滿意，此護理長所運用的衝突處理是屬於下列那一種模式？

A.競爭

B.順應

C.妥協

D.統合

47.危機管理是一系列的持續性活動，下列何者不屬於危機管理的步驟？

A.危機信號的偵測

B.做好準備與防範

C.危機與損害控制

D.檢討原因與咎責

48.下列何者為產後護理機構常用於衡量生產力的指標？

A.員工滿意度

B.產婦入住量

C.教育訓練費用

D.衛耗材使用量

49.有關護理品質管理工具，應用80/20原理找出品質改善策略，是屬於下列何者？

A.流程圖

B.魚骨圖

C.柏拉圖

D.管制圖

50.有關我國醫院病人安全工作目標「提升用藥安全」之執行重點，下列何者正確？

A.落實感染病人抗生素使用管理機制

B.營造病人安全異常事件的通報文化

C.落實用藥過敏及不良反應史的傳遞

D.落實手術辨識流程及安全查核作業