

108 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、
心理師、護理師、社會工作師考試、108 年專門職業及技術人員高等考試法醫師、
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

代號：3102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師（二）

科 目：中醫臨床醫學（三）（包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 腫瘍初起，皮膚作癢者的病因為下列何者？
(A)毒勢熾盛 (B)風熱相搏 (C)脾胃濕重 (D)氣血通暢
- 2 有關瘡瘍的調治方法，下列何者錯誤？
(A)腫瘍之治，總以消散為第一要務 (B)有表證者，以通潤為宜
(C)陽毒大疔，切不可早投補益 (D)內熱甚者，重用消毒清解
- 3 中醫外科學在「疽」的診斷名詞中，有「涌泉疽」與「湧泉疽」二者，有關二者之比較，下列何者正確？
(A)「涌泉疽」乃生於足心處 (B)「湧泉疽」乃生於尻骨之前
(C)「涌泉疽」乃因腎經虛損，兼濕熱下注而成 (D)「湧泉疽」別名足心發，俗名病穿板、井泉疽
- 4 在中醫外科領域中，下列何種疽，不是生於頭部，而是長於其他部位？
(A)百會疽 (B)勇疽 (C)侵腦疽 (D)敦疽
- 5 30 歲男性來診所自述右側臀部疼痛已數天，經局部檢視，在右臀腿之間摺紋處皮膚局部結塊紅腫熱痛，尚未成膿，但疼痛影響步行及坐臥，下列診斷何者最正確？
(A)跨馬癰 (B)上（下）馬癰 (C)箕門癰 (D)肚門癰
- 6 醫師對於顏面三角區的感染都採取較謹慎態度，下列敘述何者正確？
(A)印堂疔生於兩眉中心印堂穴，係陽明胃經積熱所致
(B)鼻疔生於鼻孔內或外鼻部，乃是心腎二經火毒所致
(C)迎香疔生於鼻觀下迎香穴，係肝膽二經風熱客聚所生
(D)人中疔生於上唇溝中，乃當督脈經行之地，頭面生疔以此疔最易毒散
- 7 一位 28 歲男性，於數日前右手大指次指手丫間合谷穴處長一粟米小皰，焮熱癢痛，數日後腫及掌背，漸漸醱膿，下列診斷何者最適宜？
(A)手丫疔 (B)手丫發 (C)手發背 (D)合谷疔
- 8 有關鈕扣風的敘述，下列何者錯誤？
(A)因汗出之後，邪風襲於皮裏或衣領壓擦而成 (B)發於肌膚，遊走無定
(C)輕者外敷獨聖散或冰疏散 (D)甚者服消風散即癒
- 9 下列何種疾患，即今之灰指甲？
(A)漏底風 (B)掌心風 (C)鵝掌風 (D)鵝爪風
- 10 依《中醫外科講義》小兒患鶴膝風者，腫硬色白，亦不醱膿，此係氣血不足，兼受風寒所致，宜服下列何方加鹿茸牛膝等以補其精血，兼理脾胃，助其生化之源，為治本之法？
(A)十全大補湯 (B)六味丸 (C)右歸飲 (D)陽和湯
- 11 某中年經商男子平日應酬多，嗜食辛辣厚味，初發面目浮腫，癢若蟲行，肌膚乾燥，時起白屑。其最可能的診斷為下列何者？
(A)面遊風 (B)赤白遊風 (C)白駁風 (D)油風
- 12 下列那一種皮膚病的臨床特徵是皮膚表面出現銀白色厚厚的鱗屑，刮之可見皮下出血，手足頭皮或軀幹均可發，不會傳染，但偶爾會波及關節或指甲？
(A)錢癬 (B)白疔 (C)鵝掌風 (D)白駁風

- 13 胖人項後髮際肉厚而多摺紋，其髮反刺瘡內，因循日久不瘥，又兼受風寒凝結，形如臥瓜，破爛津水，時破時斂，此類皮膚病的臨床診斷病名，下列何者最適當？
(A)燕窩瘡 (B)膿窠瘡 (C)肉龜 (D)松皮癬
- 14 依中醫病因理論，下列那一種皮膚病的起因與接觸外來刺激物最無關係？
(A)漆瘡 (B)蜘蛛瘡 (C)狐水刺 (D)火赤瘡
- 15 依《中醫外科學》有關葡萄疫的敘述，下列何者錯誤？
(A)多因嬰兒感受疫癘之氣，鬱於皮膚，凝結而成
(B)臨床初發常見腿脛皮膚出現大小青紫色斑點，狀如葡萄
(C)甚則邪毒攻胃，以致牙齦腐爛，味臭出血，形類牙疳
(D)初起宜服羚羊角散，久虛者宜服胃脾湯，牙齦腐爛者可服銀杏無憂散
- 16 有關纏腰火丹的敘述，下列何者錯誤？
(A)又稱蛇串瘡
(B)皮疹出現累累如珠形，質乾色紅赤，作癢發熱，此屬肝心二經風火
(C)皮疹出現色黃白水泡，大小不等，作爛流水，最適合用當歸飲子治療
(D)年老體弱者，常因血虛肝旺，濕熱毒盛，氣血凝滯，以致疼痛劇烈，病程遷延
- 17 下列何者不是坐板瘡的別名？
(A)風疔 (B)胎風 (C)猴疔 (D)瘰癧
- 18 患者皮裡膜外長有腫瘤數顆，大小不一，但無全身症狀，腫瘤質地柔軟如棉，按之可以壓扁，推之也可移動，有時略硬如饅，此診斷以下列何者最適宜？
(A)肉瘤 (B)骨瘤 (C)血瘤 (D)筋瘤
- 19 有關舌疳的敘述，下列何者正確？
(A)初起腫赤時可服「導赤散」加黃連 (B)由肝火上升，結於舌部而生
(C)大便溏薄者，可服「歸脾湯」 (D)預後佳
- 20 有關梅瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)又名梅毒
(B)其瘡小軟者又稱棉子瘡
(C)因妓女與前客交後，患者復與之交而得，又名妬精瘡
(D)清中葉由外國傳入，始於廣東，又名廣瘡
- 21 患者於籃球運動後突發膝痛，有關其膝痛的診斷及治療，下列選項何者正確？①受傷初期完全不可使用手法於患處治療 ②需排除骨折可能性 ③當患處瘀血腫脹逐漸消退，不需建議患者及時進行肌肉收縮活動 ④可以內服外用活血化瘀、消腫止痛藥物 ⑤受傷後如進行檢測發現 McMurray test (+)，需高度懷疑十字韌帶損傷
(A)①③⑤ (B)僅①③ (C)②③⑤ (D)②④
- 22 有關傷筋的包紮固定，下列選項何者正確？①不可維持手法治療後的效果 ②不利於消腫止痛，解除痙攣 ③為傷筋修復創造有利的條件 ④經手法治療後，應將關節固定於關節穩定、易於癒合的位置
(A)僅③ (B)僅③④ (C)②③④ (D)①②④
- 23 有關傷筋的併發症敘述，下列選項何者正確？①慢性腫脹是四肢傷筋中常見的併發症 ②傷筋後由於血腫吸收不完全及周圍軟組織撕裂傷或斷裂，可造成關節活動度受限 ③關節扭挫傷後合併關節或韌帶骨化現象最常發生的部位是掌指關節 ④由於韌帶嚴重的撕裂或斷裂，之後可能會有關節不穩定之現象
(A)②③④ (B)①②③ (C)①③④ (D)①②④

- 24 肱二頭肌為一跨關節的肌肉，其橫跨肩關節及肘關節，下列敘述何者正確？
 (A) 肱二頭肌，短頭起於孟上結節，長頭起於喙突，兩頭皆止於橈骨粗隆
 (B) 肱二頭肌肌腱斷裂時，因肌腱附著點斷裂造成肱二頭肌肌腹回縮，故於上臂中段有明顯之隆起（Popeye lump）
 (C) 肱二頭肌，收縮會使肩、肘關節彎曲，前臂旋前
 (D) 肱二頭肌，若處於急性炎症期，垂臂試驗（drop arm test）陽性
- 25 下列何種損傷會出現交鎖現象？
 (A) 髕下脂肪墊 (B) 膝十字韌帶
 (C) 髕前滑囊 (D) 膝關節半月板
- 26 患者主訴肩外展乏力，令其主動外展，可見患者需聳肩且側彎身體代償，肩關節活動度：被動肩外展大於主動肩外展，下列何診斷最適宜？
 (A) 肩關節周圍炎 (B) 二頭肌肌腱斷裂
 (C) 棘上肌肌腱斷裂 (D) 胸廓出口症候群
- 27 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》所述，「大腿曰股，股上曰髀，髀骨之下，大腿之上，兩骨合縫之所，曰髀樞」，其中「髀樞」最接近那個穴道位置？
 (A) 委中 (B) 風市 (C) 腎俞 (D) 環跳
- 28 有關脊椎崩解（Spondylolysis）與滑脫（Spondylolisthesis）的敘述，下列選項何者正確？①脊椎崩解是指脊椎在間隔處有向前移動 ②脊椎滑脫是指上下關節突有間隙存在 ③常發生在第五腰椎，有時在第四腰椎 ④有先天及後天兩種因素 ⑤女性因常穿高跟鞋或懷孕關係較男性容易發生
 (A) ①③④⑤ (B) ②③④⑤ (C) ①②⑤ (D) 僅③④
- 29 有關腰椎椎管狹窄症的 X 光（正、側、斜位）檢查常在 L4-L5、L5-S1 之間可見改變，下列共幾項正確？①椎間隙狹窄 ②骨質增生 ③椎體滑脫 ④腰骶角變小 ⑤小關節骨突肥大
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- 30 45 歲男性患者為一般上班族，長時間使用電腦，最近發現左側肩、臂、手麻木疼痛，在理學檢查時見拇指、食指感覺減退，壓頭試驗陽性，下列診斷何者最適當？
 (A) 頸部扭挫傷 (B) 頸椎椎間盤突出
 (C) 失枕 (D) 頸動脈狹窄
- 31 承上題，患者的拇指、食指感覺減退，提示下列何部位有病變？
 (A) 頸 4、5 椎間 (B) 頸 5、6 椎間
 (C) 頸 6、7 椎間 (D) 頸 7、胸 1 椎間
- 32 37 歲男性木工，近 3 個月偶感肘外側疼痛，壓痛明顯，提熱水瓶、扭毛巾、甚至掃地等動作均感疼痛乏力，疼痛甚至可向上臂及前臂放散，當作抗阻力的腕關節背伸和前臂旋後動作可引起患處的疼痛，其最可能病症為何？
 (A) 橈骨莖突狹窄性腱鞘炎 (B) 高爾夫球肘
 (C) 鷹嘴滑囊炎 (D) 網球肘
- 33 關於大魚際掌面包含的肌肉，下列何者正確？
 (A) 外展拇長肌 (B) 內收拇肌 (C) 外展小指肌 (D) 屈指深肌

- 34 60 歲婦女慢性腰痛 2 年，未積極治療，其 X 光如圖所示，下列處置何者適宜？①立即進行手術，腰椎放鋼板以免惡化 ②適時穿戴護腰 ③患處疼痛可外敷活血止痛藥膏 ④多訓練腰背肌肉、四肢肌肉 ⑤適度的牽引也可使用

(A) ①④⑤
(B) ①②③
(C) 僅②④⑤
(D) ②③④⑤



- 35 關於膝關節髕下脂肪墊損傷之敘述，下列何者錯誤？

(A) 大部分是因為反覆的膝關節碰撞挫傷扭傷引起
(B) 發病在男性多於女性
(C) 站立或膝關節過伸會發生疼痛無力
(D) 在髕韌帶及兩膝眼部位腫脹有壓痛

- 36 有關橈骨莖突狹窄性腱鞘炎的敘述，下列何者錯誤？

(A) 好發於經常用腕部及手指操作的勞動者 (B) 芬克斯坦氏測試 (Finkelstein test) 陽性
(C) 與外展拇長肌及伸拇短肌有關 (D) 常見下尺橈關節局部腫脹

- 37 有關腓腸肌及其損傷，下列敘述何者錯誤？

(A) 疼痛大多發生在肌腱聯合處 (B) 損傷常起因於肌肉強力收縮
(C) 腓腸肌起於股骨兩髁後面，止於跟骨後結節 (D) 臨床常見垂足症

- 38 檢查肩關節使用的 Apprehension test，下列敘述何者錯誤？

(A) 檢查時手臂外展外旋姿勢 (B) 檢查時病人出現恐慌表情則為陽性
(C) 二頭肌發炎時會呈現陽性反應 (D) 常用於檢查肩關節脫位

- 39 下列何者不屬足弓內側的構造？

(A) 距骨 (Talus) (B) 舟狀骨 (Navicular)
(C) 楔狀骨 (Cuneiforms) (D) 骰子骨 (Cuboid)

- 40 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關少腹引陰莖作痛證治，下列何者較不合適？

(A) 瘀血不行 (B) 肝氣鬱火
(C) 可用大劑參附湯 (D) 痛勢穩定後，再用養血之劑

- 41 有關《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中下列方劑之組成，何者敘述正確？

(A) 抵當湯：水蛭、虻蟲、大黃、桃仁、當歸、紅花、甘草
(B) 復元活血湯：柴胡、瓜蒌根、當歸、紅花、甘草、穿山甲、大黃、桃仁
(C) 巴戟湯：巴戟、大黃、地黃、川芎、紅花
(D) 清心藥：丹皮、當歸、黃連、赤芍、地黃、連翹、梔子、甘草

- 42 有關損傷血虛的敘述，下列何者錯誤？

(A) 肝腎不足、脾不生血屬於可能機轉原因 (B) 脈浮大無根者，為氣血虛極，陰陽離絕之證
(C) 處方一律大量獨參湯補氣養血 (D) 常因出血過多或傷久血虛

- 43 有關傷科內傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)傷後由於氣滯血瘀，可能會出現神疲納呆、夜寐不安、便秘等全身症狀
(B)可觀察眼睛的血脈經絡變化來診察受傷的部位
(C)可觀察指甲的表現來評估受傷的嚴重程度
(D)依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》所述：「凡跌打損傷墜墮之證，惡血留內，則不分何經，皆以脾為主，蓋脾統血也。」
- 44 有關損傷的敘述，下列何者錯誤？
(A)氣血的改變是損傷內證的主要基礎，因此內證的治療當以「治氣血」為中心
(B)針對損傷內證，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》：「……專從血論，須先辨或有瘀血停積，或為亡血過多，然後施以內治之法……」
(C)針對創傷出血，《血證論·創血》：「無偏陰偏陽之病，故一味止血為要，止得一分血，保得一分命。」
(D)患者因外力受傷而出現內傷症狀，則該患者必定會有相對的損傷於體表出現
- 45 受傷之後煩躁、面赤、口乾、脈洪大按之如無者。依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，可選用那個方藥處理？
(A)獨參湯 (B)柴胡四物湯 (C)當歸補血湯 (D)血府逐瘀湯
- 46 附骨癰初起，開放性損傷創面感染初期，下列方劑治療何者最適宜？
(A)四生丸《婦人良方》 (B)五味消毒飲《醫宗金鑑》
(C)十灰散《十藥神書》 (D)小薊飲子《濟生方》
- 47 關於「傷科內傷」的敘述，下列何者錯誤？
(A)《華氏中藏經·論診雜病必死候》曾載：「病墜損，內傷」
(B)由於外力作用而引起人體內部氣血、經絡、臟腑損傷而致功能紊亂的病症
(C)碰撞、打擊、跌仆、墜墮等，皆可導致內傷
(D)包含七情、痰食所引起的內傷
- 48 有關成人缺血性股骨頭壞死之敘述，下列何者錯誤？
(A)以男性發生的機會較大
(B)初期在髖關節蛙位 X 光片可見新月徵 (crescent sign)
(C)常出現鼠蹊部疼痛症狀
(D)據研究可能與長期酗酒、類固醇濫用有關
- 49 有關肱骨外科頸外展型骨折，下列敘述何者錯誤？
(A)骨折近段受棘上肌、棘下肌牽拉，呈輕度外展、外旋移位
(B)骨折遠段的中、上部受三角肌牽拉向上縮短移位
(C)手法整復後將患肢置於外展 20 度以上、前屈 30 度位置，作上臂超肩小夾板固定
(D)常發生於上臂在外展位跌倒
- 50 有關肱骨髁上骨折，下列敘述何者錯誤？
(A)為預防骨化性肌炎，應及早進行被動活動復健
(B)合併神經損傷者，絕大多數係神經挫傷所致，神經斷裂傷極為少見
(C)骨折位移一般可分為伸直型與屈曲型
(D)腫脹嚴重者，骨折整復後，注意夾板不宜包紮過緊，並應嚴密觀察患肢血液循環
- 51 下列骨折何者最易造成大動脈血管損傷？
(A)股骨轉子間骨折 (B)股骨幹上 1/3 骨折
(C)股骨幹中 1/3 骨折 (D)股骨幹下 1/3 骨折

- 52 有關跟骨骨折，下列何種骨折不會改變跟骨結節關節角（跟骨結節與後關節突的聯線與前後關節的聯線交叉成角）？
- (A)跟骨結節底部骨突骨折
(B)跟骨舌形骨折
(C)跟骨丘部橫形塌陷骨折併跟骨體冠狀位骨折
(D)跟骨外翻型骨折繼發性丘部骨折致跟骨結節關節面有改變
- 53 下圖為 60 歲男性走路自跌，左髖疼痛。下列敘述何者正確？



- (A)為不穩定骨折
(B)是順轉子間型骨折
(C)易發生股骨頭缺血性壞死
(D)此為囊內骨折
- 54 下列那些為肩關節脫位復位後之檢查與固定方法？①患肢屈肘 90 度，試以手掌搭於對側健肩，觀察肘部是否能與胸壁貼近接觸 ②方肩表現是否消失 ③將患側上臂保持在內收外旋位置以繃帶固定於胸壁旁 ④以三角巾懸托患肢前臂貼於胸前
- (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 55 有關脫臼的敘述，下列選項何者正確？①構成關節的骨骼關節面脫離正常位置 ②發生關節活動障礙 ③亦稱脫骺 ④以肩、膝、肘關節脫位較為常見
- (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 56 膝關節脫臼復位後固定期的復健訓練要積極鍛鍊下列何者？①股四頭肌 ②踝關節 ③髖關節 ④股二頭肌
- (A)①②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- 57 做完髖關節後脫位的手法復位後，如用皮膚牽引固定法，大腿姿勢應保持下列何種狀態？
- (A)髖部在中度外展旋中位處 (B)髖部在中度外展旋後位處
(C)髖部在輕度外展旋中位處 (D)髖部在輕度外展旋後位處
- 58 脛腓骨幹雙骨折，一般又分上、中、下 1/3 骨折，關於脛腓骨幹雙骨折之敘述，下列何者錯誤？
- (A)常易在中、下 1/3 交界處發生骨折
(B)下 1/3 處，因血液供應差，癒合時間較長
(C)小腿的固定物切勿壓迫腓骨小頭，以防造成脛神經的損傷
(D)中、上 1/3 骨折，近段有股四頭肌及後大腿肌群附著，易使近段向前、向內移位

- 59 依《普濟方》，有關圖示整復手法的敘述，下列共幾項正確？①即「攀門拽伸法」 ②令患者俯臥於門板上，患者雙手攀住門板上緣，用三人在下腰部與雙下肢拔伸牽引，醫者用手按壓骨折部進行復位 ③是一種過伸位脊柱骨折復位法 ④臨床適用於體格健壯的胸腰椎壓迫性骨折

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4



- 60 有關骨折部位的組合，下列選項何者正確？①行軍骨折—跟骨 ②瓊氏（Jones）骨折—踝骨 ③蒙太奇（Monteggia）骨折—尺骨 ④拳擊手骨折—第5掌骨頸

(A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④

- 61 關於眼科病因之敘述，下列何者錯誤？

(A) 因勞倦、體力、目力使用過度，可致氣血耗傷，陰液虧損，易導致胞生痰核，疳積上目
(B) 眼部外傷，如：沙塵、小蟲入目，宜小心檢查，將異物移出
(C) 眼病中有因先天稟賦不足，如胎患內障；有因衰老使臟腑功能不足，如圓翳內障、老視等
(D) 七情致眼病中，以怒、憂、悲對眼的危害為甚，例如忿怒致肝氣上逆，引起暴盲，綠風內障

- 62 中醫名稱「神膏」相當於現代醫學所稱之：

(A) 房水 (B) 晶狀體 (C) 玻璃狀體 (D) 視網膜

- 63 根據史書記載，下列何者可謂是我國最早的五官科醫師？

(A) 扁鵲 (B) 岐伯 (C) 張仲景 (D) 華佗

- 64 關於胞輪振跳之敘述，下列何者錯誤？

(A) 症見胞輪頻頻眨動，不能自主，多見於小兒
(B) 可因久病過勞等損傷心脾，心脾血虛，筋肉失養所致
(C) 可因肝脾血虛，日久生風，虛風內動，牽動胞輪所致
(D) 本病輕者或偶爾發生者，不必治療，可以自愈

- 65 患者病發赤脈傳睛，兩眦赤脈淡紅，細小稀疏，微癢不舒，心煩不寐，舌紅少苔，脈細數，其最有可能之證治為何？

(A) 證屬心經實火，以瀉心湯治之
(B) 證屬肝腎兩虛，以左歸飲治之
(C) 證屬心經虛火，以補心湯治之
(D) 證屬肝血不足，外感風邪，以四物湯加防風、白芷、羌活治之

- 66 關於白澀症之敘述，下列何者錯誤？

(A) 雖為局部症狀，但常與身體病變有關，宜辨證論治之
(B) 肝腎屬虧虛者，宜杞菊地黃丸補益肝腎，滋陰養血
(C) 此症無關黑睛，不影響視力
(D) 屬脾胃濕熱者，宜三仁湯加減，清利濕熱

- 67 關於天行赤眼暴翳之敘述，下列何者錯誤？

(A) 傳染快，易造成流行，白睛混赤，黑睛會有星翳
(B) 患眼可出現乾澀不爽，黑睛出現細點黑翳，宜養陰清肺湯
(C) 患眼灼熱疼痛，眼瞼紅腫，胃素有積熱宜瀉肺飲加減
(D) 流行期，避免到公共場所、游泳池，以免散播流行

- 68 有關「撞擊傷目」之臨床表現，下列何者錯誤？
(A)伴有抱輪紅赤，畏光流淚 (B)晶珠漸混濁，成為驚震內障
(C)邪毒乘傷侵襲，可變凝脂翳 (D)單側眼瞼受傷瘀血腫脹，不過鼻梁
- 69 黃液上衝是一種黑睛疾病，治療時不論證之輕重，總宜以何法為主？
(A)滋陰降火 (B)瀉火解毒 (C)扶正祛邪 (D)祛風清熱
- 70 一患者有感鼻竇疼痛，尤以犬齒窩壓痛甚劇，可能為下列何種炎症？
(A)額竇炎 (B)篩竇炎 (C)上頤竇炎 (D)後篩竇炎
- 71 下列何者非屬音叉試驗之「聽力計檢查」？
(A)任內試驗 (Rinne test) (B)韋伯試驗 (Weber test)
(C)卡洛里試驗 (Caloric test) (D)施瓦伯試驗 (Schwabach test)
- 72 耳科疾病錯綜複雜，下列敘述何者正確？
(A)耳脹之因為風邪侵襲，經氣痞塞時，治以通氣散加減
(B)膿耳之因為肝膽火盛，邪熱外侵時，治以托裏消毒散加減
(C)耳殼流痰，治以柴胡清肝散
(D)黃耳傷寒見熱盛動風，用清宮湯加藥
- 73 一患者常有眩暈症狀，自述在情緒波動或心情不佳時病情更嚴重，有時甚至有頭痛、口苦咽乾、紅眼、胸脅鬱悶，睡眠品質不佳、多夢等情形，觀其舌象發現舌質色紅，舌苔色黃，脈象緊且快。以上診斷應屬於耳眩暈中下列何種證型？
(A)上氣不足 (B)痰濁中阻 (C)肝陽上擾 (D)寒水上犯
- 74 某女性患者耳鳴如風雷聲，每次鬱怒之後，耳鳴耳聾突發加重，時有耳脹耳痛感，偶有眩暈，口苦咽乾，舌紅苔黃，脈弦數有力，此病因為何？
(A)風邪侵襲 (B)肝火上擾 (C)痰火鬱結 (D)腎精虧損
- 75 鼻槁若因腎虛及肺，證出現鼻孔乾燥，咽乾燥痛，手足煩熱，舌紅少苔，脈細數，為肺腎陰虛者，宜百合固金湯治療。處方中用那些藥物，作為滋養肺腎之主藥？
(A)二地、百合 (B)玄參、桔梗 (C)麥門冬、甘草 (D)貝母、芍藥
- 76 鼻通過經絡與五臟六腑緊密的聯繫著。沿著額正中下行到鼻柱至鼻尖端至上唇，為下列何經脈？
(A)大腸經 (B)小腸經 (C)膀胱經 (D)督脈
- 77 古人有「走馬看喉風」之說，形容病情危急，變化迅速，嚴重者瞬息間可以引起窒息死亡，其相關護理何者錯誤？
(A)痰涎較多，應採平臥為佳 (B)飲服藥物應緩緩吞嚥
(C)應多休息，少活動 (D)忌燥熱及甜膩食物
- 78 咽喉是經脈循行交會之處，其中「上行挾食道兩旁，循經咽喉連於舌根」者，為下列何經？
(A)足太陰脾經 (B)足少陰腎經 (C)足厥陰肝經 (D)手太陰肺經
- 79 有關口齒病的敘述，下列何者錯誤？
(A)風熱邪毒侵犯口腔肌膜齦肉，會導致氣滯血瘀，出現紅腫痛癢及牙痛
(B)外感邪熱壅盛內傳胃腑，熱困中焦而化火上炎口齒唇舌，會導致肌膜紅腫潰爛疼痛
(C)邪毒內蘊，肺經受熱，肺火上攻，熱邪傷津成痰，痰熱結聚於舌，會導致舌體脹胖強硬，語言蹇澀
(D)腎虛會導致髓弱骨枯，骨枯則不能固齒，易生齦齒，若為邪毒侵犯，滯留牙齦，久則傷肌蝕膜，血脈收縮而萎縮
- 80 25 歲女性患者，主訴唇部紅腫痛癢近 1 月，並有破裂流水，望診其舌紅苔黃，並有口乾渴喜飲，口臭，大便乾燥，脈滑數等症，治以下列何方最適當？
(A)雙解通聖散加金銀花 (B)薏苡仁湯加白朮
(C)補中益氣湯加滑石 (D)豬苓湯加黃耆