

109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：2102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(二) (包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 70歲何女士有肺結核病史，長期咯吐濁唾涎沫、咯痰黏濁不爽、口渴咽燥、音啞、語音乏力、氣急喘促，舌偏紅而乾、苔薄少，脈濡細數，治以下列何方最適宜？
(A)生薑甘草湯 (B)桔梗湯 (C)麥門冬湯 (D)如金解毒散
- 林女士因感冒就診，症見咳嗽聲重、咽癢、痰稀薄白色、鼻塞、清涕、頭痛、肢體酸楚、惡寒、發熱、苔薄白、脈浮。下列治療藥物何者最適宜？
(A)半夏、陳皮、茯苓、甘草 (B)麻黃、杏仁、甘草
(C)桑白皮、地骨皮、粳米、甘草 (D)桔梗、甘草
- 下列有關哮證及喘證之敘述，何者錯誤？
(A)喘促喉間水雞聲者，為哮證 (B)哮病反覆久延，可能發展成喘證
(C)喘證發病機理，主要在肺和心 (D)哮證發病機理為痰氣搏結，壅阻氣道，肺失宣降
- 下列有關氣喘病機和病情之敘述，何者錯誤？
(A)外邪侵襲或它臟病氣上犯，皆可使肺失宣降 (B)病情重篤者，則見脫證
(C)虛喘責之肺脾兩臟，吐納失常 (D)重證每多影響到心
- 感冒，外邪侵襲人體是否引起發病，其關鍵主要在下列何者？
(A)節氣之變化 (B)邪氣之強弱 (C)正氣之強弱 (D)飲食之宜忌
- 62歲呼吸道阻塞症候群的患者，長期於胸腔內科追蹤治療，現症狀較緩解，惟疲勞時則咳喘易發作，走動則喘咳明顯，平時表現腰膝痠軟無力，毛髮枯黃，頭暈，舌紅、少苔，脈細數。調理時，治以下列何者最適宜？
(A)丹皮、山茱萸、茯苓、生地、澤瀉、山藥、五味子
(B)熟地黃、山藥、山茱萸、枸杞、鹿角膠、菟絲子、杜仲、當歸、肉桂、製附子
(C)何首烏、赤芍、白芍、黑豆、茯苓、牛膝、當歸、枸杞、菟絲子、破故紙、黑芝麻
(D)黃耆、炙甘草、人參、當歸、陳皮、升麻、柴胡、炒白朮
- 中風，若臨床表現以昏迷、痰涎壅盛為主者，其病因病機以下列何者為主？
(A)火 (B)風 (C)痰 (D)虛
- 80歲馬先生突然昏倒不省人事，同時症見目合，口張，鼻鼾息微，手撒肢冷汗多，大小便自遺，肢體癱軟，舌痿脈細弱。下列敘述何者錯誤？
(A)此屬中臟腑
(B)脫證
(C)病機為元氣衰微，陽浮於上，陰竭於下，陰陽將離，心神頹敗
(D)主方用補陽還五湯
- 24歲張女士，近因急性腎炎就診，症見眼瞼浮腫，上半身較下半身腫，來勢迅速，合併惡風發熱，肢節酸痛，苔薄白，脈緊，治以下列何方最適宜？
(A)越婢加朮湯 (B)五苓散 (C)實脾飲 (D)金匱腎氣丸
- 有關支飲治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)治療以「溫藥和之」為原則
(B)若陽虛而飲邪不盛之微飲，則以溫脾健腎為主
(C)若為脾腎陽虛者，以苓桂朮甘湯主之
(D)若為寒飲伏肺者，以大青龍湯主之

- 11 有關胸痹的鑑別診斷，下列敘述何者錯誤？
(A)胸痹多見於中、老年人，特別是勞累、飽餐或情緒激動後突然發作
(B)胃脘痛主要表現為胸腹之間、心下的疼痛，常伴噁心、嘔吐、腹脹等症狀
(C)結胸主要表現為心下疼痛，按之硬滿，並可見大便溏瀉，噁心、嘔吐等症狀
(D)懸飲可見到胸部疼痛，多掣及脅肋，持續不解，並伴有咳嗽，轉側及呼吸時疼痛加重
- 12 45 歲鄭女士，2 週前因肺炎住院，以抗生素治療，出院後常覺胸膈不舒，特別吃完東西後，容易打嗝，嗝聲沉緩有力，同時覺胃脘不舒，得熱則減，食慾差，口淡不渴，舌淡紅、苔白潤，脈遲緩，治以下列何方最適當？
(A)溫膽湯 (B)丁香散 (C)竹葉石膏湯 (D)加味逍遙散
- 13 59 歲孫先生，主訴近數月來食慾變差，症見噯氣、打嗝嚴重，下列病機何者最適當？
(A)腎不納氣 (B)脾運失司 (C)宿食停滯 (D)胃氣上逆
- 14 45 歲朱女士，主訴近日嘔吐，嘔吐物多為清清水水的痰涎，胸覺滿悶，食慾差，苔白膩，脈滑，治以下列何方最適宜？
(A)二陳湯 (B)丁香散 (C)竹葉石膏湯 (D)沙參麥冬湯
- 15 42 歲柯先生，為銀行的理財專員，主訴近日喝酒後易覺胃脘悶脹，嘈雜吐酸，口渴喜冷，口臭，常覺似飢非飢，舌紅，苔黃厚膩，脈滑數，治以下列何方最適當？
(A)黃連溫膽湯 (B)保和丸 (C)柴胡疏肝散 (D)大承氣湯
- 16 治療濕熱痢之裏急後重症狀，應在清化濕熱的方藥中加用下列何類藥物最適當？
(A)消食藥 (B)行血藥 (C)收澀藥 (D)理氣藥
- 17 某 27 歲女性患者，上週因與男朋友爭吵，致兩脅脹痛，併胸悶氣短，納呆，噯氣後症狀會較減輕，舌苔薄白，脈弦。此屬下列何證？
(A)肝氣鬱結 (B)肝火上炎 (C)肝陰不足 (D)瘀血阻絡
- 18 承上題，以下列何方治療最宜？
(A)一貫煎 (B)柴胡疏肝散 (C)血府逐瘀湯 (D)龍膽瀉肝湯
- 19 58 歲方先生罹患慢性腎炎多年，主訴腰以下冷痛，腰部沉重感，麻痺疼痛，屈伸不利，下雨加重，苔白滑，脈濡緩，治以下列何方最適當？
(A)四妙散 (B)復元活血湯 (C)甘薑苓朮湯 (D)獨活寄生湯
- 20 68 歲劉先生罹患尿毒症，最近發現小便越來越少，且常出現嘔吐的症狀，症見說話有氣無力，面色無華，唇甲蒼白，臉部和腳都容易水腫，手足不溫，納呆，腹脹，泛惡，大便溏，脈濡細，苔薄、質淡，治以下列何方最適當？
(A)黑錫丹 (B)抑肝散 (C)金匱腎氣丸 (D)理中湯
- 21 下列有關休格蘭氏症候群 (Sjögren syndrome) 之敘述，何者錯誤？
(A)以中年女性居多，常合併於其他風濕性疾病中，如類風濕性關節炎
(B)發病原因目前仍未完全清楚，可能和病毒 (EB virus)、賀爾蒙、基因有關
(C)當患者出現口乾口苦口臭、渴不欲飲、胸悶食少、小便短赤、大便溏、脈滑數時，此為陰虛濕熱之證
(D)臨床上如果為陰虛濕熱之證，宜以甘露飲加減治之
- 22 37 歲楊小姐，自述有類風濕性關節炎病史，就診時主訴近幾天始又發生遊走性關節疼痛，痛無定處，苔白，脈浮，治法以下列何者最適當？
(A)溫經散寒，祛濕散腫 (B)化痰祛瘀，搜風通絡
(C)祛風通絡，散寒除濕 (D)祛風除濕，補益氣血
- 23 45 歲的女性拿了一份病理報告前來求診，報告上指出：「周邊多處關節周圍組織有非感染性炎症，為關節滑膜的慢性炎症，細胞浸潤、滑膜翳形成，軟骨及骨組織的侵襲，導致關節結構的破壞」，其家庭醫師提到是某種全身性自身免疫性疾病，診斷以下列何者最有可能？
(A)類風濕性關節炎 (B)僵直性脊椎炎 (C)乾燥症候群 (D)系統性紅斑性狼瘡
- 24 42 歲王先生，餐飲工作三餐不定時，抽血發現血脂過高 (膽固醇 280 mg/dL，三酸甘油酯 250 mg/dL)，平時常胸悶，咽喉有物梗阻感，清喉仍不舒，舌淡紅，苔白膩，脈弦滑。下列證型何者最適當？
(A)肝鬱氣滯 (B)瘀阻心脈 (C)氣結痰阻 (D)氣鬱化火
- 25 承上題，下列處方何者最適當？
(A)丹梔逍遙散 (B)溫膽湯 (C)柴胡疏肝湯 (D)血府逐瘀湯

- 26 60 歲王先生患有糖尿病已 20 年，血糖控制不佳，近抽血檢查發現糖化血色素 12%，Creatinine: 7 mg/dL，面色偏黯，小便清長泡泡量多，腰膝痠軟，怕冷，四肢不溫，納差，易覺噁心感，脈沉，舌淡苔薄。下列診斷何者最適當？
(A)脾氣虧虛 (B)脾腎陽虛 (C)氣血虛衰 (D)濕邪困脾
- 27 承上題，下列何者處方最適當？
(A)五苓散 (B)理中湯 (C)小半夏湯 (D)金匱腎氣丸
- 28 25 歲李女甲狀腺亢進已 5 年，服西藥後常復發，甲狀腺腫大，目珠突出，目赤目脹，多食易飢，心悸煩躁，手顫動多汗，舌紅、苔薄白，脈數。治以下列何方最適宜？
(A)天王補心丹 (B)龍膽瀉肝湯 (C)柴胡疏肝散 (D)四海舒鬱丸
- 29 一位 57 歲男性患者，出現口渴，心煩，飲水量多，飲不解渴，舌色紅，苔薄黃，脈數，治以下列何方最合適？
(A)五苓散 (B)白虎加人參湯 (C)參苓白朮散 (D)消渴方
- 30 中風發作期的中醫辨證，下列何者是區分中臟腑與中經絡的主要症狀？
(A)起病急遽 (B)語言不利 (C)肢體麻木 (D)神志障礙
- 31 65 歲周女士，症見肢體痿軟無力，逐漸加重，病勢纏綿，食少，便溏腹脹，氣短，面浮，神疲乏力，面色無華，脈濡。下列何方劑治之最適當？
(A)二妙散 (B)清燥救肺湯 (C)參苓白朮散 (D)六味地黃丸
- 32 42 歲林先生罹患退化性關節病變多年，近因腰部疼痛前來就診。主訴腰痛重墜感，痿軟無力，痛處自覺腫熱，久坐或雨天時加甚，熱敷緩解不甚，活動後則減輕。其大便軟散，小便短赤，望之其舌苔濁膩，脈濡數。治以下列何方最適當？
(A)羌活勝濕湯 (B)二妙散 (C)知柏地黃丸 (D)薏苡仁湯
- 33 下列關於「鎮肝熄風湯」之敘述，何者錯誤？
(A)本方可降血壓、鎮靜、抗驚厥 (B)方中以懷牛膝、代赭石引血下行
(C)主要用於熱盛動風者 (D)方中有龍骨、牡蠣
- 34 65 歲男性患者，主訴失眠近 1 年，其症狀有心悸不安，腰痠耳鳴，頭暈健忘，五心煩熱，口乾津少，舌紅，脈細數，下列證型何者最適合？
(A)肝鬱化火 (B)痰熱內擾 (C)陰虛火旺 (D)心脾兩虛
- 35 承上題，治以下列何者最適合？
(A)龍膽瀉肝湯 (B)溫膽湯加黃連、山梔
(C)黃連阿膠湯 (D)歸脾湯
- 36 47 歲謝先生罹患大腸癌，化療後主訴腹痛綿綿，時作時止，喜熱惡冷，痛時喜按，飢餓勞累後更甚，得食或休息後症減，大便溏薄，神疲感，舌淡紅，苔白，脈沉細。治以下列何方最適當？
(A)良附丸 (B)胃苓湯 (C)小建中湯 (D)藿香正氣散
- 37 乳癌後期，接受多次放射及化學治療，症見顏面浮腫及跗腫，肋膜積水，咳逆喘滿不得臥，痰吐白沫量多，苔白滑，脈沉細。下列辨證何者最適當？
(A)陽虛水泛 (B)肺腎氣虛 (C)痰濕壅肺 (D)氣陰兩虛
- 38 54 歲李先生，咳嗽已數月，症見咳嗽聲粗急促，喉中有痰，痰量多黏稠難出，色偏黃，痰中挾血絲，咳時伴隨右胸痛，口乾欲飲。舌苔薄黃膩，舌質紅，右寸脈滑數。X 光發現右上肺葉有陰影的存在。治以下列何方加減最適當？
(A)二陳湯合三子養親湯 (B)清金化痰湯
(C)百合固金湯 (D)沙參麥冬湯加山梔、蓮藕
- 39 胃癌患者常見呃逆病證，下列何者為胃火上衝證之辨證要點？
(A)呃聲沉緩有力，得寒則甚 (B)呃聲響亮，衝逆而出
(C)呃聲連連，因情志不暢而加重 (D)呃聲急促，氣不連續
- 40 當肺癌咳嗽時發現痰有腥味，胸部脹痛，咳時引痛，痰多質黏稠，咯吐不爽時，下列病機何者最適當？
(A)脾濕生痰，壅遏肺氣 (B)痰熱壅阻，肺失清肅
(C)肝鬱化火，上逆侮肺 (D)陰虛內熱，肺失潤降

- 41 下列關於瘰癧病的敘述，何者錯誤？
(A)《肘後方》首先用昆布、海藻治療瘰癧病
(B)又稱為瘰氣、瘰瘤、瘰囊、影袋
(C)李時珍指出黃藥子酒治瘰癧病，若見瘰略消散，當續服
(D)《本草綱目》指出可用線測量頸圍以判斷療效
- 42 關於泄瀉及痢疾兩證的敘述，下列何者錯誤？
(A)瀉與痢均多發於夏秋季節，病變皆在腸道 (B)泄瀉之腹痛，多與腸鳴同時出現
(C)痢疾之腹痛，多與裏急後重同時出現 (D)先痢後瀉者，病情轉重
- 43 水腫從肺論治的辨證要點，下列敘述何者錯誤？
(A)起病時，伴有外感症狀
(B)症見面目浮腫，然後遍及全身腫
(C)臨床症見水腫伴有納呆、便溏、身倦之象
(D)水腫來勢較急，發展迅速，可伴高熱、胸悶氣急、腹滿便秘
- 44 尿毒症，若發展為關格病時，以濁邪侵犯中焦最為常見。下列有關邪犯三焦之見症，何者錯誤？
(A)侵犯上焦心，則昏迷、譫語 (B)侵犯上焦肺，則息微、氣短
(C)侵犯下焦肝，則身重、水腫 (D)侵犯下焦腎，則陽越氣絕
- 45 30 歲女性患者近日眼瞼下垂，肢體倦怠乏力，經診斷為重症肌無力（Myasthenia Gravis），此病為自體免疫疾病，相當於中醫何病之範疇？
(A)瘰證 (B)痿證 (C)痺證 (D)厥證
- 46 瘰癧病，屬痰結血瘀型者，以下列何方最適合？
(A)四海舒鬱丸 (B)海藻玉壺湯 (C)溫膽湯 (D)散腫潰堅湯
- 47 噎膈的產生除與脾胃相關外，還與那些臟腑有關？
(A)心、腎 (B)肺、腎 (C)肝、腎 (D)肝、肺
- 48 感冒可能因六淫侵襲人體而致病，除了風邪為主因外，在不同季節常與當令之時氣相合而傷人，下列敘述何者錯誤？
(A)冬季多夾風燥 (B)春季多夾風熱 (C)夏季多夾暑濕 (D)秋季多兼燥氣
- 49 關於吳謙的婦科學術思想，下列敘述何者最正確？
(A)崩漏的治療，首重清虛火以止崩 (B)帶下病，首重肝鬱脾虛
(C)月經愆期，主由精氣虛損論治 (D)產後病證，主分血虛與血瘀論治
- 50 月經先期因素體陰虛或久病傷陰，致虛熱先期，最宜下列何方治療？
(A)《蘭室秘藏》聖愈湯 (B)《和劑局方》四物湯
(C)《傅青主女科》兩地湯 (D)《和劑局方》逍遙散
- 51 張小姐 30 歲，因月經不調就診，醫師處方人參 3 錢、山藥 4 錢、茯苓 3 錢、熟地 4 錢、當歸 3 錢、川芎 2 錢、白芍 3 錢，服用 3 帖後收效，下列相關臨床表現，何項錯誤？
(A)月經量少 (B)經色淡而質稀如水
(C)頭暈，手足不溫，腰膝酸軟 (D)舌淡，脈虛細
- 52 《傅青主女科》治療經前腹痛數日而後行經者，其經來多是紫黑塊，是熱極而火不化，最宜下列何方？
(A)調肝湯 (B)宣鬱通經湯 (C)清經散 (D)加味四物湯
- 53 一孕齡婦女，每逢經行大便溏瀉，兼見腰膝酸軟、頭昏耳鳴、畏寒肢冷、脈沉遲，下列何方最宜？
(A)《傅青主女科》健固湯合《校注婦人良方》四神丸
(B)《傷寒論》理中丸
(C)《陳素庵婦科補解》運脾飲
(D)《小兒藥證直訣》七味白朮散
- 54 一女性患者，因經行期間頭痛就診，平素經行量少，易發眩暈，心悸不安，眠差眠短，神疲乏力，脈虛細無力，下列何方最適宜？
(A)《正體類要》八珍湯加首烏、枸杞
(B)《證治準繩》抑肝散加天麻、酸棗仁
(C)《脾胃論》補中益氣湯加鉤藤、茯神
(D)《醫學心悟》半夏白朮天麻湯加夜交藤、合歡皮

- 55 更年期之女性，其症狀反應可能與下列何項因素之相互作用的結果有相關？①體內雌激素濃度下降和其速度 ②對老化過程順從或抵抗之全部傾向 ③老化之心理衝擊和個人對生活改變之情感糾纏所產生的反應
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 56 30 歲女性患者，平素經期規律。今來診主訴：2 個月前經來後期且量少淋漓不斷至昨天突然下血量多，經色紫黑，夾帶較多血塊，小腹疼痛拒按，血塊排出則痛立減。下列診斷，何項正確？
(A)月經過少 (B)月經過多 (C)月經先後不定期 (D)崩漏
- 57 《傳青主女科》開鬱種玉湯之組成藥物內容，下列何者正確？①丹皮、天花粉 ②當歸、白芍 ③柴胡、香附
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 58 有關婦人「癥」病之敘述，下列選項何者正確？①有形可徵 ②推之不移 ③痛無定處
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③
- 59 32 歲甄女，因陰道少量出血 4 日來診，尿液妊娠試驗：陽性，昨日超音波檢查初見子宮內之胎兒心跳，出血色淡質稀，腰膝酸軟，小便頻數，頭暈耳鳴，舌淡苔白，脈沉弱。下列治療何者最適宜？
(A)《景岳全書》胎元飲去當歸加黃耆、阿膠 (B)《醫學衷中參西錄》壽胎丸加黨參、白朮
(C)《蘭室秘藏》聖愈湯加菟絲子 (D)《景岳全書》保陰煎加苧麻根
- 60 33 歲白女，自妊娠 32 週起下肢微有浮腫，常感頭暈目眩，心悸氣短，面色潮紅，舌紅絳，脈弦勁而數，最宜下列何方治療？
(A)白蒺藜、鉤藤、石決明、木香、砂仁、澤瀉、茯苓、豬苓、白朮、陳皮、大腹皮、蘇梗、桑白皮、檳榔、木瓜、丹參
(B)枸杞、菊花、山茱萸、茯苓、熟地、澤瀉、山藥、牡丹皮
(C)羚羊角、鉤藤、桑葉、生甘草、鮮生地、茯神、白芍、川貝母、菊花、淡竹茹
(D)鯉魚、白朮、生薑、當歸、白芍、茯苓
- 61 產後「三審」之內容，下列何項錯誤？
(A)矢氣之有與無，以別氣機之通滯 (B)大便通與不通，以驗津液之盛衰
(C)乳汁行與不行及飲食多少，以察胃氣之強弱 (D)少腹痛與不痛，以辨惡露之有無
- 62 傅青主治產後缺乳，處方：當歸醋炒 5 錢、熟地 3 分、麥冬去心 5 錢、白芍醋炒 5 錢、柴胡 1 錢、遠志 1 錢、通草 1 錢、甘草 3 分，其用意為何？
(A)補血生乳，乳汁自下 (B)舒肝木之氣，而陽明之氣血自通
(C)養心清肝，乳汁自通 (D)滋肝養血，佐以清肝而乳自下
- 63 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》：產後發熱，若因飲食太過而嘔吐脹悶，又見倦怠乏力，下列治療何者最適宜？
(A)《傷寒論》小建中湯加陳皮、枳殼、生薑
(B)《小兒藥證直訣》異功散加山楂、神麴、厚朴、生薑
(C)《證治準繩》八珍湯加砂仁、木香
(D)《傳青主女科》生化湯加陳皮、黃耆、人參、麥芽
- 64 《溫病條辨》三甲復脈湯最宜治療下列那一病機所致之「產後瘧病」？
(A)亡血傷津，筋脈失養，肝風內動 (B)去血過多，元氣虧虛，外邪相搏
(C)勞倦汗出，腠理不密，邪乘虛入 (D)內傷七情，外感六淫，瘀血壅滯
- 65 下列何者不屬於嬰兒的臍部局部疾患？
(A)臍血 (B)臍風 (C)臍瘡 (D)臍濕
- 66 有關生理性胎黃的敘述，下列何者正確？
(A)嬰兒出生 1 天內出現黃疸
(B)足月兒出生 2 週黃疸仍不會消退，甚至繼續加深
(C)早產兒出生 18 天，仍有黃疸，但顏色漸淡
(D)黃疸退而復現
- 67 根據《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於小兒感冒夾食之敘述，下列何者錯誤？
(A)熱盛者，用黃連解毒湯
(B)內無熱者，用藿香正氣湯和解之
(C)主要是因為平日飲食無節，內傷停滯，外為風寒所襲
(D)在表邪已解之後，可用平胃散消導之

- 68 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，小兒證見頻頻咳嗽，面赤咽乾，痰黃氣穢，多帶黏稠，若便軟和便硬宜各治以下列何者？
(A)便軟者用加味瀉白散，便硬者用加味涼膈散
(B)便軟者用加味瀉白散，便硬者用麻杏石甘湯
(C)便軟者用麻杏石甘湯，便硬者用涼膈白虎湯
(D)便軟者用加味瀉白散，便硬者用加味涼膈白虎湯
- 69 有關口瘡的敘述，下列何者錯誤？
(A)發於口唇兩側，又稱為「燕口瘡」
(B)滿口糜爛，色紅作痛者又稱為「口糜」
(C)屬虛火上浮證，治以六味地黃丸
(D)屬脾胃積熱證，治以《小兒藥證直訣》瀉心導赤湯
- 70 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，「痰癰平素自多痰，發時痰壅在喉間，氣促昏倒吐痰沫」，應先服用何方以急下其痰？
(A)硃衣滾痰丸 (B)一捻金 (C)清心滌痰湯 (D)清熱化痰湯
- 71 6歲男童，平時脾氣急躁，睡中經常尿床，尿量不多，尿色較黃，尿臭味很重，晚上睡覺時還常說夢話，磨牙。望其唇紅，苔黃。診其脈數有力。綜觀病情，其辨證以下列何者最適宜？
(A)心移熱於小腸 (B)腎失封藏，心火獨盛，膀胱失約
(C)肝經濕熱，火熱內迫 (D)肝腎陰虛，濕熱下注
- 72 有關積滯的敘述，下列何者正確？①積滯與傷乳、傷食、疳證有密切關係 ②小兒「脾常不足」則常乳食不化而成積滯 ③乳食不當，易致停蓄不消，形成脾虛夾積之候 ④《幼幼集成·食積證治》夫飲食之積，必用健脾
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 73 頓咳，可按初咳、痙咳、恢復期的臨床表現進行論治。若痙咳，咳傷血絡，則血從外溢，故見雙眼出血、鼻衄、痰中帶血等症，用下列何方治療最適宜？
(A)《景岳全書》桑白皮湯加鮮茅根、側柏葉 (B)《溫病條辨》桑菊飲加川七、藕節
(C)《和劑局方》涼膈散加仙鶴草、藕節 (D)《溫病條辨》桑杏湯加仙鶴草、地榆炭
- 74 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》風溫，汗多者，用下列何方清解之？
(A)雙解通聖湯 (B)荊防敗毒散 (C)新加香薷飲 (D)桂枝合白虎湯
- 75 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門，「乳食過傷瀉酸膿，噫臭腹熱脹滿疼，口渴惡食溺赤澀」，下列治方何者正確？
(A)須用「保安丸」，次用「肥兒丸」 (B)須用「保安丸」，次用「平胃散」
(C)須用「肥兒丸」，次用「保安丸」 (D)須用「平胃散」，次用「保安丸」
- 76 依《醫宗金鑑·痘疹心法要訣》，麻疹見形證治，氣虛無法出透，治法以托裏消毒，以下列何方治療最適宜？
(A)十味敗毒散 (B)人參敗毒散 (C)托裏消毒飲 (D)參蘇飲
- 77 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》雜證門，有關二便秘結的敘述，下列何者正確？
(A)多因乳食停滯生寒，結於腸胃，以致二便秘結
(B)其候舌乾口渴，面赤脣焦
(C)熱積則小便秘澹，少腹滿急，宜導赤散主之
(D)若食積大便秘，腹脹痛者，宜一捻金主之
- 78 有關急性鏈球菌感染後腎小球腎炎(acute poststreptococcal glomerulonephritis)的敘述，下列何者錯誤？
(A)是兒童常見的急性腎炎，年齡以2~15歲，男生較多
(B)由鏈球菌B族感染引起的一種免疫複合物性腎小球腎炎
(C)臨床表現水腫、血尿或高血壓或急性腎衰竭
(D)9成病人初期會有補體C3明顯下降情況，6~8週後恢復正常
- 79 有關小兒年齡的分期，下列何者正確？
(A)胎兒期：指受孕到出生後1週內 (B)新生兒期：從出生到2個月大
(C)嬰兒期：從出生2個月大到1周歲 (D)幼兒期：從1周歲到3周歲
- 80 關於疰夏臨床表現的敘述，下列何者正確？
(A)明顯發熱 (B)口渴飲多 (C)溲多頻數 (D)納差倦怠