

109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段  
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：3106  
頁次：6-1

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：內外科護理學  
考試時間：1小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)禁止使用電子計算器。

- 有關脊髓休克 (Spinal shock) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)病人的肛門反射正常 (B)受傷部位以下的肌肉力量消失  
(C)受傷部位以下的溫、痛、觸覺消失 (D)腸蠕動下降或出現麻痺性腸阻塞
- 右側大腦損傷所引起的功能缺失，下列何者正確？①左側偏癱 ②空間及認知缺損 ③語言及計算能力降低 ④行動變得快及衝動  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 有關暫時性缺血發作 (transient ischemic attack; TIA) 使用藥物治療，下列何者正確？  
(A)抗血小板凝集藥物，如：aspirin (B)降低腦壓藥物，如：mannitol  
(C)腦血管擴張劑，如：papaverine (D)預防血管痙攣劑，如：nimodipine
- 關於多發性硬化症的敘述，下列何者正確？①為中樞神經系統髓鞘脫失而影響神經傳導 ②吞嚥困難為早期出現臨床表徵 ③腦脊髓液檢查發現 IgG 抗體增加 ④感染會引發疾病惡化  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 指導重症肌無力病人之護理措施，下列何者錯誤？  
(A)避免過度勞累，以防誘發肌無力 (B)應坐直立吃東西，下巴朝向胸部再行吞嚥動作  
(C)應於服用抗膽鹼酯酶藥物之後再運動 (D)出現腹部痙攣疼痛時，可能為藥物劑量不足徵象
- 75 歲老人最近心情抑鬱，對外在環境興趣缺缺，腦部電腦斷層顯示腦組織萎縮、腦溝變大，下列何者為其最可能診斷？  
(A)憂鬱症 (B)譫妄症 (C)阿茲海默氏症 (D)巴金森氏症
- 有關脊髓損傷造成弛緩型神經性膀胱的排尿訓練，下列何者正確？  
(A)定時敲擊恥骨上方，以刺激排尿反射 (B)使用副交感神經刺激劑，以利膀胱迫尿肌收縮  
(C)練習會陰肌肉收縮運動 (D)尿管留置或尿布使用，以解決滲尿問題
- 有關闌尾炎護理措施的敘述，下列何者正確？  
(A)右下腹部可熱敷 (B)手術前須先灌腸  
(C)術後鼓勵病人盡量床上休息 (D)術後 6 週內避免提重物
- 有關肛門瘻管手術治療後常見的併發症，下列何者正確？①出血 ②腹股溝疝氣 ③瘻管復發 ④解便失禁  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 有關大腸癌病因的敘述，下列何者錯誤？  
(A)大腸息肉 (B)發炎性腸病變  
(C)飲食習慣攝取富含植物性蛋白食物 (D)飲食習慣缺乏高纖維食物與蔬菜
- 腸道檢查前一日，可以攝取之飲食，下列何者較適當？  
(A)溫和飲食 (B)限鈉飲食 (C)半流質飲食 (D)清流質飲食
- 有關黃疸之敘述，下列何者正確？  
(A)溶血性黃疸是肝硬化所致 (B)肝細胞性黃疸之白血球數增多  
(C)阻塞性黃疸之凝血酶原時間延長 (D)上述三種黃疸尿膽紅素皆增加
- 有關風濕熱之敘述，下列何者正確？①最常侵犯三尖瓣 ②須使用抗生素治療 ③應多從事體能活動以強化心臟功能 ④若有心衰竭症狀須採低鹽飲食  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

- 14 有關腦脊髓液的檢查，下列何者異常？  
(A)外觀清澈 (B)葡萄糖的值為血糖值的 20~30 %  
(C)蛋白質為 15~45 mg/dL (D)側躺時壓力為 70~180 mmH<sub>2</sub>O
- 15 肝穿刺切片檢查時，為避免橫膈穿孔與肝臟撕裂傷，教導病人當針頭插入肝臟時應採取的動作，下列何者正確？  
(A)用力深呼吸 (B)張開嘴巴說「啊」  
(C)數個深呼吸後，深吸氣並摒住呼吸 (D)數個深呼吸後，深吐氣並摒住呼吸
- 16 有關胃食道逆流病人之護理指導，下列何者錯誤？  
(A)應少量多餐 (B)睡覺前吃一點宵夜 (C)睡覺時床頭抬高 (D)避免便秘
- 17 有關退化性關節炎的敘述，下列何者正確？  
(A)常合併乾燥症 (B)不會影響身體的其他系統  
(C)出現血管炎，如腳趾壞死或小腿潰瘍 (D)出現倦怠、發燒、貧血
- 18 有關脂肪栓塞症之症狀和徵象，下列何者正確？①呼吸急促 ②意識混亂 ③排尿增加 ④體溫上升  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 19 王先生，55 歲，身體質量指數為 30 kg/m<sup>2</sup>，紅血球沉降速率正常範圍，主訴早晨起來關節疼痛與僵硬，在活動幾分鐘後可緩解僵硬。下列何者為王先生最可能的診斷？  
(A)乾癬性關節炎 (Psoriatic arthritis, PsA) (B)骨性關節炎 (Osteoarthritis, OA)  
(C)類風濕性關節炎 (Rheumatoid arthritis, RA) (D)痛風性關節炎 (Gouty arthritis)
- 20 上石膏後 24 小時內病人的護理評估結果，下列何者應做立即處置？  
(A)石膏表面有灼熱點 (B)石膏肢體遠端有輕微水腫  
(C)石膏肢體內皮膚搔癢 (D)石膏肢體有酸味
- 21 有關美尼爾氏症候群的敘述，下列何者錯誤？  
(A)又稱為迷路水腫 (B)好發於 40~60 歲成人  
(C)女性病人在月經後，症狀可能惡化 (D)易發生在長期噪音工作環境者
- 22 有關鼻咽癌病理學的敘述，下列何者錯誤？  
(A)曾感染 EB 病毒的人就會罹患鼻咽癌 (B)鼻咽癌病人血清中 EB 病毒抗體效價高  
(C)第六對染色體有異常基因組者，罹病率較高 (D)鼻咽癌為上皮性癌
- 23 有關扁桃腺炎病人接受扁桃腺切除術之敘述，下列何者錯誤？  
(A)適用於反覆慢性扁桃腺感染病人 (B)不適用於有血液惡性疾病的扁桃腺炎病人  
(C)術後病人經常有吞嚥動作是正常的 (D)術後醫囑可以開始進食時，須先進冷食
- 24 有關喉癌病人接受全喉切除術後之護理處置，下列何者錯誤？  
(A)維持呼吸道通暢為首要目標 (B)協助採取側臥式  
(C)當病人坐起時需以手支托後頸 (D)傷口癒合前須由鼻胃管補充營養
- 25 一位 26 歲新婚女性，有計畫懷孕，近日因心臟不適，經醫師診斷二尖瓣狹窄，並建議更換心臟瓣膜，有關瓣膜選擇與抗凝劑使用之敘述，下列何者最適當？  
(A)宜選用機械性人工瓣膜，並需服用 warfarin (B)宜選用生物性人工瓣膜，不可服用 warfarin  
(C)宜選用機械性人工瓣膜，不可服用 warfarin (D)宜選用生物性人工瓣膜，並需服用 warfarin
- 26 心臟衰竭病人使用 Dopamine 6 ug/kg/min，給予該劑量 Dopamine 之最主要目的為何？  
(A)增加腎臟血流量 (B)促進周邊血管收縮 (C)使心肌收縮力增加 (D)降低腎絲球過濾率
- 27 有關心臟復健 (Cardiac Rehabilitation, CR) 運動原則之敘述，下列何者錯誤？  
(A)運動前應先暖身 5~10 分鐘  
(B)為達到最大運動效果，可以摒住呼吸  
(C)用餐後不宜立刻運動  
(D)運動強度之最大心率以 (220-年齡) × 70~85% 為原則
- 28 下列何項檢查無法評估心輸出量？  
(A)心臟超音波 (B)肺動脈導管 (C)心導管檢查 (D)運動心電圖

- 29 有關冠狀動脈疾病病人接受鉈-201 之檢查目的，下列何者正確？  
(A)監測僧帽瓣及主動脈瓣的功能 (B)觀察心室收縮及舒張的情形  
(C)確定心肌受傷的部位與範圍 (D)判定心臟電氣傳導的狀態
- 30 有關二尖瓣閉鎖不全或逆流所產生之心雜音，在心動周期出現的時間，下列何者正確？  
(A)舒張全期 (B)舒張前期 (C)收縮全期 (D)收縮末期
- 31 下列血脂肪之檢驗值何者不正常？  
(A)低密度脂蛋白 170 mg/dL (B)高密度脂蛋白 60 mg/dL  
(C)總膽固醇 150 mg/dL (D)低密度脂蛋白/高密度脂蛋白=1.5
- 32 有關惡性腫瘤特徵的敘述，下列何者正確？①細胞通常分化不良 ②腫瘤通常有被膜包覆 ③生長速度通常很迅速 ④易轉移易復發  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 33 病人的皮膚黏膜蒼白、舌頭發炎呈紅色平滑狀，指甲萎縮、變薄呈湯匙狀，可能罹患下列何種貧血？  
(A)葉酸缺乏性貧血 (B)缺鐵性貧血 (C)惡性貧血 (D)再生不良性貧血
- 34 有關癌症手術治療特性之敘述，下列何者正確？  
(A)冷凍手術是一種診斷疾病分期的手術  
(B)手術治療是切除原發癌或已轉移的固態實質腫瘤  
(C)手術適用於細胞分化差、生長快速且局部的腫瘤  
(D)雷射手術優點是切除腫瘤組織，但會增加手術出血的危險
- 35 當癌症病人出現下列何種血液檢驗數據時，要考慮停止化學治療？①白血球 1,500/ $\mu$ L ②紅血球 500 萬/ $\mu$ L ③血小板 11 萬/ $\mu$ L ④絕對嗜中性球 1,000/ $\mu$ L  
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 36 有關靜脈導管 Port-A 之敘述，下列何者正確？①放置 Port-A 人工血管，須採全身麻醉方式 ②Port-A 導管可由腋靜脈放置到鎖骨下靜脈 ③注射起泡性藥物時，應測試是否有回血 ④注射藥物時，使用一般空針 90 度插入，以免發生外滲  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 37 有關癌症病人血鈣之敘述，下列何者錯誤？  
(A)癌細胞轉移到骨頭，會出現低血鈣的現象  
(B)白蛋白數值低下時需矯正鈣質數值，以免低估了高血鈣的狀況  
(C)高血鈣的治療是補充大量水分  
(D)利尿劑可促進腎臟對鈣的排泄
- 38 有關食道靜脈曲張藥物治療之敘述，下列何者錯誤？  
(A) Furosemide (B) Propranolol (C) Sandostatin (D) Vasopressin
- 39 有關癌症病人發生口腔炎之護理指導，下列何者錯誤？  
(A)教導飯前使用 0.1% xylocaine 漱口，以減輕疼痛  
(B)鼓勵飯後 30 分鐘內，以軟毛牙刷清潔口腔  
(C)教導食用冷的流質食物，增加維生素攝取  
(D)鼓勵自行購買漱口水清潔口腔
- 40 下列何種皮膚疾病是由自體免疫系統所引起，會出現急性炎症反應但不具傳染性？  
(A)鵝口瘡 (B)帶狀疱疹 (C)紅斑性狼瘡 (D)疥瘡
- 41 有關大面積重度燒傷初期（48 小時內），對於心臟血管系統造成的影響，下列何者錯誤？  
(A)中心靜脈壓升高 (B)心輸出量減少 (C)全身性水腫 (D)脈搏淺快
- 42 有關足癬的敘述，下列何者錯誤？  
(A)為黴菌感染 (B)多因穿不透氣鞋襪而引起  
(C)急性期出現紅斑 (D)可於趾間灑上滑石粉維持乾燥

- 43 有關化學性灼傷的處置，下列何者錯誤？  
(A)立即去除身上的化學物質 (B)可將化學藥劑的中和劑塗抹在皮膚接觸部位  
(C)以大量流動的水沖洗接觸部位至少 20 分鐘 (D)眼睛灼傷時，須用生理食鹽水或清水沖洗
- 44 有關過敏性休克之敘述，下列何者錯誤？  
(A)過敏反應發生後數分鐘內休克，可能會有死亡的危機  
(B)因接觸外來物質所引起，如藥物、花粉、灰塵等  
(C)由嗜酸性細胞釋出具血管活性的介質，如組織胺、白三烯素  
(D)再次碰到相同過敏原，會產生大量抗體 IgE
- 45 一位 30 歲女性主訴最近出現皮膚對光敏感、對稱性關節疼痛、口腔潰瘍，另補體 C<sub>3</sub> 及 C<sub>4</sub> 減少、抗核抗體 (ANA) 呈現陽性、紅血球沉降速率 (ESR) 明顯上升、血小板減少，下列何者為其最可能之診斷？  
(A)痛風性關節炎 (B)後天免疫缺乏症候群  
(C)全身性紅斑性狼瘡 (D)類風濕性關節炎
- 46 有關治療類風濕性關節炎使用之藥物，下列何者不適當？  
(A)水楊酸藥物，如 aspirin (B)免疫抑制劑，如 methotrexate  
(C)糖皮質類固醇，如 prednisone (D)利尿劑，如 furosemide (Lasix)
- 47 愛滋病人感染肺囊蟲肺炎之初期主要症狀，下列何者正確？  
(A)體重下降 (B)皮疹 (C)氣喘 (D)乾咳
- 48 有關肺栓塞病人之護理處置，下列敘述何者最正確？  
(A)教導病人應多食用青花椰菜、甘藍、菠菜等  
(B)教導病人坐姿時，應避免翹二郎腿或交叉雙腿  
(C)教導病人胸痛時，可服用 NTG 緩解疼痛  
(D)教導病人使用誘發性肺量計 (incentive spirometry)，增進肺部血流
- 49 有關氣喘病人使用糖皮質類固醇吸入劑 (glucocorticoid inhaled medication) 之護理指導，下列何者正確？  
(A)將此藥含在口中 15 秒後再緩慢吸入 (B)當急性發作時應立即使用此藥緩解  
(C)使用此藥物後應漱口 (D)此藥不可突然停藥必須逐漸減量
- 50 當肺炎病人出現呼吸道清除功能失效與分泌物增加，且無法進行有效性咳嗽。下列護理措施何者最能促進其清除痰液？  
(A)鼓勵病人採胸式呼吸 (B)鼓勵病人增加飲水量  
(C)教導病人用噘嘴式呼吸 (D)協助病人採半坐臥式
- 51 有關慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的病人使用噘嘴式呼吸的目的，下列何者正確？  
(A)減少二氧化碳滯留在肺部 (B)促進痰液排除  
(C)降低呼吸道的壓力 (D)增加橫膈的肌肉力量
- 52 外傷性肋骨骨折病人可能出現之徵候與症狀，下列何者正確？  
(A)慢且深的呼吸型態，且疼痛持續存在 (B)快且深的呼吸型態，且吐氣時疼痛感加劇  
(C)較淺的呼吸型態，且吸氣時疼痛感加劇 (D)喞嘆式的呼吸型態，且飯後疼痛感加劇
- 53 有關急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 的處置，下列何者錯誤？  
(A)使用濃縮紅血球以維持正常血色素來增加攜氧能力  
(B)使用膠質溶液以減少微血管滲漏程度  
(C)使用升壓劑以改善心輸出量不足現象  
(D)使用陽壓呼吸器以降低功能性肺餘容積
- 54 下列何者降低時，可作為阻塞性肺疾病的特徵？  
(A) DL<sub>CO</sub> (一氧化碳擴散容量) (B) FEV<sub>1</sub>/FVC  
(C) FEV<sub>25~75%</sub> (D) RV

- 55 病人肺部手術後出現呼吸速率加快、粉紅色泡沫狀痰液、持續性咳嗽、呼吸困難和囉音等表徵，最有可能的合併症是下列何者？  
(A)肺炎 (B)氣胸 (C)肺栓塞 (D)急性肺水腫
- 56 蔡先生因急性腎衰竭而住院，正處於少尿期，下列何項護理指導正確？  
(A)應採低熱量飲食 (B)應限制高鈉高磷之食物  
(C)應採高蛋白飲食 (D)採高鉀飲食
- 57 王先生因急性腎衰竭而急診入院，目前檢驗測得 arterial blood gas 為 pH：7.23，PaCO<sub>2</sub>：32 mmHg，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>：17.5 mEq/L，PaO<sub>2</sub>：82 mmHg，SaO<sub>2</sub>：98%，此結果屬：  
(A)呼吸性酸中毒 (B)部分代償性呼吸性酸中毒  
(C)代謝性酸中毒 (D)部分代償性代謝性酸中毒
- 58 承上題，下列何項處置可以最有效的改善王先生酸鹼不平衡之問題？  
(A)立即給予紙袋罩住口鼻 (B)注射 NaHCO<sub>3</sub>  
(C)注射 KCL (D)指導病人緩慢呼吸
- 59 有關急性腎盂腎炎之敘述，下列何者正確？①常見於下泌尿道上行性感染 ②常見有肋骨脊柱角處疼痛 ③紅血球沉降速率 (ESR) 下降 ④急性期時應大量攝取液體  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 60 血液透析病人之液體攝取量的估計原則，下列何者最適當？  
(A)前一日尿量加排汗量 (B)取決於下肢水腫程度  
(C)兩次透析間體重增加以不超過其乾體重 5% (D)兩次透析間體重增加必須控制在 2.0 公斤以內
- 61 有關尿液檢查的敘述，下列何者錯誤？  
(A)尿液分析是泌尿系統最簡便的例行檢查  
(B)細菌培養若細菌數 > 10<sup>5</sup> CFU/c.c. 表示泌尿道感染  
(C)尿中肌酸酐和尿素氮是評估腎功能最佳指標  
(D)清晨第一次尿液是尿液分析時最佳檢體
- 62 張先生，68 歲，罹患糖尿病、高血壓，冠心症長期服用降血糖藥物、抗凝血劑及高血壓藥物，但血壓仍維持在 150~170/90~110 mmHg。近日因血尿、下肢水腫、發燒而入院，住院期間病人不宜接受下列何項診斷性檢查？  
(A)靜脈腎盂攝影 (B)酚紅試驗 (C)肌酸酐廓清試驗 (D)腎臟活體組織切片
- 63 體液容積不足時之臨床表徵，下列何者正確？①口渴 ②體溫上升 ③尿比重下降 ④血比容積升高  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- 64 甲狀腺機能亢進之臨床表徵，下列何者正確？①月經減少或停經 ②深肌腱反射減弱 ③指甲遠心端鬆脫 ④皮膚潮紅乾裂 ⑤脛前黏液水腫 ⑥指尖有刺麻感  
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②④⑥ (D)④⑤⑥
- 65 長期使用類固醇製劑而導致愛迪生氏症 (Addison's disease) 之病人所呈現的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)皮膚與黏膜都會呈現褐色的色素沉著 (B)漸進性的疲累、軟弱無力及體重減輕  
(C)出現眩暈等姿位性低血壓以及脫水徵象 (D)女性病人的腋毛與陰毛會出現減少情形
- 66 有關高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 之敘述，下列何者正確？  
(A)血糖上升，但高血糖較酮酸中毒輕微 (B)血液 pH 值下降，呈現酮酸中毒  
(C)脫水嚴重，皮膚呈現潮紅、溫暖、乾燥 (D)出現庫斯莫爾氏呼吸 (Kussmaul's breathing)
- 67 有關糖尿病的藥物治療之敘述，下列何者正確？  
(A) metformin 為雙胍類 (biguanides) 抗血糖藥物，是治療糖尿病的首選藥物，肝腎功能異常者須慎用  
(B) glipizide 為磺醯脲類 (sulfonylureas) 抗血糖藥物，與 β 細胞磺醯脲類受體結合，刺激胰島素分泌，應於飯後服用  
(C) acarbose 為 α 糖苷酶抑制劑 (α-glucosidase inhibitors)，在小腸抑制澱粉分解，延緩葡萄糖吸收，應於飯前服用  
(D) exenatide 為類升糖素受體促效劑 (GLP-1 receptor agonists)，促進 GLP-1 的功能，刺激胰島素分泌與抑制升糖素分泌，採肌肉注射

- 68 有關糖尿病酮酸中毒 (DKA) 的敘述，下列何者正確？  
(A)好發於女性老年人  
(B)多發生在第 1 型糖尿病病人胰島素治療中斷所致  
(C)多發生於第 2 型糖尿病病人身上，攝入過多食物所致  
(D)可能因為胰島素過多，攝入過多食物所致
- 69 有關重症病人常發生高血糖狀態，下列何者為最可能之原因？  
(A)住院期間發現糖尿病  
(B)胰島素分泌不足  
(C)因應壓力產生糖質新生作用  
(D)運動量減少
- 70 有關格雷氏病 (Grave's disease) 之敘述，下列何者正確？  
(A)血清脂質增加  
(B)好發於老年病人  
(C)甲狀腺素分泌過多所引起  
(D)主要徵象為副甲狀腺機能低下
- 71 有關高血磷病人的護理指導，下列何者正確？①少吃堅果類與糙米飯 ②多補充維生素 D ③監測小便量與肝功能 ④注意下床活動安全 ⑤服用磷結合劑  
(A)①②③ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- 72 有關執行胸外心臟按壓的敘述，下列何者正確？  
(A)成人胸部按壓與通氣的比率为 15:1  
(B)胸外心臟按壓可達正常心搏出量的 60%  
(C)心臟按壓的速度需維持每分鐘 60~80 次  
(D)心臟按壓施救者掌根應置於病人兩乳頭連線與胸骨中線交接
- 73 孕婦發生呼吸道梗塞的情況時，下列何種處置最適當？  
(A)腹戳法 (B)胸戳法 (C)刺激喉頭法 (D)鼓勵孕婦多喝水
- 74 有關監測敗血症病人液體療法之生理指標，下列何者最可能需調節輸液？  
(A)尿比重  $\leq 1.026$  (B)收縮壓  $< 80$  mmHg (C)血液 pH 值  $> 7.30$  (D)中心靜脈壓  $9$  cmH<sub>2</sub>O
- 75 有關肉毒桿菌中毒的敘述，下列何者錯誤？  
(A)主因食入被臘腸桿菌產生的外毒素所污染的食物  
(B)除腸胃道症狀外，會有高燒  
(C)除腸胃道症狀外，會有視力模糊、複視等神經方面的症狀  
(D)對中毒病人除須注射抗毒素外，尚須施以洗胃灌腸以中和毒素或排出腸道毒素
- 76 乳癌病人接受化學治療效果不佳，病人主訴：「我希望能活到女兒結婚有個依靠，我就可以放心離開，就讓我活到那時候吧！」請問病人是處於 Kubler-Ross 心理反應的那一階段？  
(A)否認期 (B)磋商期 (C)憤怒期 (D)接受期
- 77 乳癌病人手術後的病理報告：乳房惡性腫瘤為 3 公分，腋下有 2 顆淋巴結轉移。依癌症 TNM 分期，下列何者正確？  
(A) cT<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub> (B) cT<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>x</sub> (C) pT<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub> (D) pT<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>x</sub>
- 78 有關過敏性休克的治療與護理指導，下列何者錯誤？  
(A)治療的目標是緩解症狀 (B)避免接觸過敏原或食用引起過敏的食物  
(C)給予藥物或生物性製劑需先行皮膚試驗 (D)減敏感療法之目的在增加 IgE 的濃度
- 79 當支氣管擴張症病人出現下列何種狀況需盡速就醫？  
(A)天氣炎熱痰液變得較黏稠 (B)痰液明顯出現血絲或血塊  
(C)進食大餐後呼吸變得較喘 (D)痰液出現分層現象
- 80 病人因腰椎椎間盤突出接受手術治療，術後依醫囑需穿硬背架 3 個月，下列敘述何者錯誤？  
(A)指導病人可進行威廉氏運動加強下背部的肌肉力量  
(B)指導病人拆線後便可沐浴，最好採淋浴  
(C)應每兩小時將背架取下讓背部休息  
(D)指導病人在床上穿好背架後再下床