

109年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、109年專技高考助產師考試

代 號：4306

類科名稱：藥師(二)

科目名稱：調劑學與臨床藥學

考試時間：1小時

座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分！

※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何者可做為液體劑型之螯合劑（chelating agent）？

- A.disodium edetate
- B.butylated hydroxytoluene
- C.sodium bisulfite
- D.propionic acid

2.有關benzalkonium chloride之敘述，下列何者錯誤？

- A.可做為眼藥水之防腐劑
- B.對革蘭氏陰性菌無效
- C. Mg^{2+} 和 Ca^{2+} 會降低其殺菌作用
- D.與fluorescein和nitrates存在配伍禁忌

3.將tetracycline溶於pH>3之溶液中時，最可能產生下列何種incompatibility，使tetracycline之抗菌活性降低？

- A.decarboxylation
- B.epimerization
- C.hydrolysis
- D.racemization

4.領藥時，下列何者不須領受人憑身分證明簽名領受？

- A.morphine
- B.fentanyl
- C.alprazolam
- D.flunitrazepam

5.下列處方之常用縮寫中，何者代表each eye？

- A.o.u.
- B.o.d.
- C.o.s.
- D.oz

6.若以英文教導外國人藥品之使用方法，下列何種用藥指示最適當？

- A.one twice daily to be taken
- B.5 mg per tablet two times daily to be taken
- C.take 5 mg two times daily

D.take one tablet twice daily

7.有關藥品玻璃包材之敘述，下列何者最不適當？

- A.包材的重量造成運輸成本增加
- B.避空氣及避濕之效果佳
- C.不易檢查其內容物
- D.價格較昂貴

8.下列何者屬於secondary packaging？

- A.light-resistant containers
- B.child-resistant containers
- C.tropicalized packs
- D.patient information leaflet

9.藥師臨場調製diazepam capsule，原錠劑之有效期限尚有1年；依據USP規定，此capsule在適當保存條件下之最長使用期限為多久？

- A.1年
- B.9個月
- C.6個月
- D.14天

10.根據ISMP定義chemotherapeutic agents須以「高警訊藥品」方式管理，醫療機構在制定管理規範時，下列做法何者最不適當？

- A.應與一般性藥品分開儲放
- B.運送時須全程配置「危害物質潑灑處理」設備（spill kit）
- C.藥師調製時須穿戴個人防護設施，如護目鏡、口罩、手套、防護衣等
- D.具細胞毒性，應由男性藥師負責處理

11.王女士50公斤，使用0.05 g/min的norepinephrine升壓，與建議劑量0.05~0.5 µg/kg/min相比，是否適當？

- A.劑量適當
- B.劑量過高
- C.劑量過低
- D.無法判斷

12.醫師處方insulin glargine 40 units HS，共28天；目前藥局之品項為300 units/mL之1.5 mL包裝，應調劑幾支？

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

13.下列何種吸入給藥器絕對不可用水清洗？

- A.large volume spacer
- B.Turbuhaler®
- C.Ventolin®

D.metered dose inhaler

14.下列何者可減少全靜脈營養（TPN）鈣磷沉澱的發生？

- A.slow infusion
- B.增加溫度
- C.使用calcium chloride
- D.先加磷，接著加其他成分，最後再加鈣

15.下列何者為常見靜脈營養治療之代謝性併發症（metabolic complications）？

- A.高血鉀
- B.高血鎂
- C.低血磷
- D.低血糖

16.沒有心臟衰竭、腎臟衰竭、燒燙傷、腸胃道液體流失的成年病人，一般全靜脈營養（TPN）液體的維持量須

多少mL/kg/day？

- A.20~25
- B.30~35
- C.40~45
- D.50~55

17.下列注射劑，何者最易與heparin flush產生配伍禁忌，沖洗導管時應注意？

- A.amiodarone
- B.epinephrine
- C.lidocaine
- D.ondansetron

18.玻璃容器在下列那種pH值範圍，最容易發生alkaline earth leaching？

- A.10~11
- B.8~9
- C.6~7
- D.4~5

19.有關dexrazoxane之敘述，下列何者正確？

- A.為cisplatin外滲時的antidote
- B.銅離子的chelator
- C.須在外滲發生6小時內給與
- D.IV給與，1天1次連續給與7天


20.有關危害性藥品調製的個人防護裝備（personal protective equipment, PPE），下列敘述何者正確？

- A.須配戴N95口罩以保護操作人員
- B.使用開口在後方的拋棄式隔離衣
- C.化療手套若未污染，可半天再換
- D.藥品若尚未拆除外盒，則不須配戴手套

21.下列抗癌危害性藥品的外滲（extravasation），何者應以熱敷處理？

- A.doxorubicin
- B.mitomycin-C
- C.paclitaxel
- D.vincristine

22.如圖甲為清淨室配置，乙、丙為兩種不同的層流操作台。關於調製危害性藥品的設備，下列何者較佳？



- A.氣壓X>Y，調劑台乙
- B.氣壓X>Y，調劑台丙
- C.氣壓X<Y，調劑台乙
- D.氣壓X<Y，調劑台丙

23.依據USP，調製之無菌製劑，微生物污染風險為low risk level，放置於冰箱冷藏之beyond-use dates為多少天？

- A.7
- B.14
- C.9
- D.3

24.術後自控式止痛（PCA）處方：morphine (1 mg/mL, 100 mg/bag for PCA) 1 mg IV if pain (4 hr max 20 mg)，下列敘述何者正確？

- A.可用於術後插管，以midazolam鎮靜且意識不清的病人
- B.需要加上1個continuous infusion的劑量
- C.需要1個lockout time，病人按壓後在lockout time內不再給藥
- D.如果1天使用超過3次，應加一片fentanyl transdermal patch 25 µg/hr

25.下列敘述何者正確？

- A.regular insulin可加在靜脈營養輸液中，惟insulin可能被塑膠容器與管路吸附

- B.lactated Ringer's solution中含有 Ca^{2+} 、 HCO_3^-
- C.regular insulin合併使用dextrose injection可治療hypokalemia
- D.calcium gluconate可治療hypokalemia造成的心律不整
- 26.藥品的有效期限（expiration date, ED）與調劑後使用期限（beyond-use date, BUD）之比較，下列何者正確？
- A.有BUD的藥品在調製後，原包裝未被破壞
- B.BUD通常比ED長
- C.ED須有科學數據支持
- D.製造廠商會確保每一個產品都有BUD
- 27.下列何者一定含有防腐劑？
- A.5 mL, 0.9% NaCl prefilled syringe
- B.5 mL, 5% dextrose ampoule
- C.200 mL, lactated Ringer's injection
- D.20 mL, bacteriostatic water for injection vial
- 28.病人致電社區藥局表示昨天領取的慢箋藥品有一袋跟上次不同，藥師查證後，發現是amlodipine 1 tab QD錯拿為amiodarone 1 tab QD。下列處理順序，何者最適當？①檢視標準作業流程（SOP）避免再發生 ②確認病人是否服過藥 ③評估服藥的傷害情況，給與適當的建議 ④道歉與更換藥品
- A.①②③④
- B.①②④③
- C.②③①④
- D.②③④①
- 29.有關藥事委員會之敘述，下列何者正確？①評估藥品進用與否 ②定期評估藥品相關問題 ③核定用藥指引、監督用藥疏失及藥品不良反應之監測 ④提供療劑監測、藥品諮詢等臨床藥事服務
- A.①②③
- B.①②④
- C.①③④
- D.②③④
- 30.有關5 mg zoledronic acid在postmenopausal osteoporosis之治療，下列何者正確？
- A.IV yearly for treatment
- B.IM yearly for prevention
- C.IV every other year for treatment
- D.IM every other year for prevention
- 31.下列何項措施在預防兒童用藥疏失時效果最不理想？
- A.注射針劑與口服溶液使用標準濃度
- B.由智慧型輸注幫浦（smart pump）給藥
- C.一旦發生用藥疏失立即嚴懲相關醫療人員
- D.電腦開方系統輔以臨床決策支援系統
- 32.關於用藥疏失之敘述，下列何者錯誤？

- A. 應鼓勵通報
- B. 根本原因分析 (root cause analysis) 是前瞻性預防錯誤的方法
- C. 應避免將錯誤歸因於個人，應檢討系統性的問題
- D. 失效模式與效應分析 (failure mode and effects analysis) 是積極主動、前瞻性預防錯誤的方法

33.下列何者是使用linezolid最須注意的不良反應？

- A. tendonitis
- B. QT interval elongation
- C. optic neuropathy
- D. thrombocytosis

34.有關type A藥品不良反應之敘述，下列何者錯誤？

- A. 致死率較高
- B. 發生率較高
- C. 具可預期性
- D. 與劑量相關

35.有關藥物經濟學分析方法，下列何者錯誤？

- A. cost-minimization analysis
- B. cost-benefit analysis
- C. cost-effectiveness analysis
- D. cost-utilization analysis

36.口服非處方止痛藥中，常添加下列何種成分來加強acetaminophen或aspirin的止痛效果？

- A. caffeine
- B. pseudoephedrine
- C. acetylcysteine
- D. glucosamine

37.醫院於護理給藥系統中自動提醒護理人員，於給藥後主動監測病人之不良反應，此做法是針對「藥品使用與管理」流程中何項步驟之防誤措施？

- A. prescribing
- B. administering
- C. monitoring
- D. storage

38.有關acetaminophen引起的肝損傷 (drug-induced liver injury, DILI)，下列敘述何者正確？

- A. 與CYP3A4的抑制有關
- B. 通常為不可預防的特異體質反應
- C. 通常與劑量無關
- D. 以口服或靜脈注射acetylcysteine治療

39.有關drug eruptions之敘述，下列何者正確？

- A. 僅與病毒感染相關

B.acneiform eruption 僅發生於臉部

C.常見引起Stevens-Johnson syndrome的藥品包括sulfonamides類藥品

D.Stevens-Johnson syndrome的病程通常介於4至8個月

40.下列那些注射方式可能延緩新生兒之藥品吸收？①IV ②IM ③SC ④IT

A.①②

B.①④

C.②③

D.②④

41.有關嬰幼兒常用名詞之定義，下列何者錯誤？

A.neonate—a full-term newborn 0 to 28 days

B.preterm—<37 weeks' gestational age at birth

C.very low birth weight—birth weight<1.5 kg

D.post-term≥40 weeks' gestational age at birth

42.3歲20 kg男孩，診斷感染influenza A，須給與藥物治療時，下列處方何者最適當？

A.zanamivir 2 inhalations QD for 5 days

B.zanamivir 1 inhalation QD for 10 days

C.oseltamivir 45 mg BID PO for 5 days

D.oseltamivir 45 mg QD PO for 10 days

43.有關老年人生理變化對藥效學的影響，下列敘述何者錯誤？

A.postural hypotension的機會增加

B.blood brain barrier的功能減退，有中樞作用的anticholinergics，容易造成意識混亂

C monoamine oxidase活性減退，腦中dopamine濃度增加

D.對dopamine receptor blocker的敏感性增加

44.下列何者最適合用來治療老年人的憂鬱症？

A.imipramine

B.amitriptyline

C.phenelzine

D.escitalopram

45.下列何者最不受腎臟功能下降影響？

A.apixaban

B.dabigatran

C.rivaroxaban

D.warfarin

46.下列何種情況，藥師交付藥品時，特別須對病人提供用藥指導？①藥品外盒有警語標示 ②可能有藥品交互

作用的問題 ③narrow therapeutic index的品項 ④有特殊用法

A.僅①②

B.僅②③④

C.僅①③④

D.①②③④

47.藥師進行藥品諮詢時，下列何者不是開放式問句？

A.請問你那裡痛

B.請形容你疼痛的感覺

C.你有那些症狀

D.你是否有藥物過敏

48.下列何者須每日皮下注射兩次？

A.exenatide (Byetta[®])

B.liraglutide (Victoza[®])

C.dulaglutide (Trulicity[®])

D.albiglutide (Tanzeum[®])

49.為避免哺乳期間，母親用藥對嬰兒產生影響，下列敘述何者錯誤？

A.須考量影響藥品分布至乳汁的藥動學

B.須考量母親之藥品劑量、給藥途徑、療程、代謝及腎臟清除率等

C.分子量小的藥品較容易分泌至乳汁中

D.應優先選擇相對嬰兒劑量（relative infant dose, RID）>10%的藥品

50.孫女士因HIV感染已持續治療1年8個月，用藥包括zidovudine (AZT) 、lamivudine與atazanavir/ritonavir。目前已懷孕7週，應如何調整用藥？

A.加入stavudine

B.加入didanosine

C.加入dolutegravir

D.維持原有治療直到剖腹生產

51.下列何者最適合用於治療孕婦的慢性高血壓？

A.atenolol

B.irbesartan

C.labetalol

D.lisinopril

52.下列何者不屬於二級文獻？

A.PubMed

B.International Pharmaceutical Abstracts (IPA)

C.TOXNET

D.Martindale : The Complete Drug Reference

53.下列藥品會干擾放射性藥品¹²³I而影響其成像結果，何者應於檢查前停藥7~10天？

A.tramadol

B.amlodipine

C.salmeterol

D.olanzapine

54.下列何者可能降低口服避孕藥的效果？

- A.lorazepam
- B.prednisolone
- C.phenytoin
- D.warfarin

55.下列何者不是交付amiodarone時，應提醒病人注意的副作用？

- A.pulmonary fibrosis
- B.hyperthyroidism
- C.hypothyroidism
- D.asthma

56.下列何者最可能增加病人的血糖值及尿酸值？

- A.colestipol
- B.ezetimibe
- C.nicotinic acid
- D.simvastatin

57.70歲女性，155 cm，65 kg，serum creatinine 8.6 mg/dL。醫師處方：valacyclovir 1000 mg PO TID，診斷：

Herpes zoster。下列處置何者最適當？

- A.調整劑量至500 mg PO TID；不受透析影響
- B.調整劑量至1000 mg PO BID；確認是否透析並依透析模式調整用藥時間
- C.調整劑量至500 mg PO QD；確認是否透析並依透析模式調整用藥時間
- D.valacyclovir為肝代謝藥品，不須調整劑量

58.下列那一藥品必須計算病人總累積劑量的問題？

- A.cyclophosphamide
- B.idarubicin
- C.cisplatin
- D.bendamustin

59.醫師處方verapamil SR 240 mg TID治療高血壓，此處方有何疑義？

- A.verapamil不能治療高血壓
- B.total daily dose過高
- C.每次dose偏低
- D.應Q8H給藥

60.下列何者最適合用於治療candiduria？

- A.anidulafungin
- B.fluconazole
- C.posaconazole
- D.voriconazole

61.李小姐住院1週後發生肺炎，下列何種抗生素最不適合？

- A.ciprofloxacin
- B.ceftazidime
- C.ertapenem
- D.piperacillin/tazobactam

62.王先生平時以valproic acid控制癲癇，因嚴重感染住院，下列建議何者正確？

- A.meropenem會使valproic acid血中濃度下降，影響seizure control
- B.meropenem會使valproic acid濃度增加，導致副作用產生
- C.不可使用meropenem，但可使用imipenem
- D.不可使用meropenem，但可使用ertapenem

63.Methicillin-resistant *Staph. aureus* (MRSA) 造成的院內感染型肺炎，以vancomycin治療達穩定血中濃度，其血中谷濃度之範圍何者較適當？

- A.< 5 µg/dL
- B.5~10 mg/L
- C.10~15 mg/L
- D.15~20 µg/mL

64.18歲男性，osteosarcoma手術後接受high dose methotrexate。Methotrexate 20 g (12 g/m²) in NS 500 mL IV infusion 4 hrs，leucovorin 15 mg IV Q6H beginning at hour 24。Methotrexate血中濃度於第4、48及72小時，分別為1,300、4.5及1.2 µM；目前腎功能未發生明顯變化。下列敘述何者正確？

- A.methotrexate排除延遲，應增加leucovorin劑量以減輕毒性
- B.methotrexate排除延遲，應增加leucovorin劑量以促進methotrexate排除
- C.methotrexate排除正常，保持leucovorin原劑量至methotrexate濃度<0.1 µM
- D.methotrexate排除正常，可停用leucovorin

65.下列何種情況，進行藥品血中濃度監測最有意義？

- A.療效或ADR與血中藥品濃度密切相關，且therapeutic range大
- B.療效或ADR與血中藥品濃度密切相關，且therapeutic range小
- C.therapeutic range小，但療效或ADR與血中濃度未直接相關
- D.therapeutic range大，且個體之間藥品血中濃度差異大

66.在tacrolimus-based immunosuppression，一般標的tacrolimus血中trough concentration為多少µg/L？

- A.0.5~1.2
- B.5~12
- C.50~120
- D.0.05~0.12

67.下列何者與葡萄柚汁併服時，發生交互作用之可能性最小？

- A.citalopram
- B.cyclosporine
- C.nifedipine

D.verapamil

68.洪女士79歲，身高148 cm，體重75 kg。患有糖尿病、高血壓、高血脂，使用五種治療藥品；另因失眠使用lorazepam。下列何者不是她發生藥品交互作用的危險因子？

- A.多種慢性病與用藥
- B.肥胖
- C.高齡女性
- D.身高

69.下列何者不會透過抑制P-glycoprotein而增加digoxin之血中濃度？

- A.atorvastatin
- B.diltiazem
- C.clarithromycin
- D.St. John's wort

70.有關tacrolimus之藥品交互作用，下列敘述何者正確？

- A.與itraconazole併用，tacrolimus的血中濃度會下降
- B.與cimetidine併用，tacrolimus的血中濃度會下降
- C.與St. John's wort併用，tacrolimus的血中濃度會下降
- D.與rifampin併用，tacrolimus的血中濃度會上升

71.下列敘述何者錯誤？

- A.dabigatran與rifampin應避免併用
- B.rivaroxaban與rifampin應避免併用
- C.apixaban與rifampin併用時，降低apixaban劑量即可
- D.edoxaban與rifampin應避免併用

72.下列何組藥品交互作用的機制，不屬於藥動學交互作用？

- A.theophylline—amiodarone
- B.alcohol—disulfiram
- C.allopurinol—mercaptopurine
- D.digoxin—hydrochlorothiazide

73.下列何者與carbamazepine併服時，不會增強carbamazepine的藥效？

- A.pioglitazone
- B.cimetidine
- C.diltiazem
- D.verapamil

74.有關phenytoin之敘述，下列何者錯誤？

- A.albumin的濃度降低，會導致total phenytoin的血中濃度上升
- B.phenytoin為弱酸性藥品，主要的結合蛋白為albumin
- C.腎功能正常的病人，phenytoin與albumin結合率約為90%
- D.尿毒症的病人，游離態的phenytoin為20~25%

75.下列那種藥品交互作用，可藉由錯開服藥時間至少1小時而避免？

- A.ketoconazole + lansoprazole
- B.bisacodyl + magnesium oxide
- C.lovastatin + grapefruit juice
- D.warfarin + tetracycline

76.下列各項併用藥品與其相關副作用的配對中，何者最不可能發生？

- A.lisinopril + trichlormethiazide：導致hypotension
- B.verapamil + digoxin：增加AV-block風險
- C.theophylline + linezolid：增加theophylline毒性
- D.warfarin + cimetidine：增加embolism風險

77.有關20% azelaic acid乳膏之含量，下列敘述何者正確？

- A.每g乳膏含20 mg azelaic acid
- B.每mg乳膏含0.02 mg azelaic acid
- C.每100 mg乳膏含2 mg azelaic acid
- D.每g乳膏含200 mg azelaic acid

78.承上題，該藥主成分與軟膏之重量比例為多少？

- A.2 : 10
- B.2 : 100
- C.2 : 1000
- D.2 : 10000

79.為提升all-in-one全靜脈營養輸液（TPN）之安定性，下列何者正確？

- A.使用PVC (polyvinyl chloride) 軟袋
- B.使用多層EVA (ethylvinyl acetate) 軟袋
- C.室溫貯存
- D.添加防腐劑

80.承上題，其原因為何？

- A.PVC可阻止氧氣之穿透
- B.EVA不含塑化劑，可避免脂肪將塑化劑溶出（leaching）
- C.室溫貯存可避免沉澱之析出
- D.防腐劑可防止微生物孳生