

109年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、  
心理師、護理師、社會工作師考試、109年專門職業及技術人員高等考試法醫師、  
語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1小時30分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

（二）本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 46歲女性身形偏瘦，長期熬夜，平素常有夜間口乾之症狀。一日前出現頭痛，咳嗽，微惡風寒，身熱，汗不多，口渴，咽乾，心煩，舌紅苔少，脈數。下列方劑何者最適宜？  
(A)金銀花三錢，連翹三錢，淡豆豉兩錢，牛蒡子兩錢，薄荷兩錢，荊芥穗一錢半，桔梗兩錢，生甘草一錢半，淡竹葉三錢，鮮蘆根兩錢  
(B)桑葉兩錢，菊花一錢，杏仁兩錢，連翹一錢五分，薄荷八分，桔梗兩錢，生甘草一錢半，蘆根兩錢  
(C)升麻兩錢，葛根三錢，白芍兩錢，炙甘草兩錢  
(D)玉竹兩錢，葱白兩錢，桔梗兩錢，白薇五分，淡豆豉三錢，薄荷一錢半，炙甘草五分，紅棗兩枚
- 關於《傷寒論》麻黃湯與桂枝湯之比較，下列敘述何者正確？  
(A)麻黃湯為辛溫發汗峻劑；桂枝湯為辛涼透汗平劑  
(B)兩方均可用於治療外感風寒  
(C)麻黃湯適用於表虛者；桂枝湯適用於表實者  
(D)兩方藥物組成皆有生薑及大棗
- 若病患熱結裏實，需用下法治療。但又兼見氣陰兩虛之證候，下列何方最適宜？  
(A)《備急千金要方》溫脾湯  
(B)《景岳全書》濟川煎  
(C)《溫病條辨》新加黃龍湯  
(D)《溫病條辨》增液承氣湯
- 下列何方的功效為「發汗解表，祛風止痛」？  
(A)大秦芫湯  
(B)消風散  
(C)九味羌活湯  
(D)荊防敗毒散
- 有關銀翹散的敘述，下列何者正確？  
(A)本方以鮮葦根湯煎、煮散  
(B)本方宜久煮，以清上焦熱  
(C)主治濕熱病初起者  
(D)荊芥、豆豉、薄荷、牛蒡子為方中佐藥
- 張先生來院門診主訴大便艱，脘腹痞滿，潮熱譫語，經醫師診察舌苔黃，脈滑而數。治以下列何方最適宜？  
(A)大承氣湯  
(B)小承氣湯  
(C)調胃承氣湯  
(D)大黃牡丹皮湯
- 有關方劑之敘述，下列選項何者正確？①大承氣湯與大陷胸湯之組成藥物均含大黃、芒硝二藥 ②大承氣湯與大陷胸湯二方之方劑辨證均為實熱燥屎結聚腸胃 ③大承氣湯為峻下熱結，大陷胸湯為瀉熱逐水  
(A)僅②  
(B)僅③  
(C)①②  
(D)①③
- 下列何者為九味羌活湯和羌活勝濕湯的相同組成藥物？  
(A)獨活、藁本  
(B)細辛、白芷  
(C)川芎、防風  
(D)蒼朮、黃芩
- 75歲男性久咳多年，痰量少，夾血絲，虛煩難眠，時發虛熱，日夜汗出，咽乾舌燥，大便難解，來院求診，理學檢查發現患者形瘦氣短，舌體瘦小，舌光少苔，脈虛數，下列何方治療最適宜？  
(A)《小兒藥證直訣》瀉白散  
(B)《傷寒論》炙甘草湯  
(C)《慎齋遺書》百合固金湯  
(D)《重樓玉鑰》養陰清肺湯
- 有關《和劑局方》參苓白朮散的功效，下列共幾項正確？①健脾益氣 ②滲濕止瀉 ③培土生金 ④升陽舉陷  
(A)1  
(B)2  
(C)3  
(D)4

- 11 有關《金匱要略》腎氣丸，下列敘述共幾項正確？①方中肉桂、附子用量最少，是取「少火生氣」之義 ②臨床上可治腰痛、腳氣、痰飲、消渴等病症 ③方中組成藥物以地黃劑量最大 ④本方加牛膝、車前子即為濟生腎氣丸  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 12 有關《景岳全書》右歸丸、左歸丸及《本草綱目》七寶美髯丹三方組成藥物之比較，下列敘述共幾項正確？①三方皆有熟地、枸杞子、菟絲子 ②右歸丸及七寶美髯丹皆有當歸 ③左歸丸與七寶美髯丹皆有牛膝 ④右歸丸與左歸丸皆有鹿角膠及炙甘草  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 13 下列何者是《宣明論方》地黃飲子之組成？①石斛 ②遠志 ③附子  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 14 有關《正體類要》八珍湯之敘述，下列敘述共幾項正確？①本方即四物湯與四君子湯之合方 ②本方加入黃耆、肉桂、遠志、陳皮、生薑、大棗，去川芎即為《三因極一病證方論》人參養榮湯 ③本方加入黃耆、續斷、黃芩、砂仁、糯米，去除茯苓即為泰山磐石散，治療婦人氣血兩虛，屢有墮胎之患 ④本方加入黃耆、肉桂即為《和劑局方》十全大補湯  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 15 下列不含四君子湯之組成藥物者，共幾項正確？①升陽益胃湯 ②完帶湯 ③枳實消痞丸 ④補中益氣湯  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 16 固沖湯臨床常用以治療婦女崩漏症，有關其組方說明，下列敘述何者錯誤？  
(A)用黃耆、白朮健脾益氣，以加強攝血功能  
(B)用熟地、山茱萸以補益肝腎，養血斂陰  
(C)用煅龍骨、煅牡蠣、棕櫚炭、五倍子以收斂止血  
(D)用海螵蛸、茜草以化瘀止血，使血止而不留瘀
- 17 《婦人良方》真人活命飲為瘡瘍重要方劑，有關其組方與臨床應用原則，下列何者錯誤？  
(A)一切癰瘍腫毒初起，熱毒壅聚者，均可使用之。脾胃素虛，氣血不足者慎用之  
(B)方中用當歸、赤芍、乳香、沒藥以活血化瘀止痛  
(C)方中用防風、白芷以行氣化痰；用皂角刺、穿山甲以疏通經絡，消腫潰堅  
(D)若膿已成者：可去乳香、沒藥、皂刺、穿山甲，再加薏苡仁、敗醬草以清熱解毒排膿
- 18 8歲翁姓學生，5日前出現感冒，咽痛，咳嗽，發燒症狀，先至診所就醫服藥控制。但未料2日後卻開始出現意識不清，亂說話的狀況。家人將之送至醫院急診，證見發燒39.3°C，面紅，出汗，意識不清，顏面與胸腹皮膚出現紅色斑疹，手足偶亂揮舞，已2日未解大便，Babinski sign (+)，脈來細數有力。經西醫診為急性腦膜炎，若依中醫辨治論治原則，本案以下列方劑何者最適當？  
(A)普濟消毒飲 (B)銀翹散 (C)清營湯 (D)白虎湯
- 19 下列敘述何者錯誤？  
(A)《傅青主女科》完帶湯組成含有《和劑局方》四君子湯  
(B)《證治準繩》四神丸組成含《本事方》二神丸  
(C)《本草衍義》桑螵蛸散主治心腎兩虛之遺尿  
(D)《丹溪心法》固經丸可治療陰虛血熱之崩漏
- 20 下列方劑何者藥物組成不含當歸？  
(A)《保命集》芍藥湯 (B)《醫方集解》龍膽瀉肝湯  
(C)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯 (D)《蘭室秘藏》清胃散
- 21 關於《傷寒論》吳茱萸湯的適應證，下列選項何者正確？①陽明寒嘔腹痛 ②厥陰頭痛乾嘔 ③太陰自利不渴 ④少陰吐利肢冷  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

- 22 下列何者是《證治準繩》清骨散的藥物組成？  
(A)《衛生寶鑑》秦艽鱉甲散去烏梅、當歸加銀柴胡、胡黃連、知母、甘草  
(B)《溫病條辨》清營湯去犀角、竹葉心、麥冬加柴胡、胡黃連、秦艽、地骨皮、甘草  
(C)《衛生寶鑑》黃耆鱉甲散去黃耆、天冬、桑白皮加銀柴胡、胡黃連、秦艽、地骨皮、甘草  
(D)《溫病條辨》青蒿鱉甲湯去生地、丹皮加地骨皮、銀柴胡、胡黃連、秦艽、甘草
- 23 《景岳全書》柴胡疏肝散為《傷寒論》四逆散加減變化而來，有關柴胡疏肝散下列敘述何者正確？  
(A)枳實、陳皮以理氣行滯 (B)木香配伍柴胡以行氣導滯  
(C)炙甘草可調和諸藥 (D)當歸配伍川芎，主治產後腹痛
- 24 《醫學發明》天台烏藥散的製服法中，下列何藥與巴豆同炒，可增加其行氣散結之作用？  
(A)木香 (B)川楝子 (C)烏藥 (D)檳榔
- 25 下列那個方劑組成，沒有使用生薑？  
(A)《金匱要略》小半夏湯 (B)《金匱要略》大半夏湯  
(C)《金匱要略》半夏厚朴湯 (D)《內外傷辨惑論》厚朴溫中湯
- 26 48歲婦女因睡眠障礙求診，主訴煩躁不得眠，容易健忘、心悸，且近來舌頭易生瘡，其舌脈診發現舌紅少苔，脈細而數。下列何方治療最適宜？  
(A)《醫宗金鑑》知柏地黃丸 (B)《金匱要略》酸棗仁湯  
(C)《濟生方》歸脾湯 (D)《攝生總要》天王補心丹
- 27 有關蘇子降氣湯之敘述，下列選項何者正確？①治療上實證，主要用蘇子、白果降逆化痰定喘 ②治療下虛證，主要用肉桂、當歸溫補下虛 ③與定喘湯皆治痰壅於肺之咳喘證  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 28 有關安神方劑治療失眠的證型，下列敘述共幾項正確？①甘麥大棗湯主治肝鬱心虛的不眠 ②天王補心丹主治心腎兩虛的不眠 ③酸棗仁湯主治肝血不足的虛煩不眠 ④歸脾湯主治心脾兩虛的不眠  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
- 29 有關《溫病條辨》大定風珠的敘述，下列何者錯誤？  
(A)主治溫病時久或因誤治導致真陰大虧，虛風內動  
(B)與《通俗傷寒論》阿膠雞子黃相比，皆以阿膠、雞子黃為君藥  
(C)與《通俗傷寒論》羚羊鉤藤湯相比，皆以鉤藤涼肝息風  
(D)較《溫病條辨》加減復脈湯多了龜板、鱉甲、生牡蠣滋陰潛陽
- 30 有關《備急千金要方》獨活寄生湯的敘述，下列何者錯誤？  
(A)在祛風濕補肝腎的框架上，加上四物湯合四君子湯去人參的組合，適合用於久痹  
(B)本方去桑寄生，加黃耆、續斷，即為《婦人良方》三痹湯藥物組成  
(C)體現治風先治血，血行風自滅之理  
(D)君藥獨活，除祛風濕作用外，還具止痛作用
- 31 有關《傷寒論》真武湯的敘述，下列何者錯誤？  
(A)本方配伍生薑溫散水濕  
(B)《傷寒論》附子湯的藥味較本方少了芍藥，多了人參  
(C)主治脾腎陽虛，水氣內停  
(D)本方後記載，若咳者：加五味子、細辛、乾薑
- 32 當歸拈痛湯的主治辨證為何？①內傷濕冷 ②濕熱相搏 ③外受風邪  
(A)僅①② (B)僅②③ (C)僅①③ (D)①②③
- 33 有關《丹溪心法》保和丸之敘述，下列何者正確？  
(A)本方係以神麴為君藥  
(B)以脾虛食停、生濕化熱為主證  
(C)與《證治準繩》健脾丸共同的藥物組成，是神麴、山楂、陳皮、茯苓  
(D)本方中另加蒼朮，名：大安丸，主治食積兼有脾虛者

- 34 下列那些藥物為天麻鉤藤飲之組成？  
(A)山梔、黃芩、黃連 (B)川牛膝、杜仲、益母草  
(C)石決明、山梔、黃柏 (D)桑寄生、夜交藤、酸棗仁
- 35 《蘭室秘藏》枳實消痞丸所治療之痞證，是下列何種原因所成？  
(A)痰熱互結、氣鬱不通 (B)酒積傷脾、暴飲暴食  
(C)胃氣虛弱、痰濁內阻 (D)脾虛失運、寒熱互結
- 36 有關《太平惠民和劑局方》香薷散之敘述，下列何者正確？  
(A)其組成為香薷、厚朴、陳皮  
(B)可和中祛暑  
(C)本方加半夏、茯苓、木瓜即為六物香薷飲，主治兩腿轉筋  
(D)若治暑病，氣虛少氣多汗，可加上茯苓、甘草、木瓜、黃連、蔥白、淡豆豉、滑石即為十味香薷飲
- 37 有關祛痰劑，下列組成何者不含半夏？  
(A)《太平惠民和劑局方》二陳湯 (B)《備急千金要方》溫膽湯  
(C)《醫方考》清氣化痰丸 (D)《丹溪心法》礞石滾痰丸
- 38 有關《傷寒直格》碧玉散功用為清解暑熱，治暑濕兼肝膽鬱熱者，其組成為何？  
(A)六一散加玉竹 (B)六一散加薄荷  
(C)六一散加燈心草 (D)六一散加青黛
- 39 25歲男性，夏天在戶外打工，出現身熱汗出，心煩，口渴，尿黃，身倦，說話無力，納可，大便正常，經醫師檢查發現舌紅少苔，脈虛數。最宜下列何方治療？  
(A)鮮荷葉邊、鮮銀花、絲瓜皮、西瓜翠衣、鮮扁豆花、鮮竹葉心  
(B)杏仁、滑石、通草、白豆蔻、竹葉、厚朴、薏苡仁、半夏  
(C)西洋參、石斛、麥冬、黃連、竹葉、荷梗、知母、梗米、西瓜翠衣、甘草  
(D)黃耆、蒼朮、升麻、人參、神麴、橘皮、白朮、麥冬、當歸、青皮、黃柏、葛根、澤瀉、五味子、炙甘草
- 40 下列何者為滌痰湯之運用主證？  
(A)痰涎壅盛，飲食少思，舌苔厚膩，脈滑  
(B)膽胃不和，痰熱內擾，虛煩不眠，驚悸不寧，舌苔白膩微黃，脈弦滑  
(C)中風、舌強不能言、舌苔膩，脈濡數  
(D)咳嗽、痰多色白易咯，舌苔白膩或白潤，脈滑
- 41 肝腎不足所引起的腰膝酸痛，下列何藥不適宜？  
(A)桑枝 (B)桑寄生 (C)續斷 (D)五加皮
- 42 有關香薷主治，下列敘述何者最不宜？  
(A)脾虛水腫，寒濕腳氣，小便不利 (B)中暑頭痛，表虛有汗，心煩口渴  
(C)暑濕感冒，惡寒發熱，腹痛吐瀉 (D)胸悶嘔吐，腹痛吐瀉，霍亂轉筋
- 43 有關漢防己主治，下列敘述何者最不宜？  
(A)風濕痺痛，下肢濕熱 (B)膈間支飲，兼有鬱熱  
(C)脾腎陰虛，腳氣浮腫 (D)肺氣喘嗽，濕癩腳氣
- 44 有關附子主治，下列敘述何者最不宜？  
(A)陰寒水腫，陽虛體衰，小便不利 (B)督脈為病，脊強而厥，真熱假寒  
(C)亡陽虛脫，呼吸氣微，四肢厥逆 (D)心陽衰弱，心悸氣短、胸痹心痛
- 45 有關高良薑主治，下列敘述何者最不宜？  
(A)胃脘冷痛，嘔吐清水，胸悶不舒 (B)霍亂瀉痢，吐惡噎膈，胃燥津枯  
(C)腸鳴腹痛，完穀不化，下利清水 (D)肝經寒積，脾虛寒瘧，寒多熱少

- 46 下列何者非白芷的功效？  
(A)溫肺止咳 (B)解表祛風 (C)通竅止痛 (D)除濕止帶
- 47 有關石韋功效，下列何者最適當？  
(A)清利濕熱，起陰氣 (B)利尿通淋，殺蟲，止癢  
(C)散結化石，利濕通淋 (D)利尿通淋，清熱止血
- 48 有關木香的敘述，下列何者最適當？  
(A)行氣止痛，溫中和胃 (B)散寒止痛，理氣和胃  
(C)行氣煨用 (D)止瀉生用
- 49 有關豬苓與澤瀉的共同點，下列何者最適當？  
(A)清腎火 (B)開腠發汗 (C)利水滲濕 (D)聰耳明目
- 50 下列藥物何者最宜用於消除脹滿、咳嗽氣喘痰多？  
(A)枳實 (B)款冬花 (C)厚朴 (D)白芥子
- 51 下列何藥最宜用於治療寒濕中阻，脘腹冷痛，腸鳴泄瀉？  
(A)烏梅 (B)茯苓 (C)豬苓 (D)草果
- 52 下列何藥具有益脾止瀉之功效？  
(A)車前草 (B)薏苡仁 (C)訶子 (D)牡蠣
- 53 下列何藥治療肝膽氣鬱所致的癰癥？  
(A)蒲公英 (B)夏枯草 (C)紫花地丁 (D)昆布
- 54 下列何藥有瘡家聖藥之稱，治療癰痰核，且有利水通經的功效？  
(A)連翹 (B)金銀花 (C)夏枯草 (D)紫花地丁
- 55 下列何種藥物具生津止渴，排膿，用於胃熱諸證？  
(A)地骨皮 (B)黃連 (C)天花粉 (D)竹葉
- 56 下列何者是石膏與知母最大的不同點？  
(A)性味甘寒 (B)歸肺經 (C)除煩熱 (D)潤腎燥
- 57 下列何種藥物具除煩止嘔的功效？  
(A)天花粉 (B)枳實 (C)生薑 (D)蘆根
- 58 下列何者外敷可治乳癰消腫塊，亦能清熱治療咽痛？  
(A)芒硝 (B)冬葵子 (C)木通 (D)蘆薈
- 59 有關三七的功用，下列何者正確？  
(A)涼血活血 (B)去血中伏火 (C)破血下氣 (D)散血定痛
- 60 下列何藥用於女科及血虛血瘀之候，又能治目赤，疔痛，瘡疥腫毒，排膿生肌？  
(A)當歸 (B)丹參 (C)白芍 (D)連翹
- 61 有關五靈脂的敘述，下列何者錯誤？  
(A)功效為活血止痛、化瘀止血  
(B)用於瘀血阻滯所致的痛經、經閉、產後瘀阻腹痛  
(C)治婦科疾患及胸痛之證，常與薑黃配伍，即失笑散  
(D)本品尚可解蛇、蟲毒
- 62 下列何藥能行血補血，舒筋活絡，用於月經不調、關節痠痛、風濕痺痛等證？  
(A)桃仁 (B)乳香 (C)雞血藤 (D)紅花
- 63 下列有關白及臨床用途的敘述，何者錯誤？  
(A)用於水火燙傷、手足皸裂 (B)用於肺癰，咳吐大量腥痰膿血  
(C)用於瘡癰，未潰或已潰均可應用 (D)用於吐血及外傷出血

- 64 用於月經不調，經閉，產後腹痛，跌打傷痛，小便不利，水腫，瘡癰腫毒，癢疹等證，為下列何藥最適宜？  
(A)荊三稜 (B)川芎 (C)益母草 (D)丹參
- 65 有關麥門冬的功效敘述，下列何者錯誤？  
(A)滋陰潤肺 (B)益胃生津 (C)清心除煩 (D)補益肝腎
- 66 有關人參的禁忌症，下列何者錯誤？  
(A)肝陽上亢的高血壓患者 (B)脈微、氣虛欲脫之證  
(C)濕熱壅滯所致的浮腫 (D)失眠煩躁而屬實證者
- 67 有關淫羊藿的禁忌症，下列何者錯誤？  
(A)陰虛火旺 (B)五心煩熱 (C)陽痿 (D)血虛風燥
- 68 下列何種補氣藥具有補氣升陽、益衛固表、托毒生肌、利水退腫之功效？  
(A)山藥 (B)黃耆 (C)白朮 (D)人參
- 69 下列何種補血藥具有養血斂陰、柔肝止痛，平抑肝陽之功效？  
(A)白芍 (B)當歸 (C)何首烏 (D)熟地黃
- 70 主治傷寒、時疾、腹痛裏急，二便不通，吐血、衄血，一切實熱，下列何者最宜？  
(A)巴豆 (B)大黃 (C)牽牛子 (D)蘆薈
- 71 有關酸棗仁的敘述，下列何者錯誤？  
(A)可用於心肝血虛引起的失眠 (B)治膽虛不得眠  
(C)治下消虛渴 (D)治體虛自汗、盜汗，可與五味子同用
- 72 有關瓜蒌的敘述，下列何者錯誤？  
(A)腸癰、乳癰等證忌用 (B)瓜蒌皮寬胸理氣，強於瓜蒌仁  
(C)瓜蒌仁潤腸通便 (D)熱痰、燥痰所致咳喘均可使用
- 73 下列何藥能祛痰，消癰疽腫毒？  
(A)琥珀 (B)龍骨 (C)遠志 (D)合歡皮
- 74 蘇合香可用治胸腹冷痛滿悶之證，是基於下列何種功效？①活血化瘀 ②開鬱祛濁 ③開竅辟穢  
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 75 下列何藥最宜用於熱痰壅盛的中風患者？  
(A)百部 (B)遠志 (C)桔梗 (D)天竹黃
- 76 有關珍珠的主治功效，下列何者錯誤？  
(A)驚悸失眠 (B)清肝除翳 (C)疏肝解鬱 (D)生肌收口
- 77 下列何藥較少用於治療小兒疳積？  
(A)石菖蒲 (B)胡黃連 (C)雞內金 (D)使君子
- 78 下列藥物配伍何者最適用於腎氣虛所致之遺精、遺尿、尿頻的治療？  
(A)雞內金、赤石脂、石榴皮 (B)桑螵蛸、覆盆子、金櫻子  
(C)茯苓皮、地骨皮、大腹皮 (D)黃精、五味子、女貞子
- 79 有關蛇床子之主治功效，下列何者錯誤？  
(A)溫腎壯陽 (B)散寒祛風 (C)散結消癭 (D)燥濕殺蟲
- 80 有關白附子的敘述，下列共幾項正確？①白附子為毛茛科植物黃花烏頭Aconitum coreanum (Levl.) Raipaics.的塊根 ②白附子又稱為關白附，用於中風痰壅、口眼喎斜、驚風癲癇、破傷風等 ③外用治療癰瘰核、汗斑、陰囊濕疹，毒蛇咬傷等證 ④本品既祛風痰，又能止痛，尤擅治頭面部諸疾  
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4