

111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、
社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、
牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試

類 科：中醫師（一）

科 目：中醫基礎醫學（二）（包括中醫方劑學、中醫藥物學）

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

（二）本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

- 有關中藥方劑劑型的敘述，下列何者最不適宜？
(A)丸劑吸收緩慢，藥力持久，故不作急救用途
(B)湯劑的特點是吸收快，能迅速發揮療效
(C)蜜丸性質柔潤，適用於慢性病
(D)煎膏又稱膏滋，適合久病體虛者服用
- 有關《傷寒論》麻杏石甘湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治風熱襲肺，亦可治風寒鬱而化熱，壅遏於肺
(B)臨證用本方，有汗是其必要之證
(C)方中石膏用量倍於麻黃，可清肺而不留邪
(D)用法為先煮麻黃去上沫，再內諸藥煎煮
- 有關方劑之敘述，下列選項，何者最適宜？①《傷寒論》麻杏石甘湯與《攝生眾妙方》定喘湯之組成均含麻黃、杏仁、甘草 ②麻杏石甘湯證為風寒外束後，痰熱內蘊；定喘湯證為風寒化熱，壅遏於肺 ③麻杏石甘湯有清肺平喘的功用；定喘湯有宣肺降氣的功用
(A)僅① (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 下列何種情況，最不宜使用解表法治療？
(A)瘡瘍初起且有惡寒發熱 (B)斑疹隱而不透
(C)汗出如油 (D)腰以上水腫
- 患者證見發熱，微惡風寒，無汗，頭痛，口乾渴，咳嗽，咽痛等，其脈浮數，苔薄黃，舌尖紅。使用下列何方劑最適宜？
(A)《傷寒六書》再造散 (B)《太平惠民和劑局方》參蘇飲
(C)《溫病條辨》銀翹散 (D)《醫學心悟》加味香蘇散
- 關於祛痰劑，下列敘述何者錯誤？
(A)痰指體內水濕津液代謝異常，停聚而成的病理產物，可分為有形痰與無形痰
(B)祛痰法即以化、滌、吐等方式，來祛除痰涎、治療痰症的方式
(C)燥濕化痰、清熱化痰、潤燥化痰等都是常用治痰法
(D)葶藶子、貝母、杏仁都是溫化寒痰方劑中常見藥物
- 關於《內外傷辨惑論》生脈散主治之敘述，下何者最不適宜？
(A)溫熱病，汗出，煩躁，脈洪數 (B)久咳少痰，氣短自汗，脈虛數
(C)心悸、胸悶、口乾思飲，脈結代 (D)夏日汗多，體倦氣短，口渴，脈虛細
- 關於《小兒藥證直訣》六味地黃丸之敘述，下列何者最不適宜？
(A)丹皮配山茱萸瀉肝火 (B)加麥門冬為《醫宗己任》都氣丸
(C)能治消渴 (D)澤瀉配熟地能瀉腎降濁
- 下列何者不屬於《脾胃論》補中益氣湯與《景岳全書》舉元煎共有的藥物？
(A)柴胡 (B)黃耆 (C)人參 (D)升麻

- 10 《脾胃論》補中益氣湯與《濟生方》歸脾湯之比較，下列何者最不適宜？
(A)兩方同用人參、黃耆、白朮、甘草
(B)補中益氣湯是補氣藥配伍升陽舉陷藥，意在補氣升提，復其升清降濁之功
(C)歸脾湯是補氣藥配伍養心安神藥，意在益心脾，復其生血統血之職
(D)補中益氣湯主治發熱自汗出，氣虛乏力，舌淡，脈虛大無力之氣虛發熱證；歸脾湯主治勞倦內傷，氣弱血虛，陽浮外越，脈洪大而虛，重按無力之血虛發熱證
- 11 有關《溫病條辨》清營湯的敘述，下列何者最適宜？
(A)本方治療之患者，其身熱以夜間較明顯 (B)身熱，苔白滑者適宜本方
(C)本方治療以養陰增液為主 (D)治療患者以身熱神昏，脈洪大為主證
- 12 下列那一個清熱方劑的組方藥物中未包括黃連或黃芩？
(A)《傷寒論》白頭翁湯 (B)《保命集》芍藥湯
(C)《小兒藥證直訣》瀉黃散 (D)《疫疹一得》清瘟敗毒飲
- 13 關於《聖濟總錄》天臺烏藥散的方義與證治敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治小腸疝氣
(B)此足厥陰、手少陰藥也
(C)烏藥散膀胱冷氣，消腫止痛；良薑、茴香散寒暖腎
(D)巴豆斬關奪門，破血癥寒積。川棟導小腸邪熱，因小便下行
- 14 關於《醫學入門》固經丸的組成與證治，下列何者最不適宜？
(A)主治陰虛內熱所致的經行不止，與崩中漏下
(B)龜板滋陰降火益腎，白芍斂陰養血以柔肝
(C)地骨皮與黃柏以清陰分內熱，瀉火以止血
(D)椿根白皮以固經止帶，燥濕清熱
- 15 下列方劑組成中含有生地黃、木通、甘草等藥材之方劑有幾項？①《疫疹一得》清瘟敗毒飲 ②《醫方集解》龍膽瀉肝湯 ③《小兒藥證直訣》導赤散 ④《外科正宗》消風散 ⑤《蘭室秘藏》清胃散
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 16 臨床上治療滑精，遺尿，久瀉，失眠或帶下諸證，除以補益與收斂固澇為主之外，經常使用蓮子、遠志或茯苓等藥以交通心腎加強療效，下列方劑何者之組方未運用此法？
(A)《本草衍義》桑螵蛸散 (B)《醫方集解》金鎖固精丸
(C)《攝生秘剖》天王補心丹 (D)《醫方集解》治濁固本丸
- 17 下列藥物（半夏，黃連，黃芩，人參，大棗，乾薑，生薑，炙甘草）共同組成《傷寒論》何方劑？
(A)半夏瀉心湯 (B)黃連瀉心湯 (C)甘草瀉心湯 (D)生薑瀉心湯
- 18 患者感冒 3 天後出現惡熱、不惡寒，蒸蒸發熱，心煩譫語，腹脹，大便燥，小便數而色赤、舌紅苔黃，脈滑數。治宜以下列何者？
(A)大黃、厚朴、枳實 (B)大黃、芒硝、甘草
(C)大黃、芒硝、甘遂 (D)大黃、厚朴、枳實、芒硝
- 19 下列何者不是《外科全生集》陽和湯的組成之一？
(A)熟地、鹿角膠 (B)肉桂、薑炭 (C)麻黃、白芥子 (D)阿膠、芍藥
- 20 《攝生眾妙方》定喘湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治風寒外束，痰熱內蘊
(B)以麻黃、白果為主藥（君藥）
(C)白果可防麻黃辛散太過而耗傷肺，並以其收增強其平喘之作用
(D)以桑葉、黃芩之苦寒，清瀉肺熱，止咳平喘

- 21 神閉昏厥證經常伴隨抽搐痙攣，因此會配伍使用重鎮效力較強的礦物類藥物，下列那個處方含有最多種類的礦物藥？
(A)《太平惠民和劑局方》至寶丹 (B)《外臺秘要》紫雪丹
(C)《太平惠民和劑局方》蘇合香丸 (D)《溫病條辨》安宮牛黃丸
- 22 關於《醫林改錯》血府逐瘀湯之敘述，下列何者最不適宜？
(A)血府乃以膈膜低處如池，滿腔存血而命名之
(B)此方以活血化瘀為主，故以當歸、川芎、赤芍、桃仁、紅花為主藥（君藥）
(C)桔梗、枳殼配伍一升一降，開胸行氣
(D)牛膝祛瘀通血脈，引血熱下行；丹皮則涼血活血，共為佐藥
- 23 下列何者為《時方歌括》丹參飲之組成？
(A)川七、川芎、檀香 (B)丹參、桃仁、紅花
(C)川七、檀香、丹參 (D)丹參、檀香、砂仁
- 24 下列那個方劑，沒有使用生薑？
(A)《金匱要略》橘皮竹茹湯 (B)《傷寒論》旋覆代赭湯
(C)《金匱要略》大半夏湯 (D)《症因脈治》丁香柿蒂湯
- 25 下列何者為《金匱要略》桂枝茯苓丸組成？
(A)桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、紅花、白芍 (B)桂枝、茯苓、當歸、桃仁、白芍、紅花
(C)桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、白芍、白蜜 (D)桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、白芍、炙甘草
- 26 有關《攝生秘剖》天王補心丹，下列敘述何者正確？
(A)用遠志、石菖蒲養心安神，交通心腎
(B)五倍子益氣斂陰安神
(C)酸棗仁養心安神，用量最重，為方中主要藥物
(D)生地黃、當歸身酒洗，滋腎補陰，養血以制火
- 27 下列何者為丁香柿蒂散《症因脈治》之組成？
(A)丁香、甘草 (B)人參、生薑 (C)柿蒂、木香 (D)人參、半夏
- 28 關於《華氏中藏經》五皮散之敘述，下列何者正確？
(A)其組成為生薑皮、陳皮、地骨皮、大腹皮、桑白皮
(B)製法為將藥物打成粗粉後，每服方寸匕
(C)其功效為健脾除溼，活血利水
(D)為治療皮水的代表方
- 29 由益智仁、萆薢、石菖蒲、烏藥所組成方，下列何者為其功用？
(A)溫腎健脾，通竅安神 (B)溫陽健脾，行氣利水
(C)溫陽利水，行氣健脾 (D)溫腎利濕，化濁分清
- 30 脾陽虛致水濕內停，若兼氣滯腹脹者，以溫陽祛寒與利水滲濕藥物為主，配伍行氣藥如厚朴、大腹皮、木香等使氣行水行。符合上述法則的方劑為何？
(A)《傷寒論》真武湯 (B)《霍亂論》蠶矢湯
(C)《重訂嚴氏濟生方》實脾散 (D)《霍亂論》連朴飲
- 31 有關木瓜的敘述，下列何者最不適宜？
(A)為治療濕腳氣《證治準繩》雞鳴散的組成之一
(B)性溫味酸，功效為舒筋，化濕和胃
(C)為《霍亂論》蠶矢湯的組成之一
(D)本品不具消食作用，與熱帶水果番木瓜為不同植物

- 32 有關《太平惠民和劑局方》八正散的敘述，下列何者最不適宜？
(A)主治濕熱淋證 (B)以萹蓄、萆薢利水通淋
(C)以燈心草作為藥引，導熱下行 (D)以麵裹煨大黃泄熱降火
- 33 下列方劑中，何者不含有陳皮？
(A)《太平惠民和劑局方》平胃散 (B)《太平惠民和劑局方》藿香正氣散
(C)《蘭氏秘藏》當歸拈痛湯 (D)《朱氏類編集驗方》雞鳴散
- 34 24 歲患者，暑天求診，自覺怕冷怕風，無汗頭痛，胸煩口渴，舌苔白膩，脈浮而數，治以下列何方最適宜？
(A)《太平惠民和劑局方》香薷飲 (B)《傷寒論》麻黃湯
(C)《內外傷辨惑論》生脈散 (D)《傷寒直格》六一散
- 35 關於保和丸，下列敘述何者錯誤？
(A)半夏、陳皮行氣降逆和胃止嘔，為本方之君藥
(B)若兼見脾虛，可加白朮，即為《丹溪心法》之大安丸，主治食積兼脾虛或小兒食積
(C)兼見大便秘結者，可去茯苓加大黃以瀉下通便
(D)若食積化熱者，可加黃連、黃芩
- 36 《婦人良方大全》仙方活命飲之敘述，下列何者最不適宜？
(A)肺系疾病兼咳喘者，如見膿瘍，亦可使用
(B)舌質淡，需加強清熱解毒消腫之力
(C)舌苔厚膩，服藥後噁心感，可能為乳香、沒藥等藥物之故
(D)癰瘍兼見大便閉結，亦可使用
- 37 下列關於《慎齋遺書》百合固金湯之敘述，正確者有幾項？①百合滋陰清熱，潤肺止咳，藥量最重 ②可治肺腎陰虛、虛火上炎之咯血 ③與《重樓玉鑰》養陰清肺湯共有之藥物有 6 項 ④組成有遠志、桔梗 ⑤組成有生地、麥門冬
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- 38 以惡寒、發熱、無汗，脘腹冷痛，胸腹脹滿，舌苔白膩，脈沉遲為主證，治宜下列何方？
(A)《醫原》藿朴夏苓湯 (B)《宣明論方》防風通聖散
(C)《太平惠民和劑局方》五積散 (D)《太平惠民和劑局方》不換金正氣散
- 39 《內外傷辨惑論》枳實導滯丸以下列何藥為方中主（君）藥？
(A)枳實 (B)大黃 (C)神麴 (D)黃芩
- 40 《證治準繩》健脾丸的組成中，主要的三味消食藥物，下列選項何者正確？①雞內金 ②穀芽 ③山楂 ④神麴 ⑤麥芽 ⑥萊菔子
(A)①②④ (B)①⑤⑥ (C)②③⑥ (D)③④⑤
- 41 能宣散風熱、透疹、疏解肝鬱，下列何藥物最適宜？
(A)桑葉 (B)菊花 (C)薄荷 (D)蟬蛻
- 42 能用於水腫、腳氣，具舒筋活絡及化濕和胃功效，下列何藥物最適宜？
(A)蠶砂 (B)木通 (C)木瓜 (D)絡石藤
- 43 有關紫蘇葉、梗之應用，下列何者最不適宜？
(A)感冒風寒，頭痛鼻塞，胸悶不舒 (B)胎氣不和，胸腹痞悶，脘腹疼痛
(C)脾胃氣滯，痰盛咳喘，噁心嘔吐 (D)欬逆上氣，氣弱表虛，腸燥便秘
- 44 下列何者非麻黃的應用？
(A)與桂枝相須為用，增強發汗解表 (B)能開宣肺氣，散風寒而平喘
(C)用於水腫而兼有表證 (D)用於心脾陽虛，水濕內停而致的痰飲證

- 45 用於夏季乘涼、飲冷或暑濕感冒，下列何藥最適宜？
(A)荊芥 (B)桑葉 (C)香薷 (D)薄荷
- 46 厚朴用於中焦虛寒脹滿的治療，最適宜與那些藥合用？
(A)蒼朮、陳皮 (B)大黃、枳實 (C)黃芩、白芍 (D)人參、生薑
- 47 可以利小便，還能用於皮膚濕疹發癢，下列何組藥物最適宜？
(A)篇蓄、地膚子 (B)通草、冬葵子 (C)瞿麥、燈心草 (D)赤小豆、車前子
- 48 下列何藥對濕熱痢疾瀉泄兼有裏急後重，腹部脹悶者最適當？
(A)黃芩 (B)厚朴 (C)白頭翁 (D)木香
- 49 最常配伍用於腎不納氣之虛喘，下列何者最適宜？
(A)檀香 (B)香附 (C)沉香 (D)木香
- 50 有關冬瓜敘述，下列何者錯誤？
(A)皮：利水消腫 (B)子：治療肺膿瘍、腸癰的輔助藥
(C)子：治療淋濁帶下 (D)子：斂肺平喘
- 51 性味：苦，寒。去心熱，益肝膽，厚腸胃；用治骨蒸勞熱，五心煩熱，下列何藥物最適宜？
(A)胡黃連 (B)黃連 (C)黃芩 (D)黃柏
- 52 多服龍膽草，下列何敘述最適宜？
(A)損胃氣 (B)消腎氣 (C)耗心氣 (D)傷肺氣
- 53 射干散血消痰，為治下列何病之要藥？
(A)清暑祛濕 (B)金瘡、杖瘡 (C)小兒驚疳 (D)喉痹咽痛
- 54 清心解熱，利痰涼驚，通竅辟邪，治中風入臟，驚癇口噤，下列何藥最適宜？
(A)磁石 (B)羚羊角 (C)牛黃 (D)代赭石
- 55 可腐蝕贅疣，截瘡，下列何者最適宜？
(A)薏苡仁 (B)鴉膽子 (C)常山 (D)柴胡
- 56 水蛭功能，具有破血逐瘀，與下列何者最適宜？
(A)涼血祛風 (B)搜風通絡 (C)通經 (D)降逆止嘔
- 57 降真香具有活血行瘀，止血定痛的功效，與下列何者最適宜？
(A)和中止嘔 (B)通經下乳 (C)清熱解毒 (D)涼血止血
- 58 吳茱萸臨床應用，下列敘述何者最不最適宜？
(A)肝熱犯胃，嘔吐吞酸 (B)痞滿噎膈，食積瀉痢
(C)口舌生瘡，氣逆裏急 (D)血痹陰疽，血虛有火
- 59 關於虎杖功效的描述，下列何者最適宜？
(A)行血補血，舒筋活絡 (B)清熱解毒，散瘀止痛
(C)通經下乳，消腫排膿 (D)活血止痛，化瘀止血
- 60 三七治瘀諸證，為下列何證要藥？
(A)經產 (B)消渴 (C)痿痹 (D)杖瘡
- 61 下列何藥物最不最適宜與丹參同用？
(A)川芎 (B)延胡索 (C)藜蘆 (D)雞血藤
- 62 蜂蜜的敘述，下列何者最適宜？
(A)肺虛久咳、乾咳、咽乾 (B)濕熱積滯
(C)胸悶痞脹 (D)便溏、泄瀉者
- 63 石斛的功能，下列何者最不最適宜？
(A)清心火 (B)益胃陰 (C)清虛熱 (D)滋腎陰

- 64 具有滋陰潤肺，補脾益氣之功能，下列何者最適宜？
(A)天門冬 (B)百合 (C)黃精 (D)麥門冬
- 65 龍眼肉的敘述，下列何者最不適宜？
(A)補心脾 (B)益氣血 (C)生津止渴 (D)養血安神
- 66 陽虛兼有寒濕之證，下列何者最適宜？
(A)鹿茸 (B)菟絲子 (C)補骨脂 (D)巴戟天
- 67 下列何藥能燥濕健脾，又能用於黃疸濕痹者？
(A)金錢草 (B)萆薢 (C)茵陳 (D)白朮
- 68 石菖蒲的敘述，下列何者最不適宜？
(A)辛、苦，涼。歸心、肝、胃經
(B)開竅寧神、醒神益智、豁痰、化濕和胃
(C)具有芳香化濁開竅、益心智、寧心安神之功
(D)陰虛陽亢、煩躁汗多、咳嗽、吐血、精滑者慎服
- 69 有活血化瘀的功效，是製造香水的原料之一，能促進子宮收縮，初期懷孕的孕婦使用，子宮過度收縮可能導致流產，下列何藥最適宜？
(A)石菖蒲 (B)蘇合香 (C)冰片 (D)麝香
- 70 治療神昏竅閉因於寒者，下列那些藥物適合？①麝香 ②蘇合香 ③冰片
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 71 下列敘述，何者最不適宜？
(A)麝香常與冰片用於熱閉的神昏癱厥 (B)冰片用於神昏癱厥及瘡瘍等證
(C)蘇合香多用於熱閉的中風痰厥 (D)石菖蒲用於風寒濕痹證
- 72 全蠍除了息風止癇、解毒散結外，下列何者最適宜？
(A)通絡止痛 (B)化痰開竅 (C)清熱解毒 (D)清熱平肝
- 73 治療癭瘤、瘰癧，常配海藻、夏枯草等，有平肝潛陽又能軟堅散結，下列何者最適宜？
(A)黃藥子 (B)牡蠣 (C)代赭石 (D)乳香
- 74 有關蜂蜜的功效敘述，下列何者最不適宜？
(A)補中緩急 (B)潤肺止咳 (C)滑腸通便 (D)養血斂陰
- 75 性味：辛，溫。具澀腸止瀉、溫中行氣之功能，下列何藥物最適宜？
(A)椿皮 (B)訶子 (C)肉豆蔻 (D)金櫻子
- 76 具湧吐風痰，驅蟲之功能，其治療劑量與中毒劑量很接近，下列何藥物最適宜？
(A)常山 (B)斑蝥 (C)射干 (D)藜蘆
- 77 下列何藥具有消食化積、活血散瘀的功效，並可搭配小茴香、橘核等藥物來治療疝氣、偏墜脹痛？
(A)山楂 (B)麥芽 (C)穀芽 (D)神麩
- 78 性味辛，熱，且有驅蟲功效，下列何者最適宜？
(A)百部 (B)鶴蟲 (C)花椒 (D)雷丸
- 79 下列關於黃芩的敘述，何者最不適宜？
(A)清熱多用生黃芩 (B)安胎可用炒黃芩
(C)清上焦熱可用酒黃芩 (D)枯芩善清大腸火
- 80 有關麝香的敘述，下列何者最不適宜？
(A)為鹿科動物麝、馬麝或原麝的成熟雌體香囊（麝腺）的乾燥分泌物
(B)用於心腹暴痛、跌打損傷及痹證諸痛
(C)用於胎死腹中或胞衣不下等證
(D)能行血分之滯，有活血散結，消腫止痛之效