

112年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考
試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關清代中醫外科學的著作發展，下列著作何者是集各家所說於一爐？

- A.醫宗金鑑·外科心法要訣
- B.外科精義
- C.外科理例
- D.外科準繩

2.下列有關中醫外科開刀法的敘述，何者錯誤？

- A.除了特殊情況，切口避免橫斷切法
- B.一般瘡瘍，宜循經直開，刀頭向下，免傷血絡
- C.乳部宜放射形切開，免傷乳囊
- D.手指膿腫，從側方切開，免傷伸屈功能

3.關於風疽之敘述，下列何者錯誤？

- A.生於脛骨及曲凹之處
- B.癢搔皮損，津黃汁極其黏稠
- C.可因風濕之氣搏於血脈，鬱滯阻塞而成
- D.外用如聖金刀散

4.關於大小腸癰，下列敘述何者正確？

- A.初起疼痛，小便不利，不發寒熱者險
- B.已成小腹腫而堅硬，小便數而不利者輕
- C.已潰時時下膿，裏急後重，日夜無度，疼痛不減者，將癒
- D.潰後膿腥臭穢或流敗血濁液，虛弱更增而不進飲食者，死候

5.牙癰生齒盡頭者，又名下列何者？

- A.托腮癰
- B.銳毒
- C.穿牙毒

D.牙齦癰

6.厲癰生足背兩旁，足趾之側，下列有關證治，何者正確？

A.若紅腫熱痛，潰破有膿，腐脫無黑氣，為險證難治

B.若微紅微腫，潰出膿水，凝結不能化膿，為順證易治

C.若黑暗漫腫，痛不潰膿，煩熱作渴，小水淋漓，為善證易治

D.若色黯不痛，可用桑柴烘法，內服十全大補湯兼桂附地黄丸

7.生於牙縫齦肉上，由胃經火毒引起，若失治可成穿牙毒，下列何者正確？

A.水蛇頭

B.蛇背疔

C.蛇腹疔

D.牙疔

8.依《中醫外科講義》，赤白遊風滯於血分者，則發赤色，滯於氣分者，則發白色，初期俱宜用下列何方疏解之？

A.浮萍丸

B.四物消風飲

C.補中益氣湯

D.荊防敗毒散

9.有關紫白癩風，色紫者多起因於血滯，色白者大多起因為何？

A.血虛

B.氣滯

C.血熱

D.風寒

10.下列何種疾病，在手掌出現紫色斑點，類似西方醫學二期梅毒的表現？

A.花斑癩

B.痲瘡

C.旋指疔

D.鵝掌風

11.依《中醫外科講義》有關黃水瘡的敘述，下列何者錯誤？

A.初起時如粟米大小，搔癢抓破流出黃水，浸淫成片，隨處可生。治宜祛風涼血清熱藥內服

B.熱甚者，可用青蛤散外敷

C.濕盛者，可用碧玉散外敷

D.痂厚者，可以清水洗之

12.張先生感冒後腰間出現帶狀皰疹，皮疹顏色淡，皰壁鬆弛，腹脹，食欲不佳，舌淡苔白膩，脈沉緩，下列處方何者最適合？

A.除濕胃苓湯

B.龍膽瀉肝湯

C.柴胡清肝湯

D.四妙散

13.關於黧黑斑的病因，下列何者最適當？

A.火鬱於孫絡之血分，風邪外搏而發

B.熱體風邪濕氣，侵入毛孔，與氣血凝滯，毛竅閉塞而成

C.平素血燥，過食辛辣厚味，以致陽明胃經濕熱受風而成

D.憂思抑鬱，血虛不華，火燥結滯而生

14.下列疾病何者非生發於小腿？

A.爛腿

B.疔瘡

C.臁瘡

D.風疽

15.有關奶癬的敘述，下列何者正確？

A.不具傳染性

B.面上風癬，婦人多有之

C.好發於乳房

D.亦名桃花癬

16.外痔初起時，肛門重墜、熱痛、發癢，大便燥結者，內服下列何方劑最適當？

A.消痔止痛方

B.活血補中湯

C.聖愈湯

D.枯痔散

17.有關石癭的敘述，下列何者錯誤？

A.生於結喉正中附近

B.近似西方醫學的甲狀腺囊腫

C.因情志內傷、肝脾氣逆所致

D.多見於40~70歲的人

18.疝瘡若因男子慾念萌動，淫火猖狂，未經發泄，以致敗精濁血，留滯中途結而為腫。症見淋漓溲溺澀痛，次流黃濁敗精，陽物漸損者，以下列何方劑內服治療最適當？

A.鳳衣散

B.八正散

C.旱螺散

D.礪砂散

19.婦女陰戶外部生瘡，初癢如蟲行，酸麻徹骨，漸至焮腫異常。除內服方劑之外，亦可外用薰洗，外用薰洗以下列何藥最適宜？

A.九龍丸

B.蘆薈丸

C.濕癢湯

D.銀杏散

20.有關評估燒傷面積和深度的方法，下列敘述何者正確？


A.手掌法，是以傷員五指張開時的手掌面積占其全身體表面積的1%進行燒傷面積估算

B.九分法，是將全身體表面積分為11個9等分，其中雙上肢為2*9%，而雙下肢包括臀部則為5*9%+1%

C.兒童燒傷計算法，年齡越小，頭部與下肢體表面積越大，而上肢體表面積越少

D.燒傷深度計算法，若採用三度四分法，即為I度、II度和淺III度、深III度燒傷

21.依附圖所示之大腿伸肌群，下列何者正確？



A.17為內收長肌

B.27為半腱肌

C.19為熊足

D.18為縫匠肌

22.下列何者非屬惱人三重傷（unhappy triad）或名膝關節三聯症？


A.內側副韌帶

B.內側半月軟骨

C.前十字韌帶

D.外側副韌帶

23.依附圖所示，下列敘述何者錯誤？



A.此為檢查踝關節外側不穩定

B.前距腓韌帶會被影響

C.跟腓韌帶會被影響

D.後脛腓韌帶會被影響

24.下列何者不是外踝扭傷常見的三條韌帶？

A.前距腓韌帶

B.跟腓韌帶

C.深距腓韌帶

D.後距腓韌帶

25.56歲病人主訴左腳穿拖鞋容易掉下，但是其他手腳無力狀況沒有發生過。有關足背屈無力之相關敘述，下列何者正確？

A.薦1、2為負責之神經


- B.脛骨前肌有相關
- C.內收大肌也相關
- D.內收長肌位於最深層
- 26.腕隧道症候群常引起手指麻痛乏力，主要是因為何者在腕隧道中受壓？
- A.橈動脈
- B.拇長屈肌腱
- C.橈神經
- D.正中神經
- 27.老人家的骨關節炎，在遠端指骨間關節背面與側面常有可觸摸到的骨性結節，稱之為何？
- A.Bouchard's node
- B.Boutonniere deformity
- C.Swan-neck deformity
- D.Heberden's node
- 28.一名38歲搬家工人，長年雙肩背重物，最近發現上臂難以高舉，且推牆時，肩胛骨有如翅膀狀突出，極可能是何束肌肉無力引起？
- A.前鋸肌（serratus anterior）
- B.提肩胛肌（levator muscle of scapula）
- C.肩胛下肌（musculus subscapularis）
- D.大圓肌（teres major muscle）
- 29.關於肚臍是那個神經機能階層的分界點？
- A.T9-T10
- B.T10-T11
- C.T11-T12
- D.T12-L1
- 30.關於髂腰肌肌力測試的方法，下列敘述何者錯誤？
- A.病患採坐姿，雙腿自然下垂於床緣呈懸空狀
- B.檢查者固定受檢者的髂嵴以穩定其骨盆
- C.請受檢者抬高大腿並離開床面
- D.檢查者對受檢者大腿近鼠蹊部施予對抗力
- 31.有關慢性腰痛의 病因病機約可分為三類：外感風寒濕邪、內傷腎之精氣、外傷筋骨血脈等，下列何者正確？
- A.長期負荷過重引起脊椎病理性骨折

- B.慢性炎症引起椎間盤突出
 - C.姿勢不良引起後天性脊椎側彎
 - D.更年期障礙引起尿路結石
- 32.患者出現肩外側疼痛，且放射至三角肌，同時靜態下三角肌前緣有一個囊性腫塊，關於此患者之診斷，下列何者最適宜？
- A.肱二頭肌長頭腱鞘炎
 - B.肱二頭肌肌腱斷裂
 - C.肩峰下滑囊炎
 - D.肩關節周圍炎
- 33.一位30歲木工長期勞動，近1個月出現勞累後手肘外側疼痛，扭轉毛巾時感到疼痛乏力，休息時則無特殊不適，關於此患者之診斷，下列何者最適宜？
- A.肱骨外上髁炎
 - B.俗稱高爾夫球肘
 - C.鷹嘴滑囊炎
 - D.俗稱牽拉肘
- 34.30歲女性於昨日摔倒，當時手掌著地，就診時檢查發現腕關節尺側腫脹，旋轉動作加重疼痛，關於其診治之敘述，下列何者最不適宜？
- A.受傷部位可能是腕三角纖維軟骨
 - B.損傷初期應固定腕關節於功能位4至6週
 - C.月狀骨無菌性壞死，其壓痛點多在陽谷穴，可作為鑑別
 - D.若發現尺骨小頭移動度增加，可能是下尺橈關節韌帶斷裂
- 35.關於橈骨莖突腱鞘炎之診斷與治療，下列敘述何者最不適宜？
- A.橈骨莖突部有外展拇長肌腱與伸拇短肌腱的共同腱鞘，為病變所在
 - B.理學檢查時常見Tinel試驗為陽性
 - C.針灸可以陽谿穴為主穴
 - D.方藥可選桂枝湯加當歸、何首烏、威靈仙
- 36.關於腱鞘囊腫之敘述，下列何者最不適宜？
- A.內含凝膠的液體
 - B.古稱筋聚、筋結
 - C.部分可能自行消散
 - D.屬細胞變異增生性的腫瘤

37.關於手指傷筋之鑑別，下列敘述何者最適宜？

- A.固定患指中節，如患者無法屈遠側指間關節，是屈指淺肌腱斷裂
- B.固定患指外其他三指於伸直位，如無法屈患指近側指間關節，是指伸肌腱斷裂
- C.末節手指下垂屈曲，不能自動伸直，為蚓狀肌受損
- D.中央束斷裂，遠側指間關節可能反被側韌束拉成過伸畸形

38.在門診中進行如下之理學檢查：指導患者握拳，將拇指掩藏於其他手指內部。然後醫師以一手固定其前臂，並用另一手將其腕部偏向其尺側，結果導致患者橈骨莖突附近痛劇。如圖依據以上資訊，下列敘述何者正確？①此檢查通常用於佐證橈骨莖突狹窄性腱鞘炎 ②此檢查之名稱為Phalen's test ③該患者之患病原因較大可能是因腕部長期過度使用所致 ④陽池穴常有明顯壓痛



- A.①②
- B.①③
- C.②④
- D.③④

39.手麻患者經檢查已排除頸椎病變，其右手掌顯示異狀如下圖白圈處，關於該臨床表現，下列敘述何者最適宜？



- A.拇指外展無力

B.此為橈神經病變

C.常併見爪狀手變形

D.手部理學檢查Tinel試驗陽性最可能

40.關於橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，下列何者正確？①患者多見有急性外傷史 ②與外展拇長肌（*musculus abductor pollicis longus*）及伸拇短肌（*musculus extensor pollicis brevis*）有關 ③Finkelstein's test通常為陽性 ④抗阻力伸腕試驗通常為陽性

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

41.關於橈骨與其相關肌肉的敘述，下列何者正確？

A.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》橈骨為肱骨，又名肱膊骨

B.肱二頭肌起於橈骨頭，終點橈骨粗隆和肱二頭肌腱膜到前臂的筋膜

C.Yergason test主要測試肱二頭肌短頭肌腱的穩定性

D.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》橈骨骨折時內服四物湯

42.30歲男性喜歡重訓，近1個月出現胸腹痛悶的症狀，根據《醫宗金鑑·正骨心法要旨》中有關於胸腹痛悶的治療，下列敘述何者正確？

A.如果出現胸腹怕被手摸到的症狀，證型為肝經血滯，可用桃仁承氣湯治療

B.如果出現胸腹不利，食慾減退睡眠變差，證型為脾氣鬱結，可用四君子湯治療

C.如果出現胸脅悶痛，身體發熱，證型為肝經血傷，可用加味逍遙散治療

D.如果出現胸腹喜歡手摸按的症狀，證型為肝火傷脾，可用六君子湯加青皮治療

43.35歲男性在浴室滑倒，頭部枕骨處撞到浴缸，倒臥失去意識，緊急送醫後，在急診室恢復意識，但頭暈目眩噁心不欲飲食，依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》下列敘述何者正確？

A.枕骨傷損可內服正骨紫金丹，外敷萬靈膏，洗以海桐皮湯

B.枕骨的古名為旋臺骨

C.枕骨傷損，可能有耳鳴，項強咽直，坐臥不安，四肢無力等症狀

D.撞到枕骨昏迷不省人事，少時或明者，其人不可治

44.45歲男性，約5年前於位在山上的家中摔倒並撞傷膝蓋，當時經休養後雖大致痊癒，但之後每逢天冷潮濕時總覺膝蓋痠痛難忍，且活動較為不順，甚至略感麻木，但可以透過熱敷舒緩症狀。根據以上描述，治以下列何方最適宜？

A.獨活寄生湯

B.柴胡疏肝散

C.和營止痛湯

D.黃連解毒湯

45.關於傷後發熱中「邪毒熱」之論述，下列何者正確？

A.證見發熱、惡寒、頭痛、全身不適、苔白微黃、脈浮數時，最合適之方劑為仙方活命飲

B.若患者出現腹部脹痛拒按，腹壁板硬、腹部反彈疼痛之表現，應考慮鑑別急腹症

C.若出現煩躁不安，神昏譫語，此為火毒傷肝之表現

D.若毒邪壅於肌膚積瘀成膿時，可見局部皮膚紅腫灼熱疼痛，可用犀角地黃湯消腫潰堅

46.關於損傷疼痛的辨證診斷，下列何者正確？

A.血瘀痛：脹痛為主，疼痛走竄，痛無定處。咳嗽、呼吸、解大小便閉氣時，可使疼痛加重

B.寒濕痛：痛處固定於損傷、腫脹之處，不走竄，刺痛，痛處拒按

C.骨傷疼痛：深層且劇烈的疼痛，或深部的震動疼痛

D.傷筋痛：疼痛逐漸開始，陰雨天發作或加重，喜熱畏冷，得熱則減

47.依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損之外挾表邪者，其脈證各為何？

A.弦緊；寒熱往來

B.沉滑；四肢厥冷

C.浮緊；發熱體痛

D.滑數；發熱煩渴

48.有關胸部內傷的敘述，下列何者錯誤？

A.胸部遭受外力擊打時，要先排除是否有肋骨骨折

B.患處腫痛、青紫、壓痛部位固定，咳嗆疼痛加重，偶痰中帶血，多屬傷血型

C.胸部、脅肋部遭受外力擊打，導致患者呼吸困難逐漸加重，要儘快確認是否有氣胸情況

D.氣胸的理學檢查：傷側呼吸運動減低、呼吸音減弱、叩診濁音

49.關於股骨順轉子間型骨折敘述，下列何者正確？

A.骨折近端外展、外旋

B.骨折線自小轉子斜向外下方

C.屬於不穩定骨折

D.若股骨上端保持完整，髁則明顯內翻

50.35歲女性跌倒右手掌著地，右手背腫脹瘀青疼痛明顯就醫，X光如附圖所示，下列敘述何者正確？



- A. X光顯示右手第四第五掌骨幹骨折
- B. 確認骨折處位移與成角程度，需再拍攝手部側位（lateral view）X光檢查
- C. 該處骨折常因骨間肌與屈指肌牽拉使骨折向掌側成角
- D. 該處骨折一般需固定4~6週
51. 關於腕舟狀骨骨折，下列敘述何者最適宜？
- A. 腕舟狀骨骨折通常因直接暴力造成
- B. 腕舟狀骨骨折時按壓陽谿穴可能有明顯壓痛
- C. 如果懷疑腕舟狀骨骨折，當下拍攝X光可馬上確定或排除骨折
- D. 腕舟狀骨血液供應充足，較少發生不癒合或延遲癒合
52. 關於遠端橈骨骨折，下列敘述何項正確？①伸直型骨折為手掌著地造成，又名Colles' fracture ②屈曲型骨折為手背著地造成，又名Smith's fracture ③屈曲型骨折常會有餐叉狀畸形 ④伸直型骨折常會有鍋鏟狀畸形
- A. ①②
- B. ③④
- C. ①③
- D. ②④
53. 關於膝關節脫位的敘述，下列何者正確？
- A. 如外力由前方作用在脛骨上端，可造成脛骨向後脫位
- B. 如外力由外側作用在脛腓骨上端，可造成脛骨向外側脫位
- C. 如外力由前方作用在股骨下端，可造成脛骨向後脫位
- D. 多因暴力作用於脛骨下端而脫位
54. 關於掌指關節與指間關節脫位之敘述，下列何者正確？

- A.掌指關節脫位患處最常見為指間關節過伸、掌指關節屈曲畸形
- B.當用掌指關節脫位復位法處理掌指關節掌側脫位時，先拔伸牽引後過伸患側關節復位
- C.指間關節脫位方向最常見是近端指骨向背側移位
- D.指間關節脫位整復最常見是拔伸牽引後屈曲患指復位
- 55.《內經·癘論》提到：「……善脹，尻以代踵，脊以代頭。」其中描述有關脊椎的變形，在X光的表現最接近於下列何者？
- A.Lordosis
- B.Kyphosis
- C.Scoliosis
- D.Syndesmophytes
- 56.承上題，內經文中所描述之症，其定義為何病？
- A.胞癘
- B.肝癘
- C.肺癘
- D.腎癘
- 57.當四肢或軀幹肌肉豐富的部位被外部重物長時間擠壓，或長期固定體位的自壓解除後，有時會形成擠壓症候群（Crush syndrome），有關擠壓症候群之敘述，下列何者錯誤？
- A.擠壓症候群在病理中可累及多個器官和系統而發生病變
- B.出現肌紅蛋白尿（Myoglobinuria），是診斷擠壓症候群的一個重要條件
- C.肌紅蛋白在尿中的濃度在傷後3~12小時達到高峰
- D.會導致電解質紊亂，見高血鈣、高血鈉、高血磷
- 58.遇肩關節前脫位時，單人採用牽引回旋法做復位動作時，除了疼痛的問題之外，尚須特別注意力道，以防止有骨質疏鬆的患者發生骨折。這個動作最常發生的骨折位置在下列何處？
- A.肩胛喙突骨折
- B.肱骨頭撕裂性骨折
- C.肱骨幹骨折
- D.肱骨外科頸骨折
- 59.承上題，右肩關節前脫位採牽引回旋復位動作之順序為何？①醫者右手向下牽拉，同時外展外旋患者上臂 ②醫者右手握患側肘部，左手握住手腕 ③醫者左手迅速內旋上臂使肱骨頭滑入關節盂內 ④維持牽拉力道，同時逐漸內收肘部，使患者手肘與胸壁前方相接
- A.①②④③

B.②①③④

C.②①④③

D.①②③④

60.有關橈尺骨幹雙骨折的整復方法，下列敘述何者正確？

A.經牽引後重疊未完全糾正者，可用擠捏分骨手法加以復位

B.如骨折在上1/3，則先整復橈骨；如骨折在下1/3，則先整復尺骨

C.若斜形骨折或鋸齒形骨折有背向側方移位者，應用回旋手法進行復位

D.若橈尺骨骨折斷端互相靠攏時，可用折頂手法

61.依據中醫眼科，五輪學說與五臟間的關聯，下列敘述何者正確？

A.肉輪為眼眥內紅色肉狀隆起，五臟屬於心

B.風輪指白睛，五臟屬於肺

C.腎五色主黑，指黑睛，五輪學說中屬氣輪

D.瞳神位於黃仁中央，內含神水，五輪學說中屬水輪

62.胞臉腫脹，虛軟如球，皮色如常，《眼科臨證筆記》稱之為胞虛如球，下列何者非其病因病機？

A.脾肺氣虛，濕邪上泛

B.脾腎陽虛，水不化氣

C.心脾兩虛，無力化濕

D.心有伏火，脾蘊濕困

63.中醫名稱「目系」相當於現代醫學下列何者？

A.視神經

B.眼瞼

C.玻璃體

D.水晶體

64.關於白澀症，下列敘述何者錯誤？

A.白澀症之病名首見於《諸病源候論》

B.本病類似西醫學之淺層點狀角膜炎

C.暴風客熱或天行赤眼治之不徹，以致目乾澀不爽者，可選用桑白皮湯加減治療

D.本病白睛不紅不腫，或隱見淡赤血絡，甚則視物昏矇

65.關於兩眦赤脈的敘述，下列何者正確？

A.大眦多虛，小眦實

B.實者用九仙散

- C.虛者用洗心散
- D.眦赤病多屬心經火
- 66.關於金疳與火疳之比較，下列何者錯誤？
- A.金疳位於白睛表層；火疳位於白睛裏層
- B.金疳病程較長；火疳病程較短
- C.金疳顆粒較小，呈灰白或白色小泡樣；火疳為侷限性紫紅色結節
- D.金疳不波及瞳神，預後較火疳好
- 67.若患者黑睛破裂，視力驟降，疼痛劇烈，畏光流淚，健眼無礙，用下列何方加減治療最適宜？
- A.除風益損湯
- B.還陰救苦湯
- C.瀉腦湯
- D.經效散
- 68.患者黑睛起翳如星，邊緣不清，表面污濁，如覆薄脂，抱輪紅赤，羞明流淚，珠痛頭痛，視力下降，舌紅苔薄黃，脈浮數。關於此患者的狀況，下列敘述何者錯誤？
- A.最有可能的診斷為凝脂翳
- B.可選用新製柴連湯加減來治療
- C.本病病程發展緩慢，一般預後良好
- D.此患者之辨證分型屬風熱壅盛
- 69.一位鼻咽癌的男性患者，近日頭痛劇烈，心煩失眠，咳嗽痰稠，口氣臭，口乾苦，耳鳴甚，小便赤，舌質紅，脈弦滑數，應以下列何種方式處理較為適宜？
- A.宜燥濕健脾，化痰散結，可選用加味二陳湯
- B.宜祛痰濁，散結聚，和脾胃，可選用清氣化痰丸
- C.宜行氣活血，軟堅散結，和肝養陰，可選用丹梔逍遙散
- D.宜瀉火解毒，疏肝健脾，可選用柴胡清肝湯
- 70.若治療耳鼻咽喉口齒科腫瘤的過程中，見病人津液耗傷，則治療宜養陰益氣。下列何藥之藥效不屬於此種效用？
- A.蘆根
- B.沙參
- C.雪梨乾
- D.山豆根
- 71.某患者耳部灼熱疼痛，張口時疼痛加劇，檢查見耳膜無穿孔，耳道瀰漫性紅腫兼見黃白色分泌物，最可能診

斷為下列何病？

- A.耳癬
- B.旋耳瘡
- C.耳瘡
- D.耳疔

72.患者耳內流膿，纏綿日久，流膿量多而清稀，局部檢查見耳膜中央穿孔，全身倦怠乏力、納少腹脹、面色萎黃無華、苔白濕潤、脈緩細弱，治以下列何方最適合？

- A.附桂八味丸
- B.托裏消毒散
- C.蔓荊子散
- D.地黃飲

73.耳鳴係因肝火上擾時，下列敘述何者錯誤？

- A.《醫學準繩六要》提到：「右脈弦急而數，屬肝火，其人必多怒，耳鳴或聾」
- B.治宜清肝泄熱，開鬱通竅，方以龍膽瀉肝湯加石菖蒲
- C.肝火盛者可選用龍薈丸
- D.肝氣鬱結火熱尚輕者，用逍遙散加減

74.關於「鼻淵」之針灸療法—艾灸，下列方法何者最不適宜？

- A.取百會、上星、身柱直接灸
- B.取膏肓、命門、氣海直接灸
- C.取足三里、三陰交、曲池直接灸
- D.取神闕、湧泉、風府直接灸

75.關於膽腑鬱熱所造成的鼻淵，下列敘述何者最正確？

- A.全身主要症狀包含頭暈頭重、小便黃、咳嗽、痰多
- B.鼻涕黏白且量多，由鼻道上方流下
- C.外治可採冰連散吹入鼻腔，以疏風清熱通竅
- D.內治宜用托裏消毒散加黃芩、菊花、葛根、連翹

76.鼻甲腫實色暗，呈桑椹樣，鼻塞無歇，涕多或黃稠，或黏白，咳嗽多痰，舌質紅或有瘀點，屬鼻塞，為何病因之主證？

- A.肺經風熱，邪毒外襲
- B.肺脾氣虛，邪滯鼻竅
- C.脾胃失調，濕熱鬱蒸

D.邪毒久留，氣滯血瘀

77.關於石蛾的成因，下列何者錯誤？

A.先天稟賦不足

B.後天肺脾氣虛

C.邪毒所染

D.氣血凝滯

78.肺陰虛喉痹，若見唇淡無華，頭暈目眩，肢麻消瘦者，除養陰清肺外，最宜用下列何方藥？

A.四君子湯加黃耆、大棗

B.二陰煎加首烏、阿膠

C.四物湯加首烏、阿膠

D.知柏地黃丸加川芎

79.唇風的護理及預防，下列何者最不建議？

A.宜服健脾滲濕飲料

B.以白朮、防風煲湯服

C.少食辛辣厚味之品

D.減少菸酒刺激

80.有關牙痛的病因病理敘述，下列何者錯誤？

A.齒病風痛者，遇風發作浮腫，隨後生痛，以消風散治之

B.陽明濕熱，能致齒病

C.牙齒痛甚不可忍，涕淚俱出者，此乃臟腑之火旺，上行於牙齒而作痛也

D.牙齒疼痛，至夜而甚，呻吟不臥者，以胃火上衝之故也