

113年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：3318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(三)(包括中醫外科學、中醫傷科學、中醫五官科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 若一婦人患有乳癰，遷延乳頭潰爛，根據《中醫外科講義》使用引經藥，下列何種組合最合適？
 - A. 黃柏，藁本
 - B. 白芷，升麻
 - C. 葛根，柴胡
 - D. 石膏，青皮
2. 根據《中醫外科講義》，痛是由於多種因素導致氣血凝滯，阻塞不通而成，若瘡瘍疼痛不定時，時感抽掣，發怒時疼痛更嚴重，屬於下列那種疼痛？
 - A. 瘀血作痛
 - B. 熱痛
 - C. 膿痛
 - D. 氣痛
3. 有關「鵝口疽」與「涌泉疽」之比較，下列何者錯誤？
 - A. 兩者皆可因濕熱痰結而成
 - B. 兩者皆屬任脈經絡部位病症
 - C. 兩者皆生於尻骨部位附近
 - D. 兩者皆少壯易癒，老弱難痊
4. 生於鼻柱，由肺經風熱及上焦火鬱而成，下列何者正確？
 - A. 眉心疽
 - B. 腦後發
 - C. 鳳眉疽
 - D. 鼻疽
5. 有關腸癰之敘述，下列何者錯誤？
 - A. 可因濕熱氣滯，凝結而成
 - B. 可因膏粱厚味，火毒蘊積於腸中而致

- C. 日久不潰，身皮甲錯，腹急腹痛，身無熱而脈數者，係腸內陰冷，不能為膿，宜八珍湯加丹皮、肉桂、黃耆、五味子斂而補之
- D. 若見脈洪數，肚臍高突，腹痛脹滿不食，動轉側身，則有水聲便淋刺痛者，癰膿已成，宜薏苡湯主之
6. 一位45歲女性，在飲食店負責洗碗工作，自述手指指節初起不紅不熱不痛，數週後指節腫堅，形如蟬肚，屈伸艱難，日久方知木痛。下列診斷何者最適宜？
- A. 蟬螂疔
- B. 斷指疔
- C. 蛀節疔
- D. 蛇節疔
7. 一位40歲男性前來中醫診所求診，自述數日前左鼻孔內側長一小痘，其形尖硬，近日轉為紅腫疼痛，目前尚無膿汁，但病人自覺時寒時熱，下列診斷何者最不適宜？
- A. 鼻疽
- B. 白刃疔
- C. 鼻疔
- D. 天柱疽
8. 下列何種皮膚疾病，易發生在兩腿彎，腳彎，或兩臂彎，往往相對而生？
- A. 癩風
- B. 四彎風
- C. 漏底風
- D. 胎風
9. 有關白屑風證治，耳項燥癢，日久飛起白屑，脫去又生，宜多服下列何方？
- A. 三礬湯
- B. 諸瘡一掃光
- C. 麥錢散
- D. 祛風換肌丸
10. 有關面遊風的敘述，下列何者錯誤？
- A. 生於面部
- B. 由平素血燥，過食辛辣厚味，致少陽膽經濕熱受風而成
- C. 癢甚者宜服消風散
- D. 痛甚者宜服黃連消毒飲
11. 下列有關風病的敘述何者錯誤？

- A. 繡毬風發生於陰囊
- B. 漏底風生於足掌
- C. 油風主要生於頭髮內
- D. 鵝爪風生於手掌心
12. 下列何種皮膚病屬於微生物源傳染性皮膚病？
- A. 錢癬
- B. 奶癬
- C. 蛇虱
- D. 白癬風
13. 一位養貓的國中女學生，來診時主訴：近3個月來頭皮逐漸出現白色片狀鱗屑，遇熱或流汗會比較搔癢，皮損有慢慢擴大的現象，而且病灶處頭髮成片脫落，不再長新髮。此病症的臨床診斷以下列何者最適當？
- A. 白癬風
- B. 鬼剃頭
- C. 禿瘡
- D. 白疔
14. 下列何種皮膚病，其臨床特色是：發於面上之風癬，初如癩疹，或漸如細瘡，時作痛癢，多發於春月？
- A. 胎癬
- B. 紫白癬風
- C. 面遊風
- D. 桃花癬
15. 依中醫外科學有關漆瘡的敘述，下列何者錯誤？
- A. 起因由人之腠理不密，感漆辛熱之毒而生
- B. 患部忌浴熱水
- C. 病人戒油膩厚味發物
- D. 臨床症狀是皮膚接觸刺激性物質後，患部滲出如漆狀的分泌物
16. 陳小姐因長期工作壓力大，臉上長出黃褐斑，色深褐偏灰黑，伴有腰膝痠軟，周身無力，五心煩熱，舌質紅苔少，脈細數，下列處方何者最合適？
- A. 消風散
- B. 桂枝湯
- C. 六味地黃丸
- D. 五味消毒飲

17. 中年女士帶來一位6個月大女嬰，掀開尿片時發現女嬰兩側臀部連大腿內側與下腹皮膚出現紅斑丘疹。此病症的臨床診斷，下列何者最適當？
- A. 猴疔
 - B. 火赤瘡
 - C. 漏底風
 - D. 胎癬
18. 常見於患者頭面、項背、臀部等處，大小如豆粒，界限明顯，形圓質軟，多半埋藏於肌膚之間，與深部組織不黏連，可以推動。其內容物為豆腐渣樣物質，具有臭味。此病症診斷為下列何病名最適宜？
- A. 脂瘤
 - B. 痘癰
 - C. 癰癤
 - D. 粉刺
19. 有關失營的敘述，下列何者錯誤？
- A. 生於耳前後或項間
 - B. 治法很多，預後良好
 - C. 調治法以戒除七情，適心治情為先，再以和營散堅丸用之
 - D. 未潰之前，可貼阿魏化堅膏
20. 依《中醫外科講義》有關疔瘡之敘述，下列何者錯誤？
- A. 生莖之下者，名下疔
 - B. 莖上生瘡，外皮腫脹包裹者，名袖口疔
 - C. 痛引睪丸，陰囊腫墜者，名雞瘻疔
 - D. 生馬口旁，有孔如棕眼，眼內作癢，捻之有微膿出者，名鑷根疔
21. 關於腿部活動的相關肌肉，下列何者錯誤？
- A. 腓骨長肌外翻足部
 - B. 腓骨短肌內翻足部
 - C. 脛骨後肌內翻足部
 - D. 比目魚肌和腓腸肌協調平衡小腿
22. 42歲女性於健身房做完啞鈴重訓後，自覺手腕不適、開喇叭鎖無力而就醫。體檢發現腕關節屈伸均可，橈偏尺偏無礙，則推測該患者受損之肌肉最可能在下列何穴位出現壓痛點？
- A. 天井
 - B. 腕骨

C. 陽谿

D. 手三里

23. 有關足踝扭傷的敘述，下列何者正確？①足蹠屈外翻時，容易損傷外側副韌帶 ②足踝前拉試驗（Anterior Drawer Test）陽性表示前距腓韌帶斷裂，關節不穩定 ③內踝損傷常牽涉三角纖維軟骨 ④距骨傾斜試驗（Talar Tilt Test）陽性表示前距腓韌帶和跟腓韌帶斷裂，關節不穩定

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

24. 某位木工因腕部疼痛來院診治，主訴因摔倒時手掌著地，腕部傷後腫脹，尺側疼痛，握力顯著下降，背伸支撐及尺偏旋前疼痛加重，由以上表現，比較可能的診斷為何？

A. 肱骨外上髁炎

B. 橈骨莖突狹窄性腱鞘炎

C. 下尺橈關節扭傷

D. 腕三角纖維軟骨損傷

25. 腕部扭挫傷在診斷上必須與舟狀骨骨折相鑑別，因為後者腫脹和壓痛點局限在那個穴道部位？

A. 陽谷

B. 陽谿

C. 陽池

D. 養老

26. 關於腕三角軟骨（Triangular fibrocartilage complex）結構的敘述，下列何者錯誤？

A. 軟骨基底部附著於尺骨遠端關節面的橈側緣

B. 軟骨尖端附著於尺骨莖突基底部

C. 軟骨的掌側緣與背側緣均與腕關節囊相連

D. 軟骨將腕關節腔與尺橈下關節腔隔開

27. 站在病人身後檢查手臂外展受限問題，發現被動繼續外展時，肩部隨之高聳，觸診肩胛骨有向外上轉動情形，比較可能是何處發生粘連？

A. 胸鎖關節（sternoclavicular joint）

B. 肩峰鎖骨關節（acromioclavicular joint）

C. 肩胛胸廓接合（scapulothoracic articulation）

D. 關節盂肱骨關節（glenohumeral joint）

28. 有關慢性腰痛的原因若為椎管外的病變，不包含下列何者？

- A. 腰肌勞損
- B. 腰部急性扭挫傷後遺症
- C. 椎間盤突出症
- D. 棘上和棘間韌帶勞損

29. 53歲男性無明顯外傷史，近1個月逐漸出現右肩疼痛，肩外展60~120度時特別加重，關於其可能疾患，下列敘述何者最適宜？

- A. 患病主要肌肉與肌腱由肩峰下通過，止於肱骨大結節外上方
- B. 患病主要肌肉與肌腱位於肱骨大結節、小結節之間的骨性溝內
- C. 患者主要肌肉起始於肩胛下窩內側2/3處
- D. 患處壓痛可放射至三頭肌，並出現腫塊

30. 關於棘上肌肌腱炎 (Supraspinatus tendinitis) 出現之肩外展功能異常，下列敘述何者最不適宜？

- A. 自動外展至60度時開始出現疼痛
- B. 此病無法被動外展，是與肩關節周圍炎的鑑別要點
- C. 外展至120度以上疼痛開始減輕
- D. 手法可嘗試透過搖轉將肩外展約90~120度

31. 關於上肢傷筋主要病變及疼痛所在之經絡，下列何者最不適宜？

- A. 網球肘：大腸經
- B. 礦工肘：三焦經
- C. 高爾夫球肘：肺經
- D. 媽媽手：大腸經

32. 關於手中指麻木的病因，下列何者可能性較高？

- A. 第五頸神經根壓迫
- B. 肘隧道症候群
- C. 腕部手厥陰經韌鞘囊腫
- D. 手太陰經合穴處韌鞘囊腫

33. 40歲糖尿病女性患者，主訴中指無法伸直，必須外力輔助，或有時會出現彈響聲，下列診治相關敘述何者最不適宜？

- A. 初期不宜熱敷，可能加重症狀
- B. 主要屈指肌腱韌鞘發炎導致
- C. 患處局部可能出現充血、水腫，繼之韌鞘變性

D.局部過勞，血不榮筋，可導致此病

34.關於肱骨內上髁的病變，下列敘述何者最不適宜？


A.肱骨內上髁炎常見前臂疼痛沿手太陰經循行位置發作

B.肱骨內上髁骨折常見於兒童跌倒時手掌著地引起

C.肱骨內上髁炎可見局部腫痛，屈腕抗阻力試驗陽性

D.肱骨內上髁骨折傷後可見肘關節呈半屈伸位，肘內側腫脹、壓痛

35.有關腕三角纖維軟骨損傷，如圖何部位最接近其典型之疼痛位置？



A.紅色

B.黃色

C.綠色

D.深藍色

36.有關梨狀肌的敘述，下列何者正確？①起於薦椎3、4、5椎的後面薦椎孔外側與薦結節韌帶 ②肌纖維通常會穿過坐骨大孔，止於股骨大轉子 ③梨狀肌是股骨的外旋肌，受薦叢神經支配 ④坐骨神經通常由梨狀肌下孔穿過坐骨大孔 ⑤梨狀肌的體表投影為尾骨尖與髂前上棘連線中點，此中點向股骨大轉子做連線，此直線正好為梨狀肌下緣

A.①②⑤

B.②③④

C.③④⑤

D.①③⑤

37.手部感覺之神經支配主要由橈神經、尺神經及正中神經負責，下列穴道所在位置之皮膚與其感覺支配之神經的配對何者正確？

A.合谷：正中神經；後谿：尺神經；勞宮：橈神經；液門：尺神經

- B. 合谷：橈神經；後谿：尺神經；勞宮：橈神經；液門：正中神經
- C. 合谷：橈神經；後谿：尺神經；勞宮：正中神經；液門：尺神經
- D. 合谷：橈神經；後谿：正中神經；勞宮：尺神經；液門：正中神經
38. 有關長短腳之理學檢查，下列敘述何者不適當？
- A. 病人仰臥，膝部屈曲九十度，足部平放，若右膝比左膝高，則右脛骨較長
- B. 病人仰臥，膝部屈曲九十度，足部平放，若右膝比左膝更向前，則右股骨較長
- C. 病人仰臥，比較肚臍至內踝的距離，距離不等即表示兩腿長真正不等長
- D. 病人仰臥，比較兩側髌骨前上棘至內踝的距離，距離不等即表示兩腿長真正不等長
39. 進行肘部的Tinel's sign之測試時，其敲打部位最接近那個穴位？
- A. 曲池
- B. 尺澤
- C. 小海
- D. 少海
40. 承上題，該檢查主要用於評估下列那一條神經之狀況？
- A. 橈神經
- B. 正中神經
- C. 後側前臂皮神經
- D. 尺神經
41. 40歲男性，浴室滑倒撞到腹部，之後出現胸脅悶脹疼痛、腹脹滿痛、噯氣、排便不暢等表現。其舌黯苔白，脈弦。治以下列何方最適當？
- A. 四君子湯
- B. 柴胡疏肝散
- C. 增液承氣湯
- D. 失笑散
42. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，關於傷損瘀血泛注，下列治法何者正確？
- A. 初起皆屬肝脾鬱火
- B. 初期急用蔥熨法，內服大柴胡湯以清肝火
- C. 若日久潰破而氣血虛者，宜托裏消毒飲
- D. 若潰而寒邪凝滯不斂者，宜太乙膏祛散之
43. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損脅肋脹痛之證，若胸腹脹痛，大便不通，喘咳吐血者，乃瘀血停滯也，治以下列何方最適宜？

- A. 抵當湯
 - B. 柴胡四物湯
 - C. 小柴胡湯加青皮、山梔
 - D. 當歸導滯散
44. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，傷損腰痛、脊痛之證，或因墜墮，或因打撲，瘀血留於何處中所致？
- A. 督脈
 - B. 腎府
 - C. 脊髓
 - D. 太陽經
45. 有關傷後癱閉的原因，下列何者錯誤？
- A. 嚴重外傷或脊柱骨折脫位合併截癱，瘀血遏阻於經脈之間致經絡閉阻，膀胱氣化功能障礙，產生癱閉
 - B. 骨盆骨折合併子宮破裂，輸卵管破裂，造成癱閉
 - C. 傷後出血量多或劇烈疼痛，精神緊張，大汗淋漓，陰液大耗，化水之源枯竭，水道通調不利，亦成癱閉
 - D. 損傷之後，濕熱之邪蘊結膀胱，或逆行感染，釀成濕熱，阻遏膀胱，致氣化失常，小便滴瀝難行
46. 有關損傷內證的敘述，下列何者錯誤？
- A. 《醫宗金鑑·正骨心法要旨》凡跌打損傷，墜墮之證，惡血留內，則不分何經，皆以肝為主
 - B. 內證治療仍以氣血為中心考量
 - C. 《素問·陰陽應象大論》血傷則痛，氣傷則腫
 - D. 損傷氣閉昏厥，用蘇合香丸主治
47. 有關損傷血證的敘述，下列何者錯誤？
- A. 腹內損傷傷及腸胃，先便後血者，稱為近血
 - B. 腹內損傷傷及腸胃，先便後血者，多為腸胃道上部出血
 - C. 遠血的糞便多烏黑油亮，少有鮮血
 - D. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》：「傷損之證，或患處、或諸竅出血者，此肝火熾盛，血熱錯經而妄行也，用加味逍遙散清熱養血。」
48. 依《醫宗金鑑·正骨心法要旨》，有關治法總論，有瘀血者，宜攻利之；宜補而行之的為下列何者？
- A. 血虛者
 - B. 亡血者
 - C. 氣虛者
 - D. 氣脫者
49. 關於外踝扭傷合併第五跖骨骨折的敘述，下列何者錯誤？

- A. 常見於基部 (base)
 - B. 多為撕脫性骨折
 - C. 即所謂 March fracture
 - D. 較少出現位移
50. 下列何者非不穩定脊椎骨折之表現？
- A. 粉碎並壓縮骨折
 - B. 椎體壓縮超過1/3
 - C. 合併橫突骨折
 - D. 合併前縱韌帶撕裂
51. 關於脛腓骨幹骨折敘述，下列何者錯誤？
- A. 間接暴力受傷時，腓骨骨折線較脛骨高
 - B. 脛骨上1/3骨折常發生癒合不良狀況
 - C. 脛骨上1/3骨折應注意臍動脈損傷
 - D. 直接暴力時脛腓兩骨折線在同一水平面
52. 髕骨因股四頭肌強力收縮牽拉骨折，為了放鬆股四頭肌下列穴位何者最不適宜？
- A. 伏兔
 - B. 中瀆
 - C. 血海
 - D. 至陽
53. 12歲男童今日中午爬樹時跌落，左肩著地致疼痛難耐，冰敷後疼痛較緩解但左肩上舉角度受限，X光如附圖，下列敘述何項正確？①左鎖骨骨折 ②肱骨外科頸骨折 ③治療採用8字肩帶包紮法 ④該患者需積極手法復位才能降低後續肩部功能受限



- A. ①④
- B. ②③
- C. ①③
- D. ②④

54. 關於小兒橈骨頭半脫位病因及診斷要點，下列敘述何者正確？①橈骨頭被環狀韌帶卡住 ②幼兒多因在肘關節強力屈曲時受牽拉所致 ③肘部患側常紅腫瘀青且畸形 ④肘三角相對位置改變

- A. ①②③④
- B. 僅①④
- C. 僅③④
- D. 僅①

55. 20歲男性騎腳踏車跌倒後，觸診肘部發現肘關節疼痛、腫脹，若診斷為肘關節後脫位，下列何者最不適宜？

- A. 肘前觸診到脫出的尺橈骨上端、肘後觸到肱骨下端
- B. 肘後部空虛
- C. 肘關節呈靴形畸形
- D. 肘後肱骨內、外上髁和鷹嘴突三點標誌關係改變

56. 關於脫位引發的併發症骨化性肌炎，下列敘述何者正確？①原因常是脫位時關節軟骨面受損傷，造成關節面

不平整 ②周圍血腫機化和骨樣組織形成骨化 ③好發於肘、膝、肩關節 ④引起退行性病變與骨端邊緣骨質增生

- A. ③④
- B. ②③
- C. ①④
- D. ①②

57. 關於蹠趾及趾間關節脫位的敘述，下列何者正確？

- A. 第五蹠趾關節脫位較常見
- B. 蹠趾關節脫位常出現蹠趾關節屈曲畸形
- C. 趾間關節脫位常出現趾間關節過伸畸形
- D. 蹠趾關節脫位多因外力使近端趾骨基底脫向蹠骨頭背側

58. 有關肘關節附近之骨折，下列敘述何者錯誤？

- A. 內上髁骨折可能合併尺神經損傷，多為鈍性挫傷
- B. 內上髁骨折以間接暴力為多見，肱骨內上髁被屈肌群牽拉而撕脫
- C. 外髁骨折整復時間應愈早愈好
- D. 內上髁骨折後功能鍛鍊須儘早開始，防止關節僵硬，一週內可作用力握拳及前臂旋轉動

59. 下列何處骨折發生缺血性骨壞死併發症機率最低？

- A. 股骨頸骨折
- B. 股骨轉子間骨折
- C. 腕舟狀骨腰部骨折
- D. 距骨骨折

60. 關於脛骨髌骨折之敘述，下列何者錯誤？

- A. 又稱脛骨平台骨折
- B. 膝內翻（varus）受傷時，可造成脛骨內髌骨折，或常合併內側副韌帶損傷
- C. X光檢查時，常須與健側對比關節間隙的距離
- D. 無移位骨折，可固定膝關節於伸直位置4~5週

61. 白睛裏層向外隆起局限性紫紅色結節的眼病，《證治準繩·七竅門》稱之為火疳，下列何者非其病因病機？

- A. 肺熱亢盛，氣滯血瘀
- B. 肺經鬱熱，陰虛火旺
- C. 脾濕生痰，痰鬱肺經
- D. 濕熱內蘊，肺氣失宣

62. 瞼內面顆粒纍纍，色紅而堅，狀若花椒，《證治準繩·七竅門》稱之為椒瘡，下列何者非其病因病機？
- A. 風熱壅滯瞼絡而發
 - B. 脾胃內熱，復感風邪
 - C. 脾胃熱盛，熱入血分
 - D. 肝氣鬱滯，化火上逆
63. 六淫中下列何種邪氣致病眼睛表現為眼眵乾結，目乾澀，視物不爽，白睛紅赤？
- A. 火
 - B. 燥
 - C. 暑
 - D. 風
64. 患者因胞瞼腫脹就診，症見胞瞼高腫，瞼閉不開，皮色紅赤，伴有眼脹頭痛，其最有可能的診斷及治療為何？
- A. 胞虛如球，內治以歸脾湯加減
 - B. 暴風客熱，內治以防風通聖散加減
 - C. 天行赤眼，內治以瀉肺飲加減
 - D. 胞腫如桃，內治以龍膽瀉肝湯加減
65. 有關粟瘡之敘述，下列何者正確？
- A. 因胞瞼內面顆粒纍纍，色紅而硬，狀如粟粒
 - B. 癒後易留瘢痕，易產生後遺症，如倒睫拳毛，血翳包睛等症
 - C. 雖由風濕熱三邪為患，但以脾經濕熱為主
 - D. 多見於老年人，類似於西醫學中的濾泡性結膜炎
66. 關於胞生痰核之證治，下列何者錯誤？
- A. 胞瞼硬結處，皮色微紅，瞼裏相應部位色呈紫紅者，宜清熱散結
 - B. 瞼胞內生硬結，皮色紅腫，灼熱疼痛者，宜化痰散結
 - C. 本病緣於痰濕阻結者，治宜以化堅二陳丸加減治之
 - D. 本病緣於痰熱阻結者，治宜以清胃湯加減治之
67. 70歲的王伯伯近來覺得視力漸漸減退，白天光線充足時看得較清楚，到了傍晚或晚上便看不清，檢查發現瞳神完整無缺，展縮自如，電筒側照，可見黃仁之陰影呈新月形投射於晶珠表面。關於王伯伯的狀況，下列敘述何者錯誤？
- A. 《秘傳眼科龍木論》稱之為圓翳內障
 - B. 若兼有精神倦怠、肢體乏力、面色萎黃、食少便溏，可選用補中益氣湯加減

- C. 若晶珠灰白混濁，已明顯障礙瞳神，則藥物難以奏效
- D. 本病應考慮早期手術治療
68. 關於異物入目，下列敘述何者錯誤？
- A. 若異物游離於胞睑內面或黑睛表層，可用無菌鹽水棉籤黏出
- B. 若異物嵌在黑睛表層，必須採用角膜異物剔除術
- C. 本病嚴重者可變生凝脂翳
- D. 異物在白睛或胞睑內面，沙澀疼痛感會較異物在黑睛表層為重
69. 下列何者不是黑睛病變？
- A. 凝脂翳
- B. 黃液上衝
- C. 混睛障
- D. 綠風內障
70. 下列何部著作記載使用皂莢末吹入鼻內及用韭汁滴入鼻內以搶救危重病人，為吹鼻法與滴鼻法之最早記載？
- A. 《千金要方》
- B. 《金匱要略》
- C. 《淮南子·記論訓》
- D. 《神農本草經》
71. 慢喉瘖氣滯血瘀痰凝者，治以下列何方最適宜？
- A. 通竅活血湯
- B. 會厭逐瘀湯
- C. 膈下逐瘀湯
- D. 少腹逐瘀湯
72. 某患者耳部疼痛，檢查見耳道局限性紅腫，全身發熱、口苦咽乾、舌質紅、苔黃膩、脈弦數，下列辨證施治何者正確？①本病為耳瘡 ②證型為肝膽濕熱上蒸 ③治宜選用銀花解毒湯
- A. 僅①②
- B. 僅①③
- C. 僅②③
- D. ①②③
73. 《外科醫案彙編》：「耳後縫間皮色紅裂，時出黃水津津，名為……」，主要症狀為局部潮紅、灼熱、瘙癢、水泡、糜爛、滲液、結痂等。以上敘述為下列何種耳部疾患之症狀？
- A. 耳殼流痰

B. 旋耳瘡

C. 膿耳

D. 耳瘡

74. 某中年患者耳內流膿，時流時止，流膿量不甚多，並有臭味，聽力減退明顯，耳膜穿孔，多在邊緣部，病人有頭暈神疲，腰膝痠軟，脈細弱之症狀，其患病之病因為何？

A. 肝膽火盛，邪熱外侵

B. 脾虛濕困，上犯耳竅

C. 腎元虧損，邪毒停聚

D. 邪毒滯留，氣血瘀阻

75. 關於鼻息肉之敘述，下列何者錯誤？

A. 多因肺經濕熱，壅結鼻竅所致

B. 鼻內息肉如榴子，漸大下垂，閉塞孔竅，使氣不宣通

C. 內治可選用，溫肺止流丹加五味子、白朮、黃耆

D. 外治可用硃砂散、明礬散等

76. 下列何者對於鼻息肉內治藥方敘述最不適當？

A. 內治：宜清肺宣氣，瀉濕散結，可選用辛夷清肺飲加減治之

B. 若涕痰多，可選用二陳湯加貝母、枳實、絲瓜絡、僵蠶

C. 若脾肺氣虛者，可選用六味地黃丸加石菖蒲、蒼耳子、藿香

D. 若息肉暗紅者，可酌加活血化瘀藥物

77. 關於喉關癰的敘述，下列敘述何者正確？①又稱為騎關癰 ②又稱為外喉癰 ③相當於扁桃體周圍膿腫 ④相當於咽旁膿腫

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

78. 梅核氣內治宜疏肝解鬱，行氣導滯，散結除痰，用半夏厚朴湯主治，方中用半夏、生薑，作用為何？

A. 行氣導滯

B. 利飲除痰

C. 散結降逆

D. 疏經鬱氣

79. 牙疳風，多發於齶齒周圍牙齦，嚴重者可使紅腫連及腮頰、下頷等處。內治宜清熱解毒，應選用下列何方最

適宜？

- A. 養陰清肺湯
- B. 薄荷連翹方
- C. 五味消毒飲
- D. 連理湯

80. 飛揚喉以外治為主，若血泡經常發作，或潰後染毒，潰面紅腫潰爛，疼痛者，最宜下列何方加蒲公英、金銀花、生地、連翹來治療？

- A. 荊防敗毒散
- B. 龍膽瀉肝湯
- C. 仙方活命飲
- D. 黃連解毒湯