

113年第二次專技高考醫師中醫師考試第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、113年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：4310

類科名稱：助產師

科目名稱：助產學（一）（包括助產學緒論、生殖系統的解剖與生理、產前護理、分娩期護理、產後護理、新生兒護理）

考試時間：1小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 助產實務工作中，以科學方法驗證照護措施的效益，促進助產專業的發展，屬於下列那種角色？
 - A. 教育者
 - B. 支持者
 - C. 管理者
 - D. 研究者
2. 國內推動母乳哺育的政策，下列敘述何者錯誤？
 - A. 僱用受僱者100人以上之雇主，應提供「哺（集）乳室」
 - B. 實施「公共場所母乳哺育條例」維護婦女於公共場所哺乳之權利
 - C. 對禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所母乳哺育者訂有罰則
 - D. 子女未滿二歲須受僱者親自哺（集）乳者，除規定之休息時間外，雇主應每日另給哺（集）乳時間30分鐘
3. 有關目前臺灣婦嬰生命統計資料，下列敘述何者錯誤？
 - A. 粗出生率低於粗死亡率，人口轉為負成長
 - B. 婦女生育第一胎的年齡逐漸上升
 - C. 青少年生育率呈現上揚的趨勢
 - D. 孕產婦死亡率增加可能與晚婚及晚育現象有關
4. 有關坐骨的敘述，下列何者正確？①坐骨粗隆為坐下時體重的著力點 ②坐骨體部突入骨盆腔的尖形突起為坐骨棘 ③坐骨粗隆間距為骨盆腔最小的橫徑 ④坐骨棘間距可作為評估胎兒下降程度的指標
 - A. ①③④
 - B. ①②④
 - C. 僅①④
 - D. ②③
5. 有關月經週期中的分泌期之敘述，下列何者正確？①雌性素大量釋放 ②黃體素分泌增加 ③LH分泌至最高峰 ④子宮內膜變厚且布滿血管

- A. ①②③④
- B. 僅②③④
- C. 僅①④
- D. 僅②④
6. 有關卵巢週期中黃體期的敘述，下列何者錯誤？
- A. 在排卵後才會形成
- B. 黃體生成素（luteinizing hormone）刺激破裂濾泡形成黃體
- C. 子宮內膜開始出現螺旋狀血管膨脹
- D. 子宮頸黏液呈現稀薄、水樣狀
7. 有關胎兒臍帶的敘述，下列何者正確？
- A. 具有華通氏膠質（Wharton's jelly）可以避免臍帶打結
- B. 臍帶內含1條動脈與2條靜脈
- C. 臍靜脈將缺氧血液經胎盤送回母體
- D. 臍動脈將含氧血液經胎盤送回胎兒
8. 李女士懷孕前身高165公分、體重55公斤，BMI：20.2，目前懷孕20週，產檢時詢問助產師：「請問我下次產檢是什麼時候？體重可以增加幾公斤？」，根據我國全民健康保險之孕產婦產前檢查之建議，下列何者正確？
- A. 妊娠22週，1.0~1.4公斤
- B. 妊娠22週，1.6~2.0公斤
- C. 妊娠24週，1.0~1.4公斤
- D. 妊娠24週，1.6~2.0公斤
9. 鄭女士懷孕7個月，主訴日常活動時小腿偶爾出現僵硬、輕微抽痛感。下列建議措施何者較適當？
- A. 補充維生素E
- B. 補充鎂
- C. 足背曲屈活動
- D. 橋式運動
10. 陳女士懷孕23週，G₁P₀，有關產前教育內容的安排重點，下列何者適用？①自發性流產危險徵兆 ②胎動監測 ③教導母乳哺育技巧 ④準備進行乙型鏈球菌篩檢
- A. ①④
- B. 僅②③
- C. ①②③

D. ②③④

11. 張女士，主訴此胎是臀位，經常感覺寶寶的手腳踢動到她左側肋骨下方，下列何者與張女士敘述相符？
- A. 視診及整體觸診，腹部呈現左右較寬的橫向卵形
 - B. 腹部第一段觸診，子宮底為軟，形狀不規則，不易移動
 - C. 腹部第二段觸診，張女士身體左側，大部份硬、平滑
 - D. 腹部第二段觸診，胎心音最清晰的位置在右上象限
12. 有關胎兒生理活動評估（BPP）的檢查，下列敘述何者正確？
- A. 呼吸運動、身體張力、羊水容積及無壓力試驗由超音波檢查
 - B. 胎動次數由胎心監測器（electronic fetal monitor）收集
 - C. 8~10分表示胎兒情況良好，窒息或窘迫的機會極低
 - D. <8分者，應安排羊膜穿刺進一步確認胎兒窘迫情況
13. 有關懷孕期婦女消化系統的變化，下列敘述何者正確？
- A. 因黃體素分泌增加刺激腸內平滑肌收縮，使胃排空速度增加及腸胃道蠕動加快
 - B. 因鬆弛素分泌增加使胃幽門括約肌鬆弛，導致胃酸流至食道下端產生心灼熱感
 - C. 因雌性素分泌增加使胃液分泌增加，妊娠初期容易產生噁心、嘔吐情形
 - D. 因黃體素增加使平滑肌鬆弛，膽汁排出量減少導致膽囊排空時間延長
14. 有關正常妊娠期婦女泌尿系統之變化，下列敘述何者正確？
- A. 妊娠期尿量的排除較懷孕前增加60~80%，相對地使尿比重上升
 - B. 妊娠期腎絲球過濾率較懷孕前增加30~50%，相對降低血清尿素氮及肌肝酸的含量
 - C. 妊娠期腎小管的再吸收速度較妊娠前低，相對地延長藥物代謝排出時間
 - D. 妊娠期腎臟對葡萄糖的再吸收作用速率較妊娠前低，在尿液中可測得葡萄糖
15. 有關胎教理論與實證研究結果，下列敘述何者最適當？
- A. 在懷孕初期開始給與胎教音樂效果最好
 - B. 打擊音樂可促進胎兒大腦形成 α 波，使精神較安定
 - C. 每日用手電筒照射肚子，每次持續30分，可刺激胎兒腦部發育
 - D. 懷孕中期開始念故事給胎兒聽，有助於穩定胎兒情緒
16. 張女士產檢時，評估子宮底高度位於胸骨劍突處，在無任何孕期合併症下，下列何者為最符合的懷孕週數？
- A. 20週
 - B. 28週
 - C. 32週
 - D. 36週

17. 有關初乳的敘述，下列何者錯誤？

- A. 第一孕期即開始分泌
- B. 為黃色半透明液體，內含豐富IgA
- C. 內含血清、白血球及蛋白質
- D. 內含之抗體可幫助新生兒抵抗病菌

18. 有關懷孕期仰臥式低血壓的成因與處置，下列敘述何者正確？

- A. 主要因仰臥壓迫到上腔靜脈，阻礙血液回流增加舒張壓所致
- B. 出現眩暈及心悸症狀，導致心搏輸出量增加，又稱為「腔靜脈症候群」
- C. 母體為供應胎兒生長發展之需求，使血容量增加所致
- D. 採左側臥以增加血液灌注，可改善眩暈及心悸的症狀

19. 有關待產及生產期姿勢的敘述，下列何者錯誤？

- A. 直立前傾姿勢可減輕胎兒先露部位對尾骶骨壓迫，減輕下背痠痛
- B. 蹲姿可緩解腰痠背痛，亦可增加骨盆入口空間
- C. 半坐臥姿較仰臥更能增加胎兒氧氣供給
- D. 膀胱截石臥姿有利於接生者接生，但不是最舒適的生產姿勢

20. 根據實證研究，蹲姿、半坐臥姿、膀胱截石臥位三種生產姿勢於增大骨盆出口徑線的效益，下列排序何者正確？

- A. 半坐臥姿 > 蹲姿 > 膀胱截石臥姿
- B. 蹲姿 > 膀胱截石臥姿 > 半坐臥姿
- C. 蹲姿 > 半坐臥姿 > 膀胱截石臥姿
- D. 半坐臥姿 > 膀胱截石臥姿 > 蹲姿

21. 下列何種荷爾蒙會刺激睪丸Sertoli's 細胞分泌抑制素 (inhibin)，同時保護支持精原細胞的成長？

- A. 濾泡刺激素 (FSH)
- B. 黃體生成素 (LH)
- C. 腎上腺皮質素 (ACTH)
- D. 生長激素 (GH)

22. 有關羊膜穿刺術檢查胎兒染色體的最佳週數為何？

- A. 12週
- B. 16週
- C. 20週
- D. 24週

23. 有關孕期婦女的衛生注意事項，下列敘述何者錯誤？

- A. 採淋浴，避免盆浴
- B. 勿陰道灌洗，避免改變正常菌叢
- C. 孕期避免泡高溫溫泉
- D. 孕期避免洗牙，以減少流產機率

24. 有關懷孕生理變化，下列敘述何者錯誤？

- A. 雌性素（estrogen）增加，易造成鼻塞及鼻出血
- B. 潮氣容量會隨著懷孕而逐漸增加
- C. 黃體素（progesterone）上升，導致母體內的 PCO_2 降低
- D. 子宮擴大，橫膈膜上升，造成功能肺餘容量增加

25. 有關胎心音的監測，下列敘述何者正確？

- A. 妊娠12~14週可使用胎心筒測得
- B. 妊娠4~6週可使用腹部超音波測得
- C. 妊娠14~16週可以使用一般聽診器測得
- D. 妊娠10~12週可以藉由杜卜勒超音波器測得

26. 懷孕產生齒齦炎主要是受何種荷爾蒙的影響？

- A. 雌性素（estrogen）
- B. 濾泡刺激素（FSH）
- C. 人類絨毛膜促性腺激素（hCG）
- D. 黃體生成素（LH）

27. 孕婦在懷孕前非常喜歡喝咖啡、吃冰及辣椒，但懷孕後很努力地克制自己這些喜好，這樣的行為屬於母性任務（maternal task）的那一項？

- A. 內射—外射—接受—拒絕
- B. 確保重要家人接受新生兒
- C. 情緒上與胎兒連成一體
- D. 學習對孩子貢獻自己

28. 下列何種荷爾蒙的主要作用為促使子宮頸口軟化？

- A. 前列腺素（prostaglandins）
- B. 黃體素（progesterone）
- C. 催產素（oxytocin）

D.兒茶酚胺 (catecholamines)

29. 有關低風險待產婦女的陰道內診時機，下列敘述何者正確？①現血增多時 ②破水後，應每小時檢查一次
③活動期，應每2小時檢查一次 ④爬樓梯30分鐘後
- A. ①④
B. ③④
C. ②③
D. ①②
30. 王女士35歲，第一胎，入院待產，OS：2公分，effacement：50%，皺著眉頭表示宮縮疼痛難以接受，要求自費剖腹產，下列措施何者最適當？
- A. 討論施行剖腹產注意事項
B. 告知產婦目前才潛伏期，疼痛應是可以忍耐的
C. 引導個案嘗試不同的舒適措施
D. 建議使用硬膜外麻醉緩解疼痛
31. 足月孕婦進行腹部四段式觸診結果如下：胎兒大部位在母體左側，在恥骨聯合上方可摸到整個胎頭 (five fifths)，胎心音在左髂骨旁聽到。此胎兒的位置為何？
- A. LOP，胎頭未固定
B. LOA，胎頭未固定
C. LOP，胎頭已固定
D. LOA，胎頭已固定
32. 有關待產之照護措施，下列何者正確？①未破水於第一產程活動期的待產婦，應每4小時執行陰道內診評估產程 ②破水的待產婦，應每2小時陰道內診評估產程 ③未破水的待產婦，應每4小時監測體溫 ④破水的待產婦，應每2小時監測體溫
- A. 僅①③
B. 僅②④
C. ①③④
D. ②③④
33. 關於生產時子宮頸變化，下列敘述何者最正確？
- A. 子宮頸通常先擴張再變薄，最後才變短、消失
B. 生產時，子宮頸的擴張與變薄僅仰賴子宮收縮
C. 當子宮頸變薄像紙時，子宮頸長度消失，表示子宮頸effacement為100%
D. 子宮頸擴張過程中，子宮頸內口與外口會同時打開
34. 分娩時胎兒為OA位，當胎兒枕骨到達恥骨聯合下緣時，由於骨盆底部肌肉阻力的影響，此時胎兒將採取何項

分娩機轉？

- A. 固定
- B. 屈曲
- C. 伸展
- D. 內回轉

35. 陰道生產時，胎兒以頭位進行伸展娩出，下列處置何者最適當？

- A. 請產婦順著身體的感覺用力，不要給她口令
- B. 請產婦吐氣，鼻子深吸氣，讓胎兒獲得氧氣
- C. 請產婦哈氣，此時胎頭會慢慢通過會陰
- D. 請產婦暫時休息，若有宮縮再開始用力

36. 王女士第二產程子宮頸全開，內診胎兒為枕前位（OA），有關促進產程與胎頭下降的姿勢，下列何者最不適當？

- A. 膀胱截石姿勢
- B. 蹲姿
- C. 前傾跪姿
- D. 手膝跪姿

37. 陳女士為低風險孕婦入院待產中，表明不喜歡陰道檢查，下列處置與回應，何者最適當？

- A. 我了解你的感受，我配合你的需求不執行檢查
- B. 這是規定，沒有檢查無法知道你的產程變化
- C. 我固定每3小時幫你檢查一次，可以嗎？
- D. 當子宮收縮變強時，產程明顯變化，我會替你檢查

38. 陳女士子宮頸擴張7公分，宮縮頻率約3分鐘一次，持續40~60秒，疼痛分數9分，此時引導陳女士呼吸技巧，下列何者最適當？

- A. 陣痛時採深而慢的胸式呼吸放鬆肌肉、轉移注意力
- B. 陣痛時採快速的胸式呼吸放鬆肌肉、轉移注意力
- C. 陣痛時採深而慢的腹式呼吸放鬆肌肉、轉移注意力
- D. 陣痛時採快速的腹式呼吸放鬆肌肉、轉移注意力

39. 在母胎狀況安好的情況下，有關第一產程潛伏期之敘述，下列何者正確？①是建立信任關係、收集資料及衛教的適當時機 ②待產婦通常顯得興奮而愉快，其應對進退合乎社交禮儀 ③保持待產室燈光柔和以助催產素分泌 ④初產婦若超過12小時，則建議進行催生

- A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

40. 林女士待產中，宮縮時顯露出恐懼，且精疲力竭、情緒緊張失控，下列照護措施何者較不適當？

A. 提供按摩舒緩疼痛技巧

B. 告知再忍耐一下，產程很快就結束了

C. 提供溫水淋浴

D. 請婦女跟著手勢進行呼吸

41. 有關第二產程的用力姿勢，下列何者較容易導致會陰撕裂傷？

A. 膝跪姿 (hands and knees position)

B. 截石臥位 (lithotomy position)

C. 跪姿前傾 (leaning forward while kneeling position)

D. 側臥位 (side-lying position)

42. 有關待產期運用門閥理論之敘述，下列何者較不適當？


A. 當刺激小的神經纖維時會阻斷神經的傳導

B. 輕撫觸法 (light effleurage) 可促進腦內啡分泌

C. 較細、不具髓鞘的神經纖維，訊號傳遞速度較慢

D. 集中注意力及音樂治療也是運用門閥理論

43. 胎兒呈頭產式待產過程中，有關下列胎心音監測器圖形之敘述，下列何者不適當？



- A. 宮縮開始心跳即變慢，減速於宮縮高點，宮縮停止，心跳即恢復正常
- B. 其機轉為子宮過度活動促使子宮收縮時絨毛間隙血流量減少所致
- C. 此圖形若出現於潛伏期，則要懷疑有胎頭骨盆不對稱之虞
- D. 宮縮壓力緩解則胎兒心跳恢復正常
44. 王女士，G₁P₀，因規則陣痛入院待產，入院後6小時，助產師內診發現子宮頸口開8公分，下列何者為王女士較可能出現的行為反應？
- A. 會提高音調來釋放身體內在的壓力，容易有失去控制感
- B. 對外界及周圍環境感興趣，在宮縮結束時，能處理外界事物
- C. 身體和情緒會有明顯放鬆，並重新武裝自我，以完成胎兒娩出
- D. 對產程過慢感到失望及懊惱，不斷要求以剖腹產來結束產程
45. 當子宮頸位置為正常時，助產人員為待產婦進行陰道內診，當摸不到子宮頸時，其子宮頸擴張情形為何？
- A. 10 cm
- B. 8~9 cm
- C. 6~7 cm
- D. 4~5 cm
46. 下列何種狀況較不建議於第二產程採「直立前傾姿勢」生產？
- A. 產程進展緩慢或停滯
- B. 宮縮間隔延長或宮縮減弱

- C. 待產婦覺得腰痠背痛，覺得此姿勢較舒適
- D. 使用腰椎硬膜外麻醉法或鎮痛藥物後
47. 若將待產婦骨盆出口假想為鐘面，且以恥骨聯合處為12點鐘，則ROP的凶門位置為何？
- A. 前凶門約在10點鐘位置
- B. 後凶門約在12點鐘位置
- C. 前凶門約在2點鐘位置
- D. 後凶門約在5點鐘位置
48. 張女士第一胎，妊娠38週，因子宮頸開2 cm而入院待產。下列何者為助產師最優先的評估問題？
- A. 「子宮收縮的時間及已經開始收縮多久了？」
- B. 「妳最後吃東西是何時，吃了那些？」
- C. 「妳目前有現血嗎？」
- D. 「妳的預產期是那一天？」
49. 有關第一產程助產師提供的護理措施，下列敘述何者錯誤？
- A. 陪伴產婦並幫助產婦執行疼痛的緩解，給予讚美鼓勵以及再保證
- B. 按撫法是利用門閥控制理論刺激細小的神經纖維而抑制大的神經纖維傳導疼痛
- C. 鼓勵直立姿勢或下床活動，幫助胎兒的先露部位的旋轉和下降
- D. 鼓勵每2小時排空膀胱避免阻礙胎兒下降
50. 有關我國母嬰親善醫院政策的敘述，下列何者錯誤？
- A. 不論餵食配方奶或母乳，都可以執行24小時的親子同室
- B. 母嬰親善醫院不得提供與販售配方奶
- C. 醫院應轉介需要幫助的母乳家庭給當地衛生局所或母乳支持團體
- D. 不論餵食配方奶或母乳，都應採回應性餵食
51. 楊太太產後第二天，評估其血液檢查，下列何者為正常？
- A. 白血球數目增加
- B. 血紅素值上升
- C. 凝血因子下降
- D. 血比容上升
52. 有關產後生理變化，下列何者屬於進行性變化（progressive change）？
- A. 泌乳
- B. 惡露排出
- C. 陰道彈性恢復

D. 子宮體積縮小

53. 產後體重變化之敘述，下列何者錯誤？

A. 產後子宮體自溶的復舊過程，會導致體重降低

B. 孕期體重增加範圍與產後體重滯留有關

C. 孕期體重增加過多，應在產後第一天立即執行減重運動

D. 分娩時，胎兒、胎盤、羊水及血液的排出，可減輕4.5~5公斤體重

54. 有關產後壓力的敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 產後壓力源是指產後6週內所感受的壓力

B. 初產婦或經產婦的壓力源皆相同

C. 產後壓力對婦女健康會有不良的影響

D. 擔心母育角色、身體改變及缺乏社會支持是產後壓力源

55. 有關產後評估BUBBLEHE中的「U」是指下列何項？

A. 膀胱漲

B. 惡露變化

C. 子宮復舊

D. 腸道蠕動

56. 有關產後運動之敘述，下列何者正確？

A. 建議最好在飯前30分鐘執行

B. 運動可在彈簧床上進行，以減少腰痠背痛

C. 一次增加多種運動項目

D. 若有出血應立即停止運動

57. 葉女士於正常陰道分娩後，在產後第1天評估其子宮偏向右邊，下列敘述何者正確？

A. 可能有腸道阻塞情形

B. 可能骨盆底肌肉有鬆弛情形

C. 可能膀胱漲導致子宮偏右

D. 很多產婦產後都有此情形

58. 助產師協助父母與新生兒建立關係於何時開始最適當？

A. 產前門診

B. 待產初期

C. 肌膚接觸時

- D. 哺餵母乳時
59. 有關血栓性靜脈炎之評估方法，下列何者正確？
- A. 屈膝時股直肌會痛
 - B. 屈膝時腓腸肌會痛
 - C. 足背彎曲時腓腸肌會痛
 - D. 足部伸展時股直肌會痛
60. 有關Rubin提出的母性行為表現，下列何者屬於接受期 (Taking-in phase) 的行為？
- A. 主動學習餵奶及換尿片
 - B. 漸漸體認新生兒與自己分開
 - C. 尋求他人的意見及相關訊息
 - D. 重複對他人述說分娩的細節
61. 陰道生產婦女，子宮頸於產後多久開始完全閉合？
- A. 產後7天
 - B. 產後14天
 - C. 產後28天
 - D. 產後6週
62. 下列何種狀況適合使用口服避孕藥？
- A. 高血壓
 - B. 下肢靜脈栓塞病史
 - C. 經期不規則
 - D. 35歲以上有抽菸習慣者
63. 有關輸精管結紮之敘述，下列何者正確？
- A. 手術過程是採半身麻醉
 - B. 結紮後馬上就有避孕效果
 - C. 可預防性傳染病
 - D. 是永久性的避孕方法
64. 李女士產後第一天初乳已分泌，轉訴她婆婆說：「初乳黃黃的，在乳房裏太久，怕會臭酸掉，所以要先擠掉。」此時，助產人員的反應，下列何者最適當？
- A. 協助擠出初乳，如怕酸掉可先丟棄，因為初乳還會不斷持續分泌
 - B. 尊重婆婆的看法，並解釋初乳的成分及對嬰兒的好處
 - C. 告知婆婆的觀念是不合乎現代科學觀念

- D. 請醫師來跟李女士解釋
65. 有關避孕方法，下列何者較無副作用？
- A. 避孕貼片
 - B. 子宮內避孕器
 - C. 殺精子藥劑
 - D. 基礎體溫法
66. 李女士產後第2天，脈搏為55次／分，詢問為何其脈搏比生產前低，下列回應何者正確？
- A. 產後心輸出量增加所致，是正常現象
 - B. 可能出現產後出血，觀察惡露量
 - C. 因為剛生產完疲憊導致
 - D. 因心臟血液循環較慢所致
67. 丁女士，第2胎，採陰道生產，主訴產後會陰傷口疼痛，產後第2天，建議執行下列何項產後運動，有助會陰傷口癒合？
- A. 膝胸臥式運動
 - B. 蹲踞運動
 - C. 凱格爾氏運動
 - D. 骨盆搖擺運動
68. 陰道生產後第3天之足月新生兒，出現臉部膚色黃，四肢肌肉張力佳，對刺激有反應無嗜睡情形。下列敘述何者最適當？
- A. 新生兒若出現黃疸，就需要照光治療
 - B. 可能是挨餓引起的黃疸，改善哺乳技巧
 - C. 此為病理性黃疸，需要換血治療
 - D. 暫停母乳哺育，以防止黃疸惡化
69. 有關正常新生兒之頭部外觀之評估，下列敘述何者正確？
- A. 前凶門呈三角型，為2塊額骨及2塊頂骨組成，需6~12週即關閉
 - B. 頭血腫多為頭產式生產者，腫脹區域會超過骨縫合線，約出生後12小時會被吸收
 - C. 產瘤多見真空吸引生產者，腫脹區域不會跨越骨縫合線，3個月左右消失
 - D. 生產時胎兒經過產道，胎頭受壓使頭骨出現重疊不對稱，稱為胎頭變形
70. 下列何者為正常新生兒四肢評估之結果？
- A. 巴羅氏徵象 (Barlow's sign) 握住大腿輕往下施壓，作內展動作，可感到股骨頭在關節內滑脫
 - B. 歐氏徵象 (Ortolani's sign) 將新生兒髖骨和膝蓋彎曲成90度，輕柔地大腿外展，可聽到卡答聲音

- C. 觀察新生兒活動時，兩側手臂呈對稱性
- D. 拉直雙腿時，臀部呈現皺褶不對稱
71. 有關新生兒先天代謝異常之篩檢中，先天性甲狀腺低能症的主要檢驗項目為何？
- A. 三碘甲狀腺素 (T_3) 的血清濃度
- B. 四碘甲狀腺素 (T_4) 的血清濃度
- C. 甲狀腺素結合蛋白 (TBP) 的血清濃度
- D. 甲狀腺刺激素 (TSH) 的血清濃度
72. 王小弟，於妊娠36週出生，出生體重2,000公克，出生後1分鐘與5分鐘的Apgar scores為8與9分；目前出生第10小時，已開始母乳哺餵。王小弟的媽媽詢問何時會進行新生兒篩檢採血？下列回應何者較為適當？
- A. 王小弟需要等到出生滿37週後才回來醫院採血初檢
- B. 王小弟需等母乳哺育滿24小時之後，再安排採血初檢
- C. 王小弟在出生滿48小時後採血初檢，等週數滿37週且體重達2,200公克時進行複檢
- D. 王小弟在出生滿48小時後採血初檢，並於母乳哺育滿72小時後採血複檢
73. 新生兒出生後過渡期的第二反應期，最需注意以下何項數值的變化？
- A. 排便次數
- B. 血氧濃度
- C. 腸蠕動聲音
- D. 哺乳次數
74. 新生兒沐浴後以包巾包裹時，足部包巾處須預留活動空間最重要的目的為何？
- A. 避免影響腳抓握反射
- B. 增進足部精細動作的發展
- C. 避免影響新生兒踏步反射
- D. 增進腕關節之正常發育
75. 有關於新生兒篩檢的採血流程，下列何者正確？
- A. 每次採血需準備3~4支毛細管吸取血液樣本
- B. 血量不足時需用力擠壓採血點週邊皮膚以疏通微血管
- C. 採血之毛細管以45度角方式使血自然滲透至濾紙
- D. 若濾紙血點不足，可從背面補足血點使之均勻
76. 有關胎便 (meconium) 的敘述，下列何者正確？
- A. 通常是在新生兒出生後48~72小時解出
- B. 新生兒通常在解出一次胎便之後，就會開始解出金黃色奶便

- C. 因為內含膽汁，所以胎便呈墨綠色
- D. 胎便的內容物包含胎兒毛髮、羊水及紅血球
77. 丁小妹為足月新生兒，體重2,970公克、身長52公分、頭圍36公分、胸圍31公分，下列敘述何者正確？
- A. 所有數據皆正常
- B. 相較於其身長，體重顯得過輕
- C. 須檢查是否有水腦問題
- D. 須檢查肺部功能
78. 有關影響新生兒第一次呼吸之因素，下列敘述何者錯誤？
- A. 肺液黏稠度可影響其呼吸狀況
- B. 陰道生產經歷胸部擠壓，較易發生短暫的呼吸窘迫
- C. 娩出時受環境冷氣溫的刺激
- D. 肺泡表面張力素於妊娠24週後產生
79. 有關世界衛生組織及聯合國兒童基金會對新生兒及孩童餵食的營養指南，下列敘述何者錯誤？
- A. 除醫療需求外，不可提供任何食物或水給小於6個月進行母乳哺餵之嬰兒
- B. 4個月大出現對成人食物有興趣時，可添加副食品
- C. 完全哺餵母乳直到6個月左右
- D. 持續哺餵母乳到2歲或2歲以上
80. 關於我國助產人員法，下列何者助產人員可以執行業務？
- A. 領有美國助產師執業執照者，經我國衛生福利部認證後
- B. 曾犯墮胎罪但已服刑期滿，領有我國助產師證書者
- C. 領有我國助產師證書但尚未加入助產人員公會者
- D. 領有我國助產師執業執照者