

113年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、
113年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、
聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關以家庭為中心的產科護理模式之敘述，下列何者錯誤？
(A)待產過程中，鼓勵伴侶全程陪伴
(B)鼓勵親子同室，減少母嬰分離
(C)主張待產、生產與產後恢復皆在同一環境
(D)增加產前基因篩檢次數，減少家族遺傳疾病之發生
- 孫女士於產檢時，詢問葉酸補充注意事項，下列何者為最適當的護理指導？
(A)懷孕 3 個月後開始補充的效果最好
(B)完全素食者一定要特別注意補充
(C)可藉由維他命 C 組合加強吸收
(D)可經由新鮮深綠色蔬菜及瘦肉獲取
- 有關懷孕期無壓力試驗 (Non-stress test, NST) 的敘述，下列何者正確？
(A)建議懷孕 26 (含) 週始能開始測量，才有較準確結果
(B)測量子宮收縮時胎心率型態的改變
(C)需持續測量 60 分鐘以上，才能進行結果判讀
(D)結果判讀為「反應型者」，可預測一週內胎兒處於健康狀態
- 有關懷孕內分泌系統的變化，下列敘述何者正確？
(A)甲狀腺體積比未懷孕時期減少
(B)鬆弛素大部分是由黃體分泌
(C)醛固醇分泌量減少，特別是限鈉飲食的孕婦
(D)第一孕期，hCG 的分泌主要是來自胎盤
- 懷孕 24 週婦女，表達她很想感受「與胎兒連為一體的情感」，下列護理指導，何者最適當？
(A)建議尋求良好的產科照顧，隨時了解胎兒發育
(B)協助其表達對胎動的感受，鼓勵常常對胎兒說話
(C)請其暫時停止喝咖啡，不熬夜，減少對胎兒傷害
(D)建議請先生協助做家務，給予孕期支持
- 接近預產期婦女在家執行「每日胎兒運動紀錄」，當出現下列何種結果需立即到醫院接受診治？
(A)1 小時內記錄到 5 次胎動
(B)24 小時胎動少於 4 次
(C)2 小時內有 10 次胎動
(D)胎動比前一天相比少了 20%
- 李女士，G₁P₀，子宮收縮每 5 分鐘一次，每次持續 40~60 秒，收縮強度為中度，子宮頸口開 6 公分、變薄程度 60%、先露部位 0。下列護理措施何者不適當？
(A)至少每 30 分鐘測一次胎心率及宮縮情況
(B)注意待產婦解尿的時間，每 2 小時評估膀胱排空情形
(C)擔心隨時生產，所以應禁止待產婦下床
(D)教導呼吸法協助減輕待產疼痛
- 吳女士，G₁P₀，懷孕 38 週，主述：「下面濕濕的，不知道是不是破水了？」。下列何種檢測可以確認破水？
(A)避開尿或血液，以硝基試紙，檢測流出陰道的液體，試紙呈粉紅色 (Nitrazine test)
(B)避開尿或血液，以硝酸鹽試紙，檢測流出陰道的液體，試紙呈黃綠色 (Nitrate water test)
(C)檢視吳女士墊的衛生棉上，看到清澈淡黃液體並含有羊齒狀的碎片物質 (Pad test)
(D)將流出陰道的液體塗抹於玻片，使用顯微鏡有觀察到羊齒狀結晶 (Fern test)
- 葉女士，懷孕 39 週，因破水入院待產。護理師進行腹部觸診時，在宮底處觸摸到一個較軟，且比較不圓的胎兒部位；在恥骨聯合附近觸摸到一個較硬，似圓形的胎兒部位，接著在肚臍以下的部位聽取到清楚的胎心音。陰道內診時，摸到圓滑且硬的胎兒部位。判斷其胎產式為何？
(A)頭產式
(B)臀產式
(C)面產式
(D)肩產式
- 安胎婦女使用下列何種藥物可促進胎兒肺部成熟？
(A) Ritodrine
(B) Indomethacin
(C) Betamethasone
(D) Nifedipine

- 11 原本對生產計畫侃侃而談的待產婦女突然對護理師說：「我想解大便，我如果去廁所會不會把孩子生在馬桶裡？」，下列護理師的回應何者較適宜？
(A)「我想應該是要生了，我趕緊通知醫師處理。」
(B)「你有便意感顯示胎頭在往下降，產程有進展了喔！我來幫妳內診評估好嗎？」
(C)「不用緊張，妳這些擔心都不是真的，不會生在馬桶裡的！」
(D)「你進來待產時已經有灌腸過，去上廁所應該不會有大便才對。」
- 12 下列何者為阻礙產後婦女子宮復舊的因素？①產程延長 ②正常羊水量之單胞胎 ③漲滿的膀胱 ④純母乳親餵
(A)僅①③ (B)①④ (C)①②③ (D)②③④
- 13 有關產後情緒低落 (postpartum blues) 的定義及敘述，下列何者正確？
(A)會嚴重影響日常的生活功能 (B)會影響社會功能
(C)通常可自行復原 (D)若情緒低落持續一週則診斷為產後憂鬱
- 14 有關乳腺炎 (mastitis) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)
(B)應該暫停哺乳，避免嬰兒受到感染
(C)哺乳頻率突然減少時，可能是導因
(D)婦女可能會發燒到 38.4~40°C
- 15 護理師進入病室時發現新生兒哭泣，產婦表示：「我都等寶寶哭，確定寶寶餓了，然後再餵奶。」下列何項護理指導最適當？
(A)母乳易消化，固定每 2~3 小時餵奶可以避免寶寶飢餓
(B)寶寶有轉頭、舌頭伸出、吸吮動作出現就可以準備餵奶了
(C)哭是飢餓的徵象，等寶寶大哭後再餵會吃比較多
(D)如果寶寶哭，要先安撫，讓寶寶先睡，等醒來再餵
- 16 下列何種情況適合裝置子宮內避孕器？
(A)不明原因的陰道出血者 (B)月經週期不規則者
(C)月經過多者 (D)痛經厲害者
- 17 陳小弟出生第二天，執行親子同室。陳小弟若出現下列何種狀況，護理師應進一步評估？
(A)整天尿布都沒有濕 (B)半夜醒來二次 (C)大便為綠色 (D)哭的時候沒有眼淚
- 18 有關新生兒過渡期執行即刻母嬰肌膚接觸的敘述，下列何者為最佳時機及其理由？
(A)相對不反應期，新生兒較能專注在母親身上 (B)第一反應期，新生兒清醒且吸吮反射強
(C)第二反應期，新生兒安靜不哭鬧 (D)絕對反應期，新生兒能快速回應母親的呼喚
- 19 有關正確含乳 (suckling) 的表徵，下列敘述何者不適當？
(A)嬰兒口腔由下往上不對稱 (asymmetric) 含住一大口乳房組織
(B)嬰兒上下唇如魚嘴般，尤其是下唇外翻
(C)嬰兒嘴巴張得很大且兩頰飽滿
(D)嬰兒吸吮與吞嚥頻率，平穩地維持 1:1，約一秒一次
- 20 有關羊水栓塞 (amniotic fluid embolism) 之相關敘述，下列何者錯誤？
(A)呈現病理性收縮環 (B)通常發生在分娩時或分娩剛結束
(C)常發生於羊膜破水後 (D)易出現心肺功能衰竭和休克
- 21 初產婦 34 歲，妊娠 38 週胎兒發育符合妊娠週數，因破水入院後 24 小時仍無宮縮，予以評估子宮頸成熟度，發現其子宮頸擴張 < 1 公分，子宮頸變薄 30%，無法觸診到胎兒的先露部位，子宮頸位置在後方且堅硬。依據上述情境，若採 Bishop 計分法評估，以決定後續相關處置，下列敘述何者較適當？
(A)得分為 6 分，適用催生針劑靜脈滴注催產
(B)子宮頸已成熟，適用前列腺素針劑靜脈滴注催產
(C)得分為 0 分，適用前列腺素陰道塞劑促子宮頸成熟
(D)子宮頸不成熟，可繼續觀察 48 小時，若無產兆且確定無感染則可返家待產
- 22 下列那些為重度子癩前症的危險徵候和症狀？①嚴重頭痛 ②視力模糊 ③4 小時尿量為 400 mL ④血清肌酐酸持續下降
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- 23 林女士，若進行第一階段 50 gm 葡萄糖耐性試驗篩檢妊娠糖尿病，下列那些敘述正確？①建議於懷孕 20~22 週篩檢 ②建議於懷孕 24~28 週篩檢 ③篩檢前需禁食，空腹抽血 ④1 小時後的血糖值大於 140 mg/dL，則需進一步檢查
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

- 24 有關人類乳突病毒 (human papillomavirus, HPV) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 主要經由性行為而傳染
(B) 免疫力正常的年輕女性感染後通常能夠自行痊癒
(C) HPV 6 與 11 型屬於致癌型
(D) HPV 疫苗對於未曾有過性行為或未受到 HPV 感染者最有效
- 25 劉女士卵巢癌分期 IIIc，本週接受減積手術，劉女士表示自己不再是完整的女人也擔心影響夫妻間的性生活，下列護理師之回應何者較不恰當？
(A) 告訴劉女士現階段應該全心配合治療，不要負面思考
(B) 鼓勵劉女士與先生溝通，了解彼此的感受與疑慮
(C) 解釋術後可能出現更年期症狀，行房時可加長前戲時間來改善陰道乾澀不適
(D) 徵得同意後介紹卵巢癌病友給劉女士，以促進術後正向調適
- 26 1 歲 3 個月的幼兒通常可通過動作發展之項目，下列敘述何者較適當？
(A) 能踏動三輪車 (B) 可單腳跳躍 (C) 可獨自行走 (D) 會堆疊九塊積木
- 27 陳小妹在媽媽的麵店玩耍，不小心撞到端著熱湯的媽媽，左手臂被燙傷，燙傷部分表皮皮膚微紅且出現水泡，當下立即處理何者最適當？
(A) 趕快帶陳小妹去沖冷水至少沖 15~30 分鐘 (B) 立即去冰箱拿冰塊做局部冰敷
(C) 給予燙傷藥膏塗抹傷口 (D) 用無菌針頭將燒傷水泡戳破
- 28 有關自閉症 (autistic disorder) 兒童的照護，下列敘述何者最適當？
(A) 喜歡身體接觸的感覺，多擁抱可增進人際互動 (B) 隨時調整生活常規，培養適應能力
(C) 設計變化多端的環境，增加感官刺激 (D) 隨時維持安全的環境，防範意外或自我傷害
- 29 奇奇，2 歲，因為住院而出現分離焦慮，為了協助奇奇宣洩負向情緒，下列何種治療性遊戲較合適？
(A) 木槌敲紙箱 (B) 使用布偶進行戲劇性遊戲
(C) 把玩聽診器 (D) 玩扮家家酒
- 30 張小妹，1 歲，因發燒入院，護理師欲進行生命徵象測量，有關生命徵象測量相關護理，下列何者最適切？
(A) 壓脈帶的寬度應覆蓋過測量肢體長度的 1/2 (B) 觀察腹部起伏測量 10 秒鐘，並乘以六
(C) 於左鎖骨中線第三~四肋間測量心尖脈 (D) 耳溫測量時，應將耳朵向上向後拉
- 31 有關厭食症的敘述，下列何者錯誤？
(A) 好發於青少年期，女性多
(B) 厭食症的女性易造成經血過多，經期過短的問題
(C) 病童對身體形象知覺錯誤現象
(D) 運用認知行為治療及心理治療等，修正病童不良飲食行為
- 32 有關新生兒身體評估結果，下列何者需進一步追蹤評估？
(A) 出生身長 45~55 公分 (B) 出生頭圍 40~42 公分
(C) 新生兒兩眼瞳孔間距 3.5~4 公分 (D) 視力範圍 20 公分 (8 英吋) 以內
- 33 劉小弟，30 週又 2 天早產兒，於新生兒加護病房接受治療，強化親子依附關係的行為，下列敘述何者較適當？
(A) 說明醫療團隊專業能力很強，雙親可放心 (B) 避免回答雙親對使用醫療儀器的疑問
(C) 劉小弟病情穩定時，鼓勵雙親參與照顧 (D) 嚴格遵守訪客規定，限制雙親探視以預防感染
- 34 有關早產兒常發生的問題，下列敘述何者錯誤？
(A) 腦室內出血是因腦室周圍原生質 (germinal matrix) 部位血管較脆弱易破裂所導致
(B) 視網膜病變是因血氧過低或過高，使不成熟的視網膜血管收縮導致缺血
(C) 壞死性腸炎的主因是腸胃道生理結構與消化功能不成熟
(D) 呼吸窘迫症候群是因缺乏表面張力素造成肺擴張不全
- 35 有關病童死亡時，支持其家人哀傷的護理措施，下列敘述何者較為適當？
(A) 避免手足探訪，以免擔心害怕 (B) 提醒家庭成員勿表達自己的感情，避免彼此煩惱
(C) 營造讓病童的家人有時間與其獨處 (D) 強調痛苦的悲傷情緒，通常持續不到一年
- 36 有關高膽紅素血症新生兒的護理措施，下列何者最適切？
(A) 可即早餵食，使膽紅素正常排泄
(B) 應每 4 小時翻身一次，以增加照光的持續效果
(C) 照光時光源距離皮膚最佳的距離為 30~45 公分
(D) 出現黃疸時，立即暫停哺餵母乳
- 37 有關日本腦炎的症狀與處置，下列敘述何者錯誤？
(A) 傳播媒介為三斑家蚊為主 (B) 黃昏時刻避免至戶外，以防病媒蚊叮咬
(C) 預防感染需要隔離病患的血液和分泌物 (D) 前驅期會出現頭痛、倦怠的症狀

- 38 為病童執行抽吸 (suction) 技術時，下列護理處置何者最適當？
(A) 新生兒宜先抽鼻腔再抽口腔 (B) 抽吸前將生理食鹽水滴入氣管內管
(C) 嬰幼兒抽痰壓力應在 110~120 mmHg (D) 早產兒抽吸時間宜在 6~8 秒
- 39 有關細菌性肺炎 (bacterial pneumonia) 敘述，下列何者正確？
(A) 傳染性高，須採呼吸道隔離 (B) 聽診出現哮鳴音 (stridor)
(C) 痰液量多且黏稠 (D) 體溫正常或輕微上升
- 40 小光，3 個月大，診斷為法洛氏四重畸形，在矯正手術前，依醫囑給與 prostaglandin E₁ (PGE₁) 的理由，下列敘述何者正確？
(A) 使動脈導管維持開放，增加主動脈的血量 (B) 使動脈導管維持開放，增加肺動脈的血量
(C) 使動脈導管儘早關閉，減少肺動脈的壓力 (D) 使動脈導管儘早關閉，減少主動脈的壓力
- 41 下列何者為急性淋巴性白血病最有效之鑑別診斷？
(A) 血液檢查 (B) 骨髓抽吸檢查 (C) 淋巴組織切片檢查 (D) 腦脊髓液檢查
- 42 有關扁桃腺切除 (tonsillectomy) 術後飲食之護理指導，下列敘述何者適當？
(A) 可喝西瓜汁或番茄汁 (B) 可喝檸檬汁或柳橙汁 (C) 可吃布丁或冰淇淋 (D) 可喝無糖綠茶及咖啡
- 43 小琪，女嬰，新生兒篩檢診斷為先天性腎上腺增生症 (congenital adrenal hyperplasia, CAH)，護理師提供給小琪父母的護理指導，下列敘述何者最不適當？
(A) 教導父母觀察小琪有無脫水情形 (B) 若小琪合併醛固酮不足，應減少飲食的鹽分
(C) 確實監測小琪的身高和體重的變化 (D) 需要按時讓小琪服用皮質醇 (cortisone)
- 44 有關白血病病童接受化學治療期間，依醫囑注射 Rasburicase 及 Allopurinol 的目的，下列敘述何者正確？
(A) 預防卡氏肺囊蟲肺炎 (B) 預防腫瘤溶解症候群造成高尿酸血症
(C) 預防中樞神經系統白血病的復發 (D) 治療念珠菌感染引起的鵝口瘡
- 45 有關病童放置鼻胃管之護理照護，下列敘述何者較適當？
(A) 鼻胃管插入長度為由鼻尖至耳垂之直線距離
(B) 測試放置正確與否，可將鼻胃管末端浸入水中需出現氣泡
(C) 鼻胃管灌食的總量，不需考慮殘餘量
(D) 管灌結束後宜採右側半坐臥或坐姿，頭部抬高 30 度
- 46 王小美，5 歲，罹患巨結腸症 (megacolon)，進行腸道無神經節部位切除，有關術後之護理措施與指導，下列敘述何者錯誤？
(A) 定時評估其疼痛型態，必要時依醫囑給與止痛劑
(B) 教導並協助定時翻身，以預防肺炎或肺部擴張不全
(C) 術後觀察肛門狹窄及糞便失禁合併症
(D) 提供高纖飲食以促進早期排便
- 47 有關疫苗接種對象的敘述，下列何者最適當？
(A) 兒癌病童化療期間不宜接種水痘疫苗
(B) 體重 2,000 公克以上之新生兒，可接種卡介苗
(C) 靜脈注射免疫球蛋白的兒童需隔 4 週後才能接種疫苗
(D) 活性疫苗可接種於後天免疫缺乏症候群兒童
- 48 小妍，14 歲，被診斷為脊柱側彎 (scoliosis)，有關疾病特性和臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
(A) 彎腰時，雙側背部呈現明顯的突峰 (B) 站立時二邊肩膀高度不一
(C) 可用 Cobb 氏量角法評估脊柱側彎的嚴重度 (D) 骨盆傾斜
- 49 有關嬰幼兒呼吸系統解剖生理特徵，下列何者正確？
(A) 嬰幼兒肺泡數量較少，胸廓較小，因此年齡越小呼吸速率越慢
(B) 嬰幼兒的氣管較成人短，分叉處較高，比成人較易造成吸入性肺炎
(C) 耳咽管較成人短、窄、呈垂直，細菌易進入耳咽管，引發中耳炎
(D) 嬰幼兒肋骨位置較成人呈垂直，胸肋骨支持穩定性較小，採胸式呼吸
- 50 有關癲癇兒童接受生酮飲食療法，下列敘述何者正確？
(A) 提供高脂肪、高蛋白及低醣飲食
(B) 需要增加液體攝取，有助於酮的生成
(C) 酮 (ketones) 可製造較多的穩定性神經傳導物質，具有鎮定效果
(D) 多數用於抗癲癇藥物治療效果良好的兒童