

# 113年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、113年專技人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試

代 號：2111

類科名稱：臨床心理師

科目名稱：臨床心理學總論(一) (包括偏差行為的定義與描述、偏差行為的成因)

考試時間：2小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：本試題禁止使用電子計算器

## 一、申論題

※本題為申論題，請使用鍵盤及滑鼠輸入作答內容，由左至右橫式作答。

1. 目前對於偏差行為主要的定義包括：個人主觀不適感 (personal distress)、失能 (disability)、統計常模 (statistical norms) 或偏離社會常模 (violation of social norms)、跨文化/時代 (cross-culture and diagnostic practice)、具傷害性的失功能 (harmful dysfunction) 等觀點。

請任選以上其中兩個觀點，每一觀點各舉一個偏差行為作為例子，且討論此觀點之優缺點。(20分)

2. 請試舉三例說明跨診斷取向如何以心理病理的實驗研究成果來補充DSM診斷系統?(15分)

3. 關於佛洛伊德 (Sigmund Freud) 的精神分析論點，目前對人的心理行為之理論有那些主要的觀點與構念，請加以討論說明。(15分)

## 二、測驗題

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 為考量臨床的實用性，在定義精神疾患時，現今DSM-5對於文化議題所採取的概念，下列何者已被取代?

A. 文化依存症候群 (cultural-bound syndrome)

B. 文化症候群 (cultural syndrome)

C. 有關苦惱的文化用語 (cultural idiom of distress)

D. 文化的解釋或被認定的原因 (cultural explanation or perceived cause)

2. 有關DSM-5，下列敘述何者最不適當?

A. 診斷數量增加

B. 分類診斷的重新組織

C. 仍缺乏向度取向

D. 對症狀嚴重度的描述增加

3. 有關性別 (gender) 影響罹患精神疾病之敘述，下列何者錯誤?

A. 個體罹病的風險

B. 罹病的總體風險

C. 於疾病中的症狀表現

- D. 性別是常見的診斷準則
4. 關於診斷效度的要件，下列敘述何者錯誤？
- A. 可以暗示背後的病因
  - B. 可以預測治療效果
  - C. 可以預測病程
  - D. 可以維持診斷的穩定性
5. 研究人員挨家挨戶進行結構化診斷訪談，蒐集並探討特定精神病診斷資料來進行研究，上述為何種類型的研究？
- A. 個案研究法 (case studies)
  - B. 流行病學研究法 (epidemiological research)
  - C. 高危險群研究法 (high-risk method)
  - D. 實驗法 (experimental method)
6. 可以提供罕見或新奇案例的詳細資訊，以利後續產生假說，或更進一步經過控制性研究來驗證此假說。上述指何種研究法？
- A. 個案研究法 (case study method)
  - B. 相關研究法 (correlational method)
  - C. 類擬實驗法 (analogue experiment)
  - D. 整合分析法 (meta-analysis)
7. 關於多重基線設計 (multiple baseline design) 之敘述，下列何者最適當？
- A. 可以在同一時間點收集一組人的大量訊息
  - B. 是一種有系統性的資料蒐集與研究方式
  - C. 具良好之外在效度
  - D. 在實驗過程中針對同一目標行為反覆安排基線測量
8. 在某一實驗中，其實驗者決定選擇使用等候控制組 (wait-list control group) 而非無治療控制組 (a no-treatment control group) 來與實驗組進行比較，主要可能的好處是：
- A. 可以較快完成實驗程序
  - B. 可讓所有受試者皆可獲得治療
  - C. 不需進行隨機分派 (random assignment)
  - D. 可以減少練習效果 (practice effect) 的影響
9. 受試者不知道他們所屬的研究組別 (實驗組或是對照/控制組) 或是他們是被給予何種的治療，研究執行人員或提供治療的治療師也是如此，此研究設計為下列何者？

- A. 單盲設計 (single-blind design)
  - B. 雙盲設計 (double blind design)
  - C. 交叉設計 (crossover design)
  - D. 同步設計 (concurrent design)
10. 流行病學的研究普遍存在下列何種問題？
- A. 都是實驗法的研究
  - B. 只能測到發生率，無法測到盛行率
  - C. 取到的樣本可能不具代表性
  - D. 不使用大學生做樣本
11. 在ABAB研究設計中，若獎勵方式可增加受試兒童專心做家庭作業的行為，下列敘述何者正確？
- A. 該行為在各個A階段出現不穩定的行為模式
  - B. 該行為在所有B階段明顯較A階段提升
  - C. 該行為在所有A階段明顯較B階段提升
  - D. 該行為在各個B階段出現不穩定的行為模式
12. 下列何者為單一受試者實驗設計 (single-subject experimental designs) 的優點？①可控制內在效度 (internal validity) ②可控制外在效度 (external validity) ③個人特殊面向 (a unique aspect) 可以被深入探討 ④實驗結果可幫助研究人員決定是否需要進行團體實驗
- A. ①②③
  - B. ①②④
  - C. ②③④
  - D. ①③④
13. 依據DSM-5，關於神經認知障礙症 (neurocognitive disorders, NCD) 的敘述，下列何者正確？
- A. 額顳葉NCD病患中，語言不流暢症狀 (nonfluent language-variant) 的盛行率男性比女性高
  - B. 男性和女性在路易氏體NCD的盛行率比為3比1
  - C. 約有27%的巴金森氏症病患有輕度的NCD
  - D. 女性的血管型NCD盛行率高於男性
14. 下列那一位個案對於「沒考上研究所」的歸因方式，最有可能促成他在考試失利後產生絕望型憂鬱 (hopeless depression) ？
- A. 我的頭腦不好
  - B. 考試範圍對我來說實在太多，來不及準備
  - C. 紙筆測驗讓我焦慮度太高，所以失常

- D. 我可能不適合這個領域
15. 下列何項因子是飲食疾患關鍵的危險因子？
- A. 高酬償敏感度 (reward sensitivity)
  - B. 高內在體感覺察 (interoceptive awareness)
  - C. 高完美主義傾向 (perfectionism)
  - D. 高情緒表露 (expressed emotion)
16. 文化概念對於精神疾病的診斷具有重要性，下列原因何者錯誤？
- A. 可以避免做出錯誤診斷
  - B. 可以改善臨床投契關係
  - C. 可以澄清文化流行病學
  - D. 文化概念不隨時間改變
17. 欲研究「焦慮症患者是否更容易將注意力投注在負向線索中？」的議題，下列何項是最適合選用的研究工具？
- A. 空間廣度測驗 (Spatial Span task)
  - B. 情緒史處普叫色作業 (emotional Stroop task)
  - C. 記憶廣度測驗 (Digit Span task)
  - D. 台大3-8注意力測驗
18. 下列那一個研究方式不屬於「類擬實驗 (analogue experiment)」？
- A. 研究暴露在電擊下而無法逃脫的狗之行為反應
  - B. 將參與者分派到接受某種藥物或安慰劑，比較其情緒症狀的改變程度
  - C. 選擇在自陳式憂鬱程度問卷中得分偏高的大學生為參與者，比較他們與一般健康人的認知功能差異
  - D. 讓參與者大量運動而引發與恐慌發作相似的生理反應
19. 關於 A. Harvey 等人 (2004) 的跨診斷取向觀點與DSM診斷系統的比較，下列何者最適當？
- A. 兩者都強調以連續向度來分析偏差行為
  - B. 兩者都強調偏差行為的文化與社會背景
  - C. 相較之下，跨診斷取向比較重視實徵證據，特別是訊息處理歷程中的認知特徵
  - D. 相較之下，DSM 診斷系統比較強調功能分析 (functional analysis) 的結果
20. 在焦慮性疾患的討論中，許多研究指出這類病患有長期的肌肉緊張 (muscle tension) 反應，係指何類焦慮疾患？
- A. 恐慌疾患 (panic disorder)
  - B. 創傷後壓力疾患 (PTSD)

- C. 社交畏懼症 (social phobia)
- D. 廣泛性焦慮疾患 (GAD)
21. 下列何者不屬於阿茲海默病 (Alzheimer's disease) 造成的神經認知疾患 (neurocognitive disorder) 所呈現的神經病理變化 (neuropathological changes) ?
- A. 腦皮質萎縮 (cortical atrophy)
- B. 腦血管發炎 (vasculitis)
- C. 澱粉樣蛋白為主的神經炎斑塊 (neuritic plaques)
- D. Tau蛋白為主的神經纖維糾結 (neurofibrillary tangles)
22. 下列何項疾患之遺傳性 (heritability) 的估計為最高?
- A. 恐慌症
- B. 廣泛性焦慮性疾患
- C. 創傷後壓力症候群
- D. 蜘蛛恐懼症
23. 有關創傷後壓力症候群 (post-traumatic stress disorder, PTSD) 患者之腦造影的研究發現, 下列何者正確?
- A. 海馬迴體積萎縮極可能在PTSD診斷前即已發生
- B. 嚴重的創傷事件是導致海馬迴體積萎縮的最直接原因
- C. 女性患者的海馬迴體積萎縮情況, 往往比男性患者嚴重
- D. 女性同卵雙胞胎患者海馬迴萎縮情況, 較女性異卵雙胞胎患者嚴重
24. 正子發射掃描 (PET) 顯示思覺失調症病人:
- A. 額葉較活躍
- B. 前額葉較不活躍
- C. 腦部比較大
- D. 腦室比較小
25. 與正常兒童相比較, 注意力不足過動症的腦部影像研究顯示, 下列何者為主要異常腦區? ①amygdala ②globus pallidus ③frontal lobe ④hippocampus
- A. ①②
- B. ②④
- C. ②③
- D. ③④
26. 下列何者與腦中多巴胺 (dopamine) 含量過低關係最密切?

- A. 肌肉僵硬與顫抖
- B. 思覺失調症
- C. 追求愉悅感
- D. 探索行為

27. 有關反社會型人格障礙症的診斷與相關研究發現，下列敘述何者錯誤？

- A. 患者在十五歲前即有行為規範障礙症（conduct disorder）的證據
- B. 診斷上，患者須至少年滿十八歲
- C. 症狀表現可能隨年齡增長變得不明顯或緩解
- D. 與遺傳（基因）因素間的關係不明顯

28. 根據DSM-5，下列何種類群人格障礙症患者通常顯得焦慮或害怕？

- A. A群
- B. B群
- C. C群
- D. D群

29. 下列何者不是自閉症類群障礙症兒童的特徵？

- A. 持續的社交溝通與社會互動障礙
- B. 侷限的重複行為、興趣或活動模式
- C. 症狀多始於小學學齡階段
- D. 症狀會限制及干擾目前功能

30. 關於抽搐症，下列敘述何者錯誤？

- A. 症狀會隨焦慮或疲憊因素惡化
- B. 症狀在平靜和集中精神的狀態會減緩
- C. 症狀在激動或壓力事件中會惡化
- D. 患者的日常生活功能會受到嚴重影響

31. 關於創傷後壓力症的成因與認知特徵，下列敘述何者錯誤？

- A. 創傷嚴重度與症狀的發展明顯相關
- B. 人為的創傷比自然災害更可能促發症狀
- C. 患者主動搜尋與回憶創傷事件
- D. 患者可能因解離性失憶而無法記得創傷事件的重要情節

32. 下列何者不是憂鬱症的人際素質？

- A. 高度尋求再保證

- B. 缺乏社交能力
  - C. 社會支持網絡貧乏
  - D. 缺乏情緒表露
33. 目前研究指出，當出現童年心理創傷，包括性虐待或身體虐待等，較少見的心理疾患是：
- A. 邊緣型人格疾患 (borderline personality disorder)
  - B. 身體型疾患 (somatoform disorder)
  - C. 恐慌疾患 (panic disorder)
  - D. 思覺失調症 (schizophrenia)
34. 有關診斷性格疾患具有低信度 (reliability) 之敘述，下列何者正確？
- A. 被診斷有性格疾患的人往往在日常生活功能上與常人無異
  - B. 不同臨床工作者對於病人是否符合診斷難達成共識
  - C. 大多數目前符合診斷的病人在日後追蹤時已經痊癒
  - D. 某一類群性格疾患的人往往也具有其他類群性格疾患
35. 為何心理病理學要特別探討成人的脆弱性，下列敘述何者錯誤？
- A. 有些成年期心理疾病的脆弱因子並非只源自於童年期，而是成年期才經歷的
  - B. 有些成年期心理疾病的脆弱因子源自於潛在基因，但是於成年期才被誘發
  - C. 某些疾病反覆發作的點燃現象 (kindling phenomenon) 在成年期更加顯著
  - D. 成年期的脆弱因子通常難以改變，因此更須留意
36. 下列何者不是飲食障礙症較常共病的人格障礙症？
- A. 戲劇型人格障礙症
  - B. 邊緣型人格障礙症
  - C. 逃避型人格障礙症
  - D. 依賴型人格障礙症
37. 為了讓兒童出現的新行為可以持續更久，可採取那種策略？
- A. 連續增強
  - B. 間歇增強
  - C. 物質性增強
  - D. 區辨性增強
38. 依據精神疾病診斷及統計手冊第五版 (DSM-5)，有關智能障礙 (intellectual disability) 的敘述，下列何者正確？
- A. 是患者在生命週期任一時間點出現的智能或適應功能之缺損

- B. 患者的功能缺損可分為概念、社會與實務等向度
  - C. 患者在智能上的缺損包括無法承擔社會責任
  - D. 患者在概念上的缺損包括進行自我照顧
39. 小美在罹患思覺失調症的母親養育下成長，國中又遭受嚴重霸凌，可能因壓力分泌過量的多巴胺，使其在高二開始出現正性症狀。有關小美的心理病理機制，下列何種理論最能完整解釋前述情況？
- A. 精神分析學派
  - B. 素質－壓力模式
  - C. 認知行為理論
  - D. 客體關係理論
40. 存在主義主張：「只要抱持一個存在的理由，便能忍受無數惡劣環境。」以心理病理學素質－壓力模式（diathesis-stress paradigm）觀之，抱持「存在的理由」是防止個體崩潰之何種因素？
- A. 心理素質
  - B. 心理壓力
  - C. 生理素質
  - D. 生理壓力